ASTRONOMIE

Joseph Jérôme Le Français de Lalande

Digitized by Google

U3 2920 A850 -2

UB Augsburg
N8<28272863
N8<28272863

4° Astr. m. 203-2

Digitized by Google

2. Ex.

XIII. c- 12

Neue Signatur:
N VI c 1

<36624574180012 S

<36624574180012

Bayer. Staatsbibliothek

Digitized by Google

Digitized by Google

ASTRONOMIE,

PAR M. DE LA LANDE.

TOME SECOND.



Digitized by Google

ASTRONOMIE.

PAR M. DE LA LANDE.

Bayerische
Staatsbibliothek
München

Digitized by Google

ASTRONOMIE,

PAR M. DE LA LANDE,

Lecteur Royal en Mathématiques ; de l'Académie Royale des Sciences de Paris ; de celles de Londres, de Pétersbourg, de Berlin, de Stockholm, de Bologne, &c. Censeur Royal.

SECONDE ÉDITION REVUE ET AUGMENTÉE.

TOME SECOND.

A PARIS,

Chez la Veuve DESAINT, rue du Foin Saint Jacques.

M. DCC. LXXI.

AVEC PRIVILEGE DU ROI.

Digitized by Google

ausgeschieden
UB Augsburg
17. Feb 1993

Digitized by Google

ASTRONOMIE.

LIVRE SIXIEME.

DES LOIX DU MOUVEMENT des ſix Planètes principales vues du Soleil, & de leurs élémens; c'eſt-à-dire, de la figure & de la ſituation de leurs orbites.

PUISQUE les planètes tournent autour du ſoleil, de même que la terre (1104); c'eſt au centre du ſoleil qu'on doit ſuppoſer un obſervateur pour lui faire voir les mouvemens les plus uniformes, & lui en faire connoître les circonſtances & les meſures; c'eſt pour cela que M. de la Caille en commençant ſes leçons élémentaires d'aſtronomie, ſuppoſe d'abord que ſon obſervateur ſoit placé préciſément au centre du ſoleil, pour conſidérer de-là le mouvement régulier des planètes & des comètes parmi les étoiles, toujours fixes & immobiles; & il paſſe auſſi-tôt à la recherche des loix des mouvemens planétaires: pour moi j'ai mieux

aimé conſidérer l'aſtronomie dans ſes premiers élémens ; ſuivre les progrès lents & ſucceſſifs de ceux qui l'ont perfectionnée, & ne parler des planètes vues du ſoleil, qu'après avoir montré que c'eſt autour de lui qu'elles tournent.

Utilité des oppoſitions & des conjonctions.

1201. Pour déterminer les mouvemens vus du ſoleil, il falloit un moyen d'avoir la longitude d'une planète, telle qu'on l'obſerveroit vue du ſoleil ; c'eſt ce qu'on a trouvé dans les *oppoſitions* des planètes ſupérieures, Mars, Jupiter & Saturne, & dans les *conjonctions inférieures* de Vénus & de Mercure (1152) ; en effet, quand une planète eſt oppoſée au ſoleil, le lieu de l'écliptique où elle répond, eſt ſur une même ligne droite avec le ſoleil & la terre ; ainſi le lieu de la planète vu du ſoleil, ou le lieu vu de la terre, eſt abſolument le même : ſi la terre eſt en *N* (*fig.* 56), & la planète en *A* oppoſée au ſoleil *S*, le point du ciel où aboutit la ligne *SNA*, marque le lieu héliocentrique (1140), auſſi bien que le lieu géocentrique de la planète *A*.

Planche V. Fig. 56. Tome I.

Auſſi les aſtronomes ont-ils ſoin d'obſerver aſſiduement les oppoſitions des planètes, comme les circonſtances les plus eſſentielles de leurs mouvemens ; parce qu'alors l'obſervation faite ſur la terre, tient lieu d'une obſervation faite dans le ſoleil, & ſert à reconnoître l'orbite que la planète décrit autour du ſoleil. C'eſt avec des longitudes héliocentriques ou vues du ſoleil que nous avons déterminé les moyens mouvemens des planètes (1153), & que nous allons déterminer encore les orbites planétaires, les circonſtances & les inégalités de leurs mouvemens : on trouvera dans le XXIVe livre la maniere de calculer une oppoſition par le moyen des obſervations d'une planète ; & nous rapporterons à la fin de ce VIe livre les oppoſitions ou les conjonctions obſervées le plus exactement, qui ſont les plus propres à déterminer les élémens des orbites planétaires, & dont les aſtronomes ſe ſont ſervi juſqu'à préſent. Le moyen mouvement eſt le plus eſſentiel de tous les élé-

mens d'une planète ; mais nous en avons déja donné le détail dans le Ve livre, il nous reſte à parler de la figure des orbites, des excentricités, des diſtances, des aphélies, des nœuds, des inclinaiſons & des diamètres de chacune des ſix planètes principales.

DE LA FIGURE DES ORBITES PLANETAIRES.

1202. APRÈS avoir trouvé combien de temps les planètes emploient à terminer leurs révolutions autour du ſoleil, il faut rechercher les circonſtances de leur mouvement dans les différentes parties de chaque révolution, ou ces inégalités périodiques dont il a déja été queſtion pour le ſoleil dans le IVe livre (869), & qui dépendent de la figure des orbites planétaires.

Le mouvement de chaque planète étant rapporté au ſoleil, ou obſervé dans les temps où les apparences ſont les mêmes, vues de la terre & vues du ſoleil, eſt ſujet à une inégalité (ſemblable à celle du mouvement apparent du ſoleil), c'eſt celle que les anciens appelloient *premiere inégalité* (a); pour l'expliquer on ſe ſervoit ou d'un épicycle, ou d'un cercle excentrique (865, 1068); ces deux hypothèſes étoient abſolument équivalentes, comme nous l'avons fait voir.

1203. Ptolomée fit choix de l'excentrique *NHBCP* (*fig.* 24.) pour exprimer cette *premiere inégalité*, ou l'équation des planètes dans leur orbite, il y trouvoit plus de clarté ; & d'ailleurs il employoit enſuite l'épicycle pour repréſenter la *ſeconde inégalité* ; ſon hypothèſe a été expliquée (1068), elle conſiſtoit à faire mouvoir la planète dans un cercle, de maniere que le mouvement fût égal, non pas vu du centre *E*, mais vu d'un autre *Fig.* 24.

(a) La ſeconde inégalité étoit celle de la parallaxe du grand orbe, (1067, 1141), ou des ſtations & des rétrogradations (1181), qui étant relative au ſoleil ne pouvoit ſe déterminer qu'après avoir connu celle qui avoit lieu dans les oppoſitions.

point *K*, il ne donne ni démonſtration, ni obſervation pour la juſtifier, & dans le fait, les anciens n'avoient pas, ce me ſemble, des raiſons bien déterminantes pour mettre le centre d'égalité hors du centre du cercle décrit par la planète, nous nous contenterons donc d'expliquer ſon hypothèſe, tel qu'il la donne, (liv. IX. c. 5.) pour faire connoître enſuite la maniere dont Képler s'en ſervit pour découvrir l'ellipticité des orbites planétaires (1208).

Hypothèſe de Ptolomée pour la premiere inégalité.

1204. Du centre *B* (*fig.* 64), ſoit décrit le cercle excentrique *DEF*, dont l'excentricité ſoit *BA*, en ſorte que la terre ou l'œil du ſpectateur ſoient placés en *A*; *D* ſera l'apogée, *F* le périgée; ſi l'on prend au-deſſus du centre *B* une ligne *BC* égale à *BA*, le point *C* ſera celui autour duquel Ptolomée ſuppoſe que la planète décrit des angles égaux en temps égaux, ou le point d'où ſon mouvement paroîtroit uniforme, *Punctum æquantis*, le point d'égalité. Copernic rejetta cette hypothèſe, (*liv. IV. chap.* 7. & *liv. V. chap.* 4.), parce qu'elle péchoit contre les principes de la phyſique de ſon temps, où l'on ne vouloit que des mouvemens uniformes, & où l'on admettoit encore les orbites ſolides que Tycho-Brahé renverſa dans la ſuite par la conſidération des comètes.

Fig. 64.

Point d'égalité.

Tentatives de Tycho.

Tycho-Brahé voulant perfectionner cette hypothèſe de Ptolomée, chercha ſi en rendant *CB* différente de *BA*, on ne parviendroit pas à mieux repréſenter les inégalités qu'il obſervoit dans les planètes, mais Képler fit voir dans la ſuite que tout cela étoit inſuffiſant; & ce fut ce qui le conduiſit à trouver la véritable figure des orbites planétaires, comme nous allons l'expliquer. Riccioli a remarqué qu'avant Képler, Reinholdus à la fin des Théoriques de Purbachius avoit donné une figure ovale pour l'orbite lunaire, (*Almag. I.* 149); il n'en falloit pas davantage pour donner à Képler l'idée de rechercher ſi la figure des orbites planétaires étoit exactement circulaire; & Mars étoit, de toutes les planètes, la plus propre à cette recherche.

1205. Nous avons vu (493) que les premieres étincelles du génie de Képler parurent dans le livre qui a pour titre, *Myſterium Coſmographicum*, en 1596. Ce premier eſſai fut applaudi par *Mæſtlinus* ſon ancien maître, & par Tycho-Brahé qui en 1597 lui en témoigna de la ſatisfaction, & lui inſpira l'envie de s'appliquer aux obſervations & aux recherches d'aſtronomie. Képler, ayant ſu en 1600 que Tycho avoit abandonné ſon iſle (474), & s'étoit retiré en Bohême, vint le trouver pour converſer avec lui, & lui demander ſur-tout les réſultats de ſes obſervations ſur les excentricités des planètes, ſur leſquelles Tycho avoit déja beaucoup travaillé, (Képler, *de ſtella Martis*, *pag.* 53).

Circonſtance heureuſe pour Képler.

Une heureuſe circonſtance fit alors la deſtinée de Képler; Tycho-Brahé, & Longomontanus qui demeuroit avec lui, s'occupoient des obſervations de Mars, & dreſſoient une table de ſes oppoſitions moyennes depuis 1580; cette planète étoit la plus propre de toutes à faire pénétrer ce grand homme dans les ſecrets de la phyſique céleſte, & elle ſe préſenta la premiere à lui comme par haſard; il apperçut des difficultés, il s'attacha à les vaincre, & c'eſt-là l'époque où il faut remonter pour connoître l'origine de notre phyſique céleſte.

1206. Tycho avoit formé une hypothèſe qui repréſentoit, à quelques minutes près, toutes les obſervations de Mars, au moyen d'un excentrique, en plaçant le point *A* & le point *C* (*fig.* 64), à des diſtances différentes par rapport au centre *B*; Képler ſavoit déja que l'excentrique pouvoit s'accorder, à cinq minutes près, avec les obſervations, & malgré cela l'hypothèſe lui paroiſſoit peu vraiſemblable; il s'occupa à diſcuter ces obſervations pour en tirer, s'il étoit poſſible, quelque choſe de plus exact: ce fut alors que commencerent les recherches qui ſe trouvent détaillées dans ſon grand ouvrage intitulé, (*Aſtronomia nova* Αἰτιολογήτος, *ſeu Phyſica cœleſtis, tradita Commentariis de motibus Stellæ Martis, ex obſervationibus C. V.* TYCHONIS-BRAHE; *Pragæ*,

Fig. 64.

Ouvrage de Képler, *de Stella Martis*.

1609. *in-fol.* 337. pages.). Je vais donner un extrait de cet ouvrage célebre, mais un aſtronome doit le lire en entier : parmi les ſuperfluités, les longueurs, les tentatives inutiles qui y ſont détaillées, on y voit une marche lumineuſe & des traits de génie qui donnent la plus grande ſatisfaction.

1207. Le premier pas qu'il falloit faire dans cette carriere, étoit de trouver les diſtances de la terre au ſoleil, qui ſervent d'échelle & de terme de comparaiſon pour toutes les autres diſtances que l'on meſure dans le ciel. Pour avoir les diſtances de la terre en divers temps de l'année, il falloit trouver l'excentricité *AB*, (*fig.* 64) de l'orbite terreſtre, c'eſt-à-dire, la diſtance entre le centre du ſoleil ſuppoſé en *A*, & le véritable centre du cercle *DEF* décrit par la terre. Les anciens avoient toujours cru, & Tycho-Brahé lui-même le croyoit, que pour l'orbite du ſoleil ou de la terre, le centre *B* étoit le point d'égalité autour duquel les mouvemens de la terre paroîtroient uniformes, & que la ligne totale *AC*, qui ſert de baſe à l'équation du centre ou à l'angle *CEA* étoit au-deſſous du centre *B*, ou de *B* en *a*; c'étoit la premiere choſe qu'il falloit diſcuter; & Képler reconnut bientôt la biſſection de l'excentricité, c'eſt-à-dire, qu'il vit que le centre *B* du cercle décrit par la terre occupoit le milieu de l'excentricité totale *CA*, & qu'il étoit entre le point *A* où eſt le ſoleil & le point *C*, où il faudroit être pour appercevoir des mouvemens uniformes de la terre ou des angles égaux en temps égaux.

Fig. 64.

Biſſection de l'excentricité.

1208. Képler avoit eſſayé d'expliquer phyſiquement la cauſe de l'*Equant* (1204), la cauſe pour laquelle il y avoit un point *C*, (différent du centre *B*), autour duquel on avoit un mouvement régulier & uniforme, (*Myſter. Coſmogr. c.* 22); c'eſt pourquoi il étoit porté d'avance à croire que la cauſe étoit générale, & que l'*Equant* devoit avoir lieu dans le mouvement de la terre autour du ſoleil, comme dans celui des autres planètes : Ptolomée & Copernic ne l'avoient point

employé, ils s'étoient contenté d'un ſimple excentrique, (865), mais Képler fut perſuadé qu'ils avoient tort, ſur-tout en 1598, lorſque Tycho lui eût écrit que *l'orbe annuel, ou l'excentrique du ſoleil lui paroiſſoit n'être pas toujours de la même grandeur.* En effet, quand Tycho ſuppoſoit le mouvement du ſoleil uniforme autour du centre *B*, & la terre en *A*, qu'enſuite il déterminoit l'excentricité par le moyen de l'équation de l'orbite *AEC*, qui lui faiſoit trouver une excentricité *AC*, il prenoit le reſte *CD* du diamètre total *FD* pour rayon du cercle, mais *CD* étoit différent du rayon *BD* qu'il avoit d'abord ſuppoſé; il devoit donc trouver les rayons de l'orbite ſolaire différens entre eux, & croire que le ſoleil n'étoit pas toujours à même diſtance par rapport au centre de l'excentrique; cela indiquoit à Képler que ce centre n'étoit pas le point autour duquel le mouvement régulier avoit lieu, (*de Stella Martis, pag. 125*). Ce fut pour s'en aſſurer que Képler rechercha par obſervation, quelle étoit la parallaxe annuelle de Mars (1141) dans deux poſitions de la terre diamétralement oppoſées, dans l'aphélie & le périhélie, ou à peu-près, en obſervant chaque fois Mars en quadrature vers le même point de ſon orbite.

Képler recherche l'excentricité du Soleil.

1209. Képler ſuppoſant d'abord, à l'exemple de Tycho, que l'orbite du ſoleil étoit un cercle dont le centre *B* étoit le point d'égalité, devoit néceſſairement trouver ce cercle plus grand, ou plus petit, en le comparant aux autres planètes. Soit *S* le centre du ſoleil, (*fig. 65*), *M* le lieu de Mars dans ſon orbite, obſervé deux fois lorſque la terre étoit en *D* & en *E*, & Mars au même point *M* de ſon orbite, c'eſt-à-dire après la durée d'une révolution ou de pluſieurs, (connue par les retours des oppoſitions); le point *M* étoit choiſi de maniere que les angles *MCD* & *MCE* étoient des angles droits; le point *C* étant celui autour duquel la terre devoit paroître ſe mouvoir uniformément. Tycho, à l'exemple de Ptolomée, ſuppoſoit que les mouvemens moyens du ſoleil décidoient ſeuls de la

Fig. 65.

Fig. 65. seconde inégalité, qu'elle ne disparoissoit que quand la planète étoit opposée au lieu moyen du soleil, & qu'elle étoit égale à égale distance entre la planète & le lieu moyen du soleil; ainsi CD & CE étant égales, comme Tycho-Brahé le pensoit, & les angles C étant droits, les angles DMC, CME, (que nous appellons les parallaxes annuelles de Mars), devoient être les mêmes, mais comme CE étoit véritablement plus grande que CD, parce que le point d'égalité n'est point en B, mais en C, l'angle CME se trouvoit être plus grand que l'angle CMD, & celui qui s'obstinoit à supposer toujours que le rayon BD du cercle étoit la base de cet angle-là, étoit réduit à dire que le rayon du cercle décrit par la terre, n'étoit pas toujours de la même grandeur; c'est ce que Tycho écrivoit à Képler, & ce qui persuada ce dernier qu'il falloit mettre en C, & non pas au centre B du cercle de la terre, le point d'égalité (1068, 1204. *Képler*, *pag.* 125).

1210. Képler soupçonna donc que cette variation dans la grandeur du rayon de l'excentrique de la terre, introduite par Tycho, provenoit de ce que le point d'égalité C, autour duquel on comptoit les angles de commutation, ne devoit pas être le centre du cercle. Pour s'en assurer il choisit deux observations, faites le 18 Mai 1585, & le 22 Janvier 1591; il les réduisit, (par le calcul des mouvemens de Mars, connus assez exactement pour un intervalle de quelques jours), au 30 Mai 1585, & 20 Janvier 1591, jours où la longitude de Mars calculée par Tycho, étoit également de $6^s\ 13^\circ\ 28'$, & où les angles de commutation MCD & MCE étoient l'un & l'autre de $64^\circ\ 23'\frac{1}{2}$; les longitudes de Mars, suivant l'observation, étoient $5^s\ 6^\circ\ 37'$ & $7^s\ 21^\circ\ 34'$; ainsi les parallaxes annuelles CMD, CME, ou les différences entre les longitudes héliocentriques calculées, & les longitudes géocentriques observées, étoient $36^\circ\ 51'$ dans la premiere, & $38^\circ\ 6'$ dans la seconde observation, (*Képler*, *pag.* 128). Ces parallaxes ainsi différentes de $1^\circ\ 15'$, quoique les anomalies

malies de commutation ou les angles MCT, & MCR, fuſſent égaux, prouvoient que la ligne CR étoit plus grande que CT, & CE plus grande que CD ; ainſi le point d'égalité, autour duquel les mouvemens de la terre ſont ſenſiblement uniformes, & auquel ſe rapportoient les commutations égales MCE, MCD, ſuivant la méthode de Tycho, n'étoit pas le centre B de l'orbite terreſtre, mais un point C placé de l'autre côté du centre.

1211. Képler trouva auſſi, par le moyen des triangles TCM, RCM, ou des parallaxes de Mars que nous venons de rapporter, la diſtance BC de 1837 parties, dont le rayon BD étoit cent mille, (*Kepler, pag. 130.*) : or, Tycho avoit déterminé par beaucoup d'obſervations, que la diſtance totale CS du ſoleil au centre d'égalité, qui répond à l'équation du centre du ſoleil étoit de 3584 ; il vit donc bien que le centre du cercle décrit par la terre, étoit entre le ſoleil S & le point d'égalité C, puiſqu'il venoit de trouver CB à peu-près égal à la moitié de CS.

C'étoit une découverte importante que d'avoir démontré ainſi la biſſection de l'excentricité pour la terre, tandis que les anciens ne l'admettoient que pour les planètes ſupérieures ; ſans cela on ne pouvoit déterminer exactement les diſtances de la terre au ſoleil en différens temps de l'année, fondement eſſentiel de toutes les recherches ſuivantes.

Aprés avoir déterminé la poſition du centre d'égalité, (*Puncti æquantis*), pour l'orbite de la terre, Képler ſongea à le déterminer auſſi pour l'orbite de Mars, c'eſt-à-dire à déterminer ſon excentricité : voici la méthode qu'il employoit ; nous nous contenterons d'en donner une idée, le détail en ſeroit trop long ; on pourra le voir dans l'ouvrage cité, où toutes ſes tentatives, ſes calculs, ſes ſoupçons, ſes erreurs, ſes découvertes, ſont expliqués fort au long.

Il recherche l'excentricité de Mars.

1212. Soit B, (*fig. 66.*) le centre de l'excentrique de Mars, $HBAI$ la ligne des apſides, ſoit A le centre *Fig. 66.*

Fig. 66. du ſoleil, & *C* le point autour duquel les mouvemens de la planète ſeroient uniformes; *F*, *G*, *D*, *E*, quatre longitudes de Mars obſervées, lorſque cette planète étoit en oppoſition, & que la ſeconde inégalité étoit nulle; Képler ſe propoſe le problême ſuivant: trouver les angles *FAH*, *FCH*, tels que les quatre points *F*, *G*, *D*, *E*, ſoient dans un cercle, & que le centre *B* de ce cercle ſoit entre les points *C* & *A*, c'eſt-à-dire, l'angle *BAD* égal à l'angle *CAD*: Képler ne réſolvoit le problême que par une double fauſſe poſition: il ſuppoſoit d'abord qu'on connût la diſtance *CA* avec les angles *FCH* & *FAH*; il calculoit par la Trigonométrie toutes les autres parties de la figure, pour ſavoir ſi à la fin du calcul les quatre angles formés en *A* ſe trouveroient égaux à 360°, & les trois points *A*, *B*, *C*, ſur une même ligne; dans ce cas tout étoit connu; ſinon il ne s'agiſſoit que de recommencer le calcul avec d'autres ſuppoſitions, (*Képler*, *pag.* 93).

Ses tentatives.

1213. Képler nous apprend, (pag. 95), qu'il fit de ſemblables calculs plus de 70 fois, avant de parvenir à reconnoître que le cercle ne pouvoit ſatisfaire ſeul aux obſervations. Après cela, dit-il, on ne s'étonnera pas que j'aie paſſé cinq ans à établir la théorie de Mars; & l'on me plaindra plutôt d'avoir ſupporté l'ennui d'un ſemblable travail: en effet, un ſeul exemple que rapporte Képler de cette méthode, remplit dix pages de calcul dans le volume *in-fol.* que nous venons de citer; il trouva par ce moyen un cercle qui approchoit aſſez des quatre obſervations.

L'hypothèſe circulaire d'accord avec les oppoſitions.

1214. Après avoir trouvé par-là toutes les dimenſions de l'excentrique de Mars, Képler calcula dans cette hypothèſe circulaire 12 oppoſitions de Mars obſervées par Tycho, & il n'en trouva aucune qui s'écartât de ſon calcul de plus de $1' \frac{1}{4}$. On s'étonnera, dit-il, qu'une hypothèſe ſi bien d'accord avec les 12 oppoſitions, ſoit fauſſe; c'eſt cependant ce qu'il démontre enſuite, ſoit par les latitudes de Mars, ſoit par

les longitudes de cette planète obſervées dans d'autres ſituations : au reſte, les obſervations de Tycho-Brahé étant néceſſairement expoſées à une erreur de 2′, au jugement même de Képler, c'étoit véritablement les avoir repréſentées avec toute la perfection poſſible, que d'avoir évité des erreurs de 2′, (*Képler, pag. 110*); ainſi les oppoſitions ne ſuffiſoient pas pour reconnoître la figure de l'orbite de Mars. Le cercle excentrique par le moyen duquel Képler repréſentoit ſi bien les 12 oppoſitions, avoit pour excentricité totale $AC = 18364$, mais AB étoit de 11332 & BC de 7232 ſeulement, en ſuppoſant la diſtance de la terre 100000.

1215. Cependant Képler étoit perſuadé d'ailleurs que AB devoit être égal à BC, parce qu'il y entrevoyoit une cauſe phyſique; outre cela, l'hypothèſe qui repréſentoit très-bien les longitudes de Mars en oppoſition, ne ſatisfaiſoit ni aux latitudes obſervées en même temps, ni aux longitudes obſervées hors des oppoſitions, parce que les diſtances de Mars au ſoleil, comme AF, AE, étoient défectueuſes dans l'hypothèſe circulaire que Képler venoit d'examiner, quoique les angles ne le fuſſent pas, en ſuppoſant AB (*Excentricitas excentrici*), de 11332 & BC, (*Excentricitas æquantis*), de 7232. Les diamètres des épicycles dans la forme de Copernic & de Tycho, étoient ſuivant ſes calculs de 3616 & 14948; celui-ci eſt égal à l'excentricité totale 18564 moins la moitié de la petite excentricité 7232, ou le milieu entre B & C, parce qu'il faut que les deux rayons d'épicycle faſſent entre eux la plus grande excentricité poſſible. La parallaxe annuelle qui dépend de ces diſtances de Mars au ſoleil, étoit fauſſe, lorſque l'on faiſoit $AB = BC$, comme paroiſſoient l'exiger ces autres obſervations, & l'erreur alloit quelquefois à 8′, (pag. 114). Si Képler avoit regardé une erreur de 8′ comme négligeable, il en ſeroit demeuré-là, ainſi qu'avoit fait Tycho-Brahé; mais perſuadé que ces 8′ d'erreur prouvoient la fauſſeté de l'hypothèſe circulaire, il ſongea à s'aſſurer des diſtances de Mars au ſoleil,

Inſuffiſance pour les diſtances.

& ce furent ces diſtances qui lui firent enſuite connoître que l'orbite de Mars n'étoit pas un cercle parfait (1219). Ces recherches forment la plus grande partie de ſon ouvrage *de Stella Martis* : nous ne faiſons, pour ainſi dire, que l'hiſtoire ou l'extrait de ce livre ; mais auſſi ce livre ſeul contient le germe & les fondemens de toute l'aſtronomie ; notre objet ayant été de préſenter la marche des Inventeurs & l'hiſtoire de l'eſprit humain, nous ſuivons l'ouvrage où elles ſe trouvent totalement pour la partie & pour l'époque dont il s'agit.

1216. Képler avoit déterminé d'abord les diſtances de la terre au ſoleil (1211), il chercha enſuite les diſtances de Mars au ſoleil en trois points de ſon orbite, avec ſes longitudes vues du ſoleil, afin d'avoir non-ſeulement la figure, mais encore la grandeur de cette orbite ; nous allons rapporter ſa méthode qui étoit très-bien imaginée, & très-propre à déterminer exactement ces diſtances. Keill attribue cette méthode à M. Halley, qui n'a vécu que long-temps après. (*Inſtit. aſtronom. pag.* 515).

Méthode pour trouver les diſtances de Mars au Soleil.

Planche VI.

Fig. 67.

Soit S, (*fig.* 67.) le centre du ſoleil, M celui de Mars, B, C, deux points de l'orbite terreſtre où ſe ſoit trouvée la terre, lorſque Mars étoit au même point M de ſon orbite, & par conſéquent à la même diſtance SM du ſoleil ; on connoît les deux poſitions de la terre, c'eſt-à-dire, ſes longitudes & ſes diſtances au ſoleil, il s'agit de trouver SM ; dans le triangle rectiligne BSC l'on connoît les deux côtés BS, SC, diſtances de la terre au ſoleil, & l'angle compris BSC, différence entre les deux longitudes de la terre en B & en C, l'on trouvera les angles BCS, CBS & le côté BC. L'angle MBS eſt la différence entre la longitude obſervée de Mars & celle du ſoleil, au temps de l'obſervation faite en B ; ſi l'on en retranche l'angle CBS que nous venons de trouver, on aura l'angle MBC ; ſi l'on ôte auſſi l'angle BCS de l'angle MCS, on aura l'angle MCB ; ainſi dans le triangle MCB l'on connoît deux angles & le côté compris, on trouvera

aiſément MB & MC; enfin, dans le triangle MBS on connoît deux côtés MB, BS, avec l'angle compris MBS, on trouvera la diſtance MS, avec l'angle MSB qui étant ajouté à la longitude de la terre lorſqu'elle étoit en B, donnera la longitude héliocentrique de Mars, dans chacune des deux obſervations.

Képler avoit choiſi cinq obſervations différentes qui comparées deux à deux, lui donnoient le même réſultat pour la diſtance & pour la longitude héliocentrique de Mars, en un même point M de ſon orbite, (*de Stella Martis, cap. 28. pag. 157*).

1217. Képler, par un grand nombre d'obſervations de Tycho-Brahé, qu'il avoit diſcutées avec toute la conſtance & la ſagacité poſſible, établit l'excentricité du ſoleil de 1800 pour un rayon de cent mille; par-là il étoit en état de trouver les diſtances de la terre au ſoleil SB, SC, pour un moment quelconque, auſſi bien que l'angle CSB: mais pour en être encore plus aſſuré, il refit tous ſes calculs dans différentes ſuppoſitions d'excentricité, & à chaque fois il prenoit cinq obſervations au lieu de trois, pour que l'accord de différens réſultats lui fît mieux connoître le vrai; & c'eſt ainſi qu'après avoir diſcuté dans le plus grand détail une multitude d'obſervations, il s'arrêta à l'excentricité de 1800, & aux diſtances de Mars au ſoleil que nous rapporterons ci-après (1219). Les différentes parties de ces recherches ſe confirmoient réciproquement, & il ne pouvoit pas ſe faire que cinq poſitions de la terre donnaſſent toutes, deux à deux, le même réſultat pour la diſtance SM de Mars au ſoleil, à moins que les diſtances SC & SB de la terre au ſoleil n'euſſent été bien ſuppoſées.

1218. Cette méthode par laquelle Képler trouvoit les diſtances de Mars au ſoleil (1216), lui donnoit un moyen de trouver auſſi l'excentricité de Mars: ayant déterminé deux diſtances de Mars, l'une aux environs de ſon aphélie, l'autre aux environs de ſon périhélie, il trouva la premiere de 166780, (en ſuppoſant tou-

jours de 100000 la distance moyenne du soleil à la terre), & l'autre de 138500; en sorte que la distance moyenne étoit de 152640 & l'excentricité de 14140, qu'il appelloit *Centrorum excentrici & Mundi distantia*, (Képler, *pag.* 209).

Les observations que Képler employa pour le périhélie, étoient du 1r. Novembre 1589, du 26 Septembre 1591, & du 31 Juillet 1593. Lorsque ces observations ne se trouvoient pas avoir été faites précisément dans le même endroit de l'orbite de Mars, il y appliquoit les réductions nécessaires pour les faire toutes coincider en un même point ; mais ces réductions étant fort petites, il n'en résultoit aucune erreur.

1219. Képler détermina ainsi, par plusieurs Observations, trois distances de Mars au soleil AF, AE, AD, (*fig.* 66), indépendantes de toute supposition sur la théorie de Mars, il trouva aussi l'excentricité AB de 14140, par la comparaison des deux distances de Mars AH, AI, prises dans l'aphélie & dans le périhélie, indépendamment de toute hypothèse ; enfin, il avoit déterminé la position de la ligne des apsides HI, par une méthode qui étoit également exacte, soit que l'orbite fût circulaire, soit qu'elle ne le fût pas : nous parlerons de cette méthode, art. 1280.

Fig. 66.

Supposant donc l'orbite circulaire on a le triangle ABF, dans lequel on connoît BF, avec l'excentricité AB & l'anomalie vraie BAF, il est aisé de trouver la distance vraie AF; il en est de même des autres distances AE, AD. Voici les trois distances que Képler trouvoit dans cette supposition, (*pag.* 213.). 166605, 163883, 148539
Les distances observées. . . 166255, 163100, 147750
Ainsi l'erreur étoit. 350, 783, 789

1220. Les vraies distances de Mars au soleil étoient donc plus courtes que les distances calculées dans l'hypothèse circulaire, & cela d'autant plus qu'elles approchoient des côtés G & E de la figure. Cela prouvoit donc nécessairement que l'orbite étoit applatie, ou rentrante

par les côtés, c'eſt-à-dire, ovale, d'où ſuivoit évidemment la concluſion importante & fameuſe que Képler en tira, & qui fut la premiere loi de Képler. *Itaque plane hoc eſt, orbita planetæ non eſt circulus, ſed ingrediens ad latera utraque paulatim; iterumque ad circuli amplitudinem in perigeo exiens, cujuſmodi figuram itineris ovalem appellitant.* (*cap. 44. pag. 213. in fine.*).

Képler prouve que l'orbite de Mars eſt ovale.

Cette ovalité de l'orbite de Mars fit conclure bientôt à Képler que cette orbite étoit une véritable ellipſe; car l'ellipſe eſt de toutes les courbes alongées, ou ovales, la plus ſimple, & celle qui ſe préſente la premiere; cela fut confirmé par l'examen des lieux de Mars obſervés dans toutes ſes poſitions, qui ſe trouvèrent d'accord auſſi bien que ſes diſtances, avec les calculs faits dans l'ellipſe ordinaire. Cette concluſion que Képler étendit enſuite à toutes les planètes dans ſes tables Rudolphines, s'eſt trouvée dans toutes également exacte; elle s'eſt trouvée dans la ſuite être une conſéquence néceſſaire de l'attraction univerſelle, comme nous le dirons dans le XXIIe livre, en ſorte qu'il a été reconnu pour règle générale, que *les ſix planètes principales décrivent des ellipſes dont le foyer eſt au centre du ſoleil.*

Et enſuite que c'eſt une ellipſe.

1221. Le reſte du livre de Képler eſt employé à confirmer cette découverte par d'autres obſervations & par d'autres genres de preuves; à expliquer par des raiſonnemens phyſiques la cauſe de cette ovalité, & à chercher les moyens de calculer l'équation dans une ellipſe dont on connoîtroit l'anomalie moyenne. Nous ne ſuivrons pas l'auteur dans ces différentes tentatives, où l'on voit cependant briller le génie & l'imagination de l'auteur, mais il nous ſuffit d'avoir montré la route par laquelle il étoit arrivé à cette belle découverte.

Réflexions ſur la marche de Képler.

On a dû remarquer avec quelle ſagacité Képler avoit ſu diviſer les queſtions, pour les réſoudre chacune ſéparément, & choiſir dans le nombre prodigieux d'obſervations que Tycho lui avoit fournies, celles qui décidoient un élément, c'eſt-à-dire, un des points de la queſtion, indépendamment de tous les autres. Il avoit d'abord déterminé l'excentricité

de l'orbite terreſtre (1209) par le moyen de deux obſervations de la longitude de Mars, faites dans le temps que cette planète étoit au même point de ſon orbite : cette excentricité le mettoit à portée de connoître les autres diſtances de la terre au ſoleil en différens points de ſon orbite. Connoiſſant les diſtances de la terre au ſoleil, il s'en étoit ſervi pour trouver celles de Mars au ſoleil, dans ſon aphélie & dans ſon périhélie ; ce qui donnoit directement l'excentricité de ſon orbite (1214) ; enfin, il compara trois autres diſtances de Mars au ſoleil, calculées dans un cercle dont l'excentricité étoit connue ; & les trouvant plus longues que les vraies diſtances obſervées, il en conclut que ces vraies diſtances appartenoient à une orbite plus étroite que le cercle (1220).

Képler avoit été long-temps à ſecouer le préjugé univerſel des orbes circulaires ; il s'accuſe lui-même du temps conſidérable que lui avoit fait perdre cette fauſſe perſuaſion, fondée ſur l'autorité générale de tous ceux qui l'avoient précédé, & ſur les principes de cette métaphyſique arbitraire dont on n'oſoit s'écarter. *Primus meus error fuit viam planetæ perfectum eſſe circulum ; tantò nocentior temporis fur, quantò erat ab autoritate omnium Philoſophorum inſtructior, & Metaphyſicæ in ſpecie convenientior*, (*cap. 40, p. 192*).

La découverte de Képler fut conteſtée & rejettée d'abord par beaucoup d'aſtronomes, comme l'avoit été le ſyſtème de Copernic, & comme le fut enſuite l'attraction Newtonienne ; l'inertie de la matière ſemble donner aux hommes une certaine difficulté à s'élever à des idées nouvelles ; il n'y a que ceux qui ont de la jeuneſſe, du feu & de la curioſité, qui les examinent & les reçoivent, encore faut-il qu'ils n'ayent pas honte de s'inſtruire & de ſe réformer.

Après que l'orbite de Mars eût ſervi à trouver les dimenſions de l'orbite terreſtre, & la règle du mouvement planétaire, les mêmes élémens lui ſervirent à trouver ceux de toutes les autres planètes, il les trouva lui-même avec aſſez d'exactitude, au moyen des obſervations de Tycho ; & il s'en ſervit pour calculer ſes tables Rudolphines.

1222.

1222. La méthode par laquelle Képler venoit de trouver les distances de Mars au soleil, soit dans l'aphélie, soit dans le périhélie(1216), lui servit à trouver les distances de toutes les autres planètes,& par conséquent *l'excentricité* de chacune, qui n'est autre chose que la moitié de la différence entre la plus grande & la plus petite distance; ces distances lui servirent à trouver la loi dont nous parlerons ci-après (1224), & cette regle a servi aux autres Astronomes pour trouver encore plus exactement ces distances, car les calculs en ont été faits plus d'une fois: les voici suivant les tables deM. Halley, & suivant mes nouveaux calculs, d'aprés les durées des révolutions qui sont dans la table de l'article 1161. Toutes ces distances suppose nt que celle du soleil soit de 100000, mais j'y ai ajouté des décimales, quand le calcul me les a données.

Distances des Planètes au Soleil.

Tables des distances moyennes des Planètes au Soleil, suivant divers Auteurs.

Planetes.	Distances moyen. suiv. Képler.	Suivant les Tab. carol. de Street.	Suivant M. Halley.	Selon mes Tables.	Logarithmes de ces distances.
Mercure.	38806	38710	38710	38709,88	9 5878218
Vénus.	72413	72333	72333	72333,24	9 8593379
La Terre.	100000	100000	100000	100000	0 0000000
Mars.	152349,5	152369	152369	152369,27	0 1818974
Jupiter.	520000	520110	520098	520097,91	0 7160851
Saturne.	951003,5	953800	954007	953936,83	0 9795196

1223 Les distances sont exprimées, suivant M. Halley, en parties, dont celle de la terre contient 100000; dans les miennes j'ai employé deux chiffres de plus pour une plus grande exactitude, c'est-à-dire, les dix millioniémes de la distance moyenne du soleil; mais j'y ai ajouté les logarithmes par le moyen desquels j'ai trouvé les distances, qui suppose nt la distance moyenne du soleil égale à l'unité; car c'est sous cette forme-là qu'on les emploie souvent dans les calculs astronomiques. On trouvera les distances

de la lune dans le livre IXe où il ſera queſtion des paralaxes.

Rapports plus ſimples.

Les diſtances précédentes des planètes au ſoleil, en négligeant les quatre derniers chiffres, ſont entre elles comme les nombres 4, 7, 10, 15, 52, 95; ce ſont-là les nombres les plus ſimples qu'il y ait pour repréſenter les intervalles & les grandeurs des orbes planétaires, & nous nous en ſommes déja ſervi en expliquant la figure du ſyſtème de Copernic (1082): il eſt utile de ſe ſouvenir de ces ſix nombres dont on fait un fréquent uſage dans l'aſtronomie. Les diſtances des planètes au ſoleil déterminées ainſi par Képler, au moyen des obſervations de Tycho, lui firent trouver la belle loi dont nous allons parler.

Les carrés des Temps périodiques ſont comme les Cubes des diſtances.

1224. La plus fameuſe loi du mouvement des planètes découverte par Képler, eſt celle du rapport qu'il y a entre les grandeurs de leurs orbites, & le temps qu'elles emploient à les parcourir; Jupiter eſt cinq fois plus éloigné du ſoleil que la terre, le contour de ſon orbite eſt cinq fois plus grand; mais il met douze fois plus de temps que la terre à parcourir cette orbite qui eſt ſeulement cinq fois plus grande; Képler chercha long-temps la cauſe de cette différence & la nature de ces rapports: il avoit d'abord voulu rapporter les diſtances des ſix planètes aux corps réguliers, le cube, le tétraëdre, l'octaëdre, le dodécaëdre, l'icoſaëdre; enſuite à l'harmonie des corps ſonores: (Voy. *Myſterium Coſmographicum*, 1596, & *Harmonices Mundi*, 1619); mais il ne trouvoit aucun rapport ſatisfaiſant entre les temps & les diſtances.

Ce fut le 8 Mars 1618 qu'il lui vint à l'eſprit pour la premiere fois, de comparer les puiſſances des différens nombres, au lieu de comparer les nombres mêmes qui exprimoient les temps périodiques des planètes &

leurs distances ; il compara donc au hazard des carrés, des cubes, &c. il essaya même les carrés des temps avec les cubes des distances ; mais trop de vivacité ou d'impatience l'égara dans quelque faute de calcul, il se trompa cette premiere fois ; il crut trouver que la règle n'avoit pas lieu, & rejetta cette proportion comme fausse & inutile. Ce ne fut que le 15 de Mai suivant qu'il revint à cette idée, en recommençant les mêmes essais & les mêmes comparaisons ; il calcula mieux, & il les trouva parfaitement d'accord ; alors enfin il reconnut qu'il y avoit réellement toujours un rapport égal & constant entre les carrés des temps périodiques de deux planètes quelconques, & les cubes de leurs distances moyennes au soleil : il fut si enchanté de cette découverte, qu'à peine il se fioit à ses calculs ; il crut se faire illusion & avoir supposé ce qu'il falloit chercher ; il n'osoit qu'à peine se persuader qu'il eût enfin trouvé une vérité cherchée pendant 17 ans : *Tantâ comprobatione & laboris mei septendecennalis in observationibus Braheanis, & meditationis hujus in unum conspirantium, ut somniare me & præsumere quæsitum inter principia primò crederem*, (Harmonices, liv. V. pag. 189). Qu'auroit-il dit, s'il eût pu prévoir les conséquences admirables qu'on a su tirer de cette loi ? comme nous le dirons dans le XXIIe livre.

Cette loi fut trouvée le 15 Mai 1618.

1225. La distance de la terre au soleil est à celle de Jupiter au soleil, comme 10 est à 52 ; leurs cubes sont par conséquent comme 10 à 1406, ou comme 1 est à 140,6 ; or, les durées de leurs révolutions sont de $365\frac{1}{4}$ & de $4332\frac{1}{3}$ jours, dont les carrés en négligeant les derniers chiffres, sont encore comme 1 est à $140\frac{1}{3}$; ainsi les carrés des temps périodiques sont entre eux comme 1 est à 140,6 ; donc, le rapport est le même de part & d'autre ; le carré du temps périodique de Jupiter est 140 fois plus grand que le carré du temps périodique de la terre, & le cube de la distance moyenne de Jupiter au soleil est 140 fois plus grand que le cube de la distance moyenne de la terre,

Exemple de cette loi.

c'eſt en quoi conſiſte l'égalité des rapports. Si l'on prend plus exactement les révolutions ſydérales (1161) & les diſtances (1222), on aura 140, 6874 pour le nombre exact qui exprime combien le carré de la révolution de Jupiter, & le cube de ſa diſtance contiennent ceux de la terre. On verra dans le XVIIIe livre que cette loi ſe vérifie également quand on compare les diſtances des ſatellites de Jupiter & de Saturne avec les durées de leurs révolutions, & l'on verra dans le livre XXIIe où nous traiterons de l'attraction, que de cette loi donnée par obſervation il s'enſuivoit néceſſairement que la force centrale, ou la gravité des planètes vers le ſoleil étoit en raiſon inverſe du carré de la diſtance, c'eſt-à-dire, la plus belle découverte de Newton, qui dut ſans doute ſon origine à celle de Képler.

Je me ſuis ſervi de cette loi pour trouver les diſtances moyennes des planètes qui ſont dans la table de l'article 1222; en diviſant le carré du mouvement ſéculaire total du ſoleil, relativement aux étoiles, ou de 129597736″ par le carré du mouvement ſéculaire de chaque planète (1161), & prenant la racine cube du quotient: on doit employer les mouvement ſéculaires plutôt que les temps des révolutions, parce que c'eſt le mouvement qui eſt donné immédiatement par les obſervations, & duquel on déduit les périodes; & il eſt bon de remonter à la ſource des données, toutes les fois qu'on a de nouvelles conſéquences à en tirer.

Les Aires ſont proportionnelles au Temps.

1226. Cette loi générale du mouvement des planètes devenue ſi importante dans l'aſtronomie, ſavoir, que les aires ſont proportionnelles au temps, eſt encore une des découvertes de Képler; & c'eſt ce qu'on appelle la troiſieme loi de Képler; cependant il ne démontroit cette vérité que d'une maniere incomplète; Newton a été le premier qui ait fait voir qu'elle étoit une

ſuite néceſſaire & exacte des loix générales du mouvement.

Képler étoit perſuadé que le mouvement circulaire des planètes étoit produit par une certaine force émanée du ſoleil, qui les forçoit à tourner autour de l'axe du ſoleil, comme il y tournoit lui-même. Il conſidéroit que puiſque les planètes les plus éloignées tournoient plus lentement que les planètes les plus proches du ſoleil, il falloit que la force motrice fût plus petite à une plus grande diſtance, & cela le conduiſit à établir non-ſeulement la force d'*inertie*, dont il a parlé le premier, mais encore la règle des aires proportionnelles aux temps.

1227. Képler démontre d'abord à la page 165 de ſa nouvelle phyſique céleſte, que le mouvement des planètes dans les apſides eſt proportionnel à leur diſtance au ſoleil, même dans l'hypothèſe de Ptolomée (1204), c'eſt-à-dire, qu'en prenant un arc de l'excentrique vers l'aphélie, & un autre arc de même longueur vers le périhélie, la planète eſt plus long-temps dans l'arc aphélie, à proportion que la diſtance aphélie eſt plus grande; ou, ce qui revient au même, que les aires décrites dans le même temps ſont égales.

Démonſtration de Képler.

Soit E (*fig.* 68.) le point autour duquel le mouvement eſt ſuppoſé uniforme (1204), S le centre du ſoleil à même diſtance du centre C que le point E; ayant tiré deux lignes MEO, NEP, l'arc MN & l'arc OP ſont parcourus dans le même temps ſuivant cette hypothèſe, puiſque les angles en E ſont égaux; ſi du point S on tire les lignes SO, SP, & les lignes SN, SM; je dis qu'elles formeront des ſecteurs égaux OSP, NSM: en effet, $MN : OP :: ER : EQ$, donc $MN. EQ = OP. ER$; mais $EQ = SR$ & $ER = SQ$; donc $MN. SR = OP. SQ$; donc le ſecteur SNM eſt égal au ſecteur OSP: donc dans l'hypothèſe même des anciens ſi l'on prend deux arcs MN & OP, décrits par une planète dans des temps égaux, on aura au point S des aires égales.

Fig. 68.

1228. De ce que la planète emploie plus de temps

dans ſon aphélie à parcourir un même arc, Képler conclut en général, (*page* 168), que plus la planète eſt éloignée du centre du ſoleil, plus elle eſt foiblement animée par la force motrice qui la fait tourner autour du ſoleil. Après cela il applique cette égalité des aires, (*cap.* 40.) au calcul de l'équation; enfin, il obſerve que les ſurfaces des ſecteurs doivent exprimer les anomalies moyennes : en effet, la demeure d'une planète dans chacun des arcs égaux de l'excentrique, étant toujours proportionnelle à la diſtance de la planète; ſi l'on peut avoir la ſomme de toutes les diſtances, on aura la ſomme de toutes les demeures, ou le temps employé à parcourir un arc quelconque, de quelque grandeur qu'il ſoit : or la ſomme de toutes les diſtances eſt viſiblement la ſurface entiere du ſecteur décrit par la planète; ainſi l'aire du ſecteur repréſentera l'anomalie moyenne, qui eſt proportionnelle au temps.

1229. Lorſque Képler, (*cap.* 46 & 47. *pag.* 219 & 223), paſſe à la conſidération des orbes elliptiques, il tranſporte à l'ellipſe cette propriété qu'il n'avoit démontrée que pour le cercle excentrique, ſans y employer de nouvelle démonſtration; ainſi la loi des aires proportionnelles au temps n'étoit démontrée qu'imparfaitement, elle ne pouvoit paſſer juſqu'alors que comme une approximation commode, facile dans la pratique, & juſtifiée par l'accord du calcul avec l'obſervation.

Mais lorſqu'on conſidere les orbites planètaires comme formées par le concours de deux forces & de deux directions différentes, dont l'une eſt de ſa nature uniforme & conſtante, dès-lors les aires deviennent néceſſairement & rigoureuſement proportionnelles aux temps, comme nous le démontrerons bientôt (1233).

1230. On prouve très-bien aujourd'hui, par l'obſervation des diamètres du ſoleil, que les aires ſont proportionnelles aux temps vers les apſides, ou, ce qui revient au même, que le mouvement du ſoleil eſt d'autant plus lent qu'il eſt plus éloigné de la terre. Le diamètre du ſoleil eſt de $31' 31''$ en été, & de $32' 36''$ en hyver,

ſuivant mes obſervations ; cela prouve que la diſtance du ſoleil en hyver eſt à ſa diſtance en été, comme 31′ 31″ eſt à 32′ 36″; car les grandeurs apparentes d'un objet éloigné ſont en raiſon inverſe de ſes diſtances (1384) : le mouvement horaire du ſoleil en hyver eſt de 2′ 33″ ; or 32′ 36″ : 31′ 31″ : : 2′ 33″ : 2′ 28″ ; ainſi le mouvement horaire du ſoleil devroit être de 2′ 28″ en été, ſi ce mouvement horaire étoit en lui-même conſtant & uniforme, & que ſes différences ne dépendiſſent que de l'éloignement du ſoleil ; cependant, par l'obſervation, ce mouvement horaire ne ſe trouve que de 2′ 23″; il eſt plus petit qu'il ne devroit être dans cette ſuppoſition : donc, outre les 5″ de différence qu'il doit y avoir entre les mouvemens horaires du ſoleil en été & en hyver à cauſe de ſes différentes diſtances, il y a encore une différence réelle de 5″, qui ne provient pas des diſtances, mais qui eſt un ralentiſſement véritable dans le mouvement apparent du ſoleil ; donc, le mouvement réel de la terre eſt effectivement plus lent dans l'aphélie que dans le périhélie. On voit même qu'il eſt en raiſon inverſe des diſtances, puiſque l'on trouve 2′ 23″, au lieu de 2′ 28″ qu'il y auroit, en ſuppoſant le mouvement uniforme, c'eſt-à-dire, 5″ pour l'excès du mouvement horaire en hyver ſur le mouvement en été, indépendammenr des 5″ qu'il doit y avoir, à raiſon de la diſtance du ſoleil qui eſt moindre en hyver ; or 2′ 23″ eſt à 2′ 28″, comme 31′ 31″ eſt à 32′ 36″, c'eſt-à-dire, comme le diamètre en été eſt au diamètre en hyver, ou comme la diſtance en hyver eſt à la diſtance en été ; donc le mouvement du ſoleil en été eſt au mouvement qu'il paroîtroit avoir s'il alloit toujours uniformément, en raiſon inverſe de ſa diſtance.

La loi des aires proportionnelles au temps ayant été démontrée par Képler pour le cas de l'aphélie & du périhélie, & ſe trouvant vérifiée d'ailleurs par un accord général entre les obſervations & le calcul tiré de cette loi, nous pourrions la regarder comme prouvée aſtronomiquement, n'ayant pas encore traité des cauſes qui doivent produire cette loi ; cependant nous allons

démontrer en peu de mots, 1°. que les planètes tournent autour du ſoleil en vertu d'une force centrale ou attractive, dirigée au foyer de l'ellipſe; 2°. que cette force une fois ſuppoſée, il s'enſuit que les aires ſont proportionnelles au temps; ce ſera une connoiſſance élémentaire qui préparera le lecteur à la phyſique céleſte, dont nous traiterons dans le XXIIe livre.

Premiere loi du mouvement.

1231. C'eſt la premiere loi du mouvement prouvée par l'expérience, & admiſe par tous les mathématiciens, qu'un corps ayant parcouru une ligne droite uniformément dans l'eſpace d'une minute, parcourroit une autre ligne droite ſur la même direction dans la minute ſuivante, ſi rien ne s'y oppoſoit; ainſi la planète P (*fig.* 69), ayant été une ſeule fois uniformément de P en Q ſur la ligne droite PQ, elle continueroit à ſe mouvoir de Q en F ſur la même direction PQF, en parcourant un eſpace QF égal à PQ uniformément, & dans le même eſpace de temps : cependant les planètes décrivent des ellipſes, & non pas des lignes droites, elles courbent ſans ceſſe leur route du côté du ſoleil, & reviennent après une révolution reprendre la même route à la même diſtance du ſoleil; il y a donc dans le ſoleil une force capable de détourner à chaque inſtant une planète de la ligne droite qu'elle venoit de décrire l'inſtant précédent. Nous examinerons la meſure & la quantité de cette force dans le XXIIe livre, où nous traiterons de l'attraction; il nous ſuffit ici de faire voir que cette force exiſte, puiſque ſans elle les planètes ne pourroient décrire que des lignes droites, & jamais ne reviendroient aux mêmes lieux, comme elles le font, en décrivant ſans ceſſe une courbe qui environne le ſoleil.

Fig. 69.

Exiſtence d'une force centrale.

Seconde loi du mouvement.

1232. La ſeconde loi du mouvement que je ſuppoſe encore connue & démontrée, parce qu'elle ſe trouve dans tous les livres de mécanique, ou de dynamique, eſt celle-ci : un corps pouſſé à la fois par deux forces différentes, dont les directions font un angle, & dont chacune pourroit lui faire parcourir en une minute un des côtés d'un parallélogramme, en décrira la diagonale dans la même minute. La planète arrivée en Q eſt pouſſée vers

le

le ſoleil, ſuivant la direction *QS*, avec une force qui ſeule ſeroit capable de lui faire parcourir en une minute la ligne droite *QG*, tandis qu'au même inſtant elle eſt ſollicitée à parcourir en une minute une ligne *QF* égale à *PQ*, en vertu de la premiere loi du mouvement (1231); ſi ſur les lignes *QG* & *QF* on forme un parallélogramme *GQFR*, la planète parcourra la diagonale *QR* dans la même minute. Il ne faut que ces trois principes pour démontrer que la loi des aires proportionnelles au temps, doit avoir lieu dans tous les cas; nous allons faire cette démonſtration à peu près comme Newton, (*Philoſophiæ natur. principia mathemat. l. I. ſec. II. prop. 1*).

Démonſtration de la loi des Aires proportionnelles.

1233. Conſidérons une planète en un point quelconque *Q* de ſon orbite, venant de parcourir l'inſtant d'auparavant une très-petite portion *PQ* de cette orbite, que je conſidère comme une ligne droite; la planète parvenue de *P* en *Q*, & le rayon de ſon orbite ayant paſſé de *SP* en *SQ*, a décrit l'aire *SPQ* en une minute de temps; je dis que dans la minute ſuivante elle décrira une aire *SQR* égale à l'aire *SPQ*, ou un triangle égal en ſurface à *SPQ*, enſorte que l'aire décrite par le rayon vecteur, ſera égale en temps égal. En effet, ſi la planète livrée à elle-même, eût continué à ſe mouvoir de *Q* en *F*, en vertu de la premiere loi du mouvement (1231), elle auroit décrit une aire *QSF* égale à l'aire *PSQ*, parce que ces deux triangles ſont égaux, ayant des baſes égales *PQ* & *QF*, & pour hauteur commune la perpendiculaire abaiſſée du point *S* ſur la direction *FQP*, prolongée au-dehors : mais à cauſe de la force centrale qui attire la planète vers le ſoleil, ce ſera l'aire *QSR*, (à la place de l'aire *QSF*), qui ſera décrite par la planète; or, les triangles *QSR*, *QSF*, ſont encore égaux, parce qu'ils ont la même baſe *QS*, & ſont compris entre les mêmes paralleles *FR* & *QS*; donc l'aire *QSR* eſt auſſi égale à l'aire *PSQ*: ainſi il eſt démontré que la petite aire décrite dans la premiere minute, eſt égale à la petite aire décrite dans la minute ſuivante;

Fig. 69. & procédant ainſi de minute en minute dans toute la durée de la révolution, on démontreroit avec la même facilité que la même planète décrira éternellement la même aire dans le même temps, à quelque diſtance du ſoleil qu'elle parvienne, tant qu'il ne ſurviendra pas une force étrangère qui puiſſe troubler l'égalité entre QF & PQ, c'eſt-à-dire, entre la ligne qu'une planète vient de parcourir, & celle qu'elle tend à parcourir dans la minute ſuivante.

Ainſi la loi des aires proportionnelles aux temps eſt prouvée non-ſeulement par l'obſervation, c'eſt-à-dire, par l'accord général des calculs fondés ſur cette loi, avec les obſervations, mais encore par la nature même des deux forces qui animent les planètes : nous allons donc paſſer au calcul du mouvement des planètes dans les orbites elliptiques, pour être en état d'aſſigner en tout temps le point de ſon orbite où une planète doit ſe trouver en vertu de la loi précédente.

On a appellé *Loi de Kepler* cette régle des aires proportionnelles aux temps, auſſi bien que celles des articles 1220 & 1224, du nom de ce célebre inventeur; mais il n'eut pas la ſatisfaction de voir leur connexion & leur dépendance eſſentielle d'une autre loi plus générale, celà étoit réſervé à Newton, dans la découverte de l'attraction univerſelle, comme on le verra dans le livre XXII.

Théorie du mouvement elliptique des Planètes autour du Soleil.

Rayon vecteur. 1234. Définitions. Le *rayon vecteur* d'une planète eſt la ligne tirée du centre du ſoleil au centre de la planète, ou la diſtance de la planète au foyer de ſon ellipſe. Soit $AMDP$ (*Fig.* 70.), l'orbite elliptique d'une planète décrite autour du foyer S, où eſt placé le ſoleil (1220), M le lieu actuel d'une planète pour

Fig. 70.

un inſtant donné, la ligne *SM* ſera le rayon vecteur. *Fig. 70.*

La ligne des apſides, (a) ou le grand axe de l'ellipſe marque l'aphélie & le périhélie de la planète (864) : Aphélie.

L'APHÉLIE ou l'apſide ſupérieure, eſt le point de l'orbite où la planète eſt la plus éloignée du ſoleil ; tel eſt le ſommet *A* du grand axe *AP*, le plus éloigné du foyer *S*. Le PÉRIHÉLIE, ou l'apſide inférieure, eſt le point de l'orbite où la planète eſt la plus proche du ſoleil ; telle eſt l'extrémité inférieure *P* du grand axe *AP*, la plus voiſine du foyer *S* où réſide le ſoleil.

L'ANOMALIE en général eſt la diſtance d'une planète à ſon aphélie ; mais il y a pluſieurs manieres de meſurer cette diſtance.

L'ANOMALIE VRAIE eſt l'angle formé au foyer de l'ellipſe par le rayon vecteur & par la ligne des apſides ; tel eſt l'angle *ASM* formé par le grand axe *AS* & par le rayon vecteur *SM*. Anomalie vraie.

L'ANOMALIE EXCENTRIQUE eſt l'angle formé au centre de l'ellipſe, par le grand axe & par le rayon d'un cercle circonſcrit, mené à l'extrémité de l'ordonnée qui paſſe par le lieu vrai de la planète. Ainſi ayant décrit un cercle *ANP* ſur le grand axe *AP* de l'orbite, comme diamètre, on tirera l'ordonnée *RMN* par le point *M*, où eſt ſuppoſée la planète, & à l'extrémité *N* de cette ordonnée on ménera le rayon *CN*, c'eſt celui qui déterminera l'anomalie excentrique *AN* ou *ACN*. Anomalie excentrique.

L'ANOMALIE MOYENNE eſt la diſtance à l'aphélie, ſuppoſée proportionnelle au temps ; c'eſt celle qui augmente uniformément & également depuis l'aphélie juſqu'au périhélie ; ainſi une planète qui emploiroit ſix mois à aller de *A* en *P*, auroit à la fin du premier mois 30 degrés d'anomalie moyenne, 60 degrés à la fin du ſecond ; & ainſi de ſuite, en augmentant toujours proportionnellement au temps. Si l'on prend une ligne *CX* Anomalie moyenne.

(a) Nous avons donné l'étymologie de ces noms (864). Il y a des auteurs qui écrivent *Abſides*, tels ſont Riccioli, Sethward, &c. mais l'étymologie fait que l'on écrit plus communément Apſides.

Fig. 70. pour marquer l'anomalie moyenne, en ſuppoſant que cette ligne tourne uniformément autour du centre C, la ligne CX ſera d'abord plus avancée que la ligne CN, parce que AN croit plus lentement vers l'aphélie où le mouvement de la planète eſt moindre que le mouvement moyen, & cet avancement augmentera tant que la vîteſſe de la planète ſera moindre que ſa vîteſſe moyenne; enſuite le point N ſe rapprochera du point X, juſqu'à ce qu'au périhélie P ils ſe réuniſſent enſemble; là les trois anomalies ſe confondent, & ſont également de 180 degrés.

La différence entre l'anamolie vraie, & l'anamolie moyenne forme l'équation de l'orbite ou l'équation du centre.

1235. Puiſque l'anomalie moyenne eſt proportionnelle au temps, & qu'elle eſt une portion du temps de la révolution, elle peut être meſurée par toute quantité qui aura un progrès uniforme: ainſi non-ſeulement l'arc AX, l'angle ACX, & le ſecteur ou l'aire circulaire ACX peuvent s'appeller *Anomalie moyenne*, mais encore le ſecteur elliptique, ou l'aire ASM, formée par le rayon vecteur SM, le grand axe SA & l'arc d'ellipſe AM: en effet, les aires décrites par le rayon vecteur SM, étant proportionnelles aux temps (1226), le ſecteur AMS ſera la ſixieme partie de la ſurface elliptique $AMDPA$ au bout du premier mois, (dans la ſuppoſition de l'article précédent) il en ſera par conſéquent le tiers au bout de deux mois, & toujours ainſi uniformément; en ſorte que la ſurface, ou l'aire elliptique ſera la quantité proportionnelle au temps, une fraction égale à la fraction du temps, ou à l'anomalie moyenne: ainſi l'on pourra dire à la fin du premier mois, que l'anomalie moyenne eſt 30 degrés, ou, en général, qu'elle eſt un douzieme; car alors les 30 degrés ſont la douzieme partie du ciel, l'arc ſera la douzieme partie du cercle, le temps employé à le parcourir ſera la douzieme partie du temps de la révolution entiere; & enfin l'aire AMS ſera la douzieme partie de l'aire entiere de

l'ellipſe ; mais ordinairement c'eſt en degrés que nous exprimons l'anomalie moyenne. *Fig. 70.*

1236. Képler ayant trouvé que les planètes décrivoient des ellipſes avec des aires proportionnelles au temps, il ne lui reſtoit plus que d'en conclure le vrai lieu d'une planète pour un temps donné. Lorſqu'on connoît la durée de la révolution de la planète, par exemple, celle de Mercure, qui eſt de 86 jours ; & qu'on demande le lieu de Mercure au bout de deux jours, c'eſt-à-dire, de la 43e. partie de ſa révolution, on ſait dès lors que l'aire du ſecteur *ASM* compris entre l'aphélie & le rayon vecteur *SM*, eſt la 43e. partie de la ſurface de l'ellipſe ; cette portion du temps, ou cette portion de l'ellipſe eſt proprement l'*anomalie moyenne*, que l'on peut auſſi exprimer en degrés, en prenant la 43e. partie des 360 degrés ou du cercle entier : car on a vu que nous pouvons appeller indifféremment *anomalie moyenne*, une portion du temps, une portion de l'ellipſe, une portion de la circonférence du cercle ; c'eſt toujours une fraction qui eſt donnée, quand on cherche le lieu d'une planète, mais c'eſt en degrés que nous la prendrons ci-après, pour ſuivre la forme uſitée dans les tables aſtronomiques, où toutes les anomalies & toutes les équations s'expriment en degrés, minutes & ſecondes.

On connoît toujours l'Anomalie moyenne.

1237. Lorſqu'on connoît l'anomalie moyenne, ou la ſurface du ſecteur *AMS*, il s'agit de trouver l'anomalie vraie, ou l'angle *ASM* de ce ſecteur. Képler ſentit bien la difficulté de ce problême : *étant donnée l'anomalie moyenne, trouver l'anomalie vraie*, même dans un cercle, car la difficulté eſt à peu-près la même que dans l'ellipſe ; il ſe contenta d'inviter les géomètres à en chercher la ſolution, ſans eſpérer qu'on la pût trouver d'une maniere directe, parce qu'elle ſuppoſe connu le rapport entre les arcs & leurs ſinus, qui n'eſt donné que par approximation : voici comment il s'exprime au ſujet de ce fameux problême, qui a toujours été appellé depuis *Problême de Képler*, parce qu'en effet il le propoſa le premier, & en donna même une ſolution approchée.

Problême de Képler.

Fig. 70. *Hæc est mea sententia : quæ quominus habere videbitur geometricæ pulchritudinis, hoc magis adhortor geometras ut mihi solvant hoc problema : DATA areâ partis semicirculi, datoque puncto diametri, invenire arcum & angulum ad illud punctum : cujus anguli cruribus & quo arcu data area comprehenditur : vel aream semicirculi ex quocumque puncto diametri in datâ ratione secare. Mihi sufficit credere solvi à priori non posse propter arcus & sinus* ἑτερογένειαν (pag. 300). C'est par-là que Képler termine ses recherches ; le problème dont il désespéroit alors, est encore aujourd'hui désespéré, mais nous le résoudrons par approximation (1247).

1238. La premiere chose que nous ferons pour simplifier ces recherches, sera de renverser la question, & de supposer connue l'anomalie vraie pour en déduire l'anomalie moyenne ; cette méthode sera plus courte, souvent plus exacte, & tiendra toujours lieu dans la pratique, de la méthode directe, que nous expliquerons cependant à son tour, (1247). Cette méthode indirecte a été employée avec succès par M. l'Abbé de la Caille dans ses recherches sur le Soleil ; elle est fondée sur les deux théorêmes suivans, que nous allons démontrer d'une maniere très-simple, en supposant quelques propositions des Sections Coniques, ou de la Trigonométrie, qui seront démontrées à leur place dans les livres XXI & XXIII.

1239. Lemme. *Dans une ellipse* AMP, *à laquelle on a circonscrit un cercle* ANP ; CX *étant la ligne de l'anomalie moyenne* (1234), M *le vrai lieu de la planète*, RMN *l'ordonnée qui passe par le lieu de la planète ; le secteur circulaire* ANSA *est toujours égal au secteur circulaire* ACX *de l'anomalie moyenne.*

Démonstration. Soit T le temps entier de la révolution de la planète, & t le temps qu'elle a employé à aller de A en M, on aura par la règle des aires proportionnelles aux temps, t est à T comme le secteur AMS est à la surface de l'ellipse : de même, puisque ACX est l'anomalie moyenne, on aura t est à T comme

ACX eſt à la ſurface du cercle ; donc AMS eſt à ACX comme la ſurface de l'ellipſe eſt à la ſurface du cercle. Mais par la propriété de l'ellipſe, (liv. XXI), AMS eſt à ANS, comme la ſurface de l'ellipſe eſt à la ſurface du cercle ; nous avons donc deux proportions qui ont trois termes communs, ſavoir AMS, la ſurface de l'ellipſe & la ſurface du cercle ; le terme qui paroît différent eſt donc néceſſairement le même ; donc ACX & ANS ſont égaux entre eux. *C. Q. F. D.* Fig. 70.

1240. *La* RACINE CARRÉE *de la diſtance périhélie eſt à la racine carrée de la diſtance aphélie, comme la tangente de la moitié de l'anomalie vraie eſt à la tangente de la moitié de l'anomalie excentrique.* Théorême premier.

DÉMONSTRATION. C'eſt une propriété des triangles rectangles, tels que RSM, dont on trouvera la démonſtration dans le XXIIIe livre, que la tangente de la moitié de l'angle RSM eſt égale au côté oppoſé RM, diviſé par la ſomme des deux autres côtés SR, SM ; ainſi dans les triangles rectangles MSR & NCR on a cette proportion : tang. $\frac{1}{2}$ MSR : tang. $\frac{1}{2}$ NCR : : $\frac{RM}{SR+SM}$: $\frac{RN}{CR+CN}$; ſi l'on met à la place du rapport de RM à RN celui de CD à CA qui lui eſt égal par la propriété de l'ellipſe, & à la place de $SR+SM$ ſa valeur $PR.\frac{SA}{CA}$, (voy. liv. XXI) ; & enfin PR à la place de $CR+CN$, on changera la proportion en celle-ci : tang. $\frac{1}{2}$ MSR : tang. $\frac{1}{2}$ NCR : : $\frac{CD.CA}{PR.SA}$: $\frac{CA}{PR}$: : CD : SA ; & nommant a le demi-axe de l'ellipſe, & e l'excentricité CS, on aura $T.\frac{1}{2}$ MSR : tang. $\frac{1}{2}$ NCR : : CD : SA : : $\sqrt{aa-ee}$: $a+e$; on diviſera les deux derniers termes par $\sqrt{a+e}$, & l'on aura $T.\frac{1}{2}$ MSR : $T.\frac{1}{2}$ NCR : : $\sqrt{a-e}$: $\sqrt{a+e}$, : : $\sqrt{PS}$: $\sqrt{SA}$: donc la tangente de la moitié de l'anomalie vraie ASM eſt à la tangente de la moitié de l'anomalie excentrique ACN, comme la racine carrée de la diſtance périhélie PS eſt à celle de la diſtance aphélie AS. C. Q. F. D.

Fig. 70. Théorême ſecond.

1241. *La différence entre l'anomalie excentrique & l'anomalie moyenne eſt égale au produit de l'excentricité par le ſinus de l'anomalie excentrique.*

Démonstration. Le ſecteur circulaire $ANSA$, eſt égal au ſecteur de l'anomalie moyenne ACX (1239); ſi l'on ôte de tous deux la partie commune ACN, on aura le ſecteur NCX égal au triangle CNS. La ſurface du ſecteur circulaire NCX eſt égale au produit de CN par la moitié de l'arc NX; la ſurface du triangle CNS eſt égale au produit de CN par la moitié de la hauteur ST, qui eſt une perpendiculaire abaiſſée du foyer S ſur la baſe NC, prolongée au-delà du centre C; ainſi les deux ſurfaces étant égales, & ayant un des produiſans CN qui eſt commun à toutes deux, les autres produiſans ſont auſſi égaux; donc l'arc NX eſt égal à la ligne droite ST; mais dans le triangle STC, rectangle en T l'on a $ST = CS.$ ſin. TCS, par les règles de la Trigonométrie rectiligne; donc $NX = CS.$ ſin. $TCS = CS.$ ſin. ACN; donc la différence NX entre l'anomalie excentrique AN & l'anomalie moyenne AX, eſt égale au produit de l'excentricité CS par le ſinus de l'anomalie excentrique ACN. C. Q. F. D.

1242. C'eſt en minutes & ſecondes qu'on a coutume d'exprimer toutes les anomalies des planètes; ainſi pour trouver la différence en ſecondes entre l'anomalie moyenne & l'anomalie excentrique, il faut que l'excentricité ſoit auſſi exprimée en ſecondes; ſi l'excentricité de la planète eſt exprimée en parties de même eſpèce que la diſtance moyenne, on dira la diſtance moyenne eſt à l'excentricité, comme le nombre de ſecondes que contient le rayon d'un cercle, $206264''8$ ou environ $57°$ eſt au nombre de ſecondes que l'excentricité contient. Si cette excentricité eſt donnée en fraction de la diſtance moyenne de cette même planète, comme nous la donnerons à l'art. 1278, il ſuffira de la multiplier par les $206264''$, qui font l'arc de $57°$ égal au rayon, pour avoir cette excentricité en ſecondes; le logarithme de ce nombre de ſecondes eſt

5,3144251.

5,3144251, l'on ajoutera ce logarithme conſtant avec celui de l'excentricité de la planète exprimée en parties ou en fraction de la diſtance moyenne (1278), & l'on aura le logarithme de cette excentricité en ſecondes.

Pour ſentir la raiſon de cette multiplication par 57°, ou par 206264″, ſuppoſons que l'excentricité fût la deux cent millieme partie du rayon ou de la diſtance moyenne, il eſt évident que puiſqu'il y a deux cent mille ſecondes dans un arc égal au rayon, l'excentricité vaudroit une ſeconde; ſuppoſons qu'elle fût la moitié du rayon, ou $\frac{1}{2}$, elle vaudroit la moitié de 206264″, ou 103132″, c'eſt-à-dire, qu'en multipliant cette excentricité $\frac{1}{2}$ par 206264, on auroit le nombre de ſecondes que l'excentricité contient; & cela ſe comprendra de même de tous les autres cas; puiſque l'unité eſt à la fraction qui exprime l'excentricité en parties du rayon, comme 206264″ ſont à l'excentricité réduite en ſecondes, il eſt évident qu'en multipliant la fraction, qui contient l'excentricité en parties du rayon, par 206264″, on aura l'excentricité en ſecondes. Il en eſt de même de toutes les quantités qu'on trouve dans les calculs, exprimées en parties du rayon; lorſqu'on les veut avoir en ſecondes, on les multiplie par 206264″, ou l'on ajoute à leur logarithme le logarithme conſtant 5,3144251. C'eſt le contraire ſi l'on a des arcs en ſecondes, & qu'on veuille les réduire en décimales du rayon; nous avons déja fait uſage de cette remarque (1133), nous le ferons encore plus ſouvent dans la ſuite, & nous en expliquerons le fondement plus en détail à la fin du livre XXIe.

Exprimer en ſecondes les décimales du Rayon.

1243. On verra bientôt l'application de ces deux théorêmes avec un exemple (art. 1244); mais pour plus de facilité, nous donnerons dans la table ſuivante pour chaque planète, les deux logarithmes conſtans qui ſervent pour les proportions contenues dans ces deux théorêmes: le premier pour l'anomalie excentrique eſt la moitié de la différence entre le logarithme de la diſtance aphélie & celui de la diſtance périhélie, il s'ajoute avec le logarithme de la tangente de la moitié

de l'anomalie vraie, pour avoir celui de la tangente de la moitié de l'anomalie excentrique. Le ſecond logarithme eſt pour trouver l'anomalie moyenne : c'eſt la ſomme du logarithme de l'excentricité (1278) & du logarithme de 57° ; on ajoute ce logarithme conſtant avec celui du ſinus de l'anomalie excentrique, pour avoir celui de la différence qu'il y a entre l'anomalie excentrique & l'anomalie moyenne : enfin, nous avons joint à la même table le logarithme de la moitié du petit axe, pour ſervir à trouver la diſtance (1245). Ce logarithme eſt la demi-ſomme de ceux de la diſtance aphélie & de la diſtance périhélie.

J'ai ajouté dans la table ſuivante les logarithmes conſtans pour l'orbite de la lune, en ſuppoſant ſa moyenne diſtance égale à l'unité, & ſon excentricité 0,05505, qui donne pour la plus grande équation 6° 18′ 18″ 4 (1278) ; c'eſt ainſi que M. Halley ſuppoſoit la quantité moyenne de l'équation, comme on le verra dans le livre VIIe.

Logarithmes conſtans d'après les Tables de Halley.

Planetes.	1er. Logarithme conſtant pour l'anomalie excentrique.	2eme. Logarithme conſtant pour l'anomalie moyenne.	Logarithme du demi-axe conjugué, pour la diſtance.
Mercure,	0 0907135	4 6280602	4 5784175
Vénus,	0 0030320	3 1583660	4 8593270
Le Soleil,	0 0072975	3 5397344	4 9999385
Mars,	0 0405055	4 2828983	5 1810105
Jupiter,	0 0209575	3 9976434	5 7155795
Saturne,	0 0247830	4 0703245	5 9788450
La Lune,	0 0239391	4 0551824	9 9993409

1244. Exemple. Je ſuppoſe qu'on connoiſſe l'anomalie vraie de Mars 1^s 0° 8′ 40″, & qu'on veuille la convertir en anomalie moyenne, le logarithme de la

diſtance aphélie, ſuivant les tables de M. Halley, eſt 5, 221516, le logarithme de la diſtance périhélie 5, 140505, comme il eſt aiſé de le trouver par les diſtances moyennes (1222), & les excentricités (1278); la moitié de la différence de ces deux logarithmes eſt 0, 0405055, c'eſt le logarithme conſtant pour la premiere analogie. Les diſtances qui répondent aux deux logarithmes des tables ſont 166539 & 138199, la moitié de la ſomme de ces deux diſtances eſt 152369, c'eſt le demi-axe de l'ellipſe, ou la diſtance moyenne de Mars au ſoleil; la moitié de la différence entre ces mêmes diſtances eſt 14170, excentricité de Mars, ſuivant les tables de M. Halley, en parties dont la diſtance moyenne du ſoleil à la terre contiendroit 100000. Il faut d'abord convertir cette excentricité en fraction de la diſtance moyenne de Mars, priſe pour unité, en diſant: 152369 eſt à 1, comme 14170 eſt à 0, 0929979, dont le logarithme eſt 8, 9684733; pour la réduire en ſecondes, on fait cette proportion; 1 eſt à 0, 0929979, comme 57° 17′ 44″ 8, arc égal au rayon, eſt à un quatrieme terme qui ſe trouve 19182″, & dont le logarithme eſt 4, 2828983

Logarithme de l'excentricité, 14170 . .	4, 1513699
Otez le logarithme du demi-axe, 152369 .	5, 1828966
différence	8, 9684733
Ajoutez le logarithme de 57°	5, 3144251
Som. log. conſ. pour la 2ᵉ analogie (1243)	4, 2828984
Log. conſtant pour la premiere analogie, .	0, 0405055
L. T. de la demi-anom. vraie, 15° 4′ 20″	9, 4302374
L. T. de la demi-anom. excent. 16 28 8,6	9, 4707429
Donc l'anomalie excent. eſt 32 56 17,2	
Logar. conſtant pour la ſeconde analogie,	4, 2828983
Log. du ſin. de l'an. excent. 32° 56′ 17″ 2	9, 7353855
Logarithme de 10430″, ou 2 53 50,0	4, 0182838
Ajoutez à l'anom. excent. 32 56 17,2	
Anomalie moyenne, 35 50 7,2	

Si l'anomalie vraie donnée ſurpaſſe ſix ſignes ou 180°, on prendra ce qui s'en manque pour aller à 360 degrés, ou à 12 ſignes, afin d'avoir la diſtance à l'aphélie par le plus court chemin, dont on fera le même uſage que dans l'exemple précédent ; mais après avoir trouvé l'anomalie moyenne, on aura ſoin de reprendre auſſi ſon ſupplément à 360 degrés pour avoir toujours cette anomalie moyenne comptée ſuivant l'ordre des ſignes.

C'eſt ainſi qu'on trouve l'anomalie moyenne, en ſuppoſant connue l'anomalie vraie ; mais c'eſt ordinairement l'anomalie moyenne qui eſt donnée, & c'eſt l'autre que l'on cherche ; dans ce cas, il faut voir à peu-près par les tables, quelle eſt l'équation de l'orbite qui a lieu au degré d'anomalie qui eſt donné ; on l'applique à l'anomalie moyenne pour avoir la vraie ; & cette anomalie vraie ſe convertit en moyenne par les règles précédentes. Si l'anomalie moyenne qui en réſulte, eſt la même que celle qui étoit donnée, c'eſt une preuve que l'équation employée étoit exacte ; ſi l'on trouve une anomalie moyenne trop grande, on diminue l'anomalie vraie ſuppoſée, & l'on a ainſi, après deux ou trois ſuppoſitions, une anomalie moyenne exactement d'accord avec celle qui étoit donnée ; la différence entre celle-ci & l'anomalie vraie qui a ſervi à la trouver, eſt l'équation exacte que l'on cherchoit.

Diſtance au Soleil, ou rayonvecteur.

1245. Le Rayon vecteur, ou la diſtance d'une planète au ſoleil, lorſqu'on connoît l'anomalie vraie & l'anomalie excentrique, ſe trouve par le moyen de cette proportion : *Le ſinus de l'anomalie vraie eſt au ſinus de l'anomalie excentrique, comme la moitié du petit axe eſt au rayon vecteur.*

Fig. 70.

Démonstration. Ayant tiré la ligne NQ (*fig.* 70), parallèle au rayon vecteur MS, on a par les triangles ſemblables cette proportion $SM : QN :: RM : RN :: CD : CK$ ou CN ; donc $SM : CD :: QN : CN ::$ ſin. QCN : ſin. $CQN ::$ ſin. RCN : ſin. RSM ; donc ſin. CSM : ſin. $NCS :: CD : SM$. *C. Q. F. D.* Cette démonſtration, qui eſt du P. Boſcovich, eſt beaucoup

plus ſimple que celle de M. de la Caille, (*Leçons d'Aſtronomie*, art. 213). On trouvera ci-après une autre méthode pour déterminer le rayon vecteur dans l'hypothèſe de Képler (1250).

1246. Pour faciliter l'uſage de ce théorême, nous avons mis dans la table de l'art. 1243 les logarithmes de chaque demi-axe conjugué pour les planètes principales, en ſuppoſant l'excentricité, telle qu'elle eſt dans les tables M. Halley; on ſait par la propriété ordinaire de l'ellipſe, que CD ou $\sqrt{SD^2 - CS^2} = \sqrt{CP^2 - CS^2}$, ou ce qui revient au même, $\sqrt{CP+CS}.\sqrt{CP-CS}$; c'eſt-à-dire, que CD eſt égal au produit des racines de la diſtance aphélie & de la diſtance périhélie; ainſi il eſt aiſé de trouver ce demi-axe, quand on connoît le rapport de l'excentrité & du grand axe; après quoi l'on en conclut la diſtance, par la proportion précédente. Valeur du petit axe.

Exemple. L'anomalie vraie ſuppoſée (art. 1244), eſt de 30° 8′ 40″, l'anomalie excentrique 32° 56′ 17″; on demande la diſtance de Mars au ſoleil, ou le rayon vecteur. On ajoutera enſemble le logarithme de la diſtance aphélie & le logarithme de la diſtance périhélie, on prendra la moitié de leur ſomme, & l'on aura le logarithme du demi-axe conjugué, de l'orbite de Mars,

	5, 1810105
Ajoutez le log. ſin. anom. exc. 32°56′17″,2	9, 7353855
	4, 9163960
Otez le log. ſin anom. vraie,	9, 7008609
Logarithme de la diſtance, 164261	5, 2155351

Probleme de Képler : connoiſſant l'Anomalie moyenne, trouver l'Anomalie vraie.

1247. Jusqu'ici nous avons donné les règles néceſſaires pour convertir l'anomalie vraie en anomalie moyenne, problême facile, & auquel nous avons

coutume de réduire le problême de Képler qui en eſt l'inverſe ; néanmoins pour ſatisfaire auſſi le lecteur ſur les méthodes directes qu'on peut employer pour réſoudre le problême de Képler par approximation, nous allons rapporter, d'après M. Caſſini, (*Elem. d'aſtron. pag.* 141), la ſolution ſuivante ; & l'on en trouvera dans le XXIe livre une ſolution analytique par le moyen du calcul intégral.

Fig. 71. Dans le cercle ANB, (*fig.* 71), circonſcrit à l'orbite AMB d'une planète, on a vu que AX étant pris pour anomalie moyenne, la différence NX entre l'anomalie moyenne & l'anomalie excentrique ACN eſt égale à la perpendiculaire ST (1241) ; ſi du point X on tire une ligne XY parallele à NCT, ou perpendiculaire ſur ST, la petite ligne SY ſera la différence entre l'arc NX égal à ST, & le ſinus de cet arc, qui eſt égal à YT ; cette différence entre l'arc & le ſinus n'excède pas une demi-ſeconde, lorſque l'arc NX ne va pas au-delà d'un degré & demi, on peut alors la négliger entiérement, & conſidérer les lignes NC, XS comme paralleles entre elles : dans ce cas l'angle CXS eſt égal à l'angle NCX ; dans le triangle SCX on connoît deux côtés & l'angle compris, ſavoir, l'excentricité SC, le rayon du cercle, c'eſt-à-dire, CX, égal à la diſtance moyenne, ou au demi-axe de l'ellipſe, & l'angle compris SCX qui eſt le ſupplément de l'anomalie moyenne donnée ACX ; on trouvera donc l'angle CXS, égal à NCX, qui retranché de l'anomalie moyenne ACX donnera l'anomalie excentrique ACN, dont le ſupplément eſt NCS : dans le triangle NCS on connoît encore les deux côtés SC, CN, & l'angle compris NCS, on trouvera donc l'angle NSC ou NSP. Enfin, on dira ; ſuivant la propriété de l'ellipſe PN eſt à PM, ou le grand axe eſt au petit axe, comme la tangente de ce dernier angle NSP à la tangente de l'anomalie vraie MSP. *C. Q. F. T.* On pourroit auſſi à la place des deux dernieres opérations employer l'analogie de l'article 1240.

Cas où l'équation eſt petite.

1248. Si l'angle CXS ou l'arc NX qui en diffère très-peu eſt aſſez grand pour que ſon ſinus égal à TY ſoit ſenſiblement moindre que l'arc, ou que NX, c'eſt-à-dire, ſi cet angle paſſe 1° 30′, on prendra la différence de l'arc au ſinus dans la table ſuivante, en décimales du rayon CA, & l'on aura SY; on cherchera auſſi le côté SX du triangle CSX, alors dans le triangle XSY rectangle en Y, on connoîtra SX & SY, en parties du rayon CA qui eſt toujours pris pour l'unité, on trouvera l'angle SXY qui retranché de SXC, donnera YXC égal à l'angle NCX, dont on avoit beſoin dans le calcul précédent pour le retrancher de l'anomalie moyenne; le reſte du calcul ſera le même.

Fig. 71. Cas où l'équation eſt fort grande.

On voit par la néceſſité d'employer la différence entre un arc & ſon ſinus, que ce problême dépend de la quadrature du cercle, & que cette méthode s'emploiroit difficilement ſi l'excentricité étoit aſſez grande, pour que l'arc NX devînt extrêmement grand, comme cela a lieu dans les comètes; mais on y ſupplée, ſoit par la méthode indirecte de l'article 1244, ſoit par d'autres moyens dont nous parlerons dans le livre XIX. La table ſuivante peut ſe calculer par deux méthodes différentes, que nous expliquerons dans le XXIe livre. On trouvera cette table plus étendue dans M. Caſſini, p. 145.

Différence entre les Arcs de cercles & leurs ſinus en parties du rayon, & en ſecondes de degrés.

Deg.	Différence en décimales.	En ſecondes.	Deg.	Différence en décimales.	En ſecondes.
1	0 0000009	0′ 0″	7	0 0003037	1′ 3″
2	0 0000071	0 1	8	0 0004532	1 33
3	0 0000239	0 5	9	0 0006450	2 13
4	0 0000567	0 12	10	0 0008848	3 3
5	0 0001108	0 23	11	0 0011767	4 3
6	0 0001913	0 39	12	0 0015278	5 16
7	0 0003037	1 3	13	0 0019415	6 41

Fig. 71.

1249. Exemple. Étant donnée dans l'orbe de Mercure l'excentricité 0, 20878, c'eſt-à-dire, de 20878 parties dont le demi-axe de l'orbe de Mercure eſt cent mille, on demande l'anomalie vraie qui répond à 60° d'anomalie moyenne : ſi du carré du grand axe on ôte le carré de l'excentricité, on aura le carré du demi petit axe CG, d'où l'on conclura $CG = 0,97796$, qu'on peut trouver encore plus facilement par la méthode de l'art. 1246. Dans le triangle XCS dont on connoît les deux côtés & l'angle compris $XCS = 120°$, on cherchera l'angle X, en diſant la ſomme des côtés CX & CS, ou la diſtance aphélie, eſt à leur différence, qui eſt la diſtance périhélie, comme la tangente de la moitié de l'anomalie moyenne eſt la tangente de 20° 42′ 8″, qui retranchés de cette moitié donnent l'angle X de 9° 17′ 52″, & le côté SX de 1, 11905 ; la quantité SY eſt 0, 00071, ſuivant la table précédente ; or, $SX : SY :: R$: ſin. 2′ 11″, ainſi l'on ôtera 2′ 11″ de l'angle N, & l'on aura CXY égal à $NCX = 9° 15′ 41″$ (a), & retranchant ceci de l'anomalie moyenne, il reſtera pour l'angle ACN 50° 44′ 19″, dont le ſupplément NCS eſt de 129° 15′ 41″ ; ainſi dans le triangle NCS on dira la diſtance aphélie eſt à la diſtance périhélie, comme la tang. de 25° 22′ 9″ $\frac{1}{2}$ eſt à la tang. d'un angle qui ajouté à 25° 22′ 9″ $\frac{1}{2}$ donne $NSP = 42° 36′ 45″ \frac{1}{2}$. Pour en conclure l'anomalie vraie, on dira : PN eſt à PM, ou le demi-grand axe 1 eſt à la moitié du petit axe 0, 97796, comme la tang. NSP eſt à la tang. de MSP, qui ſera de 41° 58′ 38″ ; c'eſt l'anomalie vraie qui répond à 60° d'anomalie moyenne ; la différence des deux anomalies eſt l'équation de l'orbite ou l'équation du centre, 18° 1′ 22″ (*M. Caſſini, pag. 148*).

Pour trouver le rayon vecteur.

1250. La distance de la planète au ſoleil eſt aiſée à trouver en même temps que l'anomalie vraie ; car dans les triangles PSN, PSM, en prenant SP,

(a) Pour plus d'exactitude, il faudroit prendre la quantité SY qui répond à 9° 15′ 41″, au lieu que nous avons pris celle qui répond à 9° 17′ 52″, mais la différence eſt inſenſible.

pour

pour rayon, les côtés *SN* & *SM* ſeront comme les ſécantes des angles *PSN*, *PSM*, ou ce qui revient au même, en raiſon inverſe des coſinus, donc le coſinus de l'anomalie vraie eſt au coſinus de l'angle *PSN*, comme le côté *SN* trouvé ci-devant eſt au rayon vecteur *SM*, qui eſt la diſtance de la planète au ſoleil.

1251. La méthode que je viens d'expliquer, a été donnée par M. Caſſini dans les Mémoires de l'Académie pour 1719, & dans ſes Elémens d'aſtronomie, *pag.* 141; je la trouve plus aiſée à employer que la plupart des méthodes propoſées juſqu'ici. On peut cependant conſulter la méthode de M. Keill dans les tranſactions philoſophiques de 1713; celle de M. de la Hire dans les mémoires de l'acad. de 1710; celle de Newton dans le premier livre de ſes principes; celle de M. Herman; enfin, celle de M. T. Simpſon, (Voyez *Eſſays on ſeveral curious and uſuful ſubjects*, London, 1740, *pag.* 41.); celle-ci eſt une des plus ſimples pour la pratique; mais il n'y en a aucune qui ſoit plus commode que la méthode indirecte expliquée ci-deſſus, art. 1240. *& ſuiv.* dont nous donnerons de nouvelles applications, art. 1301 *& ſuiv.*

Hypothèſe Elliptique ſimple.

1252. Pour ſimplifier les opérations qu'exige la théorie exacte de Képler, (1247), on a ſouvent employé ce que M. Caſſini appelle *Hypothèſe elliptique ſimple*, & qui abrège conſidérablement le calcul. Cette hypothèſe conſiſte à ſuppoſer que les angles au foyer ſupérieur de l'ellipſe croiſſent uniformément, & ſoient proportionnels au temps, c'eſt-à-dire, que l'angle *AFL*, (*fig.* 74.), croiſſe toujours également en temps égaux, quoique les anomalies vraies comme *ASL*, ſoient fort inégales; ainſi dans l'hypothèſe elliptique ſimple, l'angle *AFL* ſe prend pour l'anomalie moyenne; cette hypothèſe eſt une ſuite naturelle de celle de Ptolomée, qui ſuppoſoit autrefois que le point d'égalité & le centre des anomalies vraies étoient, l'un au-deſſus, l'autre au-

Fig. 74.

Fig. 74. deſſous du centre du cercle décrit par la planète (1068). Képler avoit reconnu combien l'on appprochoit des obſervations par cette hypothèſe, même en prenant l'orbite pour un cercle (1214). Boulliaud reconnut qu'en employant même l'ellipſe, & ſuppoſant toujours le mouvement uniforme autour d'un des foyers, on repréſentoit aſſez bien les inégalités des planètes, & que le calcul en étoit fort ſimple en imaginant un cercle & un épicycle à la place de l'orbite elliptique, (*Aſtron. Philol.* 1645, *pag.* 46).

1253. Seth Ward, profeſſeur d'aſtronomie à Oxfort, publia en 1654 un examen de l'aſtronomie philolaïque, & en 1656, un ouvrage intitulé : *Aſtronomia geometrica*, in-8°, où il donne (à la *p.* 8), une autre maniere fort ſimple de calculer l'équation dans une orbite elliptique, en ſupoſant le mouvement uniforme autour d'un des foyers ; en conſéquence, les Anglois ont donné à l'hypothèſe elliptique ſimple, le nom d'*Hypothèſe de Ward*, c'eſt le nom que lui donnent Keill & M. le Monnier, (*Inſt. aſtr. pag.* 510.), quoique Mercator & Ward lui-même aient cité Boulliaud, comme le premier auteur dans cette matiere. Cette hypothèſe a été employée par Street dans ſes tables Caroliines, mais avec une correction que Keill attribue à Boulliaud, par erreur ; il paroît que Street la tenoit de Robert Anderſon, (*Aſtronomia Carolina* 1710, *pag.* 40) : on peut voir ſur l'exactitude de ces méthodes, Mercator *phil. tranſ.* 1670, n°. 57. Suivant la méthode de Seth Ward on prolonge FL, de maniere que FE ſoit égale au grand axe AP de l'ellipſe, on aura $LE = LS$, parce que FL & LS équivalent auſſi au grand axe par la propriété de l'ellipſe ; ainſi le triangle LSE eſt iſocelle, l'angle E égal à l'angle LSE, & l'angle extérieur FLS double de l'angle E.

1254. Pour trouver l'anomalie vraie, & l'équation de l'orbite ou l'angle FLS ; on conſidere que ſuivant une proportion connue dans la Trigonométrie rectiligne, la demi-ſomme des côtés FE & FS eſt à leur demi-différence, comme la tangente du demi-ſupplément de

l'angle *LFS* eſt à la tangente de la demi-différence des angles *E* & *FSE*: mais la demi-ſomme de *FE* & *FS* eſt égale à *AS*, leur demi-différence égale à *PS*; la demi-ſomme des angles *FES*, *FSE*, eſt égale à la moitié de l'angle externe *AFL*, ou à la moitié de l'anomalie moyenne; la demi-différence de ces angles eſt auſſi la demi-différence de l'angle *FSE* & de l'angle *LSE* (qui eſt égal à *LES*); c'eſt donc la demi-anomalie vraie *ASL*; ainſi il ſuffira de faire cette proportion: *la diſtance aphélie eſt à la diſtance périhélie, comme la tangente de la moitié de l'anomalie moyenne eſt à la tangente de la moitié de l'anomalie vraie.*

La diſtance *SL* de la planète au ſoleil ſe trouve auſſi par une ſimple proportion, au moyen du triangle *SLF*, en diſant: le ſinus de l'équation du centre *SLF* eſt au double *FS* de l'excentricité, comme le ſinus de l'anomalie moyenne *LFS* eſt au rayon vecteur *SL*.

1255. Nous verrons dans le VIIe livre, que M. Halley fit de cette hypothèſe elliptique ſimple un uſage commode dans ſes tables de la Lune, au moyen d'une petite correction. C'eſt la facilité du calcul de l'anomalie vraie dans l'hypothèſe elliptique ſimple, qui la fit admettre par M. Halley dans ſes tables de la Lune, en y employant l'équation néceſſaire, qu'il appelle *Tabula pro expediendo calculo æquationis centri Lunæ* (1439); mais pour les autres planètes dont l'excentricité ne change point, M. Halley les avoit calculées rigoureuſement dans l'hypothèſe de Képler, & j'en ai fait de même dans mes tables. C'eſt le meilleur parti, ſur tout pour les planètes qui ſont fort excentriques, telles que Mercure & Mars: en effet, ſi dans le cas propoſé (art. 1249), on employoit l'hypothèſe elliptique ſimple, on trouveroit l'équation du centre de 18° 35′ 44″, plus grande de 3′ 22″ que dans l'hypothèſe de Képler, car l'anomalie vraie ſeroit de 41° 24′ 16″ ou le double de ce que nous avons trouvé dans la premiere proportion de l'article 1249.

Défaut de l'hypothèſe elliptique ſimple.

Dans les calculs du ſoleil dont la plus grande équation ne va pas à 2°, la plus grande erreur de l'hypothèſe

elliptique ſimple n'eſt que de 17″, & c'eſt vers 45° de diſtance à l'apogée ou au périgée. Dans la lune, la différence peut aller à 1′ 35″; l'erreur ſe trouve en moins depuis l'apogée juſqu'à 90° d'anomalie, & depuis le périgée juſqu'à 270°, & le vrai lieu eſt plus avancé qu'il ne paroîtroit par l'hypothèſe elliptique ſimple; c'eſt le contraire dans le ſecond & le quatrieme quart d'anomalie moyenne, ou l'hypothèſe elliptique ſimple donne une trop grande anomalie. (M. Caſſini, *pag.* 147).

Nous parlerons bientôt encore de l'imperfection de cette hypothèſe, lorſqu'il s'agira de déterminer une orbite par trois obſervations, comme le fait M. Caſſini dans les deux hypothèſes (1309).

1256. Ce que nous avons expliqué juſqu'ici au ſujet de l'équation de l'orbite, ſuffit pour reconnoître trois propriétés, que nous aurons ſouvent occaſion de citer en parlant de l'équation: 1°. l'équation de l'orbite eſt nulle dans l'apſide ſupérieure, (aphélie ou apogée), puiſque vers ce point-là le lieu moyen & le lieu vrai ſont confondus; mais en partant de l'apſide, leur différence augmente rapidement, parce que la vîteſſe vraie étant la plus petite, diffère le plus de la vîteſſe moyenne: 2°. cette différence s'accumule chaque jour, tant que la vîteſſe vraie eſt moindre que la vîteſſe moyenne; lorſqu'elles ſont égales, il ſe trouve un point vers trois ſignes & quelques degrés d'anomalie moyenne où la différence qui a augmenté juſqu'alors, eſt devenue la plus grande, & où l'équation ceſſe d'augmenter, étant preſque la même pendant quelque temps, pour diminuer enſuite juſqu'à l'apſide inférieure, (ſoit périhélie, ſoit périgée) où le lieu vrai & le lieu moyen ſe retrouvent d'accord une ſeconde fois: 3°. l'équation du centre eſt ſouſtractive, ſe retranche du lieu moyen dans les ſix premiers ſignes pour avoir le lieu vrai, parce que la vîteſſe moyenne en partant de l'apſide ſupérieure, eſt plus grande que la vîteſſe vraie, ainſi le lieu moyen eſt plus avancé; il faut donc ôter de la longitude moyenne la quantité de l'équation pour avoir le lieu vrai. Le contraire

arrive après l'apſide inférieure : la vîteſſe vraie étant la plus grande, prévaut à ſon tour ſur la moyenne, & le lieu vrai ſe trouve toujours le plus avancé dans la ſeconde moitié de l'ellipſe, ou dans les ſix derniers ſignes de l'anomalie ; alors l'équation de l'orbite s'ajoute au lieu moyen pour avoir le lieu vrai, ou à l'anomalie moyenne pour avoir l'anomalie vraie. Tout cela paroîtra encore plus clair par l'inſpection & l'uſage des tables des équations du ſoleil, de la lune & des planètes, qui ſont inſérées dans cet ouvrage.

DE LA PLUS GRANDE ÉQUATION.

1257. La plus grande équation peut s'obſerver immédiatement, comme nous le dirons bientôt (1259); mais lorſque la grandeur & la figure de l'ellipſe eſt donnée, c'eſt-à-dire, lorſqu'on connoît ſa diſtance aphélie & ſa diſtance périhélie, ou ſon excentricité (1218), on peut trouver par le calcul la plus grande équation, auſſi bien que le degré d'anomalie moyenne où arrive cette plus grande équation; pour cela il ſuffit de trouver le point *M*, (*fig.* 72.), dans lequel arrive la vîteſſe moyenne. En effet, dès que la planète eſt arrivée au point où ſa vîteſſe angulaire *D F M* (c'eſt-à-dire l'angle qu'elle parcourt vue du ſoleil) eſt égale à la vîteſſe moyenne, par exemple, de 59′ 8″ par jour ſi c'eſt la terre, la longitude moyenne ceſſe d'anticiper ſur la longitude vraie; elle en diffère alors le plus qu'il eſt poſſible, parce que juſqu'à ce moment la vîteſſe réelle qui étoit plus petite, faiſoit retarder tous les jours le lieu vrai ſur le lieu moyen; mais dès que la vîteſſe vraie eſt devenue égale à la vîteſſe moyenne, elle eſt prête à la ſurpaſſer, elle va commencer à regagner ce qu'elle avoit perdu juſqu'alors, le lieu vrai ſe rapproche du lieu moyen, & l'équation de l'orbite diminue. Ainſi toute la difficulté conſiſte à trouver le point *M*, & l'anomalie *A F M* de la planète au moment où ſa vîteſſe eſt égale à la vîteſſe angulaire moyenne : pour cela, ayant pris une ligne *F M*, moyenne proportionnelle entre les deux demi-

Fig. 72.

Trouver par le calcul la plus grande équation.

Fig. 72. axes de l'orbite, on décrira du foyer *F* comme centre un cercle *MN* ſur le rayon *FM*, & ce cercle aura une ſurface égale à celle de l'ellipſe, comme nous le démontrerons en parlant des ſections coniques dans le livre XXI. Suppoſons un corps qui décrive le cercle *MN* dans un temps égal à celui de la révolution de la planète dans ſon ellipſe, ſa vîteſſe angulaire ſera conſtamment égale à la vîteſſe angulaire moyenne de la planète, par exemple, de 59′ 8″ pour le ſoleil; l'aire décrite dans le cercle ſera toujours égale à l'aire décrite en même temps dans l'ellipſe, puiſque les aires totales ſont égales & parcourues en temps égaux, les durées des révolutions étant les mêmes, & les aires partielles de l'ellipſe proportionelles aux parties du temps: par exemple, ſi le ſoleil décrit en un jour une aire *DFR* de ſon ellipſe égale à la 365e. partie de la ſurface elliptique, l'aire *EFO* décrite dans le cercle, ſera auſſi la 365e. partie de l'aire du cercle, (qui eſt égal à l'ellipſe); la vîteſſe vraie du ſoleil (ou l'angle *DFR*) ſera donc égale à la vîteſſe moyenne en *M*, c'eſt-à-dire à l'angle *DFO*; car ce ſont deux ſecteurs égaux qui ont la même longueur *FM*, la même ſurface, & par conſéquent le même angle; d'ailleurs les triangles égaux *MED*, *MRO* qui ſont l'un en dehors du cercle, l'autre en dedans, font voir que le ſecteur elliptique eſt égal au ſecteur circulaire qui a le même angle en *F*; donc pour trouver le point de la vîteſſe moyenne, il faut trouver l'interſection *M* de l'ellipſe & du cercle qui lui eſt égal en ſurface. Ayant tiré du point *M* à l'autre foyer *B* de l'ellipſe une ligne *MB*, l'on aura un triangle *BFM*, dans lequel on connoît les trois côtés, ſavoir *BF* qui eſt le double de l'excentricité, *FM* qui eſt la moyenne proportionnelle entre les deux demi-axes, & *BM* qui eſt la différence entre *FM* & le grand axe, (parce que les deux lignes *FM* & *MB* font entre elles la valeur du grand axe); ainſi réſolvant le triangle *BFM* on cherchera l'angle *F* qui eſt l'anomalie vraie de la planète au temps de la plus grande équation.

1258. Exemple. Soit le demi-axe *CA* = 38710, &

le demi-axe conjugué = 37883, comme dans l'orbite de Mercure, $CF = 7960$ $BF = 15920$, FM ſera = 38294. On réſoudra le triangle BFM; la méthode la plus facile eſt celle-ci; de la demi-ſomme des trois côtés on ôte ſéparement chacun des trois côtés; de la ſomme des logarithmes des deux différences des côtés qui comprennent l'angle cherché, l'on ôte la ſomme des logarithmes de la demi-ſomme des trois côtés & de la différence du côté oppoſé à l'angle cherché, la moitié du reſte eſt le logarithme de la tangente de la moitié de l'angle cherché. Dans le cas particulier du calcul de la plus grande équation, il ſe réduit à cette règle : de la diſtance aphélie, on ôte ſéparement la moyenne FM, & le 3e. côté BM, on a deux différences, dont on cherche les logarithmes & l'on retranche le plus petit du plus grand, de cette différence de logarithmes on ôte celle des logarithmes de la diſtance aphélie & de la diſtance périhélie, reſte celui de la tangente de la moitié de l'anomalie vraie.

Dans notre exemple on trouvera l'angle BFM de 81° 4′ 52″, c'eſt l'anomalie vraie au temps de la plus grande équation, d'où l'on peut conclure (1244) l'anomalie moyenne 104° 45′ 41″, & leur différence qui eſt l'équation du centre, ſera 23° 40′ 49″; ce doit être la plus grande équation de l'orbe de Mercure; elle eſt ainſi dans mes tables, mais dans celles de M. Caſſini, on la trouve beaucoup plus grande (1278).

1259. Après avoir indiqué la maniere de calculer l'équation, nous parlerons de la maniere de l'obſerver. Depuis l'inſtant où une planète part de ſon aphélie A, (*fig.* 72), juſqu'au temps où elle arrive au point M de ſa plus grande équation, ſa vîteſſe eſt moindre que ne ſeroit la vîteſſe moyenne, l'anomalie vraie plus petite que l'anomalie moyenne, en diffère de plus en plus; lorſque la planète ayant paſſé le périhélie P ſe trouve au point G. à neuf ſignes d'anomalie ſa diſtance vraie AFG à l'aphélie eſt également plus petite que ſa diſtance moyenne, de la quantité de la plus *Fig.* 72.

grande équation. Si l'on a deux longitudes vraies de la planète obſervées en *G* & en *M*, elles différeront entre elles de la quantité de l'angle *GFM*, qui eſt la ſomme des deux anomalies vraies; mais la ſomme des deux anomalies moyennes ſera plus grande du double de l'équation, puiſque chaque diſtance vraie eſt plus petite que la diſtance moyenne, de la quantité de la plus grande équation; il eſt aiſé de calculer en tout temps la ſomme des deux anomalies moyennes, quoiqu'on ne connoiſſe pas le lieu de l'aphélie *A*, parce que la ſomme de deux anomalies moyennes eſt égale au mouvement moyen de la planète, dans cet intervalle de temps, & on le trouve aiſément quand on connoît la durée de la révolution (1161) (a); ainſi l'excès du mouvement moyen calculé, ſur le mouvement vrai obſervé donne le double de la plus grande équation, pourvu que l'on ait fait ces deux obſervations en *M* & en *G*, c'eſt-à-dire, aux temps de la vîteſſe moyenne (1257). Ce ſera le mouvement vrai qui ſera le plus conſidérable, ſi l'on prend la premiere obſervation avant le périhélie & la ſeconde après, comme dans l'exemple ſuivant (1261). Cette méthode ſe trouve dans M. Caſſini (*Elémens d'aſtron. p. 187.*) où elle n'eſt que la neuvieme, quoique la plus exacte.

1260. Pour diſcerner les temps & les obſervations convenables à cette recherche, un Obſervateur iſolé qui ne connoîtroit en aucune façon la ſituation de l'orbite de la planète, n'auroit qu'à raſſembler un grand nombre de poſitions obſervées, les comparer deux à deux, & voir combien le mouvement vrai obſervé différoit du mouvement moyen calculé pour chaque intervalle; la plus grande de toutes les différences lui donneroit le double de la plus grande équation; car entre une moyenne diſtance & l'autre, le mouvement vrai diffère du mouvement moyen à raiſon de l'équa-

(a) Pour plus d'exactitude, c'eſt la révolution anomaliſtique (1311) dont il faut ſe ſervir, mais dans les premieres approximations, on ſe ſert de la révolution tropique.

tion

tion ſouſtractive dans l'une & additive dans l'autre, donc ſi l'on a des obſervations faites dans tous les points de l'orbite, on en trouvera deux où le mouvement vrai ſera moindre ou plus grand que le mouvement moyen, du double de la plus grande équation. Actuellement que l'on connoît, à très-peu près, les lieux des apſides & des moyennes diſtances de toutes les planètes, on n'a qu'à choiſir du premier coup les obſervations faites avant & après l'aphélie, vers le temps de la plus grande équation, comme dans l'exemple ſuivant.

1261. EXEMPLE. Le 7 Octobre 1751, le vrai lieu du ſoleil obſervé par M. l'Abbé de la Caille, avant le périgée, en y faiſant entrer 3 jours d'obſervations diſcutées & comparées entre elles, fut trouvé de $6^s\ 13^\circ\ 47'\ 13''\ 7$

Le 28 Mars 1752 cette long. vraie fut de $0\ 8\ 9\ 25\ 5$

La différence de ces deux longitudes, ou le mouvement vrai du ſoleil eſt donc, $5\ 24\ 22\ 11$, 8

Mais dans cet intervalle le mouvement moyen avoit dû être par le calcul $5^s\ 20^\circ\ 31'\ 43''\ 2$

Différence, double de la plus grande équat. $3\ 50\ 28\ 6$

Dont la moitié eſt l'équation de l'orbite. $1\ 55\ 14\ 3$

Ce ſeroit-là exactement la plus grande équation de l'orbite, ſi dans les deux obſervations le ſoleil ſe fût trouvé exactement dans les points de ſa plus grande équation; mais ayant calculé par les tables chacune de ces deux équations, on a trouvé qu'il s'en falloit de 18″, 6, que la ſomme des deux équations qui avoient lieu le 7 Octobre & le 28 Mars, ne fût exactement le double de la plus grande équation; & il ſuffiſoit pour cela d'en connoître à-peu-près la valeur, ainſi l'on ajoutera ces 18″, 6 à la quantité trouvée, & l'on aura l'équation qui réſulte de ces deux obſervations 1° 55′ 33″, plus grande ſeulement de $11''\frac{1}{2}$ que l'équation à laquelle M. de la Caille s'eſt arrêté dans ſes tables. (Voy. *mémoires acad.* 1757, *pag.* 123). Celle qu'il a trouvée pour 1684 par les obſervations de M. de la Hire, n'en differe pas ſenſiblement,

Fig. 72. 1262. Comme il eſt extrêmement rare d'avoir deux obſervations qui ſoient faites préciſément dans les points *M* & *G* de la vîteſſe moyenne, on ne trouve guères dans un premier calcul la quantité exacte de la plus grande équation; mais après qu'on a trouvé à-peu-près l'équation & le lieu de l'apſide (1279), on calcule pour les deux temps d'obſervations l'équation de l'orbite, & l'on calcule auſſi la plus grande équation, (1257), on ſait alors combien l'équation donnée par les obſervations, devoit différer de la plus grande; c'eſt ainſi que dans l'exemple précédent M. de la Caille avoit trouvé 18″, 6, qu'il falloit ajouter pour avoir la véritable quantité de la plus grande équation.

1263. On peut auſſi trouver la plus grande équation ſans connoître le lieu de l'apſide, il n'y a qu'à prendre pour époque une longitude quelconque & lui comparer beaucoup d'autres longitudes pour avoir le mouvement vrai obſervé; on calculera pour chacun de ces intervalles le mouvement moyen par les tables, on aura des différences additives, & des différences ſouſtractives, la plus grande différence additive & la plus grande ſouſtractive étant ajoutées donneront le double de la plus grande équation de l'orbite, pourvu que l'on ait eu des obſervations faites ſur un aſſez grand nombre de points pour que les deux points de la plus grande équation s'y ſoient trouvés. Nous nous ſervirons de cette méthode pour trouver le lieu de l'apſide du 4ᵉ. ſatellite de Jupiter, dans le livre XVIIIᵉ.

1264. Quand on a trouvé par obſervation la plus grande équation, & qu'on veut en conclure l'excentricité, le plus commode eſt d'employer une règle de fauſſe poſition, ou de ſuppoſer d'abord connue l'excentricité que l'on cherche, pour en conclure la plus grande équation (1257). Si elle ſe trouve trop grande on diminuera l'excentricité ſuppoſée, & l'on recommencera le calcul; cette méthode de déterminer l'excentricité par le moyen de la plus grande équation eſt ſouvent plus commode que celle dont ſe ſervit Képler

pour trouver l'excentricité de Mars (1218); ou celle dont je me ſervirai pour Mercure (1267). Au reſte nous verrons bientôt une méthode exacte pour trouver l'excentricité ſans recourir à la plus grande équation (1301).

1265. La plus grande équation du ſoleil, ou de l'orbite de la terre eſt celle que l'on peut déterminer le plus ſouvent & le plus facilement, elle a été fixée à 1° 55′ 31″ ½ par M. de la Caille, qui a calculé un nombre immenſe d'obſervations. Equation du ſoleil.

Dans les tables de Flamſteed, achevées par M. le Monnier & publiées en 1746 dans ſes inſtitutions aſtronomiques, on la trouve de 1° 56′ 20″; mais dans la derniere page de ce livre M. le Monnier déclare qu'il la réduit à 1° 55′ 30″, ainſi il eſt en cela bien d'accord avec M. de la Caille. M. Mayer par des obſervations faites à Gottingen en 1756, & dont il m'envoya le réſultat, la trouvoit de 1° 55′ 31″, & dans ſes tables publiées à Londres depuis peu, elle eſt de 1° 55′ 31″ 6. M. Caſſini après avoir comparé pluſieurs obſervations des années 1717 & 1718, (*Elém. d'aſtr.* p. 192) & prenant un milieu entre les différentes déterminations qui en réſultent, trouve l'équation du ſoleil de 1° 55′ 34″. En voyant ainſi quatre témoignages auſſi authentiques & auſſi bien d'accord, on ne ſauroit douter que l'équation du centre du ſoleil ne ſoit conſtamment d'environ 1° 55′ 32″. Enfin M. de la Caille en 1759 & 1760, depuis la publication de ſes tables, continua d'obſerver le ſoleil, & m'aſſura qu'il trouvoit encore 1° 55′ 32″ pour la plus grande équation. Elle eſt très-bien connue. Elle eſt 1° 55′ ½.

1266. Il eſt vrai que les perturbations qu'éprouve le mouvement apparent du ſoleil par l'action des planètes, & qui peuvent aller à 50″, ont fait paroître quelquefois l'équation du centre plus ou moins grande, puiſque M. le Monnier qui l'avoit trouvée en 1740 & 1742 d'environ 1° 55′ 20″ ou 25″, la trouvoit en 1746 & 1747 de 1° 56′ 0′ (*Mém. acad.* 1747, *pag.* 308); mais on peut voir encore ce que M. de la Caille objectoit à

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK ANTWERPEN

ces différences, (*Mém. acad.* 1757, p. 142) prétendant qu'il ſuffiſoit de corriger la ſeule obſervation du 28 Sept. 1746, pour rapprocher de l'égalité tous les réſultats de M. le Monnier.

Elle eſt conſtante.

Enfin les obſervations faites, il y a plus de 250 ans par Waltherus, prouvent que la plus grande équation du ſoleil ne va point en diminuant, puiſqu'elles donnent $1^d\ 55'\ 40''$ ſuivant le calcul de M. de la Caille (*Mém. acad.* 1747, p. 144). Celle qu'il a adoptée dans ſes tables eſt de $1^\circ\ 55'\ 31''\ 6$, ce qui donne pour l'excentricité 0, 01680207, ou pour la double excentricité 0, 003360414 (865). En y employant les obſervations de M. de la Hire, faites vers l'année 1684, il a trouvé l'excentricité de 0, 01685.

1267. Pour déterminer la plus grande équation des autres planètes, on n'a pas toujours deux longitudes héliocentriques obſervées dans les moyennes diſtances; on ne ſauroit même les avoir pour Mercure; mais on détermine la plus grande équation, ainſi que le lieu de l'aphélie par les méthodes ſuivantes. La premiere méthode qui ſert également pour Mercure & pour Vénus, conſiſte à obſerver la plus grande digreſſion, lorſque la planète eſt dans ſes apſides; on en conclud la diſtance aphélie ou périhélie; & comme la diſtance moyenne eſt connue (1222), on a l'excentricité. Le 25 Septembre 1753 à $22^h\ 47'\ 50''$ temps moyen. Mercure paſſant au méridien à Paris, ſa longitude fut obſervée de $5^s\ 15^\circ\ 41'\ 14''$; Mercure étoit alors fort près de ſon périhélie, & en même-temps vers ſa plus grande digreſſion; le lieu du ſoleil calculé par les tables étoit à $6^s\ 3^\circ\ 27'\ 25''$, enſorte que l'élongation de Mercure étoit de $17^\circ\ 46'\ 11''$, c'eſt l'angle ſous lequel paroiſſoit alors la diſtance périhélie de Mercure vue de la terre; on pourroit trouver cette diſtance abſolue par le moyen du triangle formé à la terre, au ſoleil & à Mercure, où l'on connoît la diſtance du ſoleil à la terre, l'angle au ſoleil qui étoit de $101^\circ\ 39'$, & qui pouvoit ſe conclure de la diſtance à la conjonction,

enfin l'angle à la terre ou l'élongation obſervée ; il ſeroit facile de réſoudre ce triangle pour connoître le côté oppoſé qui étoit la diſtance périhélie ; & comparant cette diſtance périhélie avec la diſtance moyenne qui eſt ſuppoſé connue par la loi de Képler (1225), on auroit l'excentricité. Cependant comme dans cette obſervation & dans celles que j'ai pu raſſembler, Mercure n'étoit pas exactement dans ſon périhélie & dans ſa plus grande digreſſion, il eſt plus commode pour ſavoir quelle eſt la diſtance *SP* qui ſatisfait à l'obſervation, de calculer l'élongation pour cet inſtant-là par des tables déja à-peu-près exactes, en employant différentes valeurs pour l'excentricité ; c'eſt ainſi que j'ai reconnu que l'excentricité 7960 eſt la plus propre à ſatisfaire à cette obſervation. La plus grande équation qui lui répond eſt 23° 40′ 49″ (1257). Cette méthode ſuppoſe que le lieu de l'aphélie ait été à-peu-près déterminé par d'autres obſervations (1311), afin que l'erreur qu'on commettroit ſur le lieu de l'aphélie n'affecte pas la diſtance au ſoleil, & l'élongation calculée, que l'on veut comparer à l'obſervation pour juger ſi l'excentricité ſuppoſée dans les tables eſt exacte ; mais dans cette recherche il n'eſt beſoin de connoître l'aphélie qu'à peu-près ; la diſtance de Mercure au ſoleil ne change alors que de $\frac{1}{46680}$ pour un degré d'erreur, ſur le lieu de l'aphélie, or cette erreur eſt beaucoup plus grande que celle que nous pouvons commettre actuellement ſur le lieu de l'aphélie de Mercure. Si l'on obſerve à une minute près la différence de la plus grande à la plus petite digreſſion, on aura auſſi la plus grande équation à une minute près ; mais nous pouvons l'obſerver à un quart de minute.

Fig. 73.

Equation de Mercure.

1268. La ſeconde méthode que j'ai employée pour connoître l'excentricité de Mercure, ſuppoſe qu'on connoiſſe déja le lieu de l'aphélie, & ſon mouvement, par la méthode que j'expliquerai bientôt (1286) : on prend deux longitudes obſervées dans les conjonctions de Mercure, on en retranche l'aphélie qui convient à

chacune pour avoir deux anomalies vraies, on les convertit en anomalies moyennes (1244), en ſuppoſant une excentricité déja à peu-près connue; ſi la différence des anomalies moyennes trouvées eſt la même que celle que l'on connoît d'avance, on eſt sûr que l'excentricité ſuppoſée eſt exacte; ſinon l'on en prend une autre; & par ces diverſes tentatives, on s'aſſure de la véritable.

Je choiſis pour exemple les paſſages de Mercure obſervés fort exactement en 1743 & en 1753; voici les temps moyens de ces deux conjonctions, les longitudes de Mercure ſur ſon orbite, les lieux de l'aphélie que je ſuppoſois connus d'avance, & les anomalies vraies que j'en avois déduites.

		Longitude.	Aphélie.	Anom. vraie.
1743.4	Nov. 22h 26′ 10″	1s 12° 36′ 21″	8s 13° 25′ 47″	4s 29° 10′ 34″
1753.5	Mai 18 29 50	7 15 48 10	8 13 36 58	11 2 11 12

La différence des anomalies moyennes pour l'intervalle donné eſt connue d'avance par la durée de la révolution, & par le mouvement de l'aphélie, elle doit être 5s 9° 42′ 8″; or en convertiſſant les deux anomalies vraies données en anomalies moyennes avec l'excentricité 7960, on trouve en effet 5s 9° 47′ 44″, & 10s 19° 29′ 52″, qui diffèrent autant qu'elles doivent différer, ce qui m'apprend que l'excentricité 7960 ſatisfait à ces deux obſervations. On ſent bien que ſi j'avois ſuppoſé d'autres quantités pour les lieux de l'aphélie, j'aurois trouvé une autre valeur pour l'excentricité; la différence entre ces deux obſervations n'eſt qu'une donnée, & elle ne peut déterminer qu'un élément, c'eſt-à-dire, l'excentricité ſi l'aphélie eſt connu, ou l'aphélie ſi l'excentricité eſt donnée.

Auſſi la méthode que je viens d'expliquer ſerviroit à trouver le lieu de l'aphélie de Mercure, ſi l'on vouloit ſuppoſer l'excentricité connue par les digreſſions aphélie & périhélie (1267); car en convertiſſant les anomalies vraies en moyennes, avec différentes ſuppoſitions pour le lieu de l'aphélie, on trouveroit quel eſt

l'aphélie qui ſatisfait aux deux longitudes obſervées.

1269. M. Caſſini en employant les paſſages de Mercure ſur le ſoleil obſervés en 1661, 1690 & 1697, avoit trouvé la plus grande équation de Mercure dans l'hypothèſe de Képler, de 24° 3′; je fis enſuite une pareille recherche au moyen des paſſages de 1740, 1743 & 1753, je ne trouvai que 23° 27′ 51″ pour la plus grande équation, (*Mém. acad.* 1756, *pag.* 267): les paſſages de Mercure ne ſont pas propres à ces recherches, à moins que l'on ne connoiſſe le lieu de l'aphélie; ils ne ſont pas diſpoſés ſur trois points de l'orbite aſſez différens les uns des autres. D'ailleurs la théorie de Mercure eſt extrêmement difficile à établir, parce que les obſervations en ſont rares, que ſon orbite eſt fort excentrique, & ſon mouvement vu de la terre trop lent: les tables Rudolphines qui dans le dernier ſiècle étoient les meilleures, s'écartoient encore de 14′ du lieu obſervé, & celles de M. de la Hire de 5′, (*Mém. acad.* 1706, *pag.* 99 *&* 101); ce qui fait une très-grande erreur par rapport au ſoleil (1315).

L'extrême différence qu'on trouvera ci-près (1278) entre les réſultats de M. Halley & de M. Caſſini, dont l'un fait la plus grande équation de 23° 42′ 36″, & l'autre de 24° 2′ 58″, prouvoit la néceſſité qu'il y avoit d'obſerver encore Mercure avec ſoin, & d'employer les plus grandes digreſſions pour déterminer ſon excentricité (1267). M. de Thury dans les Mém. de l'Acad. pour 1753, *pag.* 321, dit qu'ayant fait pluſieurs obſervations de Mercure dans ſes plus grandes digreſſions, il a trouvé ſon équation de 23° 50′ environ, mais que cependant il ne s'arrêtoit pas encore à cette détermination: pour moi, qui l'ai déterminé depuis ce temps-là avec le plus grand ſoin par de nouvelles obſervations, je l'ai trouvé de 23° 40′ 49″, plus petite de 2′ que par les tables de Halley, & de 22′ que par celles de Caſſini; les deux méthodes que j'ai expliquées ci-deſſus m'ont donné à peu-près le même réſultat. (*Mém. de l'acad.* 1767).

1270. Les conjonctions inférieures de Vénus au Equation de Vénus.

ſoleil obſervées à Paris en 1715, 1716 & 1718, qui ſeront rapportées à la fin de ce livre, ont ſervi à M. Caſſini, (*Elém. d'aſtron. pag.* 562), pour déterminer la plus grande équation de Vénus de 49′ 8″, & par les obſervations de 1715, 1718 & 1719, il trouve 49′ 4″; M. Halley ne l'emploie que de 48′ 0″, la différence eſt aſſez légére & fait voir qu'il y a peu d'incertitude ſur cet élément: en effet, les conjonctions inférieures de Vénus ſont des obſervations extrêmement propres à une pareille recherche & par leur moyen l'on eſt venu à bout de connoître les mouvemens de Vénus avec aſſez de préciſion; n'ayant pas d'ailleurs d'obſervations récentes qui ſoient bien propres à ces recherches, je m'en ſuis tenu à faire l'équation de Vénus dans mes tables de 48′ 30″.

Elle eſt de 48 ½ minutes.

Equation de Mars.

1271. Les obſervations de Ptolomée calculées par M. Caſſini, donnent la plus grande équation de Mars 10° 49′ pour l'année 133 avant J. C. (*Elém. d'aſtron. pag.* 472), & trois obſervations de Flamſteed faites à Greenwich le 11 Déc. 1691, le 20 Févr. 1696, & le 8 Mai 1700, donnent 10° 39′ 8″; on ne doit pas conclure de cette différence que l'équation de Mars ait diminué réellement, & que ſon orbite ſe ſoit rapprochée de la figure circulaire, parce que les obſervations de Ptolomée ſont trop peu exactes pour les faire entrer en concurrence avec celles de Flamſteed.

Nouvelle détermination.

Pour déterminer cet élément par des obſervations plus récentes & encore plus exactes, j'avois comparé entre elles les oppoſitions de Mars obſervées en 1743, 1751 & 1753, (*Mém. acad.* 1755, *pag.* 222); j'ai refait ces calculs de nouveau, & j'ai trouvé pour l'excentricité 14198, 6 (art. 1304). J'ai comparé enſuite les oppoſitions de 1745, 1747 & 1749, qui m'ont donné l'excentricité 14217, 6 (art. 1307). Il y a peu de différence entre ces réſultats, & cet élément me paroît aſſez bien déterminé; le milieu eſt 14218, 1, c'eſt cette excentricité 14218, 1 trouvée par la méthode que j'expliquerai bientôt (1301), qui m'a fait trouver l'équation de 10° 40′ 39″; elle ſurpaſſe de 37″ celles des tables de Halley (1278).

Elle eſt de 10° 40′ 39″.

1272.

Equation de Jupiter.

1272. Les oppoſitions de Jupiter obſervées en 1723, & 1728, donnent pour la différence du mouvement vrai $5^s\ 27^\circ\ 46'\ 40''$; & comme dans l'intervalle de ces obſervations on a pour le moyen mouvement $5^s\ 16^\circ\ 50'\ 15''$, la différence $10^\circ\ 56'\ 25''$ eſt le double de la plus grande équation (1259). Auſſi M. Caſſini en conclut que l'équation du centre eſt de $5^\circ\ 28'\ 12''\frac{1}{2}$ (*Elém. d'aſt. pag.* 423). Par l'oppoſition de 1716 comparée à celles qui ont ſuivi juſqu'en 1723, il trouve la plus grande équation $5^\circ\ 26'\ 42''$; par l'oppoſition de 1657, comparée avec celles de 1676 & 1677, $5^\circ\ 30'\ 43''$. Par les oppoſitions de 1719, 1721 & 1723, il trouve $5^\circ\ 31'\ 43''$; mais par les obſervations de Tycho faites vers l'an 1590, cette même équation n'eſt que de $5^\circ\ 28'\ 56''$ (*Ibid. pag.* 427).

On a ſoupçonné qu'elle étoit variable.

1273. Les obſervations de Ptolomée faites vers l'an 136 avant J. C. donnent la plus grande équation, encore plus petite, & ſuivant le calcul de M. Caſſini de $5^\circ\ 12'\ 40''$. Suivant M. Wargentin $4^\circ\ 57'\ 27''$. Ces réſultats ſemblent diminuer proportionnellement à meſure que l'on remonte aux anciennes obſervations. M. Caſſini en avoit déja fait la remarque (*pag.* 429), pour donner lieu d'examiner dans la ſuite s'il y auroit encore une ſemblable variation dans l'équation du centre de Jupiter.

M. Jeaurat ayant auſſi comparé entre elles la plupart des oppoſitions de Jupiter, ſoit en les corrigeant par les équations provenues de l'attraction de Saturne, (*Connoiſſ. des mouv. cél.* 1763). (a), ſoit en négligeant cette correction, a trouvé pour l'équation du centre $5^\circ\ 12'$ au temps de Ptolomée, $5^\circ\ 16'$ au temps de Copernic, vers l'an 1525; $5^\circ\ 23'\ 15''$ par les obſervations de Tycho pour l'an 1590; $5^\circ\ 33'\ 20''$ pour le commencement du ſiècle; & $5^\circ\ 34'\ 24''$ pour 1750 (*Mém. acad.* 1765, *pag.* 384). Il a ſuivi pour ce tra-

(a) Il faut obſerver que dans les tables de ces équations, on a changé les ſignes des tables II & III, page 128, & qu'il faut lire + au lieu de — & — au lieu de +.

vail la méthode que j'avois déja donnée, & qui ſe trouvera ci-après art. 1288. Enfin dans ſes dernieres recherches ſur cette matiere M. Jeaurat trouve l'équation de l'orbite de Jupiter pour 1762 de 5° 36′ 29″. (*Mém. acad.* 1765, *pag.* 438, & 1766, *pag.* 105). Dans les tables de Jupiter qu'il a jointes à celles des Satellites, par M. Bailly, & dont les fondemens ſont expliqués dans les mémoires de 1766, il n'a pas eu égard aux équations produites par l'attraction de Saturne, & il trouve la plus grande équation pour l'an 135 de 5° 12′ 5″; par les obſervations de 1520, 1526 & 1529, 5° 13′ 18″; par celles de 1586, 1590 & 1592, 5° 30′ 30″; par celles de 1676, 1678 & 1682, 5° 27′ 22″; par celles de 1700, 1702 & 1704, 5° 36′ 2″; par celles de 1735, 1738 & 1740, 5° 30′ 2″, & par celles de 1759, 1761 & 1765, 5° 36′ 29″, enſorte qu'il juge que cette équation a des augmentations & des diminutions ſucceſſives. Quoiqu'il en ſoit, l'équation actuelle ſenſiblement plus grande que celle des anciennes obſervations, indique une augmentation ſucceſſive dans l'équation de Jupiter. Cependant M. Euler dans ſa ſeconde pièce ſur les inégalités de Jupiter & de Saturne, qui a remporté le prix de l'académie en 1752, trouve que l'équation de Jupiter doit diminuer de 58″ ½ par ſiècle, réſultat contraire au précédent, mais M. de la Grange, dans le tome IIIe des mémoires de l'académie de Turin, trouve au contraire une augmentation de 1′ 2″ 63 par ſiècle.

1274. M. Bailly ayant comparé entre elles diverſes oppoſitions de Jupiter, également corrigées par les équations qui viennent de l'attraction de Saturne, a trouvé par un milieu entre divers réſultats 5° 12′ 10″ pour l'an 136; 5° 31′ 53″ pour 1590; 5° 31′ 36″ pour 1661; & 5° 33′ 23″ pour 1762, enſorte que l'augmentation de cette équation lui paroît d'environ 1′ 47″ par ſiècle. Enfin M. Wargentin, dont je ſuivrai les recherches pour cette partie, a trouvé la plus grande équation de Jupiter de 5° 34′ 1″ pour 1760, avec un accroiſſement de 2′ 15″ par ſiècle.

Elle eſt de 5° 34′.

Mais il faut convenir que parmi les cinq obſervations anciennes que nous avons de Jupiter, & qui ſeront rapportées à la fin de ce livre; il en reſte toujours une où l'erreur de nos tables eſt d'un demi-degré, & deux où elle eſt d'environ un quart de degré; or en ſuppoſant que les obſervations anciennes ſont ſucceptibles de ces erreurs, comme cela me paroît évident, on pourroit s'en tenir à faire l'équation conſtante, pourvu qu'on fit le mouvement ſéculaire de $5^s\ 6^\circ\ 19'\ 5''$. Mais ſi l'on fait uſage de l'équation ſéculaire (1171), on eſt obligé de rendre l'excentricité plus petite dans les ſiècles paſſés, pour ne pas mettre trop de différence entre la premiere & la ſeconde des obſervations rapportées par Ptolomée.

1275. L'équation de Saturne a été calculée par M. Caſſini, d'après le principe établi ci-deſſus (1259), que la différence entre le mouvement vrai obſervé, & le mouvement moyen calculé pour l'intervalle entre deux oppoſitions, donne le double de la plus grande équation; quand ces deux oppoſitions ſont exactement dans les points des moyennes diſtances. M. Caſſini compare l'oppoſition de 1686 avec celle de 1701; l'intervalle de temps lui donne pour le mouvement moyen $6^s\ 9^\circ\ 36'\ 0''$; le mouvement vrai obſervé eſt de $5^s\ 26^\circ\ 34'\ 10''$, la différence eſt de $13^\circ\ 1'\ 50''$, dont la moitié eſt la plus grande équation de Saturne $6^\circ\ 30'\ 55''$. Equation de Saturne.

M. Caſſini a auſſi calculé un grand nombre d'oppoſitions depuis 1685 juſqu'en 1716, priſes trois à trois, d'où il a conclu l'équation de Saturne de $6^\circ\ 31'\ 38''$, en employant l'hypothèſe de Képler; cette équation qui approche beaucoup de celle qui avoit été trouvée par les oppoſitions de 1686 & de 1701 eſt à peu-près celle que M. Caſſini emploie dans ſes tables, (*Elémens d'aſtron. pag.* 371), & elle approche également de celle qui eſt dans les tables de Halley $6^\circ\ 32'\ 4''$.

1276. M. Euler dans la Piéce qui a remporté le prix de l'Académie en 1748, ſur les inégalités de Saturne, *pag.* 109, ſuppoſe cette équation de $6^\circ\ 32'\ 10''$;

enſuite dans le ſupplément il obſerve qu'il pourroit y avoir une équation, dont la quantité iroit toujours en croiſſant, & qui feroit diminuer la plus grande équation de $1' 50''$ tous les cent ans, mais dont la quantité varie ſuivant la poſition de Jupiter par rapport à Saturne, dans l'eſpace de 29 ans.

M. Euler dans ſa ſeconde Piéce ſur le même ſujet, qui a remporté le prix de l'Académie en 1752, trouve encore que l'équation de Saturne doit diminuer de $1' 48'' \frac{1}{2}$ tous les cent ans : c'eſt une choſe remarquable, dit-il, que l'excentricité de Jupiter occaſionne, à raiſon de ſon attraction, une excentricité dans Saturne, qui a un rapport conſtant avec celle de Jupiter, & qui donne un aphélie commun ; ainſi l'excentricité qu'on obſerve actuellement dans le mouvement de Saturne, eſt le réſultat de l'excentricité qui lui étoit primitivement naturelle, & de celle qui vient de l'attraction de Jupiter dans une orbite excentrique. J'ai été obligé de prévenir le lecteur ſur une partie de ce que j'aurois pu ne dire que dans le livre de l'attraction, mais il convenoit de joindre le ſuffrage de la théorie avec celui des obſervations, pour faire voir que l'équation de Saturne eſt difficile à déterminer, à cauſe des effets de l'attraction de Jupiter. Cependant elle ne differe pas beaucoup de $6° 32'$, quand on veut tenir compte des obſervations faites dans le dernier ſiècle.

1277. Les recherches que j'ai faites ſur la théorie de Saturne, d'après l'inégalité ſinguliere dont j'ai parlé (1167), m'ont fait reconnoître que pour ſatisfaire aux obſervations faites depuis 30 ou 40 ans, il falloit ſuppoſer l'équation de $6° 23' 19''$, & c'eſt ainſi que je l'employerai dans mes tables ; cette équation ne ſatisferoit pas aux obſervations plus anciennes ; mais il eſt impoſſible de les concilier avec les plus récentes, du moins en employant la même orbite ; & j'ai préféré des tables qui fuſſent exactes pour le temps où nous ſommes.

1278. Pour mettre ſous les yeux du lecteur le réſultat des articles précédens ſur la plus grande équation

de chaque planète, nous rapporterons les quantités assignées par quatre différens auteurs dans leurs tables astronomiques ; de même que les excentricités que l'on peut conclure, (1258, 1264), & que l'on conclut effectivement de ces plus grandes équations observées, quoiqu'on puisse les déterminer aussi sans le secours de la plus grande équation (1218, 1267).

Les excentricités qui sont dans la table suivante, supposent la distance moyenne du soleil à la terre 100000, ainsi que les distances moyennes (1222) ; mais j'y ai ajouté des décimales, quand le calcul me les a données. Mais les logarithmes des excentricités supposent la distance moyenne de chaque planète égale à l'unité, parce qu'on les emploie ordinairement sous cette forme (1244). De toutes les excentricités de la derniere colonne, il n'y a que celle de Mercure & celle de Mars qui aient été calculées directement ; les autres ont été déduites de la plus grande équation observée, qui se trouvera dans la seconde table ; j'y ai joint par anticipation l'excentricité de la lune, telle que M. Mayer assure l'avoir trouvée par les observations. Celle qu'il faut supposer pour donner la plus grande équation, $6^{\circ}\ 18'\ 32''$, telle qu'elle est dans les tables de Mayer, est 0,055083 ; mais cette excentricité ne suffiroit pas pour retrouver les autres nombres de la table, parce que M. Mayer y a fait entrer une autre inégalité que celle de l'ellipse ordinaire ou de l'hypothèse de Képler. L'excentricité 0,05505 que Flamsteed, Halley & M. Clairaut ont employé, donne pour la plus grande équation $6^{\circ}\ 18'\ 18''4$, & non pas $6^{\circ}\ 18^{\circ}\ 32'$.

TABLE des excentricités ſuivant différens Auteurs.

Planetes.	Excentricité ſuivant Képler.	Suivant M. Halley.	Log. de l'excent. en partie de la diſtan. moyenne.	Excentricité ſuiv. nos calculs.
Mercure.	8150	7970	9,3136351	7960
Vénus.	501	504,985	7,8439409	510,2
Le Soleil.	1800	1692,40	8,2285030	1680,207
Mars.	14115,5	14170	8,9684732	14218,1
Jupiter.	25074	25078,6	8,6832183	25277,3
Saturne.	54143,5	54381,5	8,7558994	53210
La Lune.				0,0547218

TABLE des plus grandes Equations des Orbites planétaires ſuivant différens Auteurs.

	Boulliaud, 1645.	M. de la Hire, 1702.	M. Halley, 1719.	M. Caſſini, 1740.	Suivant nos Tables.
Mercure,	24° 17′ 20″	24° 16′ 52″	23° 42′ 36″	24° 2′ 58″	23° 40′ 49″
Vénus,	0 54 36	0 50 0	0 48 0	0 49 6	0 48 30
Le Soleil,	2 2 41	1 55 42	1 56 20	1 55 51	1 55 31,6
Mars,	10 36 12	10 40 40	10 40 2	10 39 19	10 40 39
Jupiter,	5 34 0	5 36 54	5 31 36	5 31 17	5 34 1
Saturne,	6 37 10	6 30 00	6 32 4	6 31 40	6 23 19
La Lune,					6 18 32

MÉTHODES POUR TROUVER le lieu de l'Aphélie d'une Planète.

Premiere méthode.

1279. Il y a trois méthodes pour déterminer le lieu de l'aphélie d'une planète, la premiere & la plus ſimple de toutes ſert principalement pour le ſoleil, elle peut ſervir auſſi quelquefois pour les planètes, en

voici l'explication. Lorſqu'on a pluſieurs obſervations d'une planète, faites en différens points de ſon orbite, il faut chercher celles qui donnent deux points diamétralement oppoſés ; & ſi les temps de ces obſervations different exactement d'une demi-révolution, on ſera sûr que ces deux obſervations ſont l'une dans l'aphélie, & l'autre dans le périhélie ; ainſi en comparant deux à deux un grand nombre d'obſervations, on ne pourra manquer de tomber ſur celles qui indiqueront la place des apſides.

Soit l'aphélie d'une planète en *A* (*fig.* 73), & le périhélie en *P*, la partie *ABP* de l'ellipſe eſt égale à la partie *ACP*, elles ſont parcourues l'une & l'autre dans l'eſpace du temps de la demi-révolution, par exemple, en 182j 15^h 7′ 40″, s'il s'agit du ſoleil (1312). Nous prenons ici la révolution anomaliſtique, c'eſt-à-dire, par rapport à l'apogée ; mais dans une premiere approximation l'on ſe contenteroit de la révolution tropique (1161), en ſuppoſant l'aphélie immobile pendant une demi-révolution. *Fig.* 73.

Si l'on prend un autre point quelconque *D* avec le point *E* qui lui eſt oppoſé, la partie *DACE* de l'ellipſe exigera plus de temps que la partie *DBPE*, parce que la premiere renferme l'aphélie, c'eſt-à-dire, l'endroit où le mouvement de la planète eſt le plus lent, tandis qu'au contraire la partie *DBE*, dans laquelle ſe trouve le périhélie, doit être parcourue d'un mouvement plus rapide & en moins de temps.

Méthode de Képler.

Ainſi les points *A* & *P* des deux apſides ſont les ſeuls qui étant diamétralement oppoſés par rapport au foyer de l'ellipſe, faſſent auſſi deux intervalles de temps égaux ; on ſera donc aſſuré de connoître le lieu des apſides, ſi l'on trouve deux longitudes qui étant diamétralement oppoſées comme *A* & *P*, répondent auſſi à des temps éloignés d'une demi-révolution, c'eſt-à-dire, de la moitié du temps qu'il faut à la planète pour revenir à ſon apſide, & il ſuffira de chercher dans le nombre

des obſervations d'une planète, les deux qui ſatisferont à la fois à cette double condition.

1280. Cette maniere de déterminer le lieu de l'aphélie d'une planète fut employée pour la premiere fois par Képler dans le XLIIe. Chapitre de ſon livre *de Stella Martis*, pag. 208, où il s'exprime en ces termes : *Perpende itaque quòd ſi Mars à puncto apogæi eundo dimidium temporis reſtitutorii inſumat, fine hujus temporis, omninò confectis* 180 *gradibus, ſit futurus in puncto perigæi. At ſi jam hoc ſpatium temporis auſpicetur uno die poſtquam in apogæo fuit, incipiet igitur curſum à* 26′ 13″ *ab apogæo, finietque in* 180° 38′ 2″, *itaque dimidio temporis plus dimidio itineris curret per* 11′ 49″ : *contrarium ſi die uno ante apogæum inciperet.* M. l'Abbé de la Caille avoit trouvé cette méthode, & il en fit l'objet d'un mémoire qu'il lut à l'académie le 16 Juin 1742 ; il y appliqua des obſervations qu'il fit enſuite en 1743 (*Mem. acad.* 1742, *pag.* 139). Il a enſuite employé cette méthode dans ſa théorie du ſoleil (*Mem. acad.* 1757, *pag.* 121), en annonçant qu'il l'avoit trouvée très-bien expliquée dans le livre de M. Manfredi *de Gnomone meridiano Bononienſi*, imprimé en 1736 ; enfin je l'ai retrouvée moi-même dans Képler, où l'on rencontre en général une grande partie des belles idées qui ont été miſes en œuvre par ceux qui l'ont ſuivi ; au reſte il faut convenir que cette méthode eſt ſi naturelle, & découle ſi naturellement de la loi du mouvement elliptique, qu'il n'eſt pas ſurprenant que trois perſonnes l'aient imaginée ſéparément.

1281. Pour faire uſage de cette méthode, il eſt bon de connoître la propoſition ſuivante ; elle ſert a trouver une quantité qui ajoutée au temps de l'obſervation, donne celui du paſſage par l'aphélie. *La différence des vîteſſes, aphélie & périhélie eſt à la vîteſſe périhélie, comme la différence entre l'intervalle de temps des deux obſervations, & la demi-révolution anomaliſtique, eſt au temps que la planète emploîra pour arriver à ſon aphélie.*

Soit *a* le mouvement diurne dans l'aphélie, *p* le mouvement

mouvement diurne dans le périhélie ; c la différence trouvée par obſervation entre le temps par DPE, (*fig.* 73), & la demi-révolution anomaliſtique ; t la quantité cherchée, ou le temps qui répond à l'arc AD ; alors on aura cette proportion, $p : a :: t : \frac{ta}{p}$, c'eſt-à-dire, la vîteſſe périhélie eſt à la vîteſſe aphélie, comme le temps par AD eſt au temps par PE. Si à la demi-révolution anomaliſtique de A en P, on ajoute le temps par AD, & qu'on ôte le temps par PE, on aura $t - \frac{ta}{p}$ pour la différence entre l'intervalle obſervé & la demi-révolution anomaliſtique ; différence que nous avons appellée c ; ainſi $t - \frac{ta}{p} = c$, ou $tp - ta = pc$, ce qui ſe réduit à cette proportion, $p - a : p :: c : t$, & par conſéquent à la règle que nous voulions démontrer.

Démonſtration de cette proportion.

Fig. 73.

1282. Exemple. Le lieu du ſoleil obſervé au Cap de Bonne-Eſpérance par M. de la Caille le 30 Juin 1751, à $0^h\ 2'\ 55''$ de temps moyen au Cap, ou le 29 à $22^h\ 58'\ 40''$ de temps moyen réduit au méridien de Paris, étoit de $3^s\ 8°\ 9'\ 2''\ 3$; & le 29 Décembre à $22^h\ 58'\ 45''$, il étoit de $9^s\ 8°\ 30'\ 5''\ 0$, l'apogée ayant dû avancer dans cet intervalle de $32''\ 7$, il faut les ajouter à la premiere longitude pour la réduire, par rapport à l'apogée, au même état que ſi l'apogée étoit immobile, & l'on aura $3^s\ 8°\ 9'\ 35''\ 0$, dont l'oppoſite devoit être $9^s\ 8°\ 9'\ 35''$, moins avancé de $20'\ 30''$ que le vrai lieu obſervé : le 30 de Juin il faut au ſoleil $8^h\ 36'\ 10''$ pour parcourir cette quantité ; ainſi le 30 Juin à $7^h\ 34'\ 50''$, le ſoleil dut être exactement à l'oppoſite du lieu qui fut obſervé enſuite le 29 Décembre ; l'intervalle de temps moyen entre ces deux momens eſt de 182j $15^h\ 23'\ 55''$, plus long de $16'\ 13''$ que la demi-révolution anomaliſtique ſuppoſée par M. de la Caille de 182j $15^h\ 7'\ 42''$, ce qui prouve que le ſoleil n'étoit pas encore à ſon apogée dans la premiere obſervation. Si l'on fait cette proportion qui vient d'être démontrée (1281) : l'excès de la vîteſſe du ſoleil

périgée ſur la vîteſſe du ſoleil apogée, qui eſt de 4′; eſt à la vîteſſe périgée 61′ 12″, comme 16′ 13″ de temps que nous voulons avoir de moins ſur l'intervalle des deux obſervations, ſont à 4^h 8′ 7″, on aura ce qu'il faut au ſoleil le 30 Juin pour avancer d'une quantité ſuffiſante; on ajoutera cette quantité au 30 Juin 7^h 34′ 50″, & l'on aura le moment du paſſage du ſoleil par l'apogée le 30 Juin 1751 à 11^h 42′ 57″ temps moyen à Paris. La longitude du ſoleil pour cet inſtant-là eſt aiſée à conclure de l'obſervation, elle ſe trouve de 3^s 8° 39′ 56″; c'eſt le lieu de l'apogée du ſoleil qui réſulte de ce calcul; c'eſt en même temps le vrai lieu & le lieu moyen du ſoleil le 30 Juin 1751, 11^h 42′ 57″, temps moyen à Paris : d'où l'on tire la longitude moyenne (1325) pour le dernier jour de l'année 1749 à midi moyen à Paris, 9^s 10° 0′ 46″ 5; celle que M. de la Caille a adoptée dans ſes tables, eſt 9^s 10° 0′ 43″ 4; & la longitude de l'apogée 3^s 8° 38′ 4″, (*Mém. acad.* 1757, *pag.* 121). Il a auſſi déterminé le lieu de l'apogée pour 1496 de 3^s 3° 58′ (*Mém.* 1749, *pag.* 56, 1757, *pag.* 140), & pour 1684 de 3^s 7° 28′, par les obſervations de M. de la Hire, ce qui peut en faire connoître le mouvement (1311).

Epoque du Soleil.

1283. Il eſt bon d'avertir que ſi les nombres précédens ne ſont pas tout-à-fait les mêmes dans la règle donnée par M. de la Caille, (*Mém. acad.* 1757, *pag.* 141. *Leçons d'aſtron. art.* 706), c'eſt parce que j'ai employé, conformément à la démonſtration de l'art. 1281, la vîteſſe périgée, & non pas la vîteſſe apogée, dans le ſecond terme de la proportion. Quand on emploie la vîteſſe apogée, on trouve pour quatrieme terme le temps qu'il faut ajouter à l'obſervation faite vers le périgée; ainſi dans l'exemple précédent on dira, 4′ ſont à 57′ 12″ vîteſſe apogée, comme 16′ 13″ ſont à 3^h 51′ 56″; ajoutant cette quantité à la date de l'obſervation périgée, 29 Décembre, 22^h 58′ 45″, on a le 30 Décembre 2^h 50′ 41″ pour le temps du paſſage au périgée, donc ôtant le 30 Juin 11^h 42′ 57″,

trouvé ci-deſſus pour le temps du paſſage à l'apogée, il reſte 182j 15h 7′ 44″; cette quantité ne diffère pas ſenſiblement de la demi-révolution anomaliſtique établie par M. de la Caille, de 182j 15h 7′ 42″ dans les *Mém. de l'acad.* pour 1757, *pag.* 141, & de 182j 15h 7′ 53″ dans ſes *Leçons élém. d'aſt. p.* 1761. *art.* 708, *pag.* 242; mais qui ſelon moi eſt de 182j 15h 7′ 40″¼ (1312). Au contraire ſi l'on ſuivoit le précepte & l'exemple qu'il donne dans les deux endroits cités, on ajouteroit 3h 51′ 56″ à l'obſervation du 30 Juin, & 4h 8′ 6″ à celle du 29 Décembre, on trouveroit pour le temps de l'apogée, 30 Juin, 11h 26′ 46″, & pour celui du périgée, 30 Décemb. 3h 6′ 51″ l'intervalle eſt de 182j 15h 40′ 5″, trop grand de 32′ 20″, qui eſt le double de la différence entre 3h 51′ 56″ & 4h 8′ 6″. Cette différence prouve aſſez l'exactitude de la règle que nous venons de ſubſtituer à celle de M. de la Caille.

Seconde méthode pour corriger l'aphélie.

1284. On peut auſſi trouver le lieu de l'aphélie par des obſervations éloignées ſeulement d'un quart de cercle : lorſqu'on connoît l'équation du centre, & qu'on s'en eſt bien aſſuré par des obſervations faites dans les moyennes diſtances, (art. 1257 *& ſuiv.*). Il ſuffit de prendre deux obſervations qui ſoient faites l'une vers l'aphélie, l'autre dans la moyenne diſtance ou à peu-près, pour connoître exactement le lieu de l'aphélie. On calculera pour chacune de ces obſervations l'équation du centre, en ſuppoſant le lieu de l'aphélie tel qu'on le connoît, & l'on prendra la différence de ces deux équations, ſi les deux obſervations ſont du même côté de l'aphélie, ou la ſomme ſi l'une étoit avant l'aphélie & l'autre après ; la différence ou la ſomme de ces deux équations ſera la quantité dont le vrai mouvement doit différer du mouvement moyen, qui eſt toujours ſuppoſé connu dans l'intervalle des deux obſervations ; ſi ce vrai mouvement calculé diffère trop du mouvement moyen, c'eſt-à-dire, s'il en diffère plus que le mouvement vrai obſervé, ce ſera une preuve

qu'on a ſuppoſé le lieu de l'aphélie trop près de l'obſervation faite dans la moyenne diſtance.

Fig. 73. 1285. En effet, ſoit une planète en *B*, (*fig.* 73.) dans ſa moyenne diſtance, ayant comme Jupiter $5^{\circ}\frac{1}{2}$ d'équation du centre, & en *D* à 6° de ſon aphélie ſuppoſé connu à peu-près, ayant un demi-degré d'équation du centre, la différence de ces deux équations eſt 5°; c'eſt la quantité dont le mouvement moyen doit ſurpaſſer le mouvement vrai dans l'intervalle de deux obſervations. Je ſuppoſe que les deux points *B* & *D* ſoient éloignés l'un de l'autre exactement du quart de la révolution de Jupiter en temps, (environ trois ans), en ſorte que le moyen mouvement ſoit de 90°; le mouvement vrai doit être, ſuivant le calcul précédent, de 85°, c'eſt-à-dire, plus petit de 5° que le mouvement moyen, & je ſuppoſe que par l'obſervation on l'eût trouvé de 86°, plus petit ſeulement de 4° que le mouvement moyen, c'eſt-à-dire, moins différent du moyen mouvement que ſuivant le calcul; alors je raiſonne ainſi : en éloignant dans mon calcul l'aphélie *A* de l'obſervation faite en *B*, l'équation en *D* ſe trouvera plus grande, étant plus loin de l'aphélie; mais l'équation en *B* ne changera pas ſenſiblement, parce que vers les moyennes diſtances l'équation ne varie preſque point; ainſi la différence des deux équations en *D* & en *B*, deviendra moindre qu'elle n'étoit dans la premiere ſuppoſition, & elle approchera davantage de l'obſervation, ſuivant laquelle on vient de ſuppoſer qu'il n'y avoit que 4° de différence entre le vrai & le moyen mouvement, au lieu de 5° qu'on avoit trouvés par le calcul.

Ainſi cette différence entre le vrai & le moyen mouvement, trouvée trop grande par le calcul, m'apprend que le lieu de l'aphélie ſuppoſé dans ce calcul, étoit trop voiſin de l'obſervation *B*; on peut l'en éloigner de quelques minutes pour voir ce qui en réſultera ſur la différence du mouvement vrai au mouvement moyen, & par une ou deux tentatives trouver enfin le lieu de l'apſide *A*, qu'il faut employer pour

que la différence calculée ſoit d'accord avec la différence obſervée.

1286. La troiſieme méthode pour trouver le lieu de l'aphélie d'une planète, a lieu pour Mercure ou pour Vénus, (1317) c'eſt celle que j'ai donnée dans les Mémoires de l'acad. pour 1766, à l'occaſion de ma théorie de Mercure, & qui m'a fait trouver ſoit pour les temps les plus anciens, ſoit pour le temps où nous ſommes, le lieu de l'aphélie de Mercure. Je ſuppoſe qu'on ait obſervé la plus grande digreſſion de Mercure dans le temps qu'il eſt à ſes moyennes diſtances du ſoleil, & que la diſtance ou le rayon vecteur change rapidement; ſi l'on connoît déja la moyenne diſtance & l'excentricité, l'on calculera facilement à quel endroit il faut placer l'aphélie, pour que le rayon ſur lequel ſe trouve la planète, ſoit préciſément de la longueur convenable à la digreſſion obſervée. Troiſieme méthode.

Soit C (*fig.* 73) le lieu de Mercure dans ſa moyenne diſtance, vu de la terre T ſur le rayon TC qui touche l'orbite, la plus grande digreſſion étant alors l'angle STC, & la diſtance à l'aphélie ASC. Si dans les tables dont nous nous ſervons le lieu de l'aphélie étoit mal indiqué, enſorte que l'aphélie y fut marqué en D, en faiſant avancer le point D en A la ligne SC arriveroit en SG, & l'élongation de Mercure ſeroit égale à l'angle STG, plus grande par conſéquent que l'élongation STC; ſi donc on a trouvé par le calcul des tables une élongation trop petite, il n'y a qu'à rapprocher l'aphélie du lieu de l'obſervation en laiſſant toujours Mercure à la même longitude ou ſur la même ligne STG, ou ſi l'on veut en conſervant la même longitude moyenne. Ainſi dans le cas ou l'on veut augmenter l'élongation pour accorder les tables avec l'obſervation, il faut augmenter le lieu de l'aphélie, ſi l'anomalie eſt moindre que 6 ſignes, le diminuer ſi Mercure eſt dans les ſix derniers ſignes de ſon anomalie. Un degré d'erreur dans le lieu de l'aphélie change de $\frac{1}{210}$ la diſtance au ſoleil; & comme la plus grande di- *Fig.* 73.

greſſion eſt alors d'environ 21°, il en réſulteroit 5′ d'erreur ſur cette digreſſion ; or certainement on peut l'obſerver à 15 ou 20 ſecondes près, donc alors on doit connoître le lieu de l'aphélie de Mercure à 3 ou 4 minutes près, par le moyen de la plus grande digreſſion obſervée entre 3 & 4 ſignes, ou entre 8 & 9 ſignes d'anomalie moyenne.

Le 24 Mai 1764 à 8h 7′ 50″ temps moyen, j'obſervai la longitude de Mercure 2s 26° 50′ 35″, il étoit alors dans ſa plus grande digreſſion à 22° 51′ 12″ du ſoleil, notre rayon viſuel touchoit ſon orbite à la moyenne diſtance vers 9s 8° d'anomalie ; je calculai cette longitude par les tables de M. Halley, & je la trouvai trop grande de 1′ 14″ ; mais en augmentant dans ces tables la longitude de l'aphélie de 14′ ½ ſans changer la longitude de Mercure, l'anomalie devenoit plus petite auſſi bien que le rayon vecteur, l'élongation de Mercure devenoit auſſi moindre, & la longitude de Mercure ſe trouvoit d'accord avec l'obſervation (*Mém. acad.* 1766, *pag.* 458) delà il s'enſuit que la longitude de l'aphélie étoit trop petite dans les tables de M. Halley, auſſi je l'ai augmentée de 10′ dans mes tables, & je l'ai ſuppoſée de 8s 13° 49′ 30″ pour 1764. Ayant calculé de la même maniere les 16 obſervations anciennes de Mercure qui ſont rapportées dans l'almageſte de Ptolomée, j'ai reconnu qu'il y avoit pluſieurs degrés à ôter du lieu de l'aphélie que les tables donnoient pour ces temps-là ; ainſi le 25 Avril 261 ans avant J. C. à 4h 31′, temps moyen au méridien de Paris, la longitude de Mercure fut obſervée de 1s 23° 40′ que je réduis à 1s 23° 8′, a cauſe de l'erreur des tables & du catalogue de Ptolomée (918) ; le lieu du ſoleil devoit être alors 0s 29° 49′, & l'élongation 23° 19′ ; tandis que par les tables de M. Halley, elle n'auroit été que de 22° 23′, c'eſt-à-dire plus petite de 56′ ; en augmentant de 18″ le mouvement annuel de l'aphélie de Mercure, & le ſuppoſant à 7s 4° 8′ de longitude pour ce temps-là, l'erreur n'eſt plus que de 11′, ce qui

eſt peu ſenſible pour ces anciennes obſervations (*Mém. acad.* 1766, *pag.* 498).

1287. La quatrieme méthode pour déterminer l'aphélie ne ſuppoſe point qu'on ait une des plus grandes digreſſions, ni des longitudes obſervées préciſément dans les apſides ; mais elle exige trois conjonctions ou oppoſitions, c'eſt-à-dire, trois longitudes héliocentriques, & elle donne tout à la fois l'excentricité, l'aphélie, & l'époque de la longitude moyenne, ce ſera l'objet des articles ſuivans ; nous l'expliquerons d'abord pour les cas les plus ſimples, enſuite nous la donnerons d'une maniere plus générale (1293). Quatrieme méthode.

Méthode pour corriger à la fois les trois élémens d'une Orbite.

1288. Nous avons vu ſéparément, (1259, 1279, 1284), les méthodes que l'on peut ſuivre pour trouver l'équation & les apſides d'une planète ; nous allons raſſembler l'eſprit de ces méthodes & en tirer une méthode pour trouver par trois obſervations les trois élémens d'une orbite, ſavoir l'excentricité, le lieu de l'aphélie, & l'époque ou lieu moyen qui en réſulte néceſſairement (1282) ; je ſuppoſe trois obſervations réduites, comme on le verra ci-après (1296), & je ſuppoſe auſſi les élémens à peu-près connus.

Pour bien faire ſentir l'eſprit de cette méthode, je rappellerai ici trois choſes qui doivent être familières à tous ceux qui s'occupent du calcul aſtronomique ; 1°, l'équation de l'orbite eſt la plus grande qui ſoit poſſible vers trois ſignes & quelques degrés d'anomalie moyenne, alors elle eſt à ſon *maximum*, elle augmente à peine en paſſant d'un degré à l'autre (1256), en ſorte que l'anomalie moyenne peut être alors plus ou moins grande, ſans que l'équation en ſoit affectée ; ainſi dans ces cas-là on pourroit ſe tromper ſur le lieu de l'aphélie, ſans qu'il en réſultât aucune erreur ſur

l'équation, ni ſur la longitude calculée : 2°, l'équation de l'orbite, ou la différence entre la longitude moyenne & la longitude vraie, eſt additive depuis le périhélie juſqu'à l'aphélie, c'eſt-à-dire, dans les ſix derniers ſignes d'anomalie ; on l'ajoute alors à la longitude moyenne pour avoir la longitude vraie ; elle eſt ſouſtractive depuis l'aphélie juſqu'au périhélie, c'eſt-à-dire, qu'on retranche l'équation de la longitude moyenne pour avoir la longitude vraie : 3°, le mouvement moyen d'une planète dans l'eſpace d'une ou de deux révolutions, eſt aſſez bien connu pour qu'on puiſſe toujours le ſuppoſer exact ; car les moyens mouvemens ſe déterminent par la comparaiſon des obſervations les plus anciennes ; ainſi il ne peut y avoir d'erreur ſenſible dans l'eſpace de quelques années ; d'où il réſulte que ſi l'erreur de l'époque, ou de la longitude moyenne d'une planète eſt connue pour un des points de ſon orbite, elle eſt également connue, ou plutôt elle eſt la même dans tous les autres points, elle ne fait que ſe combiner avec les erreurs qui proviennent des autres élémens, ſans que cette erreur de l'époque, priſe en elle-même, ſoit différente.

Si l'on avoit deux obſervations faites préciſément dans les moyennes diſtances, c'eſt-à-dire, à trois ſignes d'anomalie moyenne, & à neuf ſignes, il ſeroit aiſé de corriger par ces deux obſervations, 1°, l'époque des moyens mouvemens, 2°, l'équation du centre : en effet, ſi l'équation du centre eſt bonne, c'eſt-à-dire, ſi celle qu'on a employée dans le calcul des tables eſt exacte, il n'y aura entre le calcul & l'obſervation, d'autre différence que celle de l'époque des moyens mouvemens, puiſque le lieu de l'aphélie n'influe point dans le calcul des longitudes priſes vers les moyennes diſtances : s'il n'y a d'autre erreur que celle de l'époque, elle ſera égale dans les deux obſervations, car nous ſuppoſons le moyen mouvement exactement connu ; ainſi l'erreur des tables étant trouvée égale à 3^s & à 9^s d'anomalie, ce ſera une preuve que l'équation du centre

eſt

eſt exacte ; mais que l'erreur des deux calculs vient uniquement de l'époque de la longitude qui eſt mal établie.

Si l'équation du centre eſt auſſi défectueuſe, l'erreur ſera plus ou moins grande, parce qu'à 3^s d'anomalie l'équation du centre ſe retranche de la longitude moyenne pour avoir la véritable, mais à 9^s elle s'ajoute ; ainſi dans l'une des deux obſervations l'erreur de l'équation du centre augmentera celle de l'époque, & dans l'autre obſervation elle la diminuera ; par ce moyen l'erreur totale ſera plus grande dans une obſervation que dans l'autre, & cela du double de l'erreur qu'il y a eu dans l'équation du centre.

Si, par exemple, l'erreur de l'époque eſt — 5′, c'eſt-à-dire, qu'il y ait dans l'époque des tables 5 minutes de trop, & que l'erreur de la plus grande équation ſoit — 2′, alors ces deux erreurs s'accumuleront à 9^s d'anomalie moyenne, parce que l'équation y eſt additive ; en ſorte qu'on aura ajouté 2′ de trop, à raiſon de l'équation qui eſt trop grande, & 5′ de trop, à raiſon de l'époque qui eſt trop avancée ; la longitude calculée aura donc 7′ de trop. Au contraire vers 3^s d'anomalie on n'aura que 3′ de trop, c'eſt-à-dire, que l'erreur des tables ne ſera que de 3′, parce que l'équation qui eſt trop grande de 2′, étant ſouſtractive, dans ce cas-là on aura ôté 2′ de trop ; & l'époque ayant 5′ de plus qu'il ne faut, il ne reſtera que 3′ d'erreur.

La différence entre ces deux erreurs des tables 7′ & 3′ eſt donc 4′, & cette différence partagée en deux parties donnera 2′, erreur de l'équation du centre. En général, ſuppoſons que l'on ait deux longitudes vraies obſervées, vues du ſoleil, c'eſt-à-dire, en conjonction ou en oppoſition dans les moyennes diſtances d'une planète ; qu'on ait calculé pour les mêmes inſtans les deux longitudes héliocentriques par les tables aſtronomiques, & qu'on ait trouvé p & m pour les erreurs des tables.

1289. Soit α l'erreur des tables, quant à l'époque

Correction de l'époque & de l'équation.

ſeule des moyens mouvemens, & c l'erreur de la plus grande équation ſeule, on aura, à 9 ſignes d'anomalie, $p = \alpha + c$, & à 3 ſignes, $m = \alpha - c$; donc $\alpha = \frac{p+m}{2}$ & $c = \frac{p-m}{2}$.

Ces formules ont lieu pour les erreurs poſitives comme pour les négatives indifféremment, & elles donnent la correction de l'époque & celle de l'équation du centre, par le moyen de deux obſervations faites dans les moyennes diſtances (1260), ou à très-peu-près. Si les obſervations ſont un peu éloignées des moyennes diſtances, & qu'on ſache à peu-près d'avance quelle eſt la plus grande équation, & quels ſont les degrés d'anomalies auxquels eſt la planète dans chaque obſervation, il ne ſera pas difficile de calculer combien il faut ajouter à l'équation obſervée pour avoir exactement la plus grande.

1290. Lorſqu'on a rectifié, par les deux obſervations dont nous venons de parler, ſoit l'époque, ſoit l'équation de l'orbite d'une planète, il s'agit de rectifier auſſi le lieu de l'aphélie; pour cela on choiſit une obſervation qui tienne le milieu entre les deux autres, & qui ſoit faite vers le temps où la planète étoit aphélie ou périhélie; on calcule pour le moment de l'obſervation la longitude par les tables, en rectifiant l'époque & l'équation du centre, ainſi que nous l'avons indiqué dans l'article précédent, & ſi l'on trouve quelque différence entre l'obſervation & le calcul, on eſt sûr qu'elle dépend toute entiere du lieu de l'aphélie qui ſera mal ſuppoſé dans les tables.

En effet, puiſque par l'hypothèſe nous avons trouvé la véritable époque & la véritable équation, il ne doit y avoir d'erreur que dans le degré d'anomalie moyenne, auquel chaque équation appartient; ſi l'on fait l'anomalie trop grande aux environs de l'aphélie, on aura une trop grande équation dans ce point-là, quoique la quantité totale de la plus grande équation ait été exactement déterminée.

En jettant les yeux ſur la table de l'équation de l'orbite d'une planète, on voit combien elle varie pour chaque degré d'anomalie moyenne aux environs de l'aphélie ; par exemple, il y a $1' 59''$ pour le ſoleil, car ſi l'anomalie moyenne augmente d'un degré en partant de l'aphélie, l'équation augmente de $1' 59''$; ſi l'on trouvoit donc l'erreur des tables vers ce point-là de $1' 59''$ en plus, on jugeroit que l'aphélie eſt trop avancé d'un degré ; car, puiſque la longitude des tables eſt trop grande, c'eſt une preuve qu'on n'a pas retranché aſſez pour l'équation, ſi elle eſt ſouſtractive ou que la planète ait déja paſſé ſon aphélie ; c'eſt-à-dire, que l'anomalie moyenne étoit trop petite, & par conſéquent le lieu de l'aphélie trop avancé. Si la planète étoit en-deçà de ſon aphélie, & qu'elle ne l'eût pas atteint, ce ſeroit la même choſe, avec cette différence que l'erreur en plus prouveroit une équation additive trop grande, & une anomalie moyenne trop petite, d'où réſulteroit également un lieu de l'aphélie trop avancé.

Correction de l'aphelie.

1291. Soit γ l'erreur ſur le lieu de l'aphélie qu'on ſe propoſe de déterminer, & n l'erreur des tables dans l'obſervation faite aux environs de l'aphélie, en ſuppoſant, comme je l'ai dit, qu'on ait déja corrigé dans ces tables l'équation du centre & l'époque ; ſoit e la plus grande équation du centre, je dis que l'erreur n, diviſée par e, & multipliée par $57°$, qui eſt l'arc égal au rayon, (dont le logarithme eſt 5, 31442) donnera la correction de l'aphélie, qu'il faudra ajouter à celui des tables, ſi la longitude calculée eſt plus petite que la longitude obſervée, c'eſt-à-dire, ſi n eſt une quantité poſitive.

En effet, l'équation du centre pour un degré quelconque d'anomalie eſt à peu-près e ſin. anom., comme on le verra (liv. XXIe. 3343) ; ſi cette anomalie eſt une petite quantité de minutes ou de ſecondes, exprimée par γ, les petits arcs étant ſenſiblement égaux à leurs ſinus, lorſqu'on les réduit en décimales du rayon en les diviſant par l'arc égal au rayon (1242), on

aura $\frac{e\gamma}{57^{\circ}}$ pour l'équation du centre; on divise par 57°; parce que γ doit être exprimé en décimales du rayon, & pour cet effet il faut le diviser par le rayon lui-même qui soit homogène avec γ, alors $\frac{\gamma}{57^{\circ}}$ devient une fraction du rayon.

Puisque l'équation du centre est $\frac{e\gamma}{57^{\circ}}$, cette quantité sera égale à l'erreur n des tables, donc $\gamma = \frac{n\,57^{\circ}}{e}$. Je suppose ici que la planète soit précisément dans son aphélie, & que l'erreur de l'aphélie γ soit l'anomalie elle-même toute entière, mais il est aisé d'appercevoir que ce seroit la même chose quand il y auroit 2 ou 3° de différence, c'est-à-dire, quoique la planète fût éloignée de quelques degrés de son apside. Par exemple pour le soleil, si au lieu de le supposer exactement dans l'apogée, je suppose l'apogée trop peu avancé, d'un degré, l'anomalie du soleil sera d'un degré, au lieu d'être zéro, l'équation qui devoit être nulle sera $1'\ 59''$ soustractive, & la longitude trop petite d'autant, l'erreur des tables sera donc $+\ 1'\ 59''$. Je suppose ensuite que l'anomalie fût réellement de deux degrés, & que par la même erreur on la supposât de trois degrés, en faisant la longitude de l'apogée trop petite d'un degré; il y auroit toujours $1'\ 59''$ d'erreur dans l'équation & dans la longitude calculée, parce que l'équation augmente de $1'\ 59''$ pour chaque degré d'anomalie aux environs de l'apogée, soit dans le troisieme degré, soit dans le premier; c'est-à-dire, quoique la planète soit éloignée de son aphélie de plusieurs degrés.

Variation de l'équation près de l'aphélie.

1292. On peut se passer aisément des formules précédentes, en examinant dans la table de l'équation du centre, ainsi que nous l'avons dit, quelle est la quantité dont l'équation varie pour un degré d'anomalie moyenne, on trouve $19'\ 38''$ pour Mercure, $50''$ pour Vénus; $10'\ 0''$ pour Mars, $5'\ 30''$ pour Jupiter, $6'\ 16''$ pour Saturne; d'où il est aisé de conclure, par une simple proportion, quel est le changement qu'on

doit faire au lieu de l'aphélie, quand on connoît l'erreur des tables qu'il s'agit de corriger, & qui dépend toute entière de cette longitude de l'aphélie.

La méthode que je viens d'expliquer pour déterminer les élémens de l'orbite d'une planète, ſuppoſe que les trois obſervations ſoient faites exactement dans les trois points indiqués, & elle ſuppoſe en même temps que les corrections ſoient très-petites; cependant en ſuppoſant même les obſervations faites à pluſieurs degrés de l'aphélie & des moyennes diſtances, on parviendroit encore, avec quelques eſſais ou quelques tâtonnemens, à trouver les mêmes corrections.

Mais pour procéder d'une maniere plus lumineuſe & plus exacte, je vais expliquer la méthode rigoureuſe, quoiqu'indirecte, par laquelle on peut trouver les trois élémens d'une orbite par trois obſervations, avec toute la préciſion qu'on voudra, ſans être aſſujetti à des obſervations faites préciſément dans les apſides, ou dans les moyennes diſtances.

Méthode plus générale pour déterminer exactement par trois obſervations l'orbite d'une Planète.

1293. Dans les méthodes précédentes, (1257, 1279, 1287), nous avons conſidéré ſéparément la plus grande équation & le lieu de l'aphélie, ou nous avons ſuppoſé des obſervations faites exactement dans les points de la plus grande équation, & dans ceux des apſides; nous allons donner une méthode qui eſt plus générale, par laquelle on peut avec trois longitudes héliocentriques quelconques, déterminer rigoureuſement le lieu de l'aphélie, l'excentricité & l'époque de la longitude moyenne; ce ſont les trois principaux élémens de l'orbite d'une planète. Les méthodes les plus ingénieuſes, les plus géométriques, les plus directes qu'on ait données juſqu'ici, ne ſont point comparables pour la facilité à la méthode indirecte, ou de fauſſe poſition,

Elémens qu'il faut déterminer.

que nous allons expliquer ; ainſi elle nous tiendra lieu de toutes les autres.

Méthodes directes de pluſieurs Auteurs.

1294. On peut voir, ſi l'on en eſt curieux, pluſieurs méthodes pour parvenir au même but, dans les mémoires de 1723, & dans les élémens d'aſtronomie de M. Caſſini, *pag.* 172 ; la huitieme reſſemble un peu à celle que nous allons expliquer ; mais elle eſt encore un peu plus indirecte à cauſe de l'uſage qu'on y fait de l'hypothèſe elliptique ſimple dans quelques-unes des approximations. M. Halley avoit réſolu le problême par une conſtruction géométrique, où il employoit l'interſection de deux hyperboles, (*Philoſ. tranſ.* n°. 128, 1676). M. de la Hire publia une ſolution de ce problême dans le Journal des Sav. (*Mars* 1677), par une méthode très-belle dont il donna enſuite la démonſtration dans ſon grand traité des ſections coniques : liv. VIIIe. pr. 25. M. Newton en donna depuis une autre ſolution, au moins auſſi belle que la précédente, (*Phil. nat. princ. math. lib. I. prop.* 21.) Voici le problême qu'il ſe propoſe : *Trajectoriam circa datum umbilicum deſcribere quæ tranſibit per puncta data & rectas poſitione datas continget*, mais il cite la ſolution de M. de la Hire, en diſant qu'elle n'eſt pas fort différente de la ſienne ; celle de Newton ſe trouve dans Keill, & dans les inſtitutions aſtronomiques de M. le Monnier, *pag.* 545. M. Nicollic dans les mém. de 1746, *pag.* 291, donna une autre méthode fondée ſur de nouvelles propriétés des ſections coniques, dans laquelle il détermina l'eſpèce & la poſition d'une orbite planétaire, connoiſſant la poſition & le rapport de trois rayons vecteurs de cette orbite, & il en donna le calcul de deux manieres différentes. Toutes ces méthodes étoient utiles pour le cas où Képler s'étoit trouvé, après avoir fixé trois diſtances de Mars au Soleil, par une multitude d'obſervations & de calculs (1219), mais comme dans la pratique ordinaire de l'aſtronomie, on ne connoît ni la longueur des rayons vecteurs, ni la poſition de la directrice de l'ellipſe ; je vais détailler une autre

méthode employée par M. de la Caille, (*Mém. acad.* 1750, *pag.* 20), qui ne ſuppoſe que les trois longitudes obſervées & les temps des obſervations, elle eſt beaucoup plus commode & plus facile à employer, & & je vais l'expliquer encore plus clairement & avec des calculs plus exacts que je n'avois fait dans les mémoires de 1755, *pag.* 218 *& ſuiv.*

Le moyen mouvement ſuppoſé connu.

1295. La révolution d'une planète eſt la premiere choſe que l'on doit connoître (1153); ainſi le moyen mouvement d'une planète eſt donné dans l'intervalle de deux obſervations; le mouvement de l'aphélie doit être auſſi connu, par des obſervations éloignées auxquelles on aura appliqué la méthode expliquée ci-deſſus (1279 *& ſuiv.*) parce que trois obſervations ne peuvent déterminer qu'une ellipſe fixe & immobile; mais dans l'intervalle des trois obſervations qu'on emploie, il ne peut pas y avoir une erreur conſidérable ſur le mouvement de l'aphélie

Les trois obſervations doivent être, autant qu'il eſt poſſible, éloignées d'un quart de révolution, c'eſt-à-dire, deux aux environs des apſides, & l'autre aux environs de la moyenne diſtance, ou deux aux moyennes diſtances, & une à l'apſide; car quoique la méthode ne ſoit pas aſſujettie à cette condition, le réſultat n'en ſera que plus concluant & plus ſûr, ſi l'on a cette attention. Elles peuvent auſſi être éloignées de pluſieurs révolutions entieres pourvu que l'on connoiſſe aſſez bien le mouvement de la planète, & celui de ſon aphélie pendant tout l'intervalle qu'on aura pris.

On ſuppoſe dans la méthode ſuivante, que l'on connoît déja, du moins groſſiérement, l'excentricité & le lieu de l'aphélie; on ne peut manquer de les connoître quand il s'agit des planètes; d'ailleurs on a vu ci-devant (1259, 1279), la maniere de les trouver, en ſuppoſant même qu'on n'en eût aucune idée.

Conditions néceſſaires dans les obſervations.

1296. Les trois longitudes héliocentriques dont on fait choix pour déterminer les élémens d'une orbite planétaire, doivent être réduites au plan de l'orbite, &non

à l'écliptique (1134); je fais cette remarque afin d'avertir que les aſtronomes publient toujours les réſultats des longitudes obſervées réduites à l'écliptique; ainſi il eſt néceſſaire, dans le cas dont nous parlons, d'y faire une réduction pour les rapporter au plan de l'orbite, c'eſt-à-dire, d'y ajouter la réduction ordinaire (1130), ſi c'eſt dans le premier ou le troiſieme quart de l'argument de latitude, & de la ſouſtraire, ſi c'eſt dans le ſecond & le quatrieme quart; au contraire de ce qui a lieu dans les calculs faits avec les tables, où il s'agit de réduire à l'écliptique une longitude qui eſt d'abord comptée ſur l'orbite.

Ces trois longitudes qui ſont deſtinées à déterminer les trois principaux élémens de l'orbite, doivent encore être corrigées des inégalités que peuvent y cauſer les attractions planétaires, ſuivant les calculs de M. Clairaut, *Mém. acad.* 1754, ou ceux que j'ai donnés dans les mémoires de 1758, 1760, 1761, & dont on trouvera la méthode dans le XXIIe livre, de l'attraction; ſi par ces méthodes on a trouvé que Jupiter avance de 30″ le lieu de Mars par ſon action ſur cette planète, il faudra ôter 30″ du lieu de Mars obſervé, pour avoir la longitude, dégagée de cette inégalité étrangere à l'orbite, & n'avoir plus à calculer que les inégalités de l'orbite elliptique dont il s'agit de trouver les élémens.

Ces obſervations doivent être auſſi dégagées de l'aberration, qui augmente toujours les longitudes des planètes dans leurs oppoſitions, (Liv. XVII. 2850).

Quant à la ſituation des trois points où l'on choiſit ces obſervations, la plus convenable eſt d'avoir trois points de l'orbite, qui ſoient à peu-près à 90° l'un de l'autre, & placés de maniere qu'il y ait deux des obſervations faites vers les apſides, ou deux vers les moyennes diſtances: ſi l'on a deux obſervations vers les apſides, le lieu de l'apſide ſera mieux déterminé; ſi l'on a deux obſervations vers les moyennes diſtances, & ſeulement une vers l'apſide, l'équation de l'orbite ſe trouvera avec plus de préciſion, parce qu'elle

ſera

ſera déterminée par le double de ſa valeur ; mais le lieu de l'apſide ſera déterminé dans ce cas-là avec une préciſion moindre de moitié que dans le premier cas.

Je diviſerai le procédé de cette méthode en trois parties ; dans la premiere je ſuppoſerai qu'on connoît l'excentricité, & je chercherai le lieu de l'aphélie ; dans la ſeconde je changerai d'excentricité pour avoir un autre lieu de l'aphélie ; dans la troiſieme je chercherai par le moyen d'une troiſieme obſervation, quelle eſt de ces deux excentricités celle qu'on doit préférer.

Pour trouve le lieu de l'aphélie.

1297. Dès que l'on connoît la durée de la révolution d'une planète, on ſait exactement combien il y a de temps, ou combien il y a de degrés d'anomalie moyenne entre deux inſtans quelconques où cette planète aura été obſervée : par exemple, ſi ces deux inſtans ſont éloignés du quart de la durée de cette révolution anomaliſtique, il y aura toujours un quart de cercle pour la différence des anomalies moyennes, car il ne faut pas perdre de vue que les temps & les anomalies moyennes marchent toujours uniformément, & ſont toujours proportionnels, comme nous l'avons dit pluſieurs fois (1234).

Si l'on eſt toujours en état de connoître la différence ou la ſomme de deux anomalies moyennes, il n'en eſt pas ainſi de ces anomalies elles-mêmes ; car pour connoître chacune de ces anomalies moyennes, il faudroit connoître & le lieu de l'aphélie, qui eſt le point d'où elles ſe comptent, & l'excentricité qui ſert à trouver l'anomalie moyenne, par le moyen de l'anomalie vraie, ſuppoſée à peu-près connue (1244). Cette conſidération fournit le moyen de reconnoître par deux obſervations ſi le lieu de l'aphélie d'une planète qui ſe trouve dans les tables, eſt exact, en ſuppoſant qu'on connoiſſe l'excentricité ; car ayant les deux longitudes obſervées on aura (en retranchant le lieu de l'aphélie), deux anomalies vraies ſuppoſées, on cherchera l'anomalie moyenne qui répond à chacune par le moyen des deux proportions connues (1240 & 1241), & de l'excentricité ſuppoſée connue ; ſi ces deux anomalies moyennes diffèrent entre

Premiere hypothèſe de l'excentricité.

elles autant que l'exige l'intervalle des deux obſervations, elles ſont exactes l'une & l'autre, & par conſéquent le lieu de l'aphélie eſt bien connu & a été bien ſuppoſé.

Si des deux obſervations que l'on a choiſies, l'une eſt avant l'aphélie & l'autre après, ce ſera la ſomme des deux diſtances à l'aphélie que l'on prendra pour la comparer avec le moyen mouvement calculé pour l'intervalle des deux obſervations; mais pour plus d'exactitude, on doit faire enſorte qu'une de ces obſervations ſoit près de l'apſide, & que l'autre en ſoit éloignée, ou de 90° (1284), ou de 180° (1279).

Diverſes ſuppoſitions de l'aphélie.

1298. Si les deux anomalies vraies ſuppoſées ne donnent pas la différence d'anomalie moyenne, telle qu'elle doit être, c'eſt-à-dire, ſi elles ne donnent pas le même intervalle de temps que l'on a par obſervation, c'eſt une preuve qu'elles ne ſont pas bonnes; c'eſt par cette épreuve qu'on appercevra ſi le lieu de l'aphélie qu'on a ſuppoſé ou d'après les tables, ou par une ſimple conjecture, n'eſt pas exact; dans ce cas on y ſuppoſera quelques minutes de plus ou de moins, on recommencera le même calcul; & l'on verra ainſi par l'événement de différentes ſuppoſitions, quelle eſt celle qu'il faut adopter, & quel eſt le lieu de l'aphélie qu'il faut prendre, pour repréſenter l'intervalle de ces deux premieres obſervations (avec l'excentricité qui eſt connue, ou employée dans cette premiere hypothèſe). Ainſi j'appelle *premiere hypothèſe* une excentricité ſuppoſée, avec le lieu de l'aphélie qui lui correſpond en ſatisfaiſant à l'intervalle des deux obſervations; pour parvenir à cette hypothèſe on eſt obligé de paſſer par diverſes ſuppoſitions pour le lieu de l'aphélie.

1299. Pour que le lieu de l'aphélie trouvé dans la premiere hypothèſe fût bien déterminé, il faudroit néceſſairement que l'excentricité fût exacte; car pour réduire l'anomalie vraie en anomalie moyenne, on fait néceſſairement uſage de l'excentricité, comme on le voit dans les deux analogies ci-deſſus, (1240 & 1241).

Si l'on ſuppoſe une autre excentricité, & qu'on refaſſe les mêmes calculs, on aura pour ſeconde hypothèſe un réſultat différent pour le lieu de l'aphélie, en employant toujours les deux mêmes obſervations; on pourroit faire ainſi une table de différentes excentricités, & à côté de chacune on écriroit le lieu de l'aphélie qui répond à chaque hypothèſe d'excentricité.

Seconde hypothèſe d'excentricité.

1300. Pour ſavoir maintenant quelle eſt la véritable excentricité que l'on doit choiſir, ou celle de toutes nos hypothèſes qui eſt la bonne, nous emploîrons une troiſieme obſervation que je ſuppoſe éloignée d'environ 90° d'une des précédentes, ſur laquelle on fera la remarque ſuivante. L'intervalle de temps entre l'obſervation aphélie, & l'obſervation faite 90° avant ou aprés l'aphélie, étant connu, on aura la différence entre les deux anomalies moyennes; mais ſi l'on ſe trompoit ſur l'excentricité, ou ce qui revient au même, ſur l'équation du centre, toute l'erreur tomberoit ſur l'anomalie qui eſt à 90° de l'aphélie, parce que l'équation y eſt fort grande, & cette erreur ſeroit nulle dans l'aphélie où l'équation du centre eſt nulle, ou du moins fort petite; ainſi la différence entre l'anomalie moyenne vers l'aphélie & l'anomalie moyenne à 90° de-là, ſeroit affectée de toute l'erreur commiſe ſur l'équation de l'orbite; c'eſt ainſi que l'équation ſe trouvera déterminée.

Pour trouver l'excentricité.

On prendra donc l'excentricité de la premiere hypothèſe avec le lieu de l'aphélie connu, ainſi qu'il a été déterminé pour cette premiere excentricité (1298), on formera deux anomalies vraies avec les deux longitudes vraies, dont une ſoit fort éloignée de l'autre, on les convertira en anomalies moyennes, & ſi la différence de ces deux anomalies moyennes n'eſt pas exactement ce que l'on ſait qu'elle doit être, on choiſira une autre excentricité avec la poſition de l'aphélie qui lui répond, c'eſt-à-dire, la ſeconde hypothèſe, on verra laquelle des deux ſatisfait mieux au ſecond intervalle, & par une ſimple règle de trois on trouvera quelle eſt celle qui ſatisfait à l'intervalle d'anomalie moyenne qui

eſt entre ces deux obſervations ; & quelle eſt la longitude de l'aphélie correſpondante ; cette excentricité avec le lieu de l'aphélie qui lui répond, ſeront conformes aux trois obſervations, & le problême ſera réſolu.

1301. Exemple. Je ſuppoſe trois oppoſitions de Mars obſervées en 1743, 1751 & 1753, c'eſt-à-dire, les longitudes de Mars ſur ſon orbite, vues du ſoleil pour les temps moyens, comme il ſuit, en appliquant aux trois longitudes ſur l'écliptique les réductions —17″, —50″, +13″. On peut voir le détail de ces obſervations dans les mémoires de 1755.

	Temps moyen des Obſerv.	Longit. dans l'orbite.	Différ. d'anom. moy.
1743. 15 Fév.	19h 17′ 40″	4s 27° 16′ 15″	6s 21° 30′ 45″
1751. 14 Sept.	8 28 0	11 21 34 10	
1753. 16 Nov.	10 28 33	1 24 47 37	1 26 6 50

En prenant les lieux de l'aphélie dans les tables de M. Halley, 5s 1° 23′ 37″, 5s 1° 33′ 37″, 5s 1° 36′ 9″, je forme trois anomalies vraies 11s 25° 52′ 38″, 6s 20° 0′ 33″, 8s 23° 11′ 28″, je convertis les deux premières anomalies vraies en anomalies moyennes, après avoir pris ce qui s'en manque pour aller à 360 degrés, & cela en faiſant les deux hypothèſes ſuivantes pour l'excentricité, c'eſt-à-dire, en la ſuppoſant d'abord de 1417 parties, enſuite de 1427, la diſtance moyenne du ſoleil étant toujours de 10000.

Premiere Hypothése : je prends l'excentricité telle qu'elle eſt dans les tables de M. Halley 1417, la moyenne diſtance étant de 15236, 9 ſuivant le même auteur ; je la réduis à ce qu'elle ſeroit ſi la moyenne diſtance de Mars étoit l'unité, & ſuppoſant auſſi l'aphélie tel qu'il eſt dans ces tables, les deux anomalies vraies donnent, au moyen des analogies rapportées ci-deſſus, (1240, 1241), deux anomalies moyennes qui ſont 11s 25° 3′ 15″ 1 & 6s 16° 35′ 21″, 6 dont la différence 6s 21° 32′ 6″ 5 eſt trop grande de 1′

21″ 5 ; car ſuivant les tables, & à raiſon du temps écoulé entre les deux obſervations, la différence doit être de 6ˢ 21° 30′ 45″, en prenant dans les tables de M. Halley, ſoit le moyen mouvement de Mars, ſoit celui de ſon aphélie.

En continuant la même hypothèſe d'excentricité je fais une autre ſuppoſition pour l'aphélie ; j'augmente de dix minutes les lieux de l'aphélie employés dans la premiere ſuppoſition, je forme par conſéquent deux anomalies vraies moindres de 10′ que les précédentes, je les convertis en anomalies moyennes ; je trouve 11ˢ 24° 51′ 15″ 5, & 6ˢ 16° 27′ 0″ 9, dont la différence eſt de 6ˢ 21° 35′ 45″, 4, c'eſt-à-dire, trop grande de 5′ 0″. Ainſi pour avoir changé l'aphélie de 10′ l'erreur qui étoit de 1′ 21″ 5, eſt devenue 5′ 0″ ; c'eſt-à-dire, a augmenté de 3′ 38″ 5 ; on dira 3′ 38″ 5 : 10′ 0″ :: 1′ 21″ 5 : 3′ 43″ 8, ainſi pour rendre nulle cette erreur de 1′ 21″ 5 ; il auroit fallu diminuer de 3′ 43″ 8 les lieux de l'aphélie, au lieu de les augmenter de 10′ : par ce calcul nous ſommes donc aſſurés que l'excentricité tirée des tables de M. Halley, & employée dans cette première hypothèſe, avec un lieu de l'aphélie diminué de 3′ 43″ 8 ou en nombres ronds 3′ 44″, ſatisfera à l'intervalle des deux obſervations. Il faut actuellement faire la même opération avec une autre excentricité, c'eſt-à-dire, former une ſeconde hypothèſe.

Seconde Hypothése : je prends une excentricité 1427 plus grande que celle de M. Halley de 10 parties, en conſervant le grand axe toujours le même, enſorte que les log. conſtans ſoient 0, 0407930 & 4, 2859524, & ſuppoſant l'aphélie tel qu'il eſt dans ſes tables, je convertis les deux anomalies vraies en anomalies moyennes, (1240, 1241), ce qui donne 11ˢ 25° 2′ 52″ 7, & 6ˢ 16° 34′ 0″ 5, dont la différence 6ˢ 21° 31′ 7″ 8, eſt plus grande de 22″ 8 que celle qui doit avoir lieu ſuivant les tables, qui ſont exactes à cet égard, puiſque la révolution eſt exactement connue. Je forme donc une

ſeconde ſuppoſition en augmentant le lieu de l'aphélie de 10′ ; il en réſulte deux autres anomalies vraies, qui doivent auſſi ſe convertir en anomalies moyennes ; le calcul étant fait on aura 11ˢ 24° 50′ 53″, 9 & 6ˢ 16° 25′ 40″, 1 dont la différence eſt plus grande de 4′ 1″ 2, qu'elle ne doit être ſuivant les tables.

1302. Ainſi en augmentant de 10′ le lieu de l'aphélie dans cette ſeconde hypothèſe d'excentricité, l'erreur de l'anomalie moyenne qui étoit de 22″ 8 eſt venue à 4′ 1″ 2, c'eſt-à-dire, a augmenté de 3′ 38″ 4, donc pour la faire diminuer de 22″, 8 & la réduire à rien, on dira 3′ 38″ 4 : 10′ : : 22″ 8 : 1′ 2″ 6, & l'on aura la quantité qu'il falloit ôter de l'aphélie des tables pour concilier les deux premieres obſervations avec le moyen mouvement des tables, dans l'hypothèſe de 1427 d'excentricité.

Il faut choiſir entre les deux hypothèſes.

C'eſt donc l'aphélie des tables de M. Halley diminué de 3′ 43″, 8 avec 1417 d'excentricité, ou diminué de 1′ 2″ 6 avec 1427, qui ſatisfait aux deux premieres obſervations ; il faut par le moyen de la troiſieme obſervation choiſir entre ces deux hypothèſes d'excentricité, ou trouver une excentricité qui ſoit plus ou moins grande que celles-là ; en y joignant le lieu de l'aphélie corrigé à proportion, elle repréſentera non-ſeulement les deux premieres, mais encore la troiſieme obſervation.

Derniere hypothèſe.

1303. L'intervalle de temps qu'il y a entre la ſeconde & la troiſieme obſervation, donne pour différence d'anomalie moyenne 56° 6′ 50″, ſuivant les tables de M. Halley : l'on convertira en anomalies moyennes les anomalies vraies dans la ſeconde & dans la troiſieme obſervation avec 1417 d'excentricité, l'aphélie des tables étant diminué de 3′ 43″ 8, & avec 1427, l'aphélie étant diminué de 1′ 2″ 6, on aura pour la premiere hypothèſe la demi-anomalie vraie 48° 22′ 24″ 1, & pour la ſeconde 48° 23′ 44″ 7, les anomalies moyennes ſont dans la premiere 107° 13′ 43″ 4, & 163° 21′ 31″ 4 dont la différence eſt trop grande de 58″, & pour la ſeconde hypothèſe 107° 20′ 42″ 3 & 163° 25′ 7″ 6

dont la différence eſt plus petite que 56° 6′ 50″ de 2′ 24″ 7 ; ainſi ajoutant ces deux différences qui ſont en ſens contraires, on voit que le changement de 10 parties dans l'excentricité, produit 3′ 22″ 7 de variation dans le mouvement d'anomalie moyenne pour cet intervalle de temps ; on trouvera par une proportion que 58″, qui eſt l'erreur de la premiere hypothèſe, donnera 2, 86, il faudra donc ajouter 2, 86 à l'excentricité 1417 de la premiere hypothèſe (1301), & l'on aura 1419, 86 excentricité qui repréſentera également la troiſieme obſervation, pourvu qu'on y joigne l'aphélie qui doit lui correſpondre ; or on trouvera la correction du lieu de l'aphélie en diſant 3′ 22″ 7 : 2′ 41″, 2 : : 58″ 0 : 46″ 1 ; car puiſque la premiere hypothèſe d'excentricité 1417 avec le lieu de l'aphélie diminué de 3′ 43″ 8 a donné 58″ de trop, & que la ſeconde hypothèſe d'excentricité 1427 avec le lieu de l'aphélie diminué de 1′ 2″ 6, (c'eſt-à-dire, de 2′ 41″, 2 moins que dans la premiere hypothèſe), a donné 2′ 24″, 7 de moins qu'il ne falloit pour la différence d'anomalie moyenne, en ſorte que l'erreur a changé de 3′ 22″, 7, il eſt clair que pour corriger les 58″ de la premiere hypothèſe, il faut diminuer l'aphélie de 46″ 1 de moins que dans la premiere hypothèſe ou il y avoit 3′ 43″ 8 ; ainſi l'on corrigera l'aphélie des tables ſeulement de 2′ 57″ 7.

On peut encore faire cette proportion d'une autre maniere ; & chercher quel eſt le lieu de l'aphélie qui doit convenir à la nouvelle excentricité 1419, 86 ; car ſi avec la premiere ſuppoſition d'excentricité 1417, il faut ôter 3′ 43″, 8 de l'aphélie des tables, & ſi avec la ſeconde ſuppoſition d'excentricité 1427, il faut ôter 1′ 2″ 6, c'eſt-à-dire, 2′ 41″ 2 de moins ; on peut dire 10 : 2′ 41″ 2 : : 2, 86 : 46″ 1 correction de l'aphélie qui répond à 2, 86 de variation dans l'excentricité ; on a donc 3′ 43″ 8, moins 46″ 1 ou 2′ 57″ 7, comme par l'autre méthode, pour la correction de l'aphélie qui doit répondre à l'excentricité 1419, 86 ; & qui conjointe-

ment avec cette excentricité repréſentera le premier intervalle auſſi bien que le ſecond; ou la premiere différence d'anomalie moyenne, auſſi bien que la ſeconde.

Démonſtration de ſon exactitude.

1304. Je dis en premier lieu que cette excentricité 1419, 86, avec le lieu de l'aphélie diminué de 2′ 57″ 7 repréſentera le premier intervalle; en effet, nous avons trouvé que 1417 d'excentricité avec 3′ 43″ 8 de diminution dans l'aphélie, auſſi bien que 1427 avec 1′ 2″ 6 de diminution dans l'aphélie, repréſentoient également l'intervalle connu, ou la différence d'anomalie moyenne des deux premieres obſervations; ainſi toute autre excentricité entre ces deux-là, avec une diminution de l'aphélie proportionnée, repréſentera également cet intervalle; donc l'excentricité 1419, 86, avec 2′ 57″ 7 de diminution dans l'aphélie, ſatisfera à la différence des deux premieres obſervations.

Je dis en ſecond lieu qu'ils ſatisferont auſſi au ſecond intervalle ou à la différence d'anomalie moyenne entre la ſeconde & la troiſieme obſervation : car dans la premiere hypothèſe 1417, on trouve 58″ de plus pour cette différence, & dans la ſeconde hypothèſe qui eſt de 1427, on trouve 2′ 20″ 7 de moins que l'on ne doit trouver; donc à proportion on trouvera exactement ce qu'il faut trouver, en employant 1419, 86. Tout cela ſera plus ſenſible encore pour ceux qui liront ce qui précède la plume à la main en faiſant les calculs dont nous avons donné la marche & les réſultats. Au reſte il n'eſt pas toujours néceſſaire de faire tous les calculs avec la préciſion des dixiemes de ſecondes, comme nous venons de les indiquer, parce qu'il n'eſt guère poſſible d'être aſſuré des longitudes obſervées, même à 4 ou 5 ſecondes près.

On a donc enfin & l'excentricité, & la correction à faire dans le lieu de l'aphélie pour repréſenter exactement les deux différences d'anomalie moyenne, dans les trois obſervations données. Si l'on recommence en effet le calcul avec ces élémens, c'eſt-à-dire, avec l'excentricité 1419, 86, qui donne pour logarithmes conſ-

tans

tans 00405878 & 42837740, & avec les trois longitudes de l'aphélie $5^s\ 1^\circ\ 30'\ 39'',3$; $5^s\ 1^\circ\ 30'\ 39'',3$; & $5^s\ 1^\circ\ 33'\ 11'',3$; on trouvera pour les anomalies moyennes qui répondent aux trois momens d'obſervations, $11^s\ 25^\circ\ 6'\ 42''$, $6^s\ 16^\circ\ 37'\ 27''$ & $8^s\ 12^\circ\ 44'\ 17''$; elles diffèrent entr'elles des mêmes quantités que les trois anomalies moyennes qu'on avoit formées, avec les élémens tirés des tables (1301), c'eſt-à-dire, de $6^s\ 21^\circ\ 30'\ 45''$ & de $1^s\ 26^\circ\ 6'\ 50''$. De ces trois anomalies, il y en a deux qui ne ſont pas loin des apſides, & une qui approche plus des moyennes diſtances; il ſeroit également bon que des trois obſervations choiſies, celle du milieu fût faite dans une des apſides de l'orbite de la planète, & les deux autres dans les moyennes diſtances 90° avant & après celle du milieu : nous n'avons pu obſerver aucune de ces conditions dans l'exemple précédent; car on n'a pas toujours des obſervations faites dans des poſitions choiſies, & celles de Mars ſont des plus rares; mais on verra du moins par cet exemple que la méthode eſt générale, & ne ſuppoſe que trois obſervations vers les points principaux de l'orbite, c'eſt-à-dire, près des apſides & des moyennes diſtances.

1305. On abrégeroit ſenſiblement les calculs précédens, ſi l'on avoit une table de l'équation de Mars pour deux excentricités différentes, à chaque degré d'anomalie; car au lieu de convertir les anomalies vraies en moyennes, on y appliqueroit l'équation priſe dans la table avec la partie proportionnelle répondante à l'excentricité de l'hypothèſe actuelle, & l'on auroit à la fin du calcul la plus grande équation de cette hypothèſe, ſans faire le calcul de l'art. 1258. C'eſt ainſi que je me ſuis fait des tables d'équation pour toutes les planètes; & chacun pourra s'en faire de pareilles, en réuniſſant mes tables d'équation avec celles qui ſont dans M. Halley, & mettant au-deſſus de chacune l'excentricité qui lui répond, ſuivant qu'on les voit à l'article 1278.

1306. Lorſqu'on connoît l'excentricité & le lieu

Longitude moyenne.

de l'aphélie, il ne reſte plus à connoître qu'une longitude moyenne ; pour cela on prendra une des trois anomalies moyennes trouvées ci-devant (1304), par exemple $11^s\ 25^\circ\ 6'\ 42''$; on y ajoutera le lieu de l'aphélie des tables diminué de $2'\ 58''$, ſuivant le dernier réſultat, c'eſt-à-dire, $5^s\ 1^\circ\ 20'\ 39''$, & l'on aura la longitude héliocentrique moyenne de Mars dans ſon orbite au temps de la premiere obſervation $4^s\ 26^\circ\ 27'\ 21''$, plus grande de $9''$ que par les tables de Halley, d'où l'on peut conclure toutes les autres longitudes moyennes, (857). Nous parlerons bientôt plus au long des époques des longitudes moyennes (1325).

1307. En employant les oppoſitions obſervées en 1745, 1747, 1749, j'ai trouvé qu'il faudroit ſuppoſer l'excentricité 14217, 61, la correction de l'aphélie $-\ 3'\ 18''$, la correction de l'époque $+\ 1'\ 26''$; ſi l'on prend un milieu entre les deux réſultats, on aura la correction de l'époque $+\ 47''$ vers l'année 1748, ce qui donne l'époque pour 1750, $0^s\ 21^\circ\ 59'\ 17''$; la correction de l'aphélie $-\ 3'\ 8''$, l'excentricité 14218, 1 à laquelle répond la plus grande équation $10^\circ\ 42'\ 13''$ qui ſurpaſſe de $2'\ 11''$ celle des tables de M. Halley.

1308. Telle eſt la quatrieme méthode que j'avois annoncée (1287), pour déterminer l'aphélie d'une planète ; c'eſt la plus générale de toutes ; & Mercure eſt la ſeule planète à laquelle nous ne puiſſions pas l'appliquer, parce que nous n'avons pas des conjonctions de cette planète qui ſoient dans trois points de ſon orbite aſſez éloignés les uns des autres : il faut recourir pour Mercure à la méthode de l'art. 1286, ou bien ſuppoſer que l'on connoiſſe l'équation du centre par la méthode de l'art. 1267, & chercher l'aphélie par une méthode analogue à celle que j'ai employée pour trouver l'équation de Mercure (1268), après que je m'étois aſſuré du lieu de l'aphélie par une autre méthode (1286); car deux paſſages de Mercure ne peuvent déterminer que l'un des élémens, ou l'équation, ou le lieu de l'aphélie, & tous les paſſages de Mercure ſe réduiſent à deux points de ſon orbite.

On trouve cependant dans les mémoires de l'académie pour 1753, un mémoire de M. Caſſini, & dans ceux de 1756, un mémoire de moi, ſur cette matiere: nous avons eſſayé l'un & l'autre de déterminer les élémens de Mercure par le moyen de ſes paſſages ſur le ſoleil; nous manquions alors d'autres obſervations; mais j'y ai ſupplée depuis ce temps-là comme on le peut voir dans les mémoires de 1766.

Défaut de l'hypothèſe elliptique ſimple.

1309. J'ai employé dans tous les calculs précédens l'hypotèſe de Képler, pour déterminer les orbites des planètes; on trouvera dans les *Elémens de M. Caſſini* une méthode pour les trouver auſſi dans l'hypothèſe elliptique ſimple (1252), c'eſt l'hypothèſe employée par Boulliaud, Wardus & Street; mais quoique M. Caſſini faſſe un uſage fréquent de l'hypothèſe elliptique ſimple, à cauſe de la facilité qu'elle offre dans les calculs, cependant il avoue, & il démontre même que l'hypothèſe de Képler doit avoir une entiere préférence ſur l'hypothèſe elliptique ſimple. Ayant fait le calcul du lieu de l'aphélie de Mars dans les deux hypothèſes différentes par le moyen de trois obſervations de 1691, 1696 & 1700, dont une étoit voiſine de l'aphélie, M. Caſſini trouve le lieu de l'aphélie dans l'hypothèſe elliptique ſimple $5^s\ 0^\circ\ 39'\ 0''$, & dans l'hypothèſe de Képler $5^s\ 0^\circ\ 31'\ 34''$, avec une différence de $7'\ 26''$ ſeulement; en effet les deux hypothèſes ne différent point entr'elles quand on prend une obſervation dans l'aphélie & les deux autres dans les moyennes diſtances. Mais ayant enſuite choiſi trois autres obſervations de 1694, 1698 & 1702, en des points différens de l'orbite de Mars, M. Caſſini trouve $5^s\ 1^\circ\ 28'\ 23''$ dans l'hypothèſe elliptique ſimple, & $5^s\ 0^\circ\ 39'\ 2''$ dans l'hypothèſe de Képler; on voit que l'hypothèſe elliptique ſimple donne un réſultat différent de $49'\ 23''$ de celui de l'aphélie qu'elle avoit donnée dans le premier calcul, & que ceux de l'hypoſe de Képler ne diffèrent que de $7'\frac{1}{2}$; & même de $5'$ ſeulement ſi l'on a égard au mouvement de l'aphélie; cette derniere différence eſt aſſez petite pour être attribuée

au défaut d'accord entre les différentes obſervations ; mais la différence de 49′ qu'il y a entre les deux réſultats de l'hypothèſe elliptique ſimple, ne ſauroit être attribuée qu'à l'imperfection de cette hypothèſe. Il en eſt de même de l'excentricité, M. Caſſini, en ſuppoſant le grand axe de 100000, la trouve dans l'hypothèſe de Képler 9287 & 9292, ſuivant qu'il emploie les trois premières ou les trois dernières obſervations, la différence n'eſt que de 5 parties ; mais dans l'hypothèſe elliptique ſimple il trouve 9246 & 9115, réſultats qui diffèrent de 131 parties ; & prouvent encore la diſcordance de cette derniere hypothèſe quand on l'applique à différens points de l'orbite ; auſſi M. Caſſini conclut formellement que l'hypothèſe de Képler mérite la préférence, (*Elém. d'aſtron. pag.* 475, & nous n'avons parlé de l'hypothèſe elliptique ſimple que pour donner une idée de la facilité qu'elle offre, dans les occaſions où l'on n'a pas beſoin de beaucoup d'exactitude ; ou dans les orbites peu excentriques, comme celles de Vénus & de la terre.

Trouver le mouvement des apsides et la révolution anomalistique d'une Planète, par les obſervations.

1310. La méthode que nous avons donnée pour déterminer l'orbite d'une planète (1293), étant appliquée aux anciennes obſervations, fait trouver le lieu de l'aphélie dans les temps plus reculés ; & quoique les obſervations anciennes ne ſoient pas fort exactes, elles font cependant connoître que les aphélies des planètes ne ſont pas fixes dans le ciel. La théorie de l'attraction, (liv. XXIIe.) nous ſervira de même à prouver le mouvement des apſides ; mais ce mouvement eſt aſſez lent pour qu'on ait pu long-temps le négliger dans l'aſtronomie, & ſuppoſer les apſides immobiles, mais ce mouvement n'eſt pas douteux actuellement, les

obſervations de Mars le prouvent ſur-tout d'une manière inconteſtable.

1311. La révolution d'une planète par rapport à ſon apſide, le temps qu'elle emploie à y revenir, ou l'intervalle d'un paſſage par ſon aphélie au paſſage ſuivant, s'appelle la RÉVOLUTION ANOMALISTIQUE, (1279) parce que l'anomalie recommence à chaque paſſage dans l'apſide : cette révolution anomaliſtique eſt toujours un peu plus longue que la révolution par rapport aux équinoxes, parce que le mouvement des apſides ſe fait ſuivant l'ordre des ſignes; pour en déterminer la quantité, nous commencerons par la révolution anomaliſtique du ſoleil, ou plutôt de la terre, qui eſt une des plus faciles à déterminer.

Si le lieu de l'apſide de la terre étoit exactement fixe dans le ciel, la révolution anomaliſtique ſeroit égale à la révolution ſidérale, dont on a vu la détermination (1160); mais puiſque l'apogée du ſoleil a un petit mouvement ſelon l'ordre des ſignes, comme les obſervations paroiſſent le prouver, auſſi bien que la théorie de l'attraction, il faut, pour connoître ſa révolution anomaliſtique, comparer deux paſſages du ſoleil par ſon apogée, & non pas deux retours à une même étoile, ni deux paſſages par l'équinoxe (82, 884).

1312. L'APOGÉE DU SOLEIL, ſuivant Ptolomée étoit à $2^s\ 5^\circ\ \frac{1}{2}$ (865); par les obſervations de Waltherus faites à Nuremberg, rapportées & calculées par M. de la Caille (*Mém. acad.* 1749, *pag.* 60), il étoit le 1 Janvier 1496 à $3^s\ 3^\circ\ 57'\ 57''$. Mais le 1 Janvier 1750, il étoit à $3^s\ 8^\circ\ 38'$; donc le mouvement de l'apogée du ſoleil eſt de $4^\circ\ 40'$ en 254 ans, ce qui fait $1'\ 6''$ par année (*Mém. acad.* 1757, *pag.* 141).

Mouvement de l'apogée du ſoleil.

Suivant ces obſervations de Waltherus, le ſoleil avoit paſſé par ſon périgée le 16 Décembre 1487 à $6^h\ 5'$ de temps moyen; il y a paſſé encore le 30 Décembre 1751 à $3^h\ 9'$, ſuivant les obſervations de M. de la Caille; l'intervalle eſt de $96428^j\ 21^h\ 4'$, ce qui donne pour chaque révolution anomaliſtique $365^j\ 6^h\ 15'\ 42''$ (*Leçons*

d'aſtron. art. 708). Ayant comparé ainſi les obſervations de Waltherus, celles de Tycho-Brahé, & celles de Co-cheou-king faites à la Chine en 1278 & 1279 (418), que le P. Gaubil a rapportées dans ſon hiſtoire de l'Aſtronomie Chinoiſe, tom. II, *pag.* 107, & dont M. de l'Iſle avoit une copie manuſcrite encore plus détaillée, M. de la Caille a trouvé la révolution anomaliſtique, ou la différence entre deux paſſages conſécutifs du ſoleil par ſon apogée, $365^j\ 6^h\ 15'\ 24''$, plus grande que la durée de l'année tropique (588), de $26'\ 35''$; & le mouvement de l'apogée $1°\ 49'\ 10''$ par ſiècle, ou $65''\frac{1}{2}$ par année rélativement à l'équinoxe, (*Mém.* 1757, *pag.* 141). Suivant mes calculs, je trouve la révolution anomaliſtique de $365^j\ 6^h\ 15'\ 20''\ 5$, parce que je ſuppoſe le mouvement ſéculaire du ſoleil de $46'$ $10''$ au lieu de $45'\ 55''\ 6$ que ſuppoſe M. de la Caille dans ſes tables.

Il eſt $65''\frac{1}{2}$ par année.

1313. Pour voir ce qui réſulte de la comparaiſon des autres obſervations par rapport au mouvement de l'apogée du ſoleil, on pourra jetter les yeux ſur les poſitions ſuivantes de l'apogée déterminées par différens Aſtronomes, à côté deſquelles on voit ce qui en réſulte pour le mouvement annuel, par comparaiſon avec le lieu de l'apogée obſervé en 1738, (M. Caſſini, *pag.* 197).

Hipparque, 140 ans avant J. C.	2ˢ	5°	30′	1′	3″
Ptolomée, 140 ans après J. C.	2	5	30	1	14
Albategnius en 883,	2	22	17	1	$7\frac{1}{2}$
Arzachel en 1076,	2	17	50	1	$51\frac{1}{2}$
Alphonſe en 1252,	2	28	40	1	10
Waltherus en 1503,	3	4	9	1	4
Copernic en 1515,	3	6	40	0	25
Tycho en 1588,	3	5	30	1	6
Képler en 1588,	3	5	32	1	$6\frac{1}{2}$
M. Caſſini en 1738,	3	8	19	8″....	

Il ſuppoſe dans ſes tables ce mouvement de 1° 42′ 55″ par ſiecle, ou de 1′ 2″ par année, ſe fondant principalement ſur les obſervations d'Hipparque ; M. le Monnier le ſuppoſe de 63″ dans ſes Inſtitutions aſtronomiques ; & M. Mayer de 66″ dans ſes nouvelles tables ; tout cela diffère peu de la derniere détermination que nous adoptons ici, avec M. de la Caille, & qui eſt de 65″ ½. Le lieu de l'apogée pour 1750 eſt de 3ˢ 8° 38′ 4″, plus avancé de 30″ ſeulement que dans les tables de Mayer.

1314. Les aphélies des autres planètes ont auſſi leur mouvement, mais il n'eſt pas connu avec autant d'exactitude, à cauſe du peu d'obſervations anciennes que nous avons ſur les planètes ; d'ailleurs ce mouvement eſt ſi peu ſenſible, qu'on ne peut le déterminer avec préciſion, ſi ce n'eſt celui de Mars ; on en jugera par la différence qu'il y a entre les tables de M. Caſſini & celles de M. Halley pour cette partie ; différence dont il y a une table ci-après (1331). *Aphélies des autres planètes.*

Il y a même des Auteurs qui ont totalement négligé ce mouvement des aphélies comme inappréciable, & ont ſuppoſé que les apſides étoient fixes parmi les étoiles fixes, ſans autre changement de longitude que celui de 50″ par an, qui vient de la préceſſion des équinoxes ; Street dans ſes tables Caroline, faiſoit cette ſuppoſition ; on n'étoit point alors aſſez avancé dans l'aſtronomie pour déterminer des quantités auſſi petites.

Pour faire ſentir le degré de certitude qu'il peut y avoir dans de pareilles déterminations, je vais indiquer en peu de mots quelles ſont les obſervations ſur leſquelles M. Caſſini a établi ſes déterminations du mouvement des aphélies, ainſi qu'il les rapporte lui-même dans ſes *Elémens d'aſtronomie*, & j'y ajouterai quelques recherches particulieres que j'ai faites ſur la même matiere.

1315. L'APHÉLIE DE MERCURE eſt déterminé dans M. Caſſini par les paſſages ſur le ſoleil de 1661, 1690 & 1697, ſuivant leſquels il trouve que le 9 Nov. 1690, *Aphélie de Mercure.*

à 18^h 6′, l'aphélie de Mercure étoit à 8^s 12° 22′ 25″; il trouve qu'en ſuppoſant le mouvement de l'aphélie de 1′ 20″ par année, il repréſente aſſez bien les paſſages de 1631, 1672, 1723 & 1736. Mais j'ai déja remarqué que tous ces paſſages arrivent vers les mêmes points de l'orbite, car celui de 1661 étoit le ſeul qu'on eût obſervé dans la partie oppoſée, c'eſt-à-dire, dans le nœud deſcendant qui eſt vers 10^s 20° d'anomalie moyenne; ainſi l'on ne pouvoit guère s'aſſurer que ce mouvement de l'aphélie ſatisferoit également aux obſervations faites dans d'autres points de l'orbite : M. Caſſini obſerve lui-même, (*pag.* 612), que deux hypothèſes qui diffèrent entre elles de 1° 30′ pour le lieu de l'aphélie, & de 52′ pour la plus grande équation, ne laiſſent pas de repréſenter toutes les deux avec une égale préciſion ces ſept obſervations; ce qui prouve qu'elles n'étoient pas faites dans des points de l'orbite de Mercure, aſſez différens les uns des autres, pour bien déterminer le lieu de l'aphélie; on ne doit donc pas être ſurpris que M. Halley ait repréſenté également bien les mêmes obſervations, en réduiſant à 52″ $\frac{1}{2}$ au lieu de 1′ 20″ le mouvement annuel de l'aphélie de Mercure. Suivant les recherches que j'ai données ſur cette matiere dans les mémoires de l'académie pour 1756, *pag.* 266, j'ai trouvé le lieu de l'aphélie de Mercure, le 6 Mai 1753, de 8° 13′ 55″, plus avancé de 9′ ſeulement que ſuivant les tables de M. Caſſini, ou de 26′ plus avancé que ſuivant M. Halley, ce qui ſembloit prouver que le mouvement annuel de l'aphélie de Mercure étoit un peu plus grand que dans les tables de Halley; mais pour s'en aſſurer il falloit diſcuter des obſervations faites dans d'autres points de ſon orbite, & ſur-tout dans les apſides & les moyennes diſtances (1267, 1286).

Son mouvement eſt de plus de 70 ſecondes par année.

1316. On trouve dans Ptolomée quatorze obſervations de Mercure, faites dans les plus grandes digreſſions, & qui ſeront rapportées à la fin de ce VIe. liv. Je les ai toutes diſcutées avec le plus grand ſoin, & quoiqu'il y en ait deux qu'on ne peut abſolument concilier

cilier avec les autres, & quatre qui ſont trop près des apſides, il me paroît prouvé par les huit autres que le mouvement ſéculaire de l'aphélie eſt de 1° 57′ 40″ ou environ 1′ 10″ par an; c'eſt-à-dire, plus grand de 18 ſecondes que dans les tables de M. Halley, (1286).

Ce mouvement de l'aphélie de Mercure que j'ai déduit des obſervations anciennes ne s'accorde pas parfaitement avec les obſervations du 17ᵉ ſiecle : le 13 Décembre 1683 à 19ʰ 39′ temps moyen réduit au méridien de Paris, M. Halley trouva la diſtance de Mercure à l'épi de la Vierge 44° 26′ 10″; en y ajoutant 3′ 0″ pour l'effet de la réfraction, on a une diſtance plus grande de 2′ 13″ que par mes tables, d'où il ſuit qu'il faudroit ajouter 29′ au lieu de l'aphélie qu'elles donnent pour ce temps-là, ce qui nous rapprocheroit de l'aphélie des tables de Halley. Le 4 Mai 1673 à 7ʰ 53′ 25″ Hevelius meſura la diſtance de Mercure à β du Taureau 12° 21′ 50″; en y ajoutant 4′ 7″ pour la réfraction l'on a une diſtance vraie plus grande de 3′ 12″ que par mes tables. Le 21 Mai 1672 à 8ʰ 9′ 18″ Hevelius meſura la diſtance de Mercure à β du Taureau de 24° 50′ 35″; en y ajoutant 3′ 44″ pour l'effet de la réfraction, on trouve une diſtance d'ou réſulte une longitude plus grande de 1′ 37″ que par mes tables; ces réſultats ſemblent indiquer également que j'ai fait le mouvement de l'aphélie trop conſidérable; j'ai préféré le réſultat des anciennes obſervations; mais j'ai cru devoir avertir de cette différence, pour qu'on diſcute à loiſir les obſervations d'Hevelius qui pourront éclaircir encore cette queſtion. En attendant je ſuppoſe l'aphélie de Mercure en 1750 à 8ˢ 13° 33′ 3″ avec un mouvement annuel de 1′ 10″.

1317. L'APHÉLIE DE VÉNUS eſt preſque auſſi difficile à déterminer par les anciennes obſervations que celui de Mercure; & dans les différentes déterminations qu'en donne M. Caſſini, il s'y trouve des différences de près de 15 deg. Mais il y a une circonſtance de Aphélie de Vénus.

Bayerische Staatsbibliothek München

plus qui fait paroître les erreurs beaucoup plus importantes qu'elles ne ſont, c'eſt que l'excentricité de Vénus étant fort petite, une erreur d'un degré ſur l'aphélie ne produit pas une minute ſur la longitude, comme on s'en apperçoit en jettant les yeux ſur la table de l'équation de l'orbite de Vénus qui pour un degré d'anomalie n'eſt que de 50″; ainſi l'erreur peut paroître fort grande ſur le lieu de l'aphélie, ſans qu'il en réſulte ſur le lieu obſervé de la planète une différence ſenſible.

Les obſervations de Vénus faites dans les années 136, 138, 140, donnent 8ˢ 21° 27′ ou 8ˢ 21° 29′ pour le lieu de ſon aphélie, que M. Caſſini eſtime être le réſultat le moins défectueux que fourniſſent les anciennes obſervations; (*Elém. d'aſtr. pag.* 544, 564). Il trouve le lieu de cet aphélie par les conjonctions inférieures de 1715, 1716 & 1718, de 10ˢ 6° 50′; ainſi dans l'eſpace de 1578 années le mouvement de l'aphélie auroit été de 45° 21′ à raiſon de 1′ 42″ 50‴ par année.

En employant de même le lieu de l'aphélie de Vénus déterminé par les obſervations des années 1592, 1594 & 1601, à 10ˢ 1° 54′ 12″ comparé avec le précédent, on trouve 40° 25′ 37″ de mouvement pour 1460 ans ou 1′ 39″ $\frac{1}{2}$ par année. M. Caſſini compare auſſi le lieu de l'aphélie pour 1716 avec celui de 1596, & le mouvement de 4° 56′ en 120 ans donne 2′ 28″ par année. Mais il n'eſt pas étonnant que ſur un intervalle auſſi court, dans lequel la différence n'eſt que de 4° 56′, il y ait une incertitude d'un quart ou d'un tiers de ce mouvement total.

Horoccius, après l'obſervation du paſſage de 1639 examinant la théorie de Vénus, fixoit ſon aphélie à 10ˢ 5° 0′; ſi l'on compare cette poſition à celle de 1716, 10ˢ 6° 50′, on trouve par ces 77 années le mouvement annuel de 1′ 26″ (*Elém. d'aſtr. pag.* 564), & c'eſt ainſi que M. Caſſini l'employe dans ſes tables.

1318. J'ai employé pour cette recherche la même méthode que pour l'aphélie de Mercure (1286). Vénus étant dans ſa plus grande digreſſion vers le 7 Août



1769, j'ai obſervé ſa longitude pluſieurs jours de ſuite, par exemple, le 7 Août à $20^h\ 52'\ 57''$ temps moyen; elle étoit de $3^s\ 0^\circ\ 19'\ 54''$ plus petite de $25''$ que par les tables de Halley, qui ſuppoſoient l'aphélie de Vénus à $10^s\ 7^\circ\ 36'\ 57''$. Ces $25''$ d'erreur exigeroient une augmentation de $1^\circ\ 15'$ dans le lieu de l'aphélie de Vénus, ainſi l'époque de cet aphélie pour 1769 ſeroit par ces obſervations de $10^s\ 8^\circ\ 51'\ 24''$, tandis que par les tables de M. Halley, elle eſt de $10^s\ 7^\circ\ 36'\ 24''$ & par celles de M. Caſſini, $10^s\ 8^\circ\ 5'\ 14''$. Cette poſition de l'aphélie eſt aſſez conforme aux obſervations faites la même année dans le mois d'Avril, aux environs de la plus grande digreſſion, & diminue beaucoup l'erreur des tables.

La digreſſion que j'ai obſervée à la fin de Juillet 1767, donne à peu-près le même réſultat: le 31 Juillet 1767 à $2^h\ 58'\ 51''$ de temps moyen la longitude obſervée étoit $5^s\ 23^\circ\ 6'\ 45''$, & l'anomalie de Vénus de 30°. Les tables de M. Halley qui marquoient l'aphélie à $10^s\ 7^\circ\ 35'$ pour ce temps-là donnoient une longitude trop grande de $24''$; mais en ſuppoſant $10^s\ 9^\circ\ 5'$, c'eſt-à-dire, $1^\circ\ 30'$ de plus, on trouve les tables d'accord avec l'obſervation, ainſi cette correction de l'aphélie approche beaucoup de celle de $1^\circ\ 15'$ que je trouve par la digreſſion de 1769. Chacune de ces digreſſions a été déterminée par un milieu entre pluſieurs obſervations; je ſuppoſerai donc l'aphélie de Vénus au commencement de 1768 à $10^s\ 8^\circ\ 58'$, plus avancé de $54'$ que dans M. Caſſini, & plus avancé de $1^\circ\ 22'\ \frac{1}{2}$ que dans M. Halley.

Son mouvement.

En comparant cette poſition de l'aphélie avec celle que Képler donne dans ſes tables Rudolphines $10^s\ 1^\circ\ 4'$ pour 1592, je trouve le mouvement de l'aphélie de Vénus $2'\ 41''\ \frac{1}{2}$ par année & $2'\ 28''$ en le comparant avec la longitude que M. Caſſini trouvoit pour 1596 par les obſervations de Tycho, $10^s\ 1^\circ\ 54'$. Ce mouvement de l'aphélie dans Vénus paroît beaucoup plus grand que dans toutes les autres planètes, & c'eſt la

raiſon pour laquelle il ſemble que M. Caſſini l'ait rejetté (*pag.* 564) ; mais il pourroit arriver que la petiteſſe de ſon excentricité rendît plus conſidérable le mouvement de ſon aphélie. (Voy. cependant la piece de M. Euler qui a remporté le prix de 1756, art. 61 & 99, & celle de 1748, *pag.* 52). Dans les tables de M. Halley ce mouvement n'eſt que de $56'' \frac{1}{2}$, dans celles de M. Caſſini $1' 26''$. Pour moi je le ſuppoſerai de $2' 30''$.

Aphélie de Mars.

1319. L'APHÉLIE DE MARS eſt plus aiſé à déterminer, auſſi nous voyons que ſon mouvement eſt preſque le même dans les tables de M. Caſſini & de M. Halley, $1' 12''$ dans les premieres, $1' 10''$ dans les ſecondes. Les trois oppoſitions de Mars obſervées par Ptolomée, donnent pour le lieu de l'aphélie, 135 ans après J. C. $3^s 29^\circ 24'$. Par les obſervations faites à Greenwich en 1691, 1696 & 1700, qui ſont très-bien d'accord avec celles qu'on faiſoit dans le même temps à Paris, & dont la premiere & la troiſieme ſont à pareilles diſtances de l'aphélie, M. Caſſini trouve $5^s 0^\circ 31' 34''$ pour 1696; ainſi dans l'eſpace de 1561 ans l'aphélie a avancé chaque année de $1' 11'' 47''' 20''''$, (*Elém. d'aſtr. pag.* 478).

Son mouvement annuel de 70".

1320. Dans mes recherches ſur l'orbite de Mars j'ai trouvé le lieu de l'aphélie vers 1748 à $5^s 1^\circ 26' 10''$, ou moins avancé de $3' 8''$ ſeulement, que ſuivant les tables de M. Halley (1307), ce qui prouve que le mouvement annuel de l'aphélie de Mars eſt aſſez exactement conforme à ces tables ou de $1' 10''$. Cependant l'époque pour 1748 étant $5^s 1^\circ 26' 10''$, & celle de Képler pour 1592, $4^s 28^\circ 49' 50''$ la différence $2^\circ 36' 20''$ répartie ſur 156 ans, donne pour le mouvement annuel $60''$ ſeulement. Je crois donc qu'en prenant un milieu entre ces trois déterminaiſons, on peut le ſuppoſer de $1' 7''$ par année, ou $1^\circ 51' 40''$ par ſiecle.

Aphélie de Jupiter.

1321. L'APHÉLIE DE JUPITER calculé par les obſervations de Ptolomée, ſe trouve pour l'an 136 de $5^s 14^\circ 38'$ ſuivant M. Caſſini ; mais par les obſervations de

1588, 1590 & 1592, faites par Tycho, il trouve pour l'année 1590, $6^s\ 6^\circ\ 31'$; & Képler le place pour la même année à $6^s\ 6^\circ\ 44'$. Les déterminations de M. Caſſini, pour 136 & 1590 donnent $54''$ par année pour le mouvement de l'aphélie de Jupiter. Par les oppoſitions de 1719, 1721 & 1723, la longitude de l'aphélie pour l'année 1720, eſt $6^s\ 9^\circ\ 47'$; cette longitude comparée avec celles de Ptolomée, donne $57''\ 2$ par année. Mais les obſervations de Tycho comparées à celles de ce ſiecle, donnent le mouvement annuel de $1'\ 30''$. (*Elem. d'aſtron. pag.* 429).

Ces différences faiſoient ſoupçonner à M. Caſſini, que peut-être le mouvement de l'aphélie étoit accéléré, ou du moins ſujet à quelques irrégularités, en même temps que ſon excentricité eſt ſujette à augmenter (1273), mais peut-être auſſi ces différences viennent des inégalités périodiques de Jupiter, produites par l'action de Saturne, dont on n'a pu tenir compte dans toutes ces recherches, & qui ſont même encore très-peu connues; au reſte, M. Caſſini adopte dans ſes tables le mouvement annuel de l'aphélie de $57''\ 24'''$ d'après les anciennes obſervations, & M. Halley le ſuppoſe de $72''$.

M. Jeaurat ayant comparé entre elles les obſervations de Tycho, & les dernieres qui ont été faites à Paris en 1750, 1761 & 1765, trouve qu'en 1590 l'aphélie étoit à $6^s\ 7^\circ\ 49'\ 19''$, & en 1762, $6^s\ 10^\circ\ 36'\ 41''$ d'où il réſulteroit $58'',4$ pour le mouvement annuel de l'aphélie. (*Mém.* 1765, *pag.* 384 & 438); mais dans ſes tables imprimées avec celles de M. Bailly pour les ſatellites de Jupiter, & dont les fondemens ſe trouvent dans les mémoires de 1766, il ſuppoſe le mouvement de l'aphélie de $79''\ 27$ par année, & le lieu de l'aphélie, comme dans les tables de M. Caſſini, $6^s\ 10^\circ\ 24'\ 7''$ pour 1760.

D'un autre côté, M. Euler dans ſa ſeconde piéce ſur les inégalités de Jupiter & de Saturne, couronnée en 1752, trouve que l'aphélie de Jupiter doit avancer de

Son mouvement eſt incertain.

55″ par an, en vertu de l'attraction de Saturne : tous ces différens ſentimens font voir la néceſſité d'y appliquer encore les obſervations qu'on pourra faire dans la ſuite, pour développer mieux les différentes inégalités de Jupiter & le mouvement de ſon aphélie.

1322. Le mouvement de l'aphélie de Jupiter, ſuivant M. Caſſini eſt de 57″ 42 par année ; ſuivant la théorie que M. de la Grange a adoptée dans le troiſieme volume de Turin, ce mouvement eſt de 57″ 20 en vertu de l'attraction de Saturne ; il eſt ſujet encore à une accélération, mais elle eſt peu ſenſible. M. Bailly a ſuivi ces deux déterminations, & dans les calculs qu'il a lus à l'académie le 19 Mars 1769 ſur cette matiere, il s'en eſt tenu à 57″, mais M. Wargentin a préféré 62″, comme le mouvement qui ſatisfait le mieux aux obſervations, & c'eſt celui que j'ai adopté dans les tables qui ſont dans cette aſtronomie ; l'époque pour 1750 eſt 6ˢ 10° 22′ 31″ plus avancée de 7′ 58″ que par les tables de M. Caſſini, mais moins avancé de 11′ 15″ que dans les tables de Halley.

Aphélie de Saturne.

L'APHÉLIE DE SATURNE déterminé par M. Caſſini au moyen des trois oppoſitions des années 127, 133 & 136, ſe trouve pour l'an 132 à 7ˢ 24° 14′ 29″ : les oppoſitions de 1686 & de 1694, le donnent en Avril 1694 à 8ˢ 28° 58′, ce qui fait pour le mouvement annuel 1′ 20″. (*Elem. d'aſtron. pag.* 373.).

Par quatre comparaiſons différentes des oppoſitions de Saturne, obſervées par Tycho depuis 1582 juſqu'en 1599, M. Caſſini trouve l'aphélie de Saturne à 8ˢ 25° 40′ 51″ pour le 19 Décem. 1590, moins avancé ſeulement de 5′ 23″ que ſuivant les tables Rudolphines de Képler, ce lieu comparé à celui de 1694, 8ˢ 28° 58′, donne le mouvement de 3° 17′ pour 103 ans, & le mouvement annuel de 1′ 55″. Mais ces obſervations de Tycho comparées avec celles de Ptolomée, donnent ſeulement 1′ 18″. (*ibid. pag.* 374).

Les obſervations de 1701, 1708 & 1716 donnent le

lieu du périhélie $2^s\ 28^\circ\ 25'$ pour le 12 Décembre 1708; cette poſition comparée à celle de 1590, donne pour le mouvement annuel $1'\ 23''\frac{1}{2}$.

Il ſuivroit de tout cela, dit M. Caſſini, *pag.* 374. que le mouvement de l'aphélie auroit été plus prompt dans le dernier ſiècle, ou que la ſituation du périhélie ne ſeroit pas exactement oppoſée à celle de l'aphélie, en ſorte qu'il y auroit quelque équation à employer pour le vrai lieu de Saturne dans ces deux points oppoſés de ſon orbe, ce qui y formeroit une eſpece de libration: en effet, il trouve le périhélie de 1708 moins avancé d'une degré qu'il ne devroit l'être par rapport à l'aphélie de 1694; mais les irrégularités de Saturne ſont ſi grandes, qu'on ne doit pas être ſurpris de cette différence, car il ſuffit de ſix minutes d'inégalité pour produire un degré ſur le lieu de l'aphélie; ainſi l'on ne doit pas eſpérer une préciſion plus grande que celle d'un degré pour le lieu de l'aphélie, & de 5″ ſur le mouvement annuel de l'aphélie de Saturne. M. Euler dans ſa premiere piece ſur Saturne, *pag.* 108. adopte le mouvement de l'aphélie, tel qu'il ſe trouve dans les tables de M. Caſſini; c'eſt-à-dire, $1'\ 18''$ par an, & ſe contente d'ajouter 28 minutes aux époques des longitudes de l'aphélie: dans ſa ſeconde pièce il trouve que l'aphélie apparent de Saturne doit avancer chaque année de $1'\ 8''$ ſeulement; on ne peut rien ſtatuer ſur ce mouvement de l'aphélie juſqu'à ce qu'on connoiſſe la loi & la meſure des nouvelles inégalités, dont j'ai parlé ci-devant (1167).

Son mouvement eſt incertain.

1324. Dans les nouvelles tables de Saturne qu'on trouvera dans ce livre, où j'ai eu pour objet de ſatisfaire principalement aux obſervations faites depuis 30 ou 40 ans, j'ai trouvé que l'aphélie de Saturne devoit être pour 1769, à $9^s\ 0^\circ\ 22'$; à l'égard de ſon mouvement, je l'ai eſtimé par la comparaiſon avec le lieu de l'aphélie qui paroît ſatisfaire aux obſervations de Tycho-Brahé, faites vers la fin du XVIe ſiècle; car s'il étoit au commencement de 1591 à $8^s\ 25^\circ\ 41'$, & en 1769 à $9^s\ 0^\circ\ 22'$ le progrès eſt de $4^\circ\ 41'$ en 178 ans, & le mouvement an-

nuel de 1′ 34″ 7 ; il ſeroit un peu moindre en employant l'époque de Képler ; je le ſuppoſerai de 1′ 30″ par année ou 2° 30′ par ſiècle.

Trouver les époques de la longitude moyenne des Planètes.

1325. Ayant déterminé par les méthodes précédentes (1279, 1286, 1293) le lieu de l'aphélie d'une planète, ou en général celui de l'apſide, (car cette méthode convient auſſi à l'apogée du ſoleil & de la lune), on aura par la même une longitude moyenne (1306) ; d'ailleurs le jour où la planète eſt dans ſon apſide, ſa longitude vraie, ſa longitude moyenne & la longitude de ſon apſide ſont exactement la même choſe ; on les connoît donc toutes trois lorſqu'on connoît le lieu de l'aphélie.

Epoque déduite de l'obſervation.

Exemple. La premiere des trois obſervations de Mars (1301) fut faite le 15 Février 1743, à 19^h 17′ 40″, temps moyen, & la longitude moyenne pour le moment de cette obſervation a été trouvée (1306) de 4^s 26° 27′ 21″ ; de ce moment-là juſqu'au premier Janvier 1744 à midi moyen, Mars a dû parcourir 15^s 17° 16′ 53″, à raiſon du mouvement annuel qu'on a vu ci-devant (1162) ; ſi l'on ajoute ce mouvement à la longitude moyenne obſervée, on aura la longitude moyenne pour le commencement de l'année 1744, 10^s 13° 44′ 14″ déduite de l'obſervation, c'eſt ce que nous appellons l'époque des moyens mouvemens pour 1744.

Epoques des tables pour le 31 Décembre.

1326. Les époques employées dans nos tables aſtronomiques ſont pour le premier Janvier à midi de temps moyen, à Paris, lorſqu'il s'agit des années biſſextiles ; mais dans les années communes on choiſit le midi du jour précédent qui eſt celui du 31 Décembre : par exemple, on trouve l'époque du ſoleil pour 1750, par le moyen de l'obſervation des équinoxes (884),

de

de 9^s 10° 0′ 43″ 4, c'eſt la longitude moyenne du ſoleil le 31 Décembre 1749 à midi moyen ; on a introduit cette méthode dans la vue de ſimplifier l'uſage de la table des moyens mouvemens pour les jours du mois ; car dans cette table au moyen de la diſpoſition précédente, il ſuffit de retrancher un jour dans les deux premiers mois des années biſſextilles pour s'en ſervir en tout temps, au lieu qu'il faudroit faire cette correction ſur dix mois, ſi toutes les époques étoient calculées pour le premier Janvier. En effet dans les tables des moyens mouvemens pour chaque jour du mois, on a coutume de mettre au premier Janvier le mouvement d'un jour, par exemple, 59′ 8″ ſi c'eſt pour le ſoleil ; cela ſuppoſe que l'époque eſt fixée pour la veille ; ſi elle eſt pour le midi même du premier Janvier, il n'y a rien à ajouter à l'époque pour avoir la longitude moyenne le premier de Janvier, il faudra donc ôter un jour de la date propoſée ou 59′ 8″ du mouvement indiqué par la table, & ainſi des autres jours, juſqu'au premier de Mars ; alors le jour intercalaire ajouté au mois de Février, fait que tous les moyens mouvemens des jours ſuivans ſont devenus plus petits de 59′ 8″, & il n'y a plus aucune correction à y faire, au lieu qu'il faudroit y ajouter le mouvement d'un jour pendant tout le reſte de l'année, ſi les mouvemens avoient été juſtes pendant les deux premiers mois.

Quand on a l'époque d'une année commune, il faut y ajouter le mouvement moyen pour 365 jours, & l'on a l'époque de l'année commune qui la ſuit : ſi l'on ſuppoſe que l'époque de 1750 étoit de 9^s 10° 0′ 43″ 4, & qu'on y ajoute 11^s 29° 45′ 40″ 5, mouvement du ſoleil pour 365 jours, on aura 9^s 9° 46′ 23″ 9, époque pour 1751 ; mais ſi l'année ſuivante eſt biſſextile, il faut ajouter un jour de plus, c'eſt-à-dire, le mouvement pour 366 jours ; ainſi à l'époque de 1751 on ajoutera 0^s 0° 44′ 48″ 8, & l'on aura 9^s 10° 31′ 12″ 7 pour l'époque de l'année biſſextille 1752 ; la rai-

ſon de cette différence vient de ce que cette derniere époque commence un jour plus tard que celle des années communes.

Epoques pour les ſiècl. éloignés.

1327. On trouveroit auſſi par le moyen de la méthode précédente que l'époque des longitudes moyennes du ſoleil pour l'année commune 1700 eſt de $9^s\ 10^\circ\ 7'\ 19''\ 6$, en ôtant de la précédente le mouvement pour 52 années. Si l'on ôte encore le mouvement ſéculaire, qui eſt de $45'\ 55''\ 6$ au-delà des cent révolutions completes, pour 100 années Juliennes dont 25 ſont biſſextiles, l'on devroit avoir l'époque de 1600 ; mais comme l'année 1700 étoit commune, & que l'année 1600 étoit biſſextile, ſuivant la règle du calendrier Grégorien que nous expliquerons dans le VIIIe. livre, la longitude ou l'époque de 1700 qui eſt pour le 31 Décembre précédent, ſe trouve diminuée d'un jour, & rapprochée de 1600 (1326) ; il faut donc ajouter le mouvement d'un jour à l'époque de 1600 trouvée par la règle précédente, afin d'avoir cette longitude pour le premier de Janvier à midi, (& non pour le 31 de Décembre précédent), on aura par ce moyen l'époque de 1600, $9^s\ 10^\circ\ 20'\ 32''$; en général, quand on voudra conclure l'époque d'une année ſéculaire biſſextile plus éloignée, de celle d'une année ſéculaire commune, il faudra en ôter le mouvement ſéculaire, & y ajouter le mouvement diurne.

De même pour avoir l'époque de l'année ſéculaire commune 1800, par le moyen de l'année ſéculaire commune 1700, il ne ſuffit pas d'y ajouter le mouvement ſéculaire $45'\ 55''\ 6$, parce que ce mouvement ſuppoſe 25 biſſextiles, & qu'il n'y en a que 24 dans ces cent ans ; mais il faut retrancher le mouvement d'un jour, ou ce qui revient au même ajouter $11^s\ 29^\circ\ 46'\ 47''\ 3$ à la premiere longitude ; c'eſt ainſi qu'on trouvera l'époque du ſoleil pour 1800 par celle de 1700, en y ajoutant ce mouvement ſéculaire diminué d'un jour, & l'on aura $9^s\ 9^\circ\ 54'\ 6''\ 9$ pour l'époque de 1800.

1328. L'époque d'une année ſéculaire commune, telle que 1700, en y ajoutant le mouvement pour 4 années Juliennes, dont une ſoit biſſextile, c'eſt-à-dire, 1′ 50″ 2 donne l'époque de 1704. Si vous commencez à compter d'une époque de biſſextile, comme 1704, pour trouver celle de 1708, ce ſera encore la même choſe, parce que dans les deux cas il y a un jour de plus que 4 années communes; mais pour ſentir l'égalité de ces deux cas, il faut deux conſidérations différentes. Dans le premier cas l'époque de 1700 étoit pour le 31 Décembre précédent, celle de 1704 pour le premier Janvier; ainſi quoique les 4 années 1700, 1701, 1702, 1703, aient été communes, il y a cependant un jour de plus entre les époques de 1700 & de 1704, à cauſe de la différente maniere de les compter (1326). Dans le ſecond cas, l'époque de 1704 & celle de 1708, ſont bien toutes deux pour le premier Janvier; mais il y a un jour de plus dans le cours de l'année biſſextile 1704; ainſi l'intervalle des époques augmente auſſi d'un jour, & il ſe trouve le même qu'entre celles de 1700 & de 1704.

En général, quand on prend le mouvement pour 4, 8, 12, &c. ou un nombre d'années diviſible par 4, ſoit que l'on commence par une époque commune, 1700, 1701, 1702, 1703, 1800, ou par une époque biſſextile, on trouve toujours exactement l'époque demandée; c'eſt pourquoi nous avons pris le mouvement de 52 années juſte pour trouver l'époque de 1700, par le moyen de celle de 1752 (1327), quoique l'une fût commune, & l'autre biſſextile; mais s'il arrivoit que le calendrier eût ſouffert une ou deux interruptions dans l'intervalle, comme ſi on alloit de 1700 à 1800, ou de 1699 à 1799, il faudroit diminuer le mouvement de la valeur d'un jour. Dans le cas où l'on va de 1700 à 1800, cette derniere étant une année commune, & ſon époque étant pour le 31 Décembre auſſi bien que celle de 1700, tandis que l'année 1700 a été diminuée d'un jour, la différence des deux époques doit être

néceſſairement plus petite d'un jour ; ainſi il faut ôter le mouvement diurne du mouvement ſéculaire. Dans le cas où l'on iroit de 1699 à 1799, il faudroit encore ôter le mouvement d'un jour, parce que l'année 1700 a ſouffert une diminution d'un jour, & que les cent ans compris entre 1699 & 1799, n'ont que 24 biſſextiles. Ainſi quoique l'année 1800 ſoit commune, on aura exactement les longitudes des années ſuivantes en ajoutant à celle de 1800 le mouvement pour un an, deux ans, &c. pris dans la table qui eſt immédiatement après les époques.

Epoques pour le Calendrier Julien.

Pour paſſer de l'époque de 1600 à celle de 1500, il ne ſuffit pas d'ôter le mouvement ſéculaire, il faut enſuite ajouter le mouvement de dix jours, parce qu'en 1500 on ſuivoit le Calendrier Julien, ou vieux ſtyle, & en 1600 l'on avoit pris le nouveau ſtyle. Le Calendrier Grégorien ayant ſupprimé dix jours de l'année 1582, comme nous le dirons dans le VIIIe livre, l'intervalle de 1500 à 1600 eſt moindre de dix jours que celui de cent années Juliennes, ou de 36525 jours auquel répond le mouvement ſéculaire ; on ôte donc dix jours de trop quand on retranche le mouvement ſéculaire ; ainſi il faut ajouter le mouvement qui répond à ces dix jours : par exemple, l'époque du ſoleil pour 1600 eſt 9^s 10° 20′ 32″ 3 ; ſi l'on en ôte 45′ 55″ 6, mouvement ſéculaire du ſoleil, & qu'on ajoute enſuite 9° 51′ 23″ 3, mouvement pour dix jours, on aura 9^s 19° 26′ 0″, époque de 1500, plus petite de 26″ ſeulement que dans les tables de M. Caſſini.

Epoques avant 1500.

1329. Lorſqu'on connoît une fois l'époque de 1500, il n'y a plus aucune variété dans le calendrier, il ſuffit d'en ôter le mouvement ſéculaire 45′ 55″ 6, pour avoir l'époque de 1400 ; & continuant toujours la même ſouſtraction, on parvient aux époques des années ſéculaires qui ont précédé. J'ai prolongé les tables qui ſont dans ce livre, en ſuivant le même progrès, juſqu'à l'an 800 avant J. C. parce que les anciennes obſervations Caldéennes vont juſqu'à ce ſiècle-là, & que les

aſtronomes en font encore quelque uſage. Nous n'avons aucun beſoin des temps plus éloignés : au-delà de 800 ans avant J. C., l'aſtronomie ni l'hiſtoire ne fourniſſent rien qui ſoit ſuſceptible d'un calcul aſtronomique.

Le calendrier Julien ſe prolonge ainſi d'une maniere uniforme juſqu'à une époque plus ancienne de 800 ans que l'établiſſement même du calendrier, fait par Jules Céſar ; dans ces temps reculés il n'y avoit aucune forme conſtante de calendrier (278) ; ainſi il a bien fallu convenir d'une échelle commune pour meſurer ſoit les ſiècles qui ont précédé, ſoit ceux qui ont ſuivi l'ere chrétienne. La forme du calendrier Julien eſt ſimple, uniforme, commode ; elle a été ſuivie pendant près de 1000 ans dans l'hiſtoire de l'Europe, elle a été employée par des chronologiſtes & des aſtronomes habiles, elle eſt obſervée dans les tables de M. Caſſini, & je m'en ſervirai, à ſon exemple quand je parlerai des anciennes obſervations, quoique Ptolomée ſe ſoit ſervi des années de Nabonaſſar ou de la mort d'Alexandre, comme nous le dirons dans le VIIIe livre.

1330. En remontant ainſi par une ſouſtraction continuelle du mouvement ſéculaire, on parvient à l'année 100 de J. C., enſuite à l'année 0, & de-là à l'année 100 avant J. C. ; ainſi de l'année 100 de notre ere à l'année 100 avant J. C. il y a 200 ans de diſtance. Suivant la maniere de compter employée par la plupart des chronologiſtes, il faudroit retrancher un an de la ſomme des années avant & après J. C. par exemple, l'équinoxe obſervé par Hipparque l'an 602 de Nabonaſſar, tombe au 24 Mars de l'année 146 avant J. C. ſuivant les chronologiſtes ; ſi on veut le comparer avec celui de 1765, on aura 1911 pour la ſomme des années, & cependant il n'y a réellement que 1910 ans d'intervalle, parce que l'année où eſt né J. C. doit s'appeller *zero*, comme dans M. Caſſini, (*Elém. d'aſtron. pag.* 216.), & non pas l'année 1 avant J. C. ; par ce moyen l'on doit dire que l'équinoxe, dont nous venons de parler, ſe rapporte à l'année 145 avant J. C. & non pas à l'année 146.

M. Caſſini compte une année de moins que les autres.

EPOQUES des moyens Mouvemens des cinq Planètes principales, & de leurs Aphelies pour 1750; avec les Mouvemens séculaires, suivant MM. CASSINI & HALLEY, & suivant les nouvelles Tables de cet Ouvrage.

Époques de 1750.

	M. CASSINI.	M. HALLEY.	Différence.	Suivant nos Tables
Mercure,	8ˢ 13° 19′ 5	8ˢ 13° 7′ 45″	—11′ 20″	8ˢ 13° 9′ 50″
Vénus,	1 16 19 21	1 16 19 23	+ 0 2	1 16 19 4
Mars,	0 21 58 43	0 21 58 30	— 0 13	0 21 59 17
Jupiter,	0 4 0 59	0 4 5 17	+ 4 18	0 4 2 26
Saturne,	7 20 41 56	7 20 26 24	—15 32	7 20 38 53

Mouvement séculaire des Planètes.

	M. CASSINI.	M. HALLEY.	Différence.	
Mercure,	2ˢ 14° 16′ 54″	2ˢ 14° 2 13″	—14′ 41″	2ˢ 14° 12′ 10″
Vénus,	6 19 11 2	6 19 11 52	+ 0 50	6 19 12 12
Mars,	2 1 41 56	2 1 42 20	+ 0 24	2 1 42 10
Jupiter,	5 6 21 30	5 6 28 11	+ 6 41	5 6 27 30
Saturne,	4 23 29 28	4 23 6 0	—23 28	4 23 14 30

Aphélies pour 1750.

	M. CASSINI.	M. HALLEY.	Différence.	
Mercure,	8ˢ 13° 41′ 18″	8ˢ 13° 27 12′	—14 6′	8ˢ 13° 33′ 3″
Vénus,	10 7 38 0	10 7 18 31	—19 29	10 8 13 0
Mars,	5 1 36 9	5 1 31 38	— 4 31	5 1 28 24
Jupiter,	6 10 14 33	6 10 33 46	+19 13	6 10 22 31
Saturne,	8 29 13 31	8 29 39 58	+26 27	8 29 53 30

Mouvement séculaire des Aphélies.

	M. CASSINI.	M. HALLEY.	Différence.	
Mercure,	0ˢ 2° 13′ 20″	0ˢ 1° 27′ 37″	—45′ 43″	0ˢ 1° 57 40″
Vénus,	0 2 23 20	0 1 34 13	—49 7	0 4 10 0
Mars,	0 1 59 38	0 1 56 40	— 2 58	0 1 51 40
Jupiter,	0 1 35 42	0 2 0 0	+24 18	0 1 43 20
Saturne,	0 2 9 44	0 2 13 20	+ 3 36	0 2 23 20

Ainſi nous avons expliqué la maniere de déduire d'une ſeule époque toutes les autres, & de trouver une époque par obſervation, avec les autres élémens d'une planète, & nous avons donné les réſultats de ces méthodes, tels qu'ils ſont conſignés dans les tables des divers aſtronomes, avec la différence qu'il y a entre ces mêmes tables. Voici l'époque du ſoleil qui manquoit à la table précédente.

Epoque du ſoleil pour 1750 ſuiv. M. Caſſini.	9	10	0 35
Suivant les tables de Flamſteed.	9	10	0 21
Suivant les dernieres tables de Mayer. . .	9	10	0 34″7
Suivant les tables de M. de la Caille. . . .	9	10	0 43,4

1331. Lorſqu'on connoît les époques de la longitude moyenne par obſervation (1325), ou par les calculs précédens; on peut avoir la longitude moyenne à tout autre jour de l'année, en y ajoutant le mouvement diurne (1161), autant de fois qu'il y a de jours écoulés depuis l'époque. Suppoſons qu'on ait trouvé pour 1760 l'époque du ſoleil ou ſa longitude moyenne le premier Janvier à midi moyen $9^s\ 10^\circ\ 34'\ 53''$, & qu'on veuille avoir la longitude moyenne pour le 31 Janvier à midi moyen, on ajoutera le mouvement diurne pris 30 fois, ou $29^\circ\ 34'\ 10''$, avec l'époque de la longitude moyenne, & l'on aura la longitude moyenne le 31 Janvier; tel eſt le fondement de l'uſage que nous ferons des moyens mouvemens, en expliquant nos tables.

On pourroit avec les nombres de la table précédente & les règles du calcul des équations (1244), trouver en tout temps le lieu d'une planète ſur ſon orbite vu du ſoleil; mais pour abréger les calculs, je joindrai à cet ouvrage de nouvelles tables aſtronomiques des cinq planètes, auſſi étendues, mais plus exactes que celles de M. Halley & de M. Caſſini. Je ne les avois point données dans la premiere édition de ce livre n'ayant pas eu le temps pour lors de conſtater divers élémens dont j'avois montré l'incertitude; mais je les ai preſque

tous vérifiés depuis quelques années, comme on l'a vu dans le cours de ce VIe. livre.

NŒUDS ET INCLINAISONS DES PLANÉTES.

1332. On a vu dans le livre précédent ce que c'eſt que les nœuds des planètes (1122, 1137), auſſi bien que les inclinaiſons de leurs orbites, & l'effet qui en réſulte par rapport à nous; il s'agit actuellement d'indiquer les méthodes aſtronomiques de trouver la ſituation de ces nœuds & la quantité de ces inclinaiſons.

Premiere méthode pour trouver le nœud.

Lorſqu'une planète n'a aucune latitude vue de la terre elle n'en ſauroit avoir vue du ſoleil, elle eſt alors dans ſon nœud (1122), puiſqu'elle eſt dans le plan de l'écliptique; il ſuffit donc d'obſerver la longitude géocentrique de la planète, au temps où elle n'a point de latitude, on en conclura ſa longitude vue du ſoleil (1147), & ce ſera le lieu du nœud.

1333. Exemple. Le 14 Mai 1747, à 10^h 50′ 43″, de temps vrai, Mars étant fort près de ſon nœud deſcendant, M. de la Caille obſerva la longitude de cette planète 7^s 6° 15′ 10″ réduite à l'écliptique, & ſa latitude boréale de 54″; la longitude du ſoleil pour le même inſtant, déduite des obſervations faites ce jour-là, & qu'on pouvoit ſe contenter de prendre dans les tables, étoit de 1^s 23° 38′ 10″; ainſi l'angle à la terre, ou l'angle d'élongation *LTS* (*fig.* 56), étoit de 162° 37′ 0″: la parallaxe de l'orbe annuel, ou l'angle à la planète *TLS* étoit alors, ſuivant les tables de M. Caſſini, de 11° 11′ 57″; ainſi ajoutant cette quantité à la longitude géocentrique obſervée 7^s 6° 15′ 10″, on a la longitude héliocentrique de Mars 7^s 17° 27′ 7″; de-là il ſuit que l'angle de commutation, qui eſt la différence entre cette longitude & celle de la terre, ou l'angle *LST* étoit de 6° 11′ 3″; en faiſant la proportion de l'art. 1145, on trouvera que 54″ de latitude géocentrique

Fig. 56.

géocentrique répondoient à $19'' \frac{1}{2}$ de latitude héliocentrique. M. de la Caille réſout enſuite un triangle PAL, (*fig.* 54), rectangle en L, dont l'angle A eſt de 1° 51′, égal à l'inclinaiſon de l'orbite de Mars AP ſur l'ecliptique AL (on la trouvera par l'art. 1357), & le petit côté PL de $19'' \frac{1}{2}$ latitude héliocentrique de Mars, il a l'autre côté AL (3686) de 604″ ou de 10′ 4″, c'eſt la diſtance de Mars à ſon nœud vue du ſoleil ; donc le nœud deſcendant de Mars vu du ſoleil étoit alors à 7ˢ 17° 37′ 11″ (*Mém. acad.* 1747, *pag.* 146). *Fig.* 54.

1334. Il faut remarquer dans le calcul précédent qu'en obſervant pluſieurs jours de ſuite la latitude de Mars, on en pourroit conclure le temps où il avoit été ſans latitude, éviter la réſolution du dernier triangle, & ne ſuppoſer point du tout la connoiſſance de l'inclinaiſon.

1335. On peut auſſi employer à la recherche du lieu du nœud, des obſervations faites à égales diſtances des nœuds, lorſque la latitude héliocentrique d'une planète s'eſt trouvée de la même quantité, car le milieu entre les longitudes héliocentriques trouvées dans les deux cas, ſera le lieu du nœud, en le ſuppoſant fixe dans l'intervalle des deux obſervations. Seconde méthode.

Exemple. Le 13 Mars 1693, à 17ʰ 50′, le vrai lieu de Saturne vu de la terre, étoit à 8ˢ 22° 56′ 30″, & ſa latitude boréale 1° 24′ 50″ ; le 3 Mai 1699, à 15ʰ 50′, la longitude étoit de 11ˢ 1° 0′ 50″, & ſa latitude auſtrale 1° 22′ 20″. En réduiſant au ſoleil ces deux latitudes obſervées (1145), on a pour les latitudes héliocentriques de Saturne 1° 24′ 10″, & 1° 24′ 28″, que M. Caſſini ſuppoſe égales, parce qu'une différence de 18″ n'étoit pas ſenſible dans les hauteurs méridiennes priſes avec les quarts-de-cercles de ce temps-là, mais nous aurons égard à cette différence (1336) : les longitudes héliocentriques de Saturne calculées pour les mêmes temps (1147), étoient de 8ˢ 17° 4′ 37″ & 10ˢ 25° 16′ 49″, dont le milieu eſt 9ˢ 21° 10′ 43″,

c'eſt la longitude du nœud qui réſulte, ſuivant M. Caſſini, de ces deux obſervations (*Elémens d'aſtron. pag.* 389).

Corrections à employer dans cette méthode.

1336. Dans l'intervalle de ces deux obſervations qui eſt de plus de ſix années, le lieu du nœud avoit changé d'environ 3′ 4″, ce qui fait ſur la latitude une différence de 7″, dont la latitude étoit plus petite qu'elle n'eût été ſi le nœud avoit reſté immobile, & qu'il faut, pour une plus grande préciſion, ajouter à la ſeconde latitude héliocentrique, parce qu'elle eût été plus grande au même point du ciel, ſi le nœud de Saturne eût été moins avancé de 3′ 4″ dans la ſeconde obſervation; au moyen de cette ſeconde correction, la latitude ſe ſeroit trouvée de 1° 24′ 35″ pour le 3 Mai 1699, plus grande de 27″ que la premiere latitude, ces 27″ ſont 11′ 32″, dont il faut diminuer la longitude héliocentrique de Saturne, qui ſuivant des calculs plus exacts devoit être le 13 Mars 1693, de 10ˢ 25° 22′ 6″; par ce moyen l'on a la longitude où il ſe ſeroit trouvé en 1699, s'il avoit eu la même latitude 1° 24′ 10″ que dans la premiere obſervation; cette longitude ſera donc de 10ˢ 25° 10′ 34″, c'eſt la longitude à laquelle ſe ſeroit trouvé Saturne en 1699 avec une latitude de 1° 24′ 10″ égale à celle de 1693 en ſuppoſant que le nœud eût été immobile; or la premiere longitude devoit être de 8ˢ 17° 16′ 6″, la différence eſt 2ˢ 7° 54′ 28″, dont la moitié 33° 57′ 14″, eſt la diſtance de Saturne à ſon nœud en 1693, qui ajoutée à ſa longitude 8ˢ 17° 16′ 6″, donne celle du nœud 9ˢ 21° 13′ 20″. Nous nous en ſervirons encore pour trouver l'inclinaiſon de l'orbite (1360). Ainſi le lieu du nœud ſera de 9ˢ 21° 13′ 20″ pour le 13 Mars 1693, temps de la premiere obſervation, plus avancé de 2′ $\frac{1}{2}$ que ſuivant le calcul de M. Caſſini.

Après avoir indiqué les méthodes qui ſervent à trouver le lieu du nœud, nous allons expoſer ce que l'on ſait actuellement de plus exact ſur la poſition des nœuds de chaque planète, & ſur le mouvement de ces nœuds;

on verra par la conformité des réſultats trouvés dans l'un & l'autre nœud, ſoit aſcendant, ſoit deſcendant, que ces nœuds ſont en effet directement oppoſés & ſitués par conſéquent ſur une ligne droite qui paſſe par le centre du ſoleil, comme nous l'avons ſuppoſé (1117).

1337. Le Nœud de Mercure ne ſauroit ſe déterminer par des obſervations meilleures que celles de ſes paſſages ſur le ſoleil dans leſquels ſa latitude eſt preſque nulle, & nous en avons un aſſez grand nombre pour y parvenir avec quelque préciſion : je les ai tous diſcutés, (*Mém. acad.* 1756, *pag.* 259. *& ſuiv.*), & j'en ai tiré une table des époques de la longitude du nœud, calculée en ſuppoſant le mouvement ſéculaire de 1° 15′, tel que le donne l'obſervation de 1723, comparée à celle de 1753, enſorte que ce mouvement eſt moindre de 8′ 20″ que le mouvement des étoiles, ou la préceſſion en longitude (917). Nœud de Mercure.

Années.	Epoques calculées.	Epoques obſervées.
1697.	1ˢ 14° 41′ 30″	1ˢ 14° 41′ 6″
1723.	1 15 1 0	1 15 1 0
1736.	1 15 10 45	1 15 12 59
1740.	1 15 13 45	1 15 14 45
1743.	1 15 16 0	1 15 16 25
1753.	1 15 23 30	1 15 23 30

On accorderoit encore mieux les différentes obſervations, ſi l'on diminuoit le diamètre du ſoleil dans les paſſages de Mercure ſur ſon diſque, ainſi que nous le dirons dans le livre XIe (2159). Son mouvement annuel de 45″.

Ce mouvement du nœud de Mercure, eſt donc rétrograde par rapport aux étoiles fixes, d'environ 5″ par an, je l'avois fixé de même par les ſeules obſervations, mais il s'eſt trouvé parfaitement d'accord avec celui que m'a donné la théorie de l'attraction, diſcutée enſuite avec ſoin dans les *Mém. de l'acad.* pour 1758 & 1761, par la méthode qui ſera expliquée dans le

XXIIe. livre (3523), & dont on trouvera le réſultat ci-après (1347).

1338. Ainſi le mouvement ſéculaire du nœud de Mercure, que M. Halley a fait de 1° 23′, & M. Caſſini de 1° 24′ 40″, eſt certainement beaucoup moindre : M. le Gentil en comparant le lieu du nœud qu'il avoit déterminé en 1753, à 1ˢ 15° 24′ 14″ avec celui que M. Halley avoit fixé en 1677, à 1ˢ 14° 21′ 3″, trouvoit le mouvement du nœud de 50″ 21 centièmes (*Mém. acad.* 1753, *pag.* 277). Mais M. de l'Iſle a cru qu'on devoit le réduire à 37″, ce qui ſuppoſeroit 13″ par an pour la rétroceſſion des nœuds ; car en calculant avec ſoin les obſervations faites par Tycho le 22 & le 23 Janvier 1586, M. de l'Iſle a trouvé le nœud de Mercure pour ce temps-là, à 1ˢ 13° 5′ 8″, moins avancé de 7′ $\frac{1}{4}$, que par les tables de M. Halley ; cela prouve du moins que le mouvement du nœud de Mercure eſt plus lent que M. Halley & M. Caſſini ne le ſuppoſent ; & il m'a paru toujours impoſſible que l'action de Vénus & de la terre n'y produiſît pas quelque altération. Il eſt évident qu'une planète attirée ſans ceſſe vers un plan différent de celui de ſon orbite, doit s'en rapprocher continuellement, c'eſt-à-dire, y arriver toujours un peu plutôt à chaque révolution, comme nous l'expliquerons (3516). J'ai ſuppoſé dans mes tables ce mouvement de 45″ par an, & l'époque pour 1750, 1ˢ 15° 21′ 15″.

Nœud de Vénus.

1339. Le Nœud de Vénus, ſuivant les calculs que j'ai faits du paſſage de cette planète avec la plus grande exactitude, étoit le 3 Juin 1769, à 2ˢ 14° 36′ 20″, comme on le verra dans le livre XIe ; il n'y a pas une demi-minute d'erreur à craindre dans cette poſition ; les tables de M. Halley donnoient 2′ 36″ de moins, & celles de M. Caſſini, 2′ 25″ de plus ; la différence eſt peu conſidérable. M. Hornſby ayant calculé avec ſoin le lieu du nœud par l'obſervation d'Horoccius, faite au mois de Décembre 1639, (2040) le trouve à 2ˢ 13° 27′ 50″, le mouvement ſeroit donc en 129 ans $\frac{1}{2}$ de

68′ 30″, ou de 31″ 7 par année, c'eſt-à-dire, de 18″ $\frac{1}{2}$ par rapport aux étoiles fixes, quantité qui eſt aſſez d'accord avec celle de 20″ 4, que j'ai tirée des calculs de l'attraction (1347, 3516), & qui me paroît d'une exactitude déciſive. M. Caſſini avoit déterminé le lieu du nœud par l'obſervation de Vénus ſur le Soleil, le 24 Novem. 1639, à 2ˢ 13° 28′ 22″, détermination qu'il jugeoit auſſi la plus exacte; cette obſervation comparée avec le lieu du nœud obſervé en 1761, à 2ˢ 14° 31′ 30″, l'on en tire pour le mouvement du nœud 31″ $\frac{1}{4}$ par année, ou 19″ par rapport aux étoiles.

1340. M. Caſſini emploie auſſi à cette recherche une ancienne obſervation, c'eſt celle de Timocharès, faite le 11 Oct. 271 avant J. C. dans laquelle Vénus éclipſa l'étoile » de l'aile auſtrale de la Vierge; il trouve le lieu du nœud de Vénus par cette obſervation, de 1ˢ 24° 2′, comparant cette obſervation avec le lieu du nœud obſervé en 1698, à 2ˢ 14° 1′ 45″; on a le mouvement de 36″ $\frac{1}{2}$ par année, ou de 14″ par rapport aux étoiles fixes. L'obſervation de 1639, par laquelle M. Caſſini trouve 2ˢ 13° 28′ 22″, comparée avec la poſition du nœud obſervée par M. Caſſini le 4 Sept. 1698, à 2ˢ 14° 1′ 45″, donne 2″ $\frac{1}{2}$ de plus pour le mouvement annuel par rapport aux étoiles, ou 34″ par rapport aux équinoxes; celles de 1705, de 1710 & de 1731 en différoient très-peu, enſorte que M. Caſſini s'en eſt tenu dans ſes tables à un mouvement annuel de 34″ par rapport aux équinoxes; mais ſi l'on avoit égard au changement de latitude de l'étoile » (2741); il pourroit en réſulter quelque différence dans le lieu du nœud conclu pour le temps de Timocharès.

Son mouvement eſt de 31″.

M. de la Caille, (*Mém. de l'acad.* 1746, *pag.* 181) rapporte une obſervation qu'il fit du paſſage de Vénus par ſon nœud deſcendant; le 21 Décembre 1746, à 10ʰ 37′ $\frac{1}{2}$ de temps moyen, Vénus avoit 10ˢ 3° 52′ 17″ de longitude géocentrique, & ſa latitude étoit nulle; il trouve le nœud à 2ˢ 14° 23′ 10″; il compare cette obſervation avec celle de M. de la Hire qui détermina

le paſſage de Vénus par ſon nœud le 31 Oct. 1692 à 0^h $12' \frac{1}{4}$ du ſoir, temps moyen, d'où il conclut que Vénus avoit fait à l'égard de ſon nœud 88 révolutions complettes en 19773j 10^h 25′ 15″, ce qui donne pour chacune 224j 16^h 45′ 17″, & le mouvement annuel du nœud de 38″, au lieu de 30 que donne la théorie; ces obſervations ſont moins déciſives & moins éloignées entre elles que celles de 1639 & de 1761, qui donnent à peu-près le même mouvement que la théorie de l'attraction, & je m'en tiendrai à 31″, pour le mouvement annuel du nœud de Vénus; avec l'époque pour 1750, 2^s 14° 26′ 18″.

Nœud de Mars.

1341. Le Nœud de Mars peut ſe déterminer de pluſieurs manieres; M. Caſſini ſe ſert des obſervations de Tycho, ſuivant leſquelles le nœud de Mars étoit le 28. Oct. 1595, à 1^s 16° 24′ 33″. Le 13 Novem. 1721 M. Caſſini trouve qu'il étoit à 1^s 17° 29′ 49″, ce qui donne pour le mouvement ſéculaire 51′ 47″, ainſi le mouvement annuel du nœud de Mars ſeroit de 31″ 07. (*Elém. d'aſtron. pag.* 490).

Par la comparaiſon de la même obſervation de Tycho avec celles qui furent faites en 1700 à Paris & à Greenwich, lorſque Mars étoit dans ſon nœud deſcendant, on trouve le mouvement annuel de $34\frac{1}{4}$ & de $38'' \frac{1}{4}$, ſuivant qu'on emploie les obſervations de Flamſteed, ou celles de M. Caſſini.

1342. Si l'on compare les obſervations de 1721 avec la détermination de Ptolomée, (*Almag. liv. XIII. c.* 1.), qui place le terme boréal de l'orbite de Mars à la fin du Cancer ou le nœud aſcendant à la fin du Bélier, on voit que dans l'intervalle de 1582 ans le mouvement du nœud a été de 17° 30′ & de 66′ 22″ par ſiecle, c'eſt-à-dire, pour chaque année, de 39″ 8, ce qui ſeroit parfaitement d'accord avec mes calculs faits d'après la théorie, qui donnent $10'' \frac{1}{2}$ pour le mouvement du nœud par rapport aux étoiles, ou 39″ 8 par rapport aux équinoxes. Mais M. Caſſini ayant préféré les obſervations de Tycho, comparées aux ſiennes & à celles de Flamſteed,

Son mouvement eſt de 49″,

s'en eſt tenu dans ſes tables à faire le mouvement annuel du nœud de Mars 34″. M. Halley dans ſes tables le fait de 38″. M. de la Caille, (*Mém. acad.* 1747, *pag.* 146), trouve le nœud de Mars à 1ˢ 17° 37′ 11″, moins avancé de 7′ $\frac{1}{3}$, que ſuivant les tables de M. Caſſini, & de 17′ $\frac{1}{3}$ que ſuivant celles de M. Halley. Dans les mémoires de 1754, il rapporte des obſervations faites à l'Iſle de France en 1753, par leſquelles il trouva le nœud de Mars à 1ˢ 17° 42′ 5″ le 4 Novembre 1753, cette détermination ne diffère que de 36″ de la précédente, quand on les réduit à une même époque. J'ai auſſi obſervé Mars au mois de Novembre 1768, dans le temps qu'il étoit près de ſon nœud, & j'en ai conclu l'époque de 1769, 1ˢ 17° 44′ 23″ moins avancée de 24′ que dans les tables de Halley. Les obſervations que j'ai calculées & diſcutées avec ſoin, (*Mém. acad.* 1755, *pag.* 212. *& ſuiv.*), ſoient auſſi très-propres à vérifier cet élément avec beaucoup d'exactitude : en attendant j'ai pris un milieu entre les déterminations précédentes, & je ſuppoſerai le nœud de Mars en 1750 à 1ˢ 17° 36′ $\frac{1}{2}$ & le mouvement annuel de 39″ 8.

1343. Le Nœud de Jupiter eſt déterminé par M. Caſſini pour 1705 à 3ˢ 7° 37′ 50″, par un milieu entre pluſieurs obſervations faites à Paris depuis 1692 juſqu'en 1730 ; mais à l'égard du mouvement de ce nœud nous ſommes encore dans une fort grande incertitude à ce ſujet. Suivant Ptolomée, le nœud étoit de ſon temps au commencement du Cancer, cela donne le mouvement annuel de 17″. Képler le ſuppoſoit dans ſes tables Rudolphines de 4″ ſeulement : ce même mouvement, lorſqu'on emploie la conjonction de Jupiter avec l'étoile du Cancer appellée l'Ane auſtral, arrivée le 3 Septembre 240 ans avant J. C., paroît à M. Caſſini de 24″ 9‴; mais cette obſervation calculée d'une autre maniere par M. le Gentil, ne donne que 10″. Par l'obſervation du 26 Septembre 508, rapportée par Boulliaud, dans laquelle Jupiter ſe trouva en conjonction avec Régulus, M. Caſſini trouve 15″ 30‴; Nœud de Jupiter.

au contraire Boulliaud en calculant d'une autre manière la même obſervation, c'eſt-à-dire, en ſuppoſant que la latitude boréale de Jupiter étoit plus grande d'un doigt, ou de 2′ 30″, trouve ce mouvement 24″ 37‴ : M. Caſſini s'en tient dans ſes tables à 24″, tandis que M. Halley l'emploie de 50″, & que par la théorie de l'attraction, je trouve ce mouvement de 57″ $\frac{1}{2}$.

M. le Gentil, dans les mémoires de l'académie pour 1758, ayant calculé diverſes obſervations propres à déterminer le nœud de Jupiter trouve pour 1633, 3ˢ 6° 4′ 50″; pour 1716, 3ˢ 7° 37′ 30″; pour 1753, 3ˢ 8° 16′ 17″ & 3ˢ 8° 21′ 25″. Ces obſervations ſont de Gaſſendi, de Halley, & de M. le Gentil lui-même; en comparant la dernière obſervation ou la poſition de 1753 avec l'obſervation de M. Halley faite en 1716, il trouve 66″ par année pour le mouvement du nœud; le même réſultat ſe trouve encore en comparant l'obſervation de 1753 avec l'obſervation que Gaſſendi fit en 1633 : ce mouvement ne s'éloigne pas beaucoup de celui que la théorie m'a donné de 57″ $\frac{1}{2}$; mais il ſemble qu'on ne ſauroit l'accorder avec les anciennes obſervations; il faudroit ſuppoſer une diſtance de plus d'un degré entre Jupiter & l'étoile pour le moment où, ſuivant l'obſervation Caldéenne, Jupiter cachoit entiérement l'étoile.

Son mouvement paroît d'une minute.

1344. Y a-t-il de la mépriſe dans le paſſage de Ptolomée? y a-t-il une accélération réelle dans le mouvement du nœud, ou bien le changement de latitude des étoiles (2741), & leurs dérangemens particuliers ont-ils été aſſez conſidérables pour influer beaucoup dans le calcul des anciennes obſervations; c'eſt ce que je n'entreprens pas de décider; il ſuffit de voir que ce mouvement eſt certainement d'environ 1′ par an, depuis le dernier ſiecle. Je ſuppoſerai donc ſon mouvement de 60″ par année, & ſa longitude en 1750, 3ˢ 8° 16′ en prenant un milieu entre les deux déterminations dont j'ai parlé.

Difficulté ſur cette détermination.

1345. Le Nœud de Saturne vers l'an 136 au rapport

Nœud de Saturne.

rapport de Ptolomée (*Liv.* 13 *ch.* 1) étoit au commencement du Cancer, M. Caſſini l'a trouvé en 1700 à 3^s 21° 13′ 30″, le progrès eſt de 21° 13′ 30″ en 1560 années : ainſi le mouvement annuel ſeroit de $48'' \frac{1}{2}$ par ces obſervations. (*Elémens d'aſtronomie pag.* 397).

Les Caldéens obſerverent le premier Mars 228 ans avant J. C. que Saturne étoit deux doigts au-deſſous de l'étoile qui eſt dans l'épaule auſtrale de la Vierge appellée ζ par Bayer : deux doigts répondent environ à 5′, ainſi la latitude de l'étoile étant ſuppoſée conſtamment de 2° 48′ 55″, celle de Saturne étoit de 2° 43′ 55″; d'où M. Caſſini conclud que la latitude vue du ſoleil étoit de 2° 27′ 1″, la diſtance de Saturne à ſon nœud 77° 21′, & par conſéquent le lieu du nœud à 2^s 21°; ce qui donne le mouvement pour chaque année 56″ 26‴. Il le ſuppoſe, en effet de 57″ dans ſes tables ; mais la grande diſtance de Saturne à ſon nœud rend le réſultat de cette ancienne obſervation peu concluant. Boulliaud dans ſon aſtronomie Philolaïque (*pag.* 253), rapporte une occultation de Saturne par la lune arrivée l'an 503, d'où il conclud que le nœud de Saturne étoit alors à 3^s 12° 36′ 21″. Si l'on compare cette poſition avec celle que j'ai trouvée par des obſervations exactes pour 1769, 3^s 21° 40′ 47″, on a le mouvement annuel de 25″ 8, & Boulliaud trouvoit lui-même 26″ pour ce mouvement.

Tycho-Brahé obſerva Saturne fort près de ſon nœud le 29 Décemb. 1592. M. Caſſini (*Elém. d'aſt. pag.* 400) ayant calculé cette obſervation, trouve le nœud aſcendant à 3^s 20° 21′ 5″; cette obſervation étant comparée à celles de la fin du dernier ſiècle qui donnent le nœud de Saturne pour 1700, à 3^s 21° 13′ 30″, il en réſulte pour le nœud un mouvement annuel de 29″ 24‴ ſeulement. Sur quoi il faut obſerver que M. Caſſini ayant trouvé 1′ 5″ de différence entre les déclinaiſons conclues le 29 Déc. 1592 de différentes obſervations, il en réſulte 24′ d'incertitude pour le lieu du nœud con-

clu des obſervations de ce jour-là ; ce qui changeroit de 14″ le mouvement annuel. Il faut auſſi obſerver que la poſition déterminée pour 1700 par M. Caſſini eſt le milieu de cinq obſervations dont une diffère de l'autre d'un degré & 9 minutes ſur la poſition du nœud, différence qui produiroit 39″ ſur le mouvement annuel du nœud. Auſſi la poſition du nœud de Saturne & ſon mouvement, ſont de tous les élémens des planètes ceux ſur leſquels M. Halley diffère le plus de M. Caſſini ; il y a dans les tables de M. Caſſini 41′ de plus pour le lieu du nœud en 1750, & 65′ 11″ de plus pour le mouvement ſéculaire, que dans celles de M. Halley. Pour moi rejettant la première des cinq déterminations de M. Caſſini, & réduiſant les quatre autres à l'année 1700, je trouve pour l'époque du nœud 3ˢ 21° 14′ 7″, 3ˢ 21° 3′ 14″, 3ˢ 21° 9′ 34″, 3ˢ 21° 18′ 24″, dont le milieu eſt 3ˢ 21° 11′ 20″ pour 1700 ; comparant cette poſition avec celle que j'ai obſervée en 1769, je trouve pour le mouvement annuel du nœud 25″ 6, à-peu-près comme par l'obſervation de l'an 503.

Incertitude ſur ſon mouvement.

Dans l'oppoſition de Saturne obſervée en 1755, cette planète étoit voiſine de ſon nœud : la latitude héliocentrique de Saturne n'étoit le 18 Juillet 1755 que de 10′ 34″, & ſa longitude héliocentrique ſur ſon orbite, étoit alors de 9ˢ 25° 35′ 52″ ; une latitude de 10′ 34″ ſuppoſe la diſtance au nœud de 4° 2′ 17″, comme il eſt aiſé de le trouver par la réſolution d'un triangle ſphérique rectangle (1333), dont un côté eſt de 10′ 34″, & l'angle oppoſé de 2° 30′ 36″ inclinaiſon de l'orbite de Saturne ; ainſi je trouve le lieu du nœud, ſuivant cette obſervation, à 3ˢ 21° 33′ 35″ ; les tables de M. Caſſini donnoient 32′ 44″ de plus, & celles de M. Halley 11′ 50″ de moins.

1346. Ayant obſervé moi-même avec ſoin l'oppoſition de 1769, j'ai trouvé qu'il falloit ajouter 15′ à la longitude qui eſt dans les tables de M. Halley, & ſuppoſer pour 1769 3ˢ 21° 40′ 47″ ; il ſeroit à ſouhaiter que nous euſſions pour les ſiècles paſſés une détermi-

Nœud en 1769.

nation auſſi exacte. Quoi qu'il en ſoit, le nœud en 1600, ſuivant les tables Rudolphines, étoit à 3^s 21° 0′, plus avancé de 34′ que M. Caſſini ne le trouve par l'obſervation de 1592; mais Képler ayant diſcuté pluſieurs obſervations différentes dans la conſtruction de ſes tables, l'on doit avoir quelque confiance à ſa détermination; en y comparant mon obſervation de 1769, je trouve le mouvement annuel de $17''\frac{1}{2}$. En comparant l'obſervation de 1593 avec la mienne, je trouve 27″ par année; cependant les calculs de l'attraction m'ont donné 41″ 6, ainſi nous devons avouer qu'il eſt bien difficile de décider quant à préſent cette queſtion; les grandes inégalités que j'ai découvertes dans le mouvement de Saturne (1167), font que je n'oſe me fier à la théorie ſeule, & en me rapprochant des obſervations, je ſuppoſerai 30″ par année; & l'époque du nœud pour 1750, 3^s 21° 31′ 17″.

1347. Pour raſſembler ſous un ſeul point de vue toutes les recherches précédentes ſur les nœuds des planètes, j'ai mis dans les tables ſuivantes les longitudes des nœuds, & leur mouvement ſuivant les tables de M. Caſſini & de M. Halley, & ſuivant la théorie de l'attraction (1347. *Mém. acad.* 1768 *&*, 1761), enfin leur poſition & leur mouvement ſuivant moi; le ſigne — marque un mouvement rétrograde par rapport aux étoiles fixes; la troiſième colonne de la ſeconde table eſt le mouvement annuel par rapport aux étoiles fixes ſuivant la théorie; la quatrième contient ce mouvement par rapport aux équinoxes, c'eſt-à-dire, la ſomme ou la différence entre 50″ 3 & les nombres de la colonne précédente.

Ce mouvement paroit de 30″.

TABLE de la longitude du Nœud de chaque Planète pour 1750, & de ſon Mouvement ſéculaire ſuivant les Tables de M. Cassini *&* *de M.* Halley.

	Suivant M. Cassini.		Suivant M. Halley.		Selon nos Tables.
	Nœud en 1750.	Mouv. ſéculaire.	Nœud en 1750.	Mouv. ſéculaire.	Nœud en 1750.
Mercure,	1ˢ 15°25′ 20″	1°24′ 40″	1ˢ 15° 21′ 58″	1°23′ 20″	1 15 21 15
Vénus,	2 14 27 45	0 56 40	2 14 23 42	0 51 40	2 14 26 18
Mars,	1 17 45 45	0 56 40	1 17 56 21	1 3 20	1 17 36 30
Jupiter,	3 7 49 57	0 40 9	3 8 15 49	1 23 20	3 8 16 0
Saturne,	3 22 1 4	1 35 11	3 21 20 5	0 30 0	3 21 31 17

TABLE du mouvement annuel des Nœuds de chaque Planète par rapport aux Etoiles fixes, ſuivant la théorie de l'Attraction, & ſuivant les Tables de M. Caſſini & de M. Halley; avec le mouvement par rapport aux équinoxes, ſuivant la théorie (3522).

	Suivant les Tables de M. Caſſini.	Suivant les Tables de M. Halley.	Suivant la Théorie.	Mouvement par rapport aux équinoxes.	Suivant nos Tables.
Mercure,	0	0	— 5″0	45″ 3	45″
Vénus,	— 17	— 19	— 20 4	29 9	31
Mars,	— 17	— 12	— 10 5	39 8	39,8
Jupiter,	— 27	0	+ 7 2	57 5	60
Saturne,	+ 6	— 32	— 8 7	41 6	30

Remarques ſur la théorie de ce mouvement.

1348. Le calcul du mouvement des nœuds que j'ai déduit du principe de l'attraction, ſe trouve détaillé dans les mémoires de l'académie pour 1758 & 1761; j'en donnerai un abrégé dans le livre XXIIe. (3525), en parlant de l'attraction. Le mouvement du nœud d'une planète eſt le réſultat du mouvement que toutes les autres y produiſent; car il n'eſt aucune d'elles qui n'influe plus ou moins ſur le nœud des autres planètes: mais comme la théorie fait trouver ce mouvement du

nœud, ſur l'orbite de la planète qui le produit, il eſt néceſſaire de réduire à l'écliptique tous ces mouvemens qui ſe font ſur des orbites différentes, pour en compoſer un ſeul mouvement ſur l'écliptique; c'eſt cette réduction qui rend direct le mouvement de Jupiter; car il eſt naturellement rétrograde ſur l'orbite de Saturne qui en eſt la cauſe principale; mais il devient direct, quand on le rapporte à l'écliptique.

1349. Soit *C B* (*fig.* 75) l'écliptique, *CA* l'orbite de Jupiter, *BA* l'orbite de Saturne; la longitude du nœud *C* de Jupiter en 1760 eſt de 3ˢ 8° 25′, ſuivant les tables de M. Halley; la longitude du nœud *B* de Saturne, eſt de 3ˢ 21° 23′, la différence *C B* eſt de 12° 58′. L'inclinaiſon *C* de l'orbite de Jupiter eſt de 1° 19′, & l'inclinaiſon *B* de l'orbite de Saturne eſt de 2° 30′. En réſolvant le triangle *A B C*, on trouve *AC* de 26° 41′, & l'angle *A* ou l'inclinaiſon de l'orbite de Jupiter ſur celle de Saturne 1° 15′. Par l'effet naturel de l'attraction de Saturne ſur Jupiter, le point d'interſection *A* de l'orbite de Jupiter ſur celle de Saturne, doit rétrograder dans le ſens contraire au mouvement de Jupiter, comme on le verra dans la théorie de l'attraction, mais l'angle des deux orbites ne change point par le mouvement du nœud; ainſi le nœud ira de *A* en *a*, & l'orbite de Jupiter *A C* paſſera dans la ſituation *a c*, ſans que l'angle *A* éprouve aucun changement, les cercles *AC* & *a c* reſteront paralleles, dans leurs parties voiſines de *A a*, & leur interſection *D* ſera éloignée du point *A* de 90°. Ainſi le triangle *A B C* ſe changera en un triangle *a B c*, les angles *A* & *B* étant conſtans; & le nœud *C* de l'orbite de Jupiter ſur l'écliptique paſſera en *c*; il aura donc un mouvement direct *C c*, quoique le mouvement *A a* ait été rétrograde; ainſi quoique l'action des planètes les unes ſur les autres produiſe dans les nœuds un mouvement *rétrograde* ſur l'orbite de la planète troublante ou de la planète qui par ſon attraction produit ce mouvement, cependant le mouvement des nœuds ſur l'écliptique devient quelque-

Fig. 75.

fois direct ou ſuivant l'ordre des ſignes, comme dans le cas du nœud de Jupiter dont je viens de parler.

Dans quel cas le mouvement devient direct.

1350. En général lorſque la planète troublante a ſon angle d'inclinaiſon B plus grand que l'angle C de la planète troublée, le mouvement du nœud de celle-ci eſt direct ſur l'écliptique; au contraire ſi l'angle B de la planète troublante ſur l'écliptique eſt plus petit que l'angle C, comme dans la fig. 76, le point A tombe à droite du point C; c'eſt-à-dire, de l'autre côté de C par rapport au point B, comme on le voit dans la figure; le mouvement du nœud A étant rétrograde, le mouvement Cc ſur l'écliptique CB le devient également. *Ainſi quand la planète troublante a ſon angle d'inclinaiſon plus petit que celui de la planète troublée, elle ne produit en général dans le nœud de celle-ci qu'un mouvement rétrograde.*

Fig. 76.

Le terme de ce mouvement où la plus grande valeur de BC arrive lorſque $\text{ſin } AC = \sqrt{1 - \frac{\text{tang.}^2 A}{\text{tang.}^2 C}}$, comme nous le démontrerons dans le livre XVIIIe. à l'occaſion des ſatellites de Jupiter où les mêmes règles nous ſerviront.

1351. Si l'on range les planètes ſuivant l'ordre de leurs inclinaiſons, en conſultant la table de l'art. 1376, & qu'on mette la première, celle qui a le plus petit angle d'inclinaiſon, on aura l'ordre ſuivant : Jupiter, Mars, Saturne, Vénus & Mercure; alors on ſera sûr que la première fera rétrograder ſur l'écliptique les nœuds de toutes les autres; la ſeconde fera rétrograder le nœud des trois ſuivantes, mais donnera un mouvement direct au nœud de celle qui la précède; la troiſieme produira un mouvement direct ſur les deux premières, & rétrograde ſur les deux dernières; la quatrieme rendra direct le nœud des trois premières, & rétrograde le nœud de la dernière; la dernière ne pourra produire qu'un mouvement direct ſur toutes les autres planètes.

1352. Quand on a trouvé par les règles de l'at-

traction (3522) le mouvement $A\,a$ (*fig.* 75) du nœud de Jupiter ſur l'orbite AB de Saturne, il faut en conclure le mouvement Cc ſur l'écliptique. Pour cela on emploîra les formules différentielles du XXIIIe. livre. Dans un triangle ABC dont les deux angles A & B ſont conſtans (1349), la différentielle Cc ou la petite augmentation du côté BC eſt égale à la différentielle Aa du côté AB, multipliée par $\frac{\text{ſin. } A. \text{ coſ. } AC.}{\text{ſin. } C.}$ (3842). En employant les valeurs de ces trois quantités (1349) on trouvera que ſi le mouvement Aa eſt de $8'\ 56$ par année, comme le donnent les calculs de l'attraction, le mouvement Cc ſur l'écliptique ne ſera que de $7''\ 26$. Dans la *fig.* 76, on auroit exactement la même équation $Cc = \frac{Aa.\text{ ſin. } A.\text{ coſ. } AC.}{\text{ſin. } C}$. C'eſt ainſi qu'il faut réduire à l'écliptique le mouvement du nœud de chaque planète produit par l'attraction de chacune des autres planètes. Nous avons placé ici ces réflexions, parce qu'elles ſont néceſſaires aux Aſtronomes, indépendamment du calcul de l'attraction : elles avoient échappé à M. Bradley lorſqu'il croyoit que le mouvement direct du nœud du 4e. ſatellite étoit contraire aux loix de l'attraction, comme nous le dirons dans le XVIIIe livre (2967); ce ſont ces conſidérations qui m'ont fait découvrir la cauſe des changemens ſinguliers qui ont lieu dans les inclinaiſons des ſatellites, & que perſonne avant moi n'avoit même ſoupçonnée (2944).

Fig. 75.

Mouvement d'un pole autour d'un axe.

1353. Le mouvement du nœud d'une planète ſur l'orbite d'une autre planète produit un mouvement de l'axe de l'orbite troublée autour de l'axe de l'orbite de la planète troublante; par exemple, quand on dit que Saturne par ſon action ſur Jupiter fait rétrogader les nœuds de l'orbite de Jupiter, cela revient au même que ſi l'on diſoit l'axe de l'orbite, ou la ligne qui paſſe par les poles de l'orbite de Jupiter & qui eſt perpendiculaire au plan de cette orbite, tourne autour de l'axe de l'orbite de Saturne, & le pole de l'orbite de Jupiter décrit autour du pole de l'orbite de Saturne

un petit cercle dont le rayon eſt de 1° 15′, c'eſt-à-dire, égal à la quantité de l'inclinaiſon mutuelle de ces deux orbites l'une ſur l'autre.

Pour faire comprendre le rapport ou plutôt l'identité de ces deux choſes ; ſoit *S fig.* 77 le centre commun de deux orbites *A N B*, *C N D*, dont les plans ſont inclinés d'un degré l'un ſur l'autre ; *P S O* & *E S L*, les axes de ces mêmes orbites qui leur ſont perpendiculaires ; *P* le pole de l'orbite *A N B*, *E* le pole de l'orbite *C N D*, *E P* la diſtance de ces poles, égale à l'inclinaiſon des deux orbites ; ou à la quantité dont le point *B* eſt éloigné du point *D*. Si l'on tire par les deux poles *P* & *E* un cercle *P E B D*, il rencontrera les deux orbites à 90° des nœuds *N*, *M*, de chacune ; l'arc *B D* égal à l'arc *P E* marquera la plus grande diſtance ou l'inclinaiſon des deux orbites, parce que les arcs *P B* & *E D* ſont chacun de 90°, auſſi bien que les arcs *N B*, *M B*, *N D*, *M D*. Mais ſi le nœud *N* change de poſition, les points *B* & *D* de la plus grande diſtance changeront de la même quantité, parce qu'ils ſont toujours néceſſairement à 90° des nœuds *N* & *M* ; donc le cercle *P E B D* changera également, & le pole *E* avancera de la même quantité dans le petit cercle *E R*. On peut le voir d'une manière plus ſenſible en faiſant un demi-cercle de carton qui ait à ſon centre une aiguille perpendiculaire à ſon plan ; on l'inclinera ſur un autre cercle tracé ſur la table, qui ait auſſi une aiguille à ſon centre ; & en faiſant tourner le premier ſur le ſecond ſans changer leur inclinaiſon & ſans que leurs centres ſe quittent, on verra l'axe du premier décrire un cône autour de l'axe du ſecond, ou le pole du premier décrire un cercle autour du pole du ſecond ; *ainſi le mouvement du nœud d'un cercle ſur un autre cercle ſuppoſe le mouvement circulaire du pole de l'un autour du pole de l'autre.* Nous ferons pluſieurs fois uſage de cette propoſition, dans les livres XVIe & XVIIe. (2707, 2731, 2862).

Fig. 77.

Inégalité des mouvemens des nœuds.

1354. Le mouvement du nœud d'une planète ſur l'écliptique

l'écliptique ſe réduit donc au mouvement du pole de l'orbite de cette planète autour du pole de l'écliptique; mais ce mouvement ne ſera pas uniforme, parce qu'il eſt l'aſſemblage des mouvemens particuliers que chacune des autres planètes produit ſur le nœud de celle-ci, leſquels mouvemens ont chacun des modifications différentes parce qu'ils dépendent de la ſituation des nœuds, & de la quantité des inclinaiſons. Auſſi les mouvemens des nœuds des planètes déduits de l'attraction (1347) ne ſont exacts que pour un petit nombre de ſiècles.

Déterminer les inclinaiſons.

1355. L'INCLINAISON d'une planète eſt l'angle que le plan de ſon orbite fait avec le plan de l'écliptique (1123); la latitude héliocentrique (1138) de cette planète, lorſqu'elle eſt à 90° de ſes nœuds, eſt égale à cette inclinaiſon, parce que la planète eſt alors auſſi éloignée qu'elle puiſſe être du plan de l'écliptique.

1356. Ainſi pour trouver l'inclinaiſon d'une orbite il ſuffit d'obſerver la latitude de la planète lorſqu'elle eſt à 90° des nœuds, & de réduire cette latitude obſervée ou géocentrique, à la latitude héliocentrique; mais comme cette dernière réduction ſuppoſe connue la parallaxe du grand orbe, on cherche à éviter cette condition par la méthode ſuivante.

Premiere méthode.

1357. On choiſit le temps où le ſoleil eſt dans le nœud de la planète, c'eſt-à-dire, nous paroît à la même longitude, que la planète quand elle eſt dans ſon nœud, parce qu'alors la terre paſſe en T ſur la ligne des nœuds NST (*fig.* 78), ce qui rend la détermination de l'inclinaiſon fort ſimple. Suppoſons que la planète ſe trouve pour lors au point A de ſon orbite, de manière qu'ayant abaiſſé la perpendiculaire AB ſur le plan de l'écliptique, ou de l'orbite de la terre prolongé juſques vers la planète, la ligne TB qui marque ſon lieu réduit à l'écliptique ſoit perpendiculaire à la ligne TSN dans laquelle ſe trouvent le nœud & le ſoleil; l'angle d'élongation BTS étant de 90°; alors les lignes AT & BT ſont perpendiculaires à la commune ſection TN, Fig. 78.

Fig. 78. l'une dans le plan de l'orbite, & l'autre dans le plan de l'écliptique; elles ſont donc entr'elles le même angle que les deux plans, c'eſt-à-dire, un angle égal à l'inclinaiſon que l'on cherche (1121): or l'angle *ATB* n'eſt autre choſe que la latitude même de la planète vue de la terre (1123); donc *la latitude obſervée ſera elle-même l'inclinaiſon de l'orbite.* Au reſte il eſt rare de rencontrer ces deux circonſtances enſemble, c'eſt-à-dire, le ſoleil dans le nœud, & la planète à 90° du ſoleil; d'ailleurs cette dernière condition ne ſe rencontre que dans les planètes ſupérieures, ainſi nous avons beſoin d'une règle plus générale pour la détermination des inclinaiſons.

Seconde méthode. 1358. Je ſuppoſe qu'on ait obſervé la latitude d'une planète, vue de la terre, quelle qu'elle ſoit, pourvu que le ſoleil ſoit dans le nœud ou à-peu-près; ſoit *P* la planète en un point quelconque *P* de ſon orbite, la terre étant toujours en *T* dans la ligne des nœuds *TSN*; on abaiſſe la perpendiculaire *PL* de l'orbite de la planète ſur le plan de l'écliptique, on tire des points *P* & *L* les perpendiculaires *PR* & *LR* ſur la commune ſection des deux plans; l'angle *PRL* de ces deux perpendiculaires ſera égal à l'angle des deux plans, c'eſt-à-dire, à l'inclinaiſon de l'orbite ſur le plan de l'écliptique (1121); l'angle *LTP* ſera égal à la latitude géocentrique de la planète, l'angle *RTL* égal à l'élongation de la planète (1142); alors la propriété ordinaire des triangles rectilignes tels que *RTL* & *PTL* rectangles en *R* & en *L* donnera les deux proportions ſuivantes.

$$\left.\begin{array}{l} TL : RL :: R : \text{ſin. } RTL \\ TL : PL :: R : \text{tang. } LTP \end{array}\right\} \text{donc } RL : PL :: \text{ſin. } RTL : \text{tang. } LTP.$$

Mais dans le triangle *PRL* rectangle en *L* on a cette autre proportion $RL : PL :: R : \text{tang. } PRL$; donc en comparant la 3e. proportion avec cette dernière, on aura ſin. *RTL*: tang. *LTP* :: *R*: tang. *PRL*, c'eſt-à-dire, que le *ſinus de l'élongation eſt au rayon comme*

la tangente de la latitude géocentrique obſervée eſt à la tangente de l'inclinaiſon.

Règle pour avoir l'inclinaiſon.

1359. EXEMPLE. Le 12 Janvier 1747 à 6^h 6′ 33″ du matin, M. de la Caille obſerva la longitude de Saturne, 6^s 26° 12′ 52″, & ſa latitude boréale 2° 29′ 18″, le ſoleil étoit alors à 9^s 21° 47′, c'eſt-à-dire, dans le nœud de Saturne, ou du moins il n'en étoit éloigné que de 12 minutes ſelon les tables de M. Caſſini, ce qui ne peut produire aucune erreur ſenſible dans le réſultat. En appliquant à cette obſervation l'analogie précédente, on trouve l'inclinaiſon de l'orbite de Saturne 2° 29′ 45″, au lieu de 2° 30′ 10″ que donne M. Halley. (*Mém. acad.* 1747, *pag.* 135).

Troiſième méthode.

1360. Lorſqu'on détermine le lieu du nœud d'une planète par le moyen de deux latitudes égales (1335), ſoit que ces latitudes ſoient priſes avant & après le paſſage d'une planète par ſes limites, ou qu'elles ſoient priſes avant & après le paſſage par le nœud, les mêmes obſervations peuvent déterminer à la fois non-ſeulement le nœud, mais encore l'inclinaiſon de l'orbite.

EXEMPLE. Le 13 Mars 1693 à 17^h 50′ M. Caſſini obſerva la longitude de Saturne 8^s 22° 56′ 30″, & ſa latitude géocentrique boréale 1° 24′ 50″ (*Elém. d'aſtron. pag.* 388 & 396); les concluſions qu'il tire de cette obſervation dans les deux endroits de ſon ouvrage que je viens de citer n'étant pas les mêmes, j'ai réfait les calculs, & j'ai trouvé le lieu héliocentrique de Saturne 8^s 17° 16′ 6″, en corrigeant les tables par les obſervations. Le lieu du ſoleil étoit 11^s 24° 23′ 18″, & par conſéquent l'élongation 88° 33′ 12″, & la commutation 82° 52′ 48″, donc en ſuivant la proportion demontrée (1145), on trouve que la latitude héliocentrique de Saturne étoit de 1° 24′ 12″ 4. Cette obſervation comparée avec celle du 3 Mai 1699 donne, ſuivant mon calcul (1336), 9^s 21° 13′ 20″ pour le lieu du nœud: retranchant de ce lieu celui de Saturne vu du ſoleil 8^s 17° 16′ 6″, on a la diſtance de Saturne à ſon nœud

descendant, 33° 57′ 14″ vue du soleil, qui est l'arc
Fig. 54. LA de l'écliptique (*fig.* 54) : ainsi dans le triangle sphérique PAL rectangle en L, on connoît les côtés LA & PL, on fera cette proportion : le sinus de la distance au nœud est au sinus total, comme la tangente de la latitude est à la tangente de l'angle A, l'on aura l'inclinaison véritable de l'orbite de Saturne 2° 30′ 50″ 6.

Inconvénient de cette méthode.

1361. Cette méthode qui détermine à la fois l'inclinaison & le nœud d'une planète par deux observations de latitudes égales, est moins exacte que celle où l'on détermine les deux choses séparément, en employant une observation faite dans le nœud pour déterminer le nœud, & une observation faite dans une des limites pour avoir l'inclinaison de l'orbite. En effet si les deux observations correspondantes sont près du nœud, elles déterminent mal l'inclinaison de l'orbite ; puisqu'alors la latitude est petite & qu'on ne doit pas déterminer une quantité plus grande par le moyen de celle qui est moindre ; au contraire si ces deux observations sont trop près des limites, elles sont peu propres à déterminer le lieu du nœud ; par exemple, à 30° du nœud la latitude d'une planète n'est que la moitié de son inclinaison ; si l'on se trompe de 10″ dans la latitude observée, on sera en erreur de 20″ sur l'inclinaison cherchée ; ainsi cette observation sera moins favorable de moitié que si l'on avoit observé la planète dans ses limites. D'un autre côté le changement de latitude d'un jour à l'autre n'étant alors que les $\frac{87}{100}$ de celui qu'elle éprouve dans les nœuds, on aura un huitième moins d'exactitude pour le lieu du nœud que si l'on eût observé la planète dans son nœud. Si l'on prend les deux latitudes correspondantes & égales à 45° des nœuds, la latitude n'étant alors que les $\frac{7}{10}$ de l'inclinaison, une erreur de 7″ sur l'observation des latitudes que l'on compare, en produira 10 sur l'inclinaison que l'on veut en conclure, & en même temps l'erreur que l'on com-

mettra ſur le lieu du nœud ſera plus grande dans le rapport de 10 à 7, que celle qu'on auroit pu commettre en obſervant la planète dans le nœud.

1362. Pour bien ſentir la loi de ces différens avantages il faut conſidérer que la latitude augmente comme le ſinus de la diſtance au nœud, parce que dans un triangle ſphérique tel que *PAL* (*fig.* 54), on a cette proportion ſin. *PL* : ſin. *PA* : : ſin. *A* : 1, or les deux derniers termes étant conſtans, le ſinus de *PL* & celui de *PA* ſeront toujours dans le même rapport entre eux; ainſi la latitude *PL* qui à cauſe de ſa petiteſſe eſt proportionnelle à ſon ſinus croîtra comme le ſinus de la diſtance au nœud *PA*; mais on verra dans le livre XXI° (3307) que la petite variation d'un ſinus eſt à celle de l'arc, comme le coſinus de l'arc eſt au rayon, c'eſt-à-dire, qu'à 30 degrés du nœud, le coſinus étant les $\frac{87}{100}$ du rayon, la variation du ſinus n'eſt que les $\frac{87}{100}$ de celle de l'arc, ou de celle que ce même ſinus éprouvoit dans ſa naiſſance, (quand l'arc & le ſinus étoient l'un & l'autre très-petits & croiſſoient également); ainſi puiſque *PL* croît comme le ſinus de la diſtance au nœud, & que la variation de ce ſinus eſt proportionnelle au coſinus, la petite augmentation qu'éprouve la latitude d'un degré à l'autre ſera auſſi proportionnelle au coſinus de l'argument de latitude; & comme l'on obſerve la poſition du nœud par le moyen de la latitude, avec d'autant plus de préciſion que la latitude augmente alors plus rapidement, l'avantage ou la préciſion que l'on trouve à déterminer le lieu du nœud par le moyen de la latitude, eſt auſſi proportionnel au coſinus de l'argument de latitude; ainſi à 60° du nœud l'avantage eſt réduit à la moitié, tandis qu'à 30° il n'y avoit de perdu que les $\frac{13}{100}$ ou le demi-quart de l'avantage qu'on avoit eu dans le nœud.

Meſure de l'avantage que l'on trouve.

Fig. 54.

1363. A l'égard de l'avantage qu'on trouve à déterminer l'inclinaiſon par le moyen d'une latitude obſervée, il eſt proportionnel au ſinus même de la diſtance au nœud, parce que la latitude obſervée ſuit le même rapport; ſi d'une latitude d'un degré l'on veut conclure une

inclinaiſon qui eſt de deux, comme cela arrive quand on a obſervé à 30 degrés du nœud, on s'expoſe dans le réſultat à une erreur double de celle de l'obſervation même, c'eſt-à-dire, qu'on n'a que la moitié de l'avantage qu'on devroit ſe procurer. Auſſi dans les différentes déterminations que je rapporterai bien-tôt des inclinaiſons planétaires, j'aurai toujours ſoin de marquer quelle étoit la diſtance au nœud, pour faire juger du degré de préciſion dont elles ſeront ſuſceptibles.

1364. J'ai dit que plus la latitude augmentoit rapidement, plus il y avoit de préciſion & d'avantage à déterminer le lieu du nœud par ſon moyen; l'on peut s'en aſſurer par le même raiſonnement qui a ſervi à prouver que l'équinoxe ſe déterminoit avec plus d'exactitude quand la déclinaiſon du ſoleil augmentoit avec vîteſſe (883).

Cas où l'effet de l'inclinaiſon ſe multiplie.

1365. Dans le choix des oppoſitions ou des conjonctions que l'on prend pour déterminer l'inclinaiſon d'une planète ſupérieure, on choiſit celles où la latitude géocentrique eſt la plus grande qui ſoit poſſible, afin que l'erreur commiſe ſur cette inclinaiſon devienne la plus petite; c'eſt ce que l'on fait pour tout autre élément; on choiſit les cas où ſon effet eſt le plus grand, le plus multiplié, le plus ſenſible. L'inclinaiſon de l'orbite de Vénus quoiqu'elle ne ſoit que de 3° 23′, produit dans certains cas pour nous une latitude géocentrique de $8° \frac{2}{3}$, comme cela arriva dans la conjonction inférieure de Vénus obſervé le 2 Sept. 1700; il eſt évident que ſi l'on a 10″ d'erreur à craindre dans une latitude obſervée, il vaut mieux que ce ſoit dans cette circonſtance où il n'en réſulte que 4″ d'erreur ſur l'inclinaiſon; il faut convenir cependant que ſi l'on s'étoit trompé de 10″ dans cette obſervation, quoiqu'il n'en réſultât que 4″ ſur l'inclinaiſon, il n'en ſeroit pas moins vrai qu'on auroit encore 10″ d'erreur à craindre une autre fois dans une pareille ſituation.

Inclinaiſon de Mercure.

1366. L'INCLINAISON DE MERCURE a été déterminée par M. Caſſini, au moyen de l'obſervation du

21 Mai 1715, faite à 10^h 39′ du matin; M. Maraldi détermina le lieu de Mercure à 1^s 8° 36′ 0″ & ſa latitude méridionale à 2° 23′ 55″; cette planète étoit alors à 10^s 29° 14′ 55″, vue du ſoleil, & par conſéquent éloignée de 75° 42′ de ſon nœud ſuppoſé à 1^s 14° 57′; le lieu du ſoleil étoit à 1^s 29° 38′ 14″, d'où M. Caſſini conclut que la latitude héliocentrique étoit de 6° 41′ 40″, & l'inclinaiſon de l'orbite 6° 54′ 12″. (*Elémens d'aſtronomie*, *pag.* 616).

1367. Le 16 Juillet 1731 à 10^h 32′ 47″ du matin, M. Caſſini détermina le lieu de Mercure à 3^s 3° 2′ 35″ avec 2° 2′ 20″ de latitude méridionale; ſa diſtance au nœud calculée par les tables étoit de 49° 16′; d'où il ſuit que ſa latitude héliocentrique étoit de 5° 15′ 30″ & l'inclinaiſon de l'orbite 6° 55′ 30″; mais cette obſervation m'a paru défectueuſe par l'examen que j'en ai fait, en travaillant à la théorie de Mercure. Les obſervations de Mercure étant rares, on ne doit pas être étonné de trouver dans cette détermination quelques minutes d'incertitude.

1368. M. le Gentil obſerva Mercure dans le méridien le 5 Octobre 1750, & il en conclut ſa longitude de 217° 18′ 19″ & ſa latitude auſtrale 2° 50′ 23″, le lieu du ſoleil étoit pour lors à 6^s 12° 8′ 52″$\frac{1}{2}$, l'angle de commutation 78° 31′ 23″$\frac{1}{2}$ la latitude héliocentrique 6° 31′ 23″, d'où il conclut l'inclinaiſon de 7° 1′ 0″.

M. de Thury, le 6 Mai 1751, obſerva Mercure dans le méridien à 1^h 0′ 47″$\frac{1}{6}$, M. le Gentil obſervoit en même temps la hauteur méridienne, & il en conclut la longitude de Mercure 2^s 0° 50′ 36″ & la latitude boréale 1° 51′ 15″; le lieu du ſoleil étoit alors 1^s 15° 33′ 14″$\frac{1}{4}$ & l'angle de commutation 108° 31′ 23″, d'où il réſulte que l'inclinaiſon de Mercure étoit de 6° 59′ 30″$\frac{1}{2}$ (*Mém. acad.* 1753, *pag.* 277). M. Halley la ſuppoſe de 6° 59′ 20″, & M. Caſſini de 7° 0′ 0″, je la ſuppoſerai également en nombres ronds de 7° 0″. Elle eſt de 7° 0′.

1369. L'INCLINAISON DE VÉNUS ſur l'écliptique eſt facile à déterminer exactement, lorſqu'on obſerve Inclinaiſon de Vénus.

ſes conjonctions inférieures dans le temps de ſes plus grandes latitudes, c'eſt-à-dire, quand elle eſt à 90° de ſes nœuds; car alors on n'a aucun beſoin de connoître la poſition exacte du nœud; & ſa diſtance à la terre étant trois fois plus petite que ſa diſtance au ſoleil, les erreurs qu'on peut commettre ſur ſa latitude deviennent trois fois moindres ſur l'inclinaiſon (1365). Le 2 Septembre 1700 la latitude de Vénus fut obſervée à Paris de 8° 40′ 15″ vers le midi, elle étoit à 11ˢ 10° 20′ 20″ de longitude vue du ſoleil, & par conſéquent à 86° 22′ de ſon nœud; d'où M. Caſſini conclut que ſa latitude héliocentrique étoit de 3° 22′ 38″, & l'inclinaiſon de ſon orbite 3° 23′ 5″. Le 28 Août 1716 à 23ʰ 45′ 37″ & 7ʰ 10′ après ſa conjonction qui étoit arrivée à 11ˢ 5° 49′ 2″, la latitude de Vénus fut obſervée de 8° 35′ 24″, Vénus étant alors à 11ˢ 6° 17′ 45″ de longitude vue du ſoleil, & à 82° 8′ de ſon nœud; d'où il réſulte que ſa latitude héliocentrique étoit de 3° 21′ 16″, & l'inclinaiſon de ſon orbite 3° 23′ 10″. (*Elém. d'aſtron. pag.* 574); ainſi cet élément eſt connu avec exactitude; M. Caſſini & M. Halley ſont d'accord à ſuppoſer cette inclinaiſon de 3° 23′ 20″, dans leurs tables, M. de la Hire la ſuppoſoit de 3 degrés 23′ 5″.

Elle eſt de 3°23′ un tiers.

Inclinaiſon de Mars.

1370. L'INCLINAISON DE MARS a été déterminée par une obſervation de Flamſteed du 3 Mars 1694, calculée par M. Caſſini, (*Elém. d'aſtron. pag.* 492); Mars étant à 89° de ſon nœud, & ſa latitude obſervée 3° 30′ 0″, l'inclinaiſon fut trouvée 1° 50′ 52″

M. le Gentil ayant calculé cette obſervation ſur d'autres élémens trouve l'inclinaiſon, 1 51 14

Par une autre obſervation de Flamſteed du 27 Mars 1694, à 78° 31′ du nœud M. Caſſini trouve, 1 50 50

M. le Gentil ayant calculé cette même obſervation (*Mém. acad.* 1757, *pag.* 275) trouve cette inclinaiſon, 1 51 12

Suivant

Suivant une obſervation faite à Paris le 2 Novembre 1695, à 56° 9′ du nœud, (*Elém. d'aſtron. pag.* 494),	1° 50′ 50″
Par M. le Gentil, en calculant l'oppoſition du 8 Août 1687 obſervée à Paris, à 90° du nœud, la latitude étant de 6° 50′ 40″,	1 50 50
Suivant l'oppoſition obſervée le 25 Août 1593 par Tycho-Brahé, l'inclinaiſon de Mars eſt de	1 50 33
M. le Gentil par la conjonction de Mars avec ι des Gémeaux au mois de Mars 1756, (*Mém. acad.* 1757, *pag.* 259), Mars étant à 85° de ſon nœud, trouve par un milieu entre ſix obſervations qui ne différoient pas de 9″, que cette inclinaiſon eſt de	1 51 20
Par la hauteur méridienne de Mars obſervée le 11 Février 1756, à 70° 45′ du nœud,	1 51 12½
Par la hauteur méridienne obſervée le 29 Janvier 1754, à 56° 12′ du nœud, (*Ibid. p.* 260)	1 51 31
Par l'oppoſition du 14 Septembre 1751, à 56° 52′ du nœud, (*page* 262) 1° 51′ 52″, mais enſuite page 274 elle n'eſt marquée que	1 50 53

1371. M. le Gentil y a auſſi employé les obſervations de Boulliaud, tirées d'un manuſcrit latin dont M. le Monnier étoit dépoſitaire, & dont il y a une copie au dépôt de la marine; mais ces obſervations n'étant fondées que ſur des diſtances eſtimées ſans aucun inſtrument, leur réſultat n'ajouteroit rien à la certitude qui naît des obſervations précédentes; le milieu entre les réſultats que donne M. le Gentil (*pag.* 277), comme Elle eſt de 1° 51′.

tirés de ſes propres obſervations eſt 1° 51′ 4″; M. Halley la ſuppoſe dans ſes tables de 1° 51′ 0″, & M. Caſſini 1° 50′ 54″. Les obſervations paroiſſent donc prouver aſſez bien que l'inclinaiſon de Mars eſt de 1° 51′ 0″. Nous parlerons bientôt de la diminution qu'elle éprouve (1379).

Inclinaiſon de Jupiter.

1372. L'INCLINAISON DE JUPITER ſuivant l'obſervation faite à Greenwich le 21 Déc. 1690 par Flamſteed, à 86° du nœud, calculée par M. Caſſini, (*pag.* 444) eſt de 1° 19′ 23″

L'obſervation faite par Hévélius le 28 Mars 1661, à 88° ½ du nœud, donne pour l'inclinaiſon, 1 20 25

L'obſervation faite à Paris le 2 Avril 1673, à 84° 0′ du nœud, ſuivant M. Caſſini (*pag.* 445) donne 1 19 52

Celle du 16 Sept. 1690, à 87° du nœud, 1 19 41
Celle du 2 Oct. 1702, à 88° du nœud, 1 19 4
Celle du 8 Oct. 1714, à 83° du nœud, 1 18 53
Celle du 20 Mars 1720, à 83° du nœud, 1 20 14
Celle du 13 Oct. 1726, à 77° ½ du nœud, 1 19 20

Enſorte que par un milieu M. Caſſini eſtime cette inclinaiſon de 1° 19′ 38″; celle de ſes tables eſt 1° 19′ 30″.

M. le Gentil détermine l'inclinaiſon de Jupiter (*Mém. acad.* 1758, *pag.* 44) par une conjonction de Jupiter avec l'étoile θ de la Vierge, obſervée par Flamſteed & Picard en 1673, à 84° du nœud (*Philoſ. tranſact.* 1673, *n°.* 94). 1 18 28

Et par l'oppoſition de 1750, à 67° ½ du nœud (*pag.* 46). 1 19 2

Elle eſt de 1° 19′ 10″.

1373. J'ai obſervé avec ſoin l'oppoſition de Jupiter le 6 Avril 1768, dans ſa plus grande latitude, & j'en ai conclu l'inclinaiſon de ſon orbite 1° 19′ 4″, à 6″ près comme dans M. Halley (*Mém. acad.* 1768). L'incli-

naiſon dans les tables de M. de la Hire eſt 1° 19′ 20″ dans celles de M. Caſſini 1° 19′ 30″, & dans celles de M. Halley 1° 19′ 10″, je la ſuppoſerai dans mes tables de cette même quantité.

1374. L'INCLINAISON DE SATURNE eſt déterminée dans M. Caſſini (*pag.* 394) par une obſervation du 20 Avril 1688, faite à 11ʰ 23′. Saturne fut obſervé à 6ˢ 20° 57′ 30″ de longitude, avec une latitude boréale de 2° 47′ 50″; d'où M. Caſſini conclut que ſa latitude héliocentrique étoit de 2° 30′ 48″. Saturne étoit preſque dans ſes limites, & l'inclinaiſon ſe trouve par cette obſervation de 2° 30′ 50″ — Inclinaiſon de Saturne.

L'obſervation du 14 Avril 1688 donne; 2 30 37

Le 25 Décemb. 1703 à 6ʰ 51′ du ſoir Saturne fut obſervé à 0ˢ 15° 52′ 30″ de longitude, avec 2° 34′ 10″ de latitude auſtrale; d'où M. Caſſini conclut que ſa latitude héliocentrique, égale pour lors à l'inclinaiſon de ſon orbite, étoit 2° 30′ 0″.

Le 13 Mars 1693 & le 3 Mai 1699, la latitude de Saturne ayant été obſervée à 34° du nœud, M. Caſſini en conclut l'inclinaiſon de 2° 30′ 44″, mais ſuivant mon calcul (1360) 2° 30′ 51″ — Elle eſt de 2° 30′ 20″.

M. de la Caille en 1747 l'a trouvée (1359) de 2 29 45

Le milieu entre ces cinq déterminations eſt de 2 30 24

M. Halley la ſuppoſe de 2° 30′ 10″, & je m'en tiendrai à 2° 30′ 20″ dans mes tables.

1375. Suivant les calculs que M. Euler a faits de l'attraction de Jupiter ſur Saturne, dans la pièce qui a remporté le prix de l'académie en 1748, *pag.* 77, cette attraction peut à peine produire 5″ de variation dans l'inclinaiſon de Saturne; ainſi cette inégalité périodique eſt abſolument négligeable : j'ai trouvé qu'il en eſt de même des autres planètes; leurs inclinaiſons n'ont preſque aucune inégalité périodique, dont nous ayons beſoin de tenir compte dans nos calculs. — Les Inclinaiſons n'ont aucune inégalité périodique.

1376. Pour raſſembler ſous un même point de vue les réſultats précédens, & faire juger de la différence ou de l'incertitude qu'il peut y avoir dans les inclinaiſons des orbites planétaires, nous allons rapporter celles qui ſont établies dans les tables de M. Caſſini & de M. Halley, & celles que nous avons adoptées dans nos tables; on verra que la plus grande différence eſt pour l'inclinaiſon de Mercure, & cependant elle n'eſt que de 40″ entre M. Caſſini & M. Halley. Nous avons mis dans la même table la plus grande réduction, parce qu'elle eſt une ſuite néceſſaire de l'inclinaiſon, étant égale à la moitié du ſinus verſe de l'inclinaiſon (1133).

TABLE de l'inclinaiſon des Orbites & de la plus grande réduction à l'écliptique.

	Képler.	Halley.		Cassini.		Suivant mes Tables.
	Inclinaiſon.	Inclinaiſon.	Réduct.	Inclinaiſon.	Réduct.	Inclinaiſon.
Mercure,	6° 54′ 0″	6° 59′ 20″	12′ 49″	7° 00′ 00″	12′ 52″	7 0 0
Vénus,	3 22 0	3 23 20	3 0	3 23 20	3 0	3 23 20
Mars,	1 50 30	1 51 0	0 54	1 50 54	0 54	1 51 0
Jupiter,	1 19 20	1 19 10	0 27	1 19 30	0 29	1 19 10
Saturne,	2 32 0	2 30 10	1 38	2 30 36	1 39	2 30 20

Nouvelle équation pour les inclinaiſons.

1377. Les calculs de l'attraction, par leſquels j'ai recherché les mouvemens des nœuds des planètes produits par leurs attractions réciproques, m'ont fait découvrir en 1761 une choſe qu'on n'avoit pas encore ſoupçonnée, c'eſt que leurs inclinaiſons ſur l'écliptique ne ſauroient être conſtantes: j'ai trouvé, par exemple, que l'action de Vénus diminue l'angle d'inclinaiſon de Mercure de 8″ par ſiècle; de même l'action de Jupiter

diminue de 3″ l'inclinaiſon de Mercure, augmente de 10″ celle de Vénus, diminue de 25″ celle de Mars, & augmente de 9″ celle de Saturne.

1378. On verra dans le XXIIe. livre (3517) que l'attraction de chaque planète fait rétrograder ſur ſon orbite les nœuds de toutes les autres planètes, comme je l'ai déja dit (1348); l'effet de ce mouvement eſt de déplacer toutes les orbites, & il ne peut manquer d'en réſulter un changement dans leurs inclinaiſons ſur l'écliptique. Soit *CB* l'écliptique, (*fig.* 75), *AB* l'orbite de Saturne, *AC* celle de Jupiter, *Aa* le mouvement du nœud de Jupiter ſur l'orbite de Saturne; ce mouvement du nœud ſe fait ſans aucun changement de l'angle *A*, c'eſt-à-dire, de l'inclinaiſon mutuelle des deux orbites; le triangle *ABC* ſe change en un triangle *aBc*; les angles *A* & *B* demeurent conſtans, mais l'angle *C* ne l'eſt pas, & l'angle *c* eſt plus ou moins grand que l'angle *C*. Suivant les formules différentielles qu'on trouvera dans le XXIIIe. livre (3849), la variation de l'angle *C* eſt égale à celle du côté *AB* multipliée par le ſinus de l'angle *B*, & par le ſinus du côté *BC*, c'eſt-à-dire, que $dC = dAB.\ \text{ſin.}\ B.\ \text{ſin.}\ BC$: par exemple, le mouvement du nœud de Mars par l'action de Jupiter étant de 14″ 2 par année, ſur l'orbite de Jupiter, (*Mém.* 1758, *pag.* 261, 1761, *pag.* 404), l'angle *B* inclinaiſon de Jupiter 1° 19′, & la diſtance *BC* de leurs nœuds 50° 22′, on trouvera pour le changement de l'angle *C*, 0″ 248, ou 24″ 8 par ſiècle. *Fig.* 75.

1379. Les actions de Vénus & de Saturne produiſent encore 6″ de diminution dans l'inclinaiſon de l'orbite de Mars; en ſorte que cet angle diminue de 31″ par ſiècle, & depuis le temps de Tycho-Brahé il doit y avoir 53″ de diminution dans l'inclinaiſon de l'orbite de Mars; ſi les obſervations anciennes étoient aſſez exactes, on verroit cette différence dans la table que j'ai donnée ci-devant des inclinaiſons des planètes (1376); mais une minute de différence eſt peu ſenſible dans les obſervations de Tycho: cet effet qui ſe

continue de ſiècle en ſiècle, apportera dans la ſuite une grande différence dans les inclinaiſons des orbites, & il y a déja plus de 8 minutes depuis le temps de Ptolomée, quantité qu'on ne doit pas négliger dans la comparaiſon des différentes obſervations, mais que les calculs de l'attraction pouvoient ſeuls indiquer, du moins quant à préſent.

Diſtinguer l'augmentation ou la diminution.

1380. Pour ſavoir ſi l'inclinaiſon d'une planète doit augmenter, ou diminuer, c'eſt la ſituation des nœuds qu'il faut conſidérer. Soit AB (*fig.* 75), l'orbite de la planète troublante, & AC l'orbite de la planète troublée, dont le nœud paſſe de A en a; puiſque l'inclinaiſon mutuelle des deux orbites n'eſt point changée, l'angle A & l'angle a ſont égaux, & vers ce point-là les cercles AC, ac ſont paralleles; de-là il ſuit qu'ils vont ſe rencontrer en un point D, éloigné de 90° du point A; car deux grands cercles de la ſphère, pris à 90° de leur interſection commune, deviennent ſenſiblement paralleles, du moins ſur un petit eſpace : or dans le triangle DCc on voit évidemment que l'angle DcC eſt plus petit que l'angle DCE, c'eſt-à-dire, que dans ce cas-là l'inclinaiſon diminue, d'ou il eſt aiſé de déduire la règle ſuivante.

Fig. 75.

Règle.

1381. *Toutes les fois que le nœud de la planète troublante eſt plus avancé que celui de la planète troublée, l'inclinaiſon de celle-ci eſt diminuée, pourvu que l'excès ne ſoit pas de* 180 *degrés.* Cette règle eſt aiſée à appercevoir en figurant les poſitions de différentes orbites les unes par rapport aux autres. Par conſéquent, ſi l'on diſpoſe les planètes dans l'ordre de la longitude de leurs nœuds aſcendans, en commençant par celle dont le nœud eſt le moins avancé, nous aurons l'ordre ſuivant; Mercure, Mars, Vénus, Jupiter & Saturne; cela nous indiquera, conformément à la règle, que Mercure contribue à augmenter les inclinaiſons de toutes les planètes; & que Saturne les diminue toutes; Mars diminue l'inclinaiſon de Mercure, mais il augmente celles de Vénus, de Jupiter & de Saturne, dont les

nœuds ſont plus avancés, & ainſi des autres. J'eſpère donner bientôt ſur cette matiere des détails plus circonſtanciés dans les mémoires de l'académie ; ce ſont ces conſidérations que perſonne n'avoit encore faites qui m'ont donné l'explication des inégalités obſervées dans les inclinaiſons du ſecond & du troiſième ſatellite, inégalités ſi ſingulieres, qu'avant moi l'on n'en ſoupçonnoit pas même la raiſon ; M. Bailly a donné un mémoire ſur ces inégalités dans le volume de 1766, *pag.* 346, d'après les principes que je viens d'expliquer, mais qui étoient déja conſignés dans la premiere édition de ce livre. (voyez l'art. 2944).

1382. Après avoir rapporté les élémens de chaque planète ſuivant M. Caſſini & M. Halley, & d'après de nouvelles déterminations, il ne ſera pas inutile de mettre tout à la fois ſous les yeux du lecteur la comparaiſon & la différence de ces trois différens recueils de tables, pour faire juger de l'incertitude qu'il peut y avoir dans les divers élémens des tables aſtronomiques. Si je veux ſavoir, par exemple, de combien l'équation du centre de Mercure eſt différente dans les tables de M. Caſſini & de M. Halley, je trouve que dans la colonne de Mercure, & à côté du mot *Equation* il y a — 20′ 22″ ; cela ſignifie qu'il faut ôter 20′ 22″ de la plus grande équation priſe dans les tables de M. Caſſini, pour avoir celle des tables de M. Halley. On trouve après cela une autre comparaiſon des tables de M. Halley avec les miennes, où l'on trouvera ce qu'il faut ôter des élémens pris dans les tables de Halley pour avoir ceux auxquels nous nous ſommes arrêtés dans les articles précédens.

TABLE de ce qu'il faut ôter des Nombres contenus dans les Tables de M. CASSINI, ou y ajouter pour avoir ceux des Tables de M. HALLEY.

Élémens des Tables.	Mercure.	Vénus.	Mars.	Jupiter.	Saturne.
Longitude moy. 1750.	— 1′ 20″	+ 0′ 2″	— 0′ 13″	+ 4′ 18″	—15′ 32″
Longitude de l'Aphélie.	—14 6	—19 29	— 4 31	+19 13	+26 27
Longitude du Nœud.	— 3 22	— 4 3	+10 36	+25 51	—41 0
Mouvement ſéculaire.	—14 41	+ 0 50	+ 0 24	+ 6 41	—23 28
Mouv. de l'Aphélie.	—45 43	—49 7	— 2 58	+24 18	+ 3 36
Mouv. du Nœud.	— 1 20	— 5 0	+ 6 40	+43 11	—65 11
Equation.	—20 22	— 1 6	+ 0 43	+ 0 19	+ 0 24
Inclinaiſon.	— 0 40	0 0	+ 0 6	— 0 20	— 0 26

TABLE de ce qu'il faut ôter des nombres contenus dans les Tables de M. Halley, ou y ajouter, pour avoir ceux de nos nouvelles Tables.

Élémens des Tables.	Mercure.	Vénus.	Mars.	Jupiter.	Saturne.
Longitude moy. 1750.	+ 2 5	— 0 19	+ 0 47	— 2 1	+12 29
Long. de l'Aphélie 1750.	+ 5 51	+54 29	— 3 14	—11 15	+13 32
Long. du Nœud 1750.	— 0 43	+ 2 36	—19 51	+ 0 11	+11 12
Mouv. ſécul. de la Planète.	+ 9 57	+ 0 20	— 0 10	— 0 41	+ 8 30
Mouv. ſécul. de l'Aphélie.	+30 3	+155 47	— 5 0	—16 40	+10 0
Mouv. ſécul. du Nœud.	— 8 20	0 0	+ 3 0	+16 40	+20 0
Equation.	— 1 47	+ 0 30	+ 0 37	+ 2 25	— 8 45
Inclinaiſon de l'Orbite.	+ 0 40	0 0	0 0	0 0	+ 0 10

DES DIAMETRES APPARENS DES PLANETES.

1383. LE DIAMÈTRE apparent d'une planète eſt l'angle ſous lequel il nous paroît, exprimé en minutes & en ſecondes; c'eſt l'angle dont il eſt la corde ou la ſous-tendante, en prenant pour rayon la diſtance de la planète à la terre. Soit *T* la terre, (*fig.* 79), où eſt *Fig. 79.*

ſitué

ſitué l'obſervateur ; AB le diamètre d'une planète, TA & TB les rayons viſuels menés de la terre aux deux bords, ou aux deux limbes oppoſés du diſque de la planète ; l'angle ATB eſt le diamètre apparent de la planète.

Les diamètres des planètes ſe déterminent & s'obſervent avec des micromètres (2358) ; mais on y peut auſſi employer le temps ou la durée de leur paſſage. En effet, ſi l'on obſerve dans une lunette le moment où le premier bord du ſoleil ſe trouve dans le méridien, ou ſur un fil perpendiculaire à la direction de ſon mouvement, & qu'enſuite le ſecond bord y arrive deux minutes plus tard ; ces deux minutes de temps indiqueront que le diamètre du ſoleil eſt de 30′, en ſuppoſant qu'il ſoit dans l'équateur ; on a vu (892) la différence qui a lieu ſi le ſoleil n'eſt pas dans l'équateur, & nous verrons dans le livre ſuivant cette méthode appliquée au diamètre de la lune.

Variation des diamètres apparens.

1384. *Les* DIAMÉTRES *apparens d'une planète ſont en raiſon inverſe de ſa diſtance.* Si la planète AB, étoit ſituée en CD, de maniere que la diſtance TD fût la moitié de la premiere diſtance TB, l'angle CTD ſous lequel elle paroîtroit, ſeroit double de l'angle ATB ou ETD ſous lequel elle paroiſſoit auparavant ; prenons AB ou CD pour rayons ; alors, ſuivant les règles de la Trigonométrie ordinaire TB ſera la cotangente de l'angle ATB, & TD ſera la cotangente de l'angle CTD : or les cotangentes ſont en raiſon inverſe des tangentes, donc $TB : TD ::$ tang. CTD : tang. ETD ; mais les petits angles ſont proportionnels à leurs tangentes ; donc $CTD : ETD :: TB : TD$; c'eſt-à-dire, que le diamètre apparent dans le ſecond cas, eſt au diamètre apparent dans le premier, comme la premiere diſtance eſt à la ſeconde.

Trouver le vrai diamètre.

1385. Les diamètres apparens des planètes ſervent à trouver leurs véritables diamètres ou leurs grandeurs réelles, quand on connoît leurs diſtances : dans le triangle TAB qui eſt rectangle en B, on a cette proportion ;

R : ſin. ATB : : TA : AB ; ainſi l'on trouvera le véritable diamètre AB en multipliant la diſtance TA par le ſinus de l'angle ATB, qui eſt le diamètre apparent de la planète.

On a vu ci-deſſus (1216) la manière de trouver les diſtances des planètes; on verra encore (1634) la manière de les calculer par le moyen de la parallaxe : nous n'avons à parler ici que des diamètres apparens des différentes planètes, tels qu'on les a trouvés par les obſervations les plus récentes & les plus exactes.

Diamètre du Soleil.

1386. Avant la découverte des lunettes l'éclat de lumière que répandent les planètes faiſoit juger leurs diamètres beaucoup plus grands qu'ils ne ſont, & ſurtout ceux des étoiles fixes; cependant les anciens ne s'étoient pas trompés de beaucoup en ſuppoſant le diamètre du ſoleil d'un demi-degré ; au reſte, il ne s'agiſſoit alors que d'avoir un nombre rond approchant de la vérité. Ariſtarque & Archimède ſuppoſoient déja le diamètre apparent du ſoleil de 30′ en tout temps. Du temps de Ptolomée, on n'avoit encore remarqué aucune différence entre l'hiver & l'été; cet auteur faiſoit le diamètre du ſoleil & celui de la lune apogée de 31′ 20″ (*Almag. V.* 14). On peut voir dans le P. Riccioli (*Almag. nov. tom. I, pag.* 119, & *Aſt. ref. pag.* 38) une table des ſentimens de différens auteurs ſur cette matière. Il nous ſuffit de dire que Copernic ſuppoſoit les diamètres du ſoleil de 31′ 48″, & 33′ 54″. Tycho avoit trouvé un peu moins de 30′ dans l'apogée, 32′ & quelques ſecondes dans le périgée (*Progymn. pag.* 471). Képler regardoit comme une choſe certaine que ces diamètres étoient de 30′ & 31′ (*Aſtron. pars optica.* 1604, *pag.* 343).

Malgré la découverte des lunettes d'approche qui devoit donner une grande facilité pour avoir exactement ces meſures, nous voyons que Képler ne faiſoit encore le diamètre du ſoleil dans l'apogée que de 30′, (*Epit. aſtr. cop. pag.* 476 & 827); Hévélius dans une diſſertation *de Saturni facie* imprimée en 1656, ſuppo-

ſoit le diamètre du ſoleil dans l'apogée de 31′ 12″, & dans le périgée de 32′ 36″. Le Pere Scheiner en 1625 & quelques autres Aſtronomes crurent avoir le diamètre avec beaucoup d'exactitude en recevant l'image du ſoleil par un trou imperceptible, & la meſurant à une très-grande diſtance; mais ils trouvèrent le diamètre du ſoleil beaucoup trop grand, quelquefois même il parut de 55 à 56′ (*Aſtr. ref. pag.* 39), c'étoit un effet de la *diffraction* ou *inflexion* de la lumière obſervée par le Pere Grimaldi, & enſuite par Newton, (*Opt. part.* 3) qui rendoit dans ces cas-là l'image très-grande & très-mal terminée; le Pere Riccioli fit voir alors qu'on devoit ſe ſervir d'un trou plus large, & retrancher le diamètre du trou de la largeur de l'image ſolaire; c'eſt ainſi qu'il trouva par le gnomon de S. Pétrone, les diamètres du ſoleil de 31′ 0″ 32′ 4″. M. Caſſini dans le même temps les trouvoit de 31′ 8″ & 32′ 10″. (*Aſtr. ref. pag.* 38).

Erreur du P. Scheiner.

1387. Depuis la découverte des micromètres (2358) il n'y a eu qu'une incertitude de peu de ſecondes dans la meſure du diamètre ſolaire, comme on le verra dans la table ſuivante; mais ce petit nombre de ſecondes étoit devenu une choſe importante à conſtater.

Diamètre apogée ſuivant divers Auteurs.

Flamſteed en 1673, comme on le voit dans les œuvres d'Horoccius *pag.* 488, faiſoit le diamètre apogée de	31′ 40″
M. Caſſini en 1684 à la fin de ſes obſervations aſtronomiques *pag.* 48, faiſoit le diamètre moyen de 32′ 12″, ce qui donne pour le diamètre apogée,	31 40
M. de la Hire dans ſes tables aſtronomiques en 1702.	31 38
M. Halley dans ſes tables aſtron. en 1719,	31 38
M. Auzout & M. Picard, (*Hiſt. cél. pag.* 10)	31 37
M. Caſſini dans ſes tables aſtronomiques 1740,	31 36
M. de la Caille dans ſes tables du ſoleil 1758,	31 34½

M. le Gentil dans les Mém. de l'acad. 1752, *pag.* 459,	31′ 34″
M. de Louville, Mém. de l'acad. 1724;	31 33.
M. Caſſini, Elémens d'aſtr. 1740, *pag.* 127,	31 32½
M. Mouton, (*Obſervat. Diametrorum Lugd. an.* 1670, *Mém. acad.* 1752, *pag.* 445).	31 31½
Par mes obſervations (*Mém. ac.* 1760, *pag.* 48).	31 30½
Suivant M. Short avec un grand téleſcope;	31 28

Le diamètre périgée ſurpaſſe de 64″ 8 le diamètre apogée; & comme il n'y a point d'incertitude là-deſſus; je me ſuis contenté de rapporter dans la table précédente le plus petit des diamètres du ſoleil, celui qui s'obſerve le 30 Juin jour de l'apogée du ſoleil, d'où il eſt aiſé de conclure le diamètre périgée en ajoutant 1′ 5″ au premier.

Le diamètre du ſoleil étant en raiſon inverſe de ſa diſtance, & ſa diſtance apogée étant de 10168 parties dont la moyenne eſt 10000, ſi l'on connoît ſa diſtance ou ſon rayon vecteur pour un temps quelconque par la méthode des articles 1245 ou 1250, on aura auſſi ſon diamètre en faiſant cette proportion : la diſtance actuelle du ſoleil eſt à ſa diſtance apogée 10168, comme le diamètre apogée 31′ 30″ ½, eſt au diamètre apparent pour un temps quelconque.

Diamètre du Soleil, 31′ 30″ & demie.

1388. Les différences que l'on vient de voir entre les différens auteurs me paroiſſoient exiger une nouvelle diſcution, cet élément eſt un des plus importans de l'aſtronomie, puiſque c'eſt au diamètre du ſoleil que nous rapportons ſans ceſſe toutes les meſures des petits arcs céleſtes; j'y ai donc employé la plus grande lunette qui eût encore ſervi à cette recherche; un héliomètre de 18 pieds; & j'ai trouvé par des meſures répétées une multitude de fois, que le diamètre du ſoleil apogée eſt de 31′ 30″ ½, (2529).

M. Short m'a dit depuis en Angleterre qu'il n'avoit trouvé ce diamètre que de 31′ 28″, avec un micromè-

tre objectif & achromatique d'une très-grande perfection, appliqué à un téleſcope de deux pieds; il pourroit ſe faire que le cercle d'aberration & de couleur qui environne toujours l'image des objets au foyer d'une lunette ſe fût trouvé encore plus grand de 2″ ou 3″ dans mon héliomètre, quoique très-bon; c'étoit le ſentiment de Newton qui ſuppoſoit qu'il y avoit une aberration ſenſible dans les meilleures lunettes, & les paſſages de Vénus en fourniſſent encore un indice, comme on le verra dans le XIe. livre (2159). Cependant je ſuppoſerai toujours le diamètre du ſoleil de 31′ 30″ ½ dans ſon apogée; mais pour réduire des obſervations faites avec de petites lunettes ou des lunettes qui ne ſont pas abſolument parfaites, il ſeroit bon de ſuppoſer le diamètre de 5″ plus grand; c'eſt-à-dire, comme dans les tables de M. Caſſini.

1389. LE DIAMÈTRE DE LA LUNE varie depuis 29′ 25″ juſqu'à 33′ 34″ environ, ainſi ſon diamètre moyen eſt de 31′ 30″. C'eſt-à-dire, qu'il égale ſeulement le plus petit diamètre du ſoleil, ou celui qu'il paroît avoir dans ſa plus grande diſtance; mais le diamètre moyen de la lune eſt vu à une diſtance 380 fois plus petite que la diſtance moyenne du ſoleil, & il ne ſeroit pas de 5″ s'il étoit vu à la diſtance du ſoleil; nous parlerons plus au long du diamètre de la lune (1503). Diamètre de la Lune.

1390. Avant la découverte des lunettes d'approche trouvées en 1609, on avoit une idée fort défectueuſe des damètres apparens des planètes: la lumière dont elles ſont environnées, faiſoit juger ces diamètres beaucoup plus grands qu'ils ne ſont réellement; Tycho donnoit 3′ ¼ au diamètre de Vénus dans ſa moyenne diſtance à la terre, ce qui feroit 12′ ⅓ dans le temps de ſes conjonctions inférieures; ſuivant les tables de Képler, on auroit 6′ 51″, au lieu de 59″ que nous trouvons actuellement (*Horoc. Venus in ſole, c.* 16). On trouvera la table de tous les ſentimens des anciens aſtronomes à ce ſujet dans le Pere Riccioli, (*Aſtron. reform. pag.* 359).

La découverte des lunettes fut ſeule ſuffiſante pour donner une plus juſte idée des diamètres apparens, même avant l'uſage des micromètres : le P. Riccioli avec le P. Grimaldi, trouverent les diamètres des planètes vers 1650 de la manière ſuivante : Mercure dans ſes moyennes diſtances 13″ 48‴, Vénus 1′ 4″ 12‴, Mars 22″, Jupiter 49″ 46‴, Saturne ſans ſon anneau 26″ 40‴ & l'anneau 57″, (*Aſtron. reform. pag.* 356) tous ces diamètres ſont pour les moyennes diſtances à la terre.

Le P. Riccioli avoit déterminé les diamètres de Jupiter & de Saturne par leurs appulſes aux étoiles fixes, (*Aſtron. reform. pag.* 355), & il ne trouvoit que 4″ de plus, que M. Huygens ne trouva enſuite par le moyen de ſon micromètre ; (*Syſtema ſaturnium 1659 in fine*) ; mais le P. Riccioli s'étoit trompé ſur le diamètre de Vénus, qu'il trouvoit beaucoup trop grand, parce que ſes lunettes ne dépouilloient pas aſſez cette planète de ſon excès de lumière. Hévélius avoit trouvé le diamètre de Vénus & de Jupiter, à peu-près tels que M. Huygens les trouva enſuite avec ſon micromètre : il les comparoit avec les taches de la lune, dont il avoit examiné la proportion avec le diamètre entier de cet aſtre, (*Selenog. pag.* 449, 477, 547) ; ces diamètres étoient encore trop grands ; & il eſt évident que l'uſage des micromètres, (2358) a mis dans cette matière une bien plus grande exactitude ; mais à l'égard de Mercure & de Vénus, ce ſont leurs paſſages ſur le ſoleil qui nous ont fait connoître la véritable quantité de leurs diamètres (2156).

Diamètre de Mercure.

1391. Le diamètre de Mercure dans ſon paſſage ſur le ſoleil que j'obſervai à Meudon en 1753, meſuré pluſieurs fois avec un héliomètre de 18 pieds, me parut de 11″ 8, c'eſt-à-dire, 11 ſecondes & 8 dixiemes, (*Mém. acad.* 1754, *pag.* 599) ; la diſtance de Mercure à la terre étoit alors à la diſtance moyenne du ſoleil à la terre, comme 55674 eſt à 101007 ; ainſi l'on fera cette proportion, 1010 : 557 : : 11″ 8 ; 6″ 5.

& l'on aura 6″ 5 pour le diamètre de Mercure au temps où ſa diſtance eſt égale à la diſtance moyenne du ſoleil. En 1723 lorſque Mercure paſſa ſur le ſoleil, M. Bradley avec une lunette de 120 pieds, trouva que ce diamètre étoit pour lors 10″ ¼ ce qui fait 7″ 34 pour la diſtance moyenne, (*Inſt. aſtron. pag.* 556. *Philoſ. tranſ.* 1723, *n°.* 386), ainſi par un milieu je le ſuppoſerai de 6″ 9. On verra dans le livre XIe. la manière dont on s'y prend pour le déterminer par la durée de ſon entrée ſur le ſoleil.

Diamètre de Vénus.

LE DIAMÉTRE DE VÉNUS ſur le ſoleil obſervé le 6 Juin 1761, m'a paru être de 57″ 8, (2157) la diſtance de Vénus à la terre étoit alors à la diſtance moyenne du ſoleil, comme 2890 eſt à 10000; ainſi le diamètre de Vénus à la diſtance moyenne du ſoleil paroîtroit de 16″ 7. J'ai conclu exactement le même diamètre de quatre obſervations de M. Short, faites dans d'autres temps, avec un micromètre objectif, appliqué à un téleſcope de deux pieds (*Mém acad.* 1762, *pag.* 258).

Diamètre de Mars.

1392. LE DIAMÈTRE DE MARS paroiſſoit à M. Picard le 29 Septembre 1672 de 25″ environ, c'étoit un mois après l'oppoſition durant laquelle il avoit paru de 30″; c'eſt ainſi qu'il le raconte lui-même parmi les obſervations faites en divers endroits du royaume imprimées à la ſuite du voyage d'Uranibourg, en 1680, *pag.* 34. M. le Monnier dit cependant que le 5 Sept. 1672 le diamètre de Mars meſuré par M. Picard avec une lunette de 20 pieds garnie d'un micromètre, avoit paru de 26″ tout au plus, (*Inſtit. aſtr. pag.* 556); mais parce que Flamſteed avoit meſuré le diamètre de Mars à peu-près dans le même temps, & qu'il lui avoit paru tantôt de 2″, & tantôt de 7″ plus grand, il le ſuppoſe de 27″ ½, dont il ôte encore 5″ à cauſe de la dilatation de la lumière. Pour moi n'ayant pas trouvé que l'effet de la dilatation fût ſenſible dans Vénus même, & voulant m'en tenir aux propres paroles de M. Picard, je ſuppoſerai que le diamètre de Mars paroiſſoit de 30″ en 1672 le jour de l'oppoſition, c'eſt-à-dire, le 8 Sept.

n. ſtyle, la diſtance de Mars à la terre étoit alors de 0,3815; ainſi le diamètre réduit à la diſtance du ſoleil à la terre ſeroit 11″ 38 ou 11″ 4.

Il y a dans les tranſactions philoſophiques, une occultation de Mars par la lune obſervée en 1676 qui ſeroit propre à déterminer le diamètre de Mars, ſi les obſervations étoient plus complettes & mieux d'accord; car il n'y auroit guère de meilleur moyen que celui d'obſerver l'émerſion de Mars, quand il ſort du diſque obſcur de la lune, mais ces phénomenes ſont fort rares. On trouve une occultation de Saturne par la lune dans l'hiſtoire céleſte de M. le Monnier, *pag* 238, qui ſeroit propre à vérifier auſſi le diamètre de Saturne.

Diamètre de Jupiter.

1393. Le diamètre de Jupiter obſervé par M. Pound avec une lunette de 123 pieds de M. Huygens, en 1719, parut toujours plus petit que 40″, jamais au-deſſous de 38, & plus ſouvent 39″ (*Newton Princip. mathem. l. III, phænom.* 1). Par les durées des paſſages du premier & du troiſieme ſatellite & par le paſſage de l'ombre du premier ſur le diſque de Jupiter, qui furent obſervés avec la même lunette, Newton conclut ce diamètre de $37'' \frac{1}{4}$ pour la diſtance moyenne de Jupiter au ſoleil ou à la terre. Si nous prenons avec lui $37'' \frac{1}{4}$, & que nous faſſions cette proportion; 1000 : 5201 : : $37 \frac{1}{4}$: 193″, 74, nous aurons $3' 13'' \frac{1}{4}$ pour le diamètre que Jupiter auroit s'il étoit auſſi près de nous que le ſoleil; mais il s'agit ici du diamètre de l'équateur, car on verra que Jupiter eſt applati vers les poles d'environ une quatorzième partie (3221).

Diamètre de Saturne.

Le diamètre de Saturne obſervé par M. Pound en 1719 avec la même lunette de 123 pieds Anglois, parut de 18″, & le diamètre de l'anneau (3225) parut de 42″, en les réduiſant à la diſtance moyenne de Saturne au ſoleil & à la terre (*Newton Princip. l. III. Phænom.* 2). Newton réduiſoit à 16″ le diamètre de Saturne à cauſe de l'irradiation, mais je ne crois pas devoir ici en tenir compte. La diſtance moyenne de Saturne au ſoleil eſt à celle du ſoleil à la terre, comme 1000 eſt à 9539,

(1222),

(1222) ainſi le diamètre de Saturne eſt 2′ 51″, 71 à la diſtance moyenne du ſoleil, & celui de l'anneau ſeroit de 6′ 40″ 65, réduit à la moyenne diſtance du ſoleil à la terre.

Les diamètres que je viens d'aſſigner aux planètes, ſe trouvent un peu différemment dans M. Huygens, (*Syſtema Saturnium*); mais les obſervations ſur leſquelles il ſe fondoit, ne ſont pas à beaucoup près, auſſi exactes que celles dont je viens de parler : il donnoit, par exemple, 9′ 4″ au diamètre de l'anneau de Saturne, 5′ 35″ au diamètre de Jupiter, 21″$\frac{1}{4}$ à celui de Vénus ; ces quantités ſont viſiblement trop grandes.

Diamètre de la Terre.

1394. LE DIAMÈTRE DE LA TERRE vu du ſoleil, égal au double de la parallaxe horiſontale de cet aſtre, eſt d'environ 18″ : nous en traiterons en particulier dans le IXe. livre de cet ouvrage (1742). A l'égard du diamètre réel de la terre en lieues, il ſera déterminé dans le XVe. livre, où nous parlerons de la grandeur & de la figure de la terre, on verra qu'il eſt de 2865 lieues, chacune de 25 au degré ou de 2283 toiſes (2652).

L'irradiation eſt inſenſible.

1395. J'ai dit que ſuivant Newton, tous ces diamètres obſervés avec les plus grandes lunettes, ſont encore affectés d'une certaine *irradiation*, ou dilatation de lumière qui les environne comme une frange, & les fait paroître trop grands ; en conſéquence pluſieurs aſtronomes ont cru que pour avoir les vrais diamètres des planètes, il falloit ôter 2″ de celui de Saturne, 5″ de celui de Mars, tandis qu'il falloit ajouter 1″ ou 2″ aux diamètres de Mercure & de Vénus obſervés ſur le ſoleil, à cauſe d'un ſemblable débordement de la lumière ſolaire qui devoit faire paroître ces planètes plus petites. M. le Monnier (*Inſtit. aſtron. pag.* 554). Le P. Hell dans le recueil d'obſervations de Vénus qui eſt à la ſuite de ſes éphémérides pour 1762, *pag.* 24, paroît croire à cette irradiation, dont il donne pluſieurs explications ; mais il convient que les obſer-

vations qui ſembloient l'indiquer, n'étoient pas aſſez concluantes.

Pour moi ayant comparé avec grand ſoin le diamètre de Vénus obſervé ſur le ſoleil en 1761, & ce diamètre obſervé dans ſa plus grande lumière avant & après le paſſage de Vénus ſur le ſoleil, je les ai rapportés tous à une même diſtance, (*Mém. acad.* 1762) & je n'y ai trouvé aucune différence; l'éclipſe annulaire de 1764 a prouvé la même choſe par rapport à la lune, je crois donc que le phénomène de l'irradiation eſt inſenſible, pour les planètes, que leur lumière n'eſt pas aſſez forte pour produire ce phénomène, & que quand on ſe ſert des mêmes lunettes, il eſt inutile d'en tenir compte.

Différence des lunettes.

On croit cependant avec quelque fondement que le diamètre du ſoleil avec de grandes lunettes paroît plus petit qu'avec les petites lunettes, ainſi M. de la Caille a toujours penſé que le diamètre du ſoleil étoit de $31'$ $34''$ meſuré avec des lunettes de 6 pieds, tandis que je l'ai trouvé de $31'$ $30''\frac{1}{2}$ avec un héliomètre de 18 pieds (1388); peut-être cette différence provient-elle de la difficulté qu'il y a de meſurer exactement ce diamètre avec un micromètre ordinaire comme celui de M. de la Caille, & avec une lunette qui n'a que 6 pieds; mais ſi cette différence eſt réelle il faudra l'attribuer à une couronne lumineuſe formée par l'aberration des rayons qui dans les lunettes ne ſe réuniſſent pas exactement au même point. (2289) V. auſſi M. le Gentil, *Mém. acad.* 1755, *pag.* 437; mais cette différence étant toujours la même pour le ſoleil, vu dans la même lunette, il eſt inutile d'y avoir égard; ſi ce n'eſt dans les paſſages de Vénus & Mercure, où ſon effet diſparoît comme je l'expliquerai dans le livre XIe. à l'occaſion de ſes paſſages (2159).

On m'objectera peut-être que quand une planète paroît ſur le ſoleil, l'irradiation du ſoleil qui l'environne de tout côté devroit retrecir en apparence la partie obſcure ou le diamètre de la planète; & ce diamètre devroit paroître plus petit de la même quantité que

celui du ſoleil paroît trop grand ; mais comme j'ai déterminé les diamètres de Vénus & de Mercure par la durée du temps qu'ils employent à ſortir de deſſus le ſoleil, j'ai évité l'effet de cette irradiation, comme je le prouverai dans le livre XIe. A l'égard de la lune dont le diamètre a été meſuré ſur le ſoleil en 1748, & n'a pas paru plus petit que quand la lune eſt éclairée, peut-être quelques ſecondes auront pu échapper à l'exactitude de cette obſervation pour laquelle on n'a eu que le peu de minutes que dura l'éclipſe annulaire de 1748, & peut-être auſſi que ce débordement de lumière n'a lieu qu'à la circonférence extérieure du ſoleil.

1396. Les diamètres apparens de toutes les planètes réduits à une même diſtance, nous donnent le moyen de trouver les diamètres abſolus & de les comparer tous ou au diamètre du ſoleil ou à celui de la terre ; il eſt vrai que pour les comparer au diamètre de la terre, il faut ſuppoſer qu'on connoiſſe la parallaxe du ſoleil, c'eſt-à-dire, l'angle ſous lequel paroît, vu du ſoleil, le demi-diamètre de la terre ; mais les obſervations du paſſage de Vénus, nous ont fait connoître avec aſſez de préciſion que ce diamètre eſt de 18″ (1742) ; comme ces comparaiſons ne ſont qu'une pure curioſité & qu'on aime aſſez à rapporter tout à la terre, nous donnerons les groſſeurs totales des planètes par rapport à la terre, en ſuppoſant que ſon demi-diamètre vu du ſoleil paroît de 9″.

Pour trouver les volumes ou les groſſeurs des planètes par rapport à la terre, quand on connoît le rapport de leurs diamètres, il ſuffit de prendre le cube du diamètre, ou de tripler ſon logarithme, parce que l'on ſait par les élémens de géométrie que les ſphères ſont comme les cubes de leurs diamètres. Par exemple le diamètre de la terre eſt de 18″, celui de Mercure eſt de 6″ 9 à la même diſtance. Si l'on diviſe 6″ 9 par 18″ l'on aura 0, 3889 ; c'eſt le diamètre de Mercure, en ſuppoſant que celui de la terre eſt 1. Le cube de cette fraction décimale donnera 0, 05881 qui

vaut à peu-près $\frac{1}{17}$; ce qui nous apprend que la groſſeur de Mercure eſt la dix-ſeptieme partie de celle de la terre.

Différence entre la groſſeur & la maſſe.

1397. Le volume ou la groſſeur d'une planète n'eſt pas la même choſe que ſa maſſe ou la quantité de matière qu'elle renferme; celle-ci dépend de la denſité dont nous parlerons dans le XXIIe. livre (3403), & qu'en attendant j'ai miſe dans la table ſuivante. La denſité multipliée par le volume, donne la maſſe, le poids, la quantité de matière, ou la force attractive; c'eſt ce que j'ai renfermé de même dans la table ſuivante.

On obſervera au ſujet de cette table que les quatre denſités marquées par des étoiles, ſont les ſeules qu'on puiſſe déterminer par un calcul immédiat, les autres ſont établies par une eſpèce de conjecture (3410).

1398. Les diſtances en lieues ne ſont certaines qu'à un trentieme près, parce qu'elles dépendent de la parallaxe du ſoleil ſur laquelle on a peut-être un tiers de ſeconde d'incertitude; nous diſcuterons cette matière dans les livres IXe. & XIe. (1742, 2149).

J'ai ſuppoſé la maſſe de la lune $\frac{1}{70}$ de celle de la terre : comme M. Bernoulli l'a déduit de ſon effet ſur le flux & le reflux de la mer. Voy. liv. XXIIe. (3412), au lieu de $\frac{1}{40}$ que Newton avoit trouvé. La maſſe du ſoleil eſt plus grande que celle de Newton, l. 3, pr. 8, qui eſt 169282, parce que j'ai ſuppoſé la parallaxe plus petite que Newton, c'eſt-à-dire, de 9″ au lieu de $10''\frac{1}{2}$; avec d'autres élémens plus exacts que les ſiens.

Nous parlerons du diamètre de la lune dans le VIIe. livre (1503), & de ceux des étoiles fixes dans le XVIe. livre (2784).

On trouve dans la même table les vîteſſes que les corps peſans doivent avoir dans la première ſeconde, à la ſurface de chaque planète, en ſuppoſant que les corps décrivent ſur la terre 15 pieds 1 pouce 2 lignes 95 ou 15 pieds 1038 en une ſeconde ſous l'équateur; c'eſt la meſure de la peſanteur dans chaque pla-

nète ; elle eſt proportionelle à la maſſe diviſée par le carré du rayon (3411).

Les diſtances des planètes à la terre en lieues qui ſont dans les dernières colones de la table ne ſont autre choſe que la ſomme & la différence de la diſtance moyenne de la terre, & de chaque planète au ſoleil (1222), réduites en lieues à raiſon de 2865, pour le diamètre de la terre, j'ai négligé les valeurs des derniers chiffres qui dans ces ſortes de calculs ſont tout-à-fait inappréciables, exceptés pour la lune (1719).

De ces diſtances il ſeroit facile de conclure la vîteſſe de chaque planète, par exemple, la circonférence de l'orbite terreſtre ſuppoſée circulaire doit avoir 206280000 lieues ; ainſi la vîteſſe de la terre dans ſon orbite eſt de 564754 lieues par jour, 23531 par heure, 392 par minute & $6\frac{1}{2}$ par ſeconde. A l'égard de la vîteſſe diurne du mouvement de rotation, elle n'eſt que de 238 toiſes par ſeconde ſous l'équateur, à peu-près comme celle d'un boulet de canon de 24 livres, qu'on eſtime de 250 toiſes dans la première ſeconde.

TABLE des diametres apparens des Planètes, vus à la diſtance moyenne du Soleil à la terre ; & de leurs diametres vrais en ſuppoſant la parallaxe du Soleil de 9″ (Voyez Liv. IX.) *avec leurs volumes, leurs denſités, leurs maſſes & leurs diſtances.*

Planetes.	Diametres en minutes & ſecondes.	Diametres en lieues.	Diametres par rapport à la terre.
Le Soleil,	32′ 2″,0	305918	Cent & ſept diam. de la terre ou 106,778
La Terre,	18,0	2865	 1,000
La Lune,	4,915	782	Un tiers, ou $\frac{11}{35}$ du diam. de la terre 0,3141
Mercure,	7,0	888	Un tiers, ou $\frac{7}{18}$ ou 0,3889
Vénus,	16,7	2658	Treize quatorziemes 0,9278
Mars,	11,4	1814	Cinq huitiemes, ou 0,6333
Jupiter,	3 13,7	30832	Dix diametres & trois quarts, 10,761
Saturne,	2 51,7	27329	Neuf diametres & demi, 9,539
Anneau de ♄.	6 40,6	63771	Vingt-deux diam. de la terre, 22,25

	Groſſeur ou volume par rapport à la terre, à peu-près.	Plus exactement & en décimales.	Denſité par rapport à la terre.
Le Soleil,	Douze cent mille fois plus gros,	12 17480	0,25285 *
La Lune,	La quarante-neuvieme,	0,02036	0,68706 *
Mercure,	Un dix-ſeptieme,	0,05881	2,0377
Vénus,	Quatre cinquiemes de la terre,	0,7986	1,2749
Mars,	Le quart de la terre,	0,2540	0,7292
Jupiter,	1246 fois plus gros que la terre,	1246	0,23147 *
Saturne,	868 fois plus gros que la terre,	867,95	0,09032 *

	Maſſe par rapport à la terre.	Viteſſe des graves à leur ſurface pour chaque ſeconde.	Diſtances à la terre en lieues.	
			La plus petite.	La plus grande.
Le Soleil,	307831	407pl. 69	32278 900	33382000
La Terre,	1	15 10	.....	.....
La Lune,	0,01399	2 83	77577	91454
Mercure,	0,1198	11 96	20122000	45539000
Vénus,	1,01818	17 82	9083000	56578000
Mars,	0,1852	6 97	17193000	82854000
Jupiter,	288,44	37 66	137920000	203581000
Saturne,	78,39	13 01	280352000	346012000

OBSERVATIONS ASTRONOMIQUES anciennes & Modernes du Soleil, & des cinq Planètes principales.

1399. Les obſervations ſont le fondement de toutes les théories, elles en ſont la vérification & la preuve; ainſi je ne puis terminer mieux ce VIe. livre qu'en y raſſemblant une collection des meilleures obſervations anciennes & modernes, extraites des auteurs qui en ont fait le calcul & l'application; j'y ai ajouté les obſervations les plus récentes & les plus déciſives pour chaque planète, comme un point fixe d'où l'on pourra partir pour établir des théories, & conſtruire de nouvelles tables.

Les anciennes obſervations ſe trouvent raſſemblées & diſcutées dans les ouvrages ſuivant: Longomontani *Aſtronomia Danica*, 1640. Bullialdi, *Aſtronomia Philolaïca*, 1645. Riccioli, *Aſtronomia Reformata*, 1665. Wing, *Aſtronomia Britannica*, 1669. *Hiſtoria Cœleſtis, Tychonis Brahe*, 1672. M. Caſſini, *Elémens d'Aſtronomie*, 1740. J'en ai moi-même examiné & calculé un grand nombre; mais il ſera toujours bon de remonter aux ſources, parce que mon intention n'étoit pas de former ici un recueil complet d'obſervations aſtronomiques.

A l'égard des obſervations modernes, on pourra conſulter le grand ouvrage d'Hévélius intitulé, *Machinæ Cœleſtis*, (livre très-rare); celui de Flamſteed, *Hiſtoria Cœleſtis Britannica*; les mémoires de l'académie, &c. S'il étoit poſſible de publier toutes celles que M. de l'Iſle a raſſemblées dans ſes manuſcrits, & qui ſont actuellement au dépôt de la marine à Verſailles, on y trouveroit la plus grande collection d'obſervations aſtronomiques qui ait jamais exiſté; mais le plus grand inconvenient, c'eſt que la plupart de ces obſervations ne peuvent ſe réduire que par de longs calculs.

Des obſervations de Mercure.

Je raſſemble ici principalement des obſervations de Mercure, parce qu'elles ſont rares & difficiles à faire ſur-tout à Paris. Copernic éprouvoit la même difficulté dans le nord; il ne put jamais faire une ſeule obſervation de Mercure, ce qu'il attribuoit aux vapeurs de la Viſtule & à la longueur des crépuſcules en été. On trouve dans l'aſtronomie réformée beaucoup d'obſervations de Riccioli qui n'ont jamais été calculées, & dont on pourroit ſe ſervir pour la théorie de cette planète; on en peut dire autant de celles qui ſont dans Hévélius, (*Mach. cæleſt.*), & Flamſteed, (*Hiſt. cæl. ſt.*), dont j'ai fait uſage pour calculer mes tables de Mercure, de même que de celles de M. Halley (V. *les Mém. de* 1766, *pag.* 450 & 503).

J'ai auſſi trouvé dans les manuſcrits de M. de l'Iſle la notice de beaucoup d'obſervations de M. de la Hire & de pluſieurs autres aſtronomes, obſervations qui n'ont point été publiées : telles ſont celles que Margraf fit en 1639 & 1640, dans l'Iſle de Vaaz au Bréſil, qui ſont au dépôt; mais l'original eſt reſté à Cadix, avec les manuſcrits de M. de Louville & beaucoup d'autres que M. Godin y avoit emportés, & que l'on croit être entre les mains de D. *Antonio de Ulloa.*

On pourroit y ajouter pluſieurs obſervations que M. de l'Iſle a faites à Péterſbourg, où pendant 20 ans il s'eſt occupé des obſervations aſtronomiques; j'y ai ſuppléé par les miennes, qui ſont les plus récentes, & qui m'ont donné les élémens actuels de l'orbite de Mercure (1267, 1286). Parmi les obſervations de Mercure & de Vénus, que j'ai tirées de l'*Aſtronomia Danica*, il y en a auxquelles Longomontanus a fait des corrections pour la réfraction & la parallaxe, comme il le dit *pag.* 418, & elles ſont marqués *vraies*; mais comme il ſuppoſoit la parallaxe du ſoleil de 2′ 40″, & les autres à proportion, il pourroit y avoir près de 2′ d'erreur en certains cas, qu'il faudroit corriger dans ces obſervations, ſi l'on ſe propoſoit d'y mettre ce degré de préciſion.

OBSERVATIONS

OBSERVATIONS DU SOLEIL.

Av. J. C.	Temps moy. à Paris.				
161	27 Sept.	4^h		Equinoxes obſervés par Hipparque.	
158	26 Sept.	16			
157	26 Sept.	22			
145	23 Mars	22	10′	Voy. *Ptolomée*, *Almag.* *Mém. Acad.* 1757, *p.* 423. *M. Caſſini*, *El. d'Aſtr. p.* 211.	
145	26 Sept.	16			
142	26 Sept.	4			
134	22 Mars	10	15		
127	23 Mars	4	15		
1278	13 Déc.	18^h	7′	ſolſt. d'hiv.	*Hiſt. de l'Aſt. Chin.* *pag.* 107.
1279	14 Juin	8	46½	ſolſt. d'été.	
1279	13 Déc.	23	52	ſolſt. d'hiv.	*Mém. Ac.* 1757, *pag.* 140, 141.
1280	12 Déc.	5	50	ſolſt. d'hiv.	
1487	12 Déc.	12	1	ſolſt. d'hiv.	*Mém. Acad.* 1749, *pag.* 53, 1757, *pag.* 139, 140.
1488	11 Juin	20	40½	ſolſt. d'été	
1488	12 Déc.	11	47½	ſolſt. d'hiv.	
1503	12 Juin	12	8	ſolſt. d'été	
1503	12 Déc.	9	45½	ſolſt. d'hiv.	

OBSERVATIONS *de Waltherus calculées par M. de la Caille*, (Mém. Acad. 1749, *p.* 60).

Années.	Temps moy. à Paris.			Longitude du Soleil.			
1475	15 Sept.	23^h	17′	6^s	1°	51′	24″
1476	15 Mars	23	33	0	5	4	55
1476	12 Sept.	23	18	5	29	40	6
1477	10 Mars	23	33	11	29	54	0
1477	16 Sept.	23	17	6	3	16	48
1478	11 Mars	23	33	0	0	35	37
1478	12 Sept.	23	18	5	29	6	54
1487	17 Sept.	23	17	6	2	54	24
1488	16 Mars	23	31	0	6	7	48
1488	13 Sept.	23	17	6	0	43	31
1488	14 Sept.	23	17	6	1	42	52
1488	17 Sept.	23	16	6	4	38	37
1489	12 Mars	23	32	0	1	58	30

Années.	Temps moyen à Paris.			Longit. du Soleil.			
1489	14 Mars	23h	31′	0s	3°	57′	46″
1489	18 Mars	23	30	0	7	54	20
1491	12 Mars	23	32	0	1	28	26
1491	14 Sept.	23	17	6	0	59	12
1498	17 Sept.	23	16	6	4	13	24
1498	18 Sept.	23	16	6	5	13	
1499	13 Mars	23	32	0	2	32	37
1501	16 Mars	23	31	0	5	58	20
1501	14 Sept.	23	17	6	1	34	15
1501	18 Sept.	23	15	6	5	28	50

Equinoxes observés par Tycho, (Mém. Acad. 1757, *pag.* 424. M. Caſſini, *pag.* 228).

	Temps moyen à Paris.							Temps moyen à Paris.			
1584	10 Mars	0h	46′	42″	1587	13 Sept.	5h	37′	16″
1584	12 Sept.	11	11	16	1588	10 Mars	0	16	42
1585	10 Mars	6	51	42	1588	12 Sept.	10	35	16
1585	12 Sept.	17	3	16	1589	10 Mars	5	5	42
1586	10 Mars	12	41	42	1589	12 Sept.	16	49	16
1586	12 Sept.	23	6	16	1590	10 Mars	11	15	12
1587	10 Mars	17	55	42	1590	12 Sept.	22	52	16

On trouvera dans M. Caſſini, *pag.* 209, une ſuite d'équinoxes obſervés depuis 1672 juſqu'en 1739, à l'Obſervatoire Royal de Paris.

TABLE de 144 *Longitudes du Soleil obſervées par M. de la Caille à Paris & au Cap.* (Mém. Acad. 1757, *pag.* 125).

Temps vrai à Paris.			Longitude obſervée.				Temps vrai à Paris.			Longitude obſervée.			
1746 29 Oct.	0h	0′	7s	5°	56′	5″7	1747 17 Avril	0h	0′	0s	27°	2′	45″5
7 Nov.	0	0	7	14	58	2,0	1 Mai	0	0	1	10	38	54,3
8	0	0	7	15	58	25,2	2	0	0	1	11	36	58,9
1747 14 Mars	0	0	11	23	33	30,7	11	0	0	1	20	18	47,8
15	0	0	11	24	33	11,4	12	0	0	1	21	16	40,6
16	0	0	11	25	32	49,8	14	0	0	1	23	12	19,0
23	0	0	0	2	29	14,9	16	0	0	1	25	7	51,4
13 Avril	0	0	0	23	8	17,9	17	0	0	1	26	5	34,8
14	0	0	0	24	6	58,0	21 Juin	0	0	2	29	35	10,9
15	0	0	0	25	5	35,9	1748 15 Févr.	0	0	10	26	15	53,3
16	0	0	0	26	4	11,7	21	0	0	11	2	18	20,2

Temps vrai à Paris.			Longit. observée.			
1748	7 Mars	0h 0′	11s	17°	20′	22″8
	8	0 0	11	18	20	14,8
	16 Avril	0 0	0	26	48	27,5
	20	0 0	1	0	42	15,7
	18 Juin	0 0	2	27	26	44,0
	5 Sept.	0 0	5	13	11	1,7
	6	0 0	5	14	9	18,5
	7 Sept.	0 0	5	15	7	37,2
	8	0 0	5	16	5	58,3
	9	0 0	5	17	4	20,8
	10	0 0	5	18	2	45,7
	11	0 0	5	19	1	13,2
1749	5 Mars	0 0	11	15	6	18,0
	21	0 0	0	1	1	19,5
	24	0 0	0	3	59	30,1
	25	0 0	0	4	58	49,0
	26	0 0	0	5	58	5,3
	27	0 0	0	6	57	19,2
	28	0 0	0	7	56	31,2
	29	0 0	0	8	55	40,2
	12 Avril	0 0	0	22	40	4,4
	13	0 0	0	23	38	43,8
	23	0 0	1	3	23	45,4
	25	0 0	1	5	20	22,9
	6 Mai	0 0	1	15	59	20,8
	7	0 0	1	16	57	16,8
	8	0 0	1	17	55	11,1
	9	0 0	1	18	53	3,9
	10	0 0	1	19	50	56,0
	24	0 0	2	3	18	56,3
	25	0 0	2	4	16	29,4
	18 Juin	0 0	2	27	13	4,4
	19	0 0	2	28	10	19,7
	5 Juil.	0 0	3	13	25	21,2
	6	0 0	3	14	22	32,5
	7	0 0	3	15	19	45,6
	9 Juil.	0 0	3	17	14	12,1
	13	0 0	3	21	3	11,4
	16	0 0	3	23	55	1,2
	19	0 0	3	26	46	53,9
	20	0 0	3	27	44	11,9

Temps vrai à Paris.			Longit. observée.			
1749	21	0h 0′	3s	28°	41′	30″0
	28	0 0	4	5	22	50,5
	2 Août	0 0	4	10	9	54,2
	6	0 0	4	13	59	56,1
	7	0 0	4	14	57	30,4
	29	0 0	5	6	9	21,5
	30	0 0	5	7	7	26,5
	31	0 0	5	8	5	33,3
	1 Sept.	0 0	5	9	3	42,2
	8	0 0	5	15	51	43,6
	9	0 0	5	16	50	9,2
	13	0 0	5	20	44	10,7
	2 Oct.	0 0	6	9	22	11,1
	3	0 0	6	10	21	22,9
	4	0 0	6	11	20	37,2
	6	0 0	6	13	19	13,4
	8	0 0	6	15	17	58,9
	10	0 0	6	17	16	53,0
1750	2 Mars	0 0	11	11	51	17,9
	3	0 0	11	12	51	21,3
	4	0 0	11	13	51	22,5
	5	0 0	11	14	51	20,9
	8	0 0	11	17	51	9,4
	30	0 0	0	9	39	52,7
	2 Avr.	0 0	0	12	37	4,2
	3	0 0	0	13	36	3,9
	18	0 0	0	28	17	17,4
	21 Juin	0 0	2	29	50	50,7
	28	0 0	3	6	31	15,0
	29	0 0	3	7	28	28,7
	30	0 0	3	8	25	41,6
1751	27 Mai	22 55″½	2	6	38	14,7
	30	22 55	2	9	30	43,7
	19 Juin	22 55	2	28	37	4,4
	21	22 55	3	0	31	34,6
	27	22 55	3	6	15	1,0
	29	22 55	3	8	9	26,2
	11 Juil.	22 55	3	19	35	47,3
	12	22 55	3	20	33	1,1
	19	22 55	3	27	13	58,2
	3 Août	22 55	4	11	34	57,0

Temps vrai à Paris.				Latitude observée.				Temps vrai à Paris.				Latitude observée.			
1751	21 Août	22h	55 1/2	4s	28°	53′	19″8	1752	21 Fév.	22h	55′3/5	10s	1°	56′	20″9
	22	22	55	4	29	51	14,8		3 Fév.	22	55	10	15	7	54,0
	1 Sep.	22	55	5	9	31	40,3		5	22	55	10	17	9	22,9
	12	22	55	5	20	13	23,2		26	22	55	11	8	19	21,7
	13	22	55	5	21	11	55,9		2 Mars	22	55	11	13	19	40,2
	29	22	55	6	6	53	9,9		3	22	55	11	14	19	38,6
	30 Sep.	22	55	6	7	52	14,7		4	22	55	11	15	19	34,6
	6 Oct.	22	55	6	13	47	25,6		12	22	55	11	23	18	5,2
	7	22	55	6	14	46	45,5		13	22	55	11	24	17	46,7
	8	22	55	6	15	46	7,5		20	22	55	0	1	14	40,5
	4 Nov.	22	55	7	12	41	46,1		27	22	55	0	8	9	42,3
	5	22	55	7	13	42	20,7		4 Avr.	22	55	0	16	1	48,2
	3 Déc.	22	55	8	12	1	10,2		10	22	55	2	20	45	25,5
	10	22	55	8	19	8	15,0		18	22	55	2	28	23	40,9
	19	22	55	8	28	18	30,5		19	22	55	2	29	20	54,8
	24	22	55	9	3	24	24,7		21	22	55	3	1	15	20,1
	27	22	55	9	6	27	55,7		26	22	55	3	6	1	15,7
	29	22	55	9	8	30	15,8		9 Nov.	22	55	7	18	29	33,8
1752	8 Jan.	22	55	9	18	41	50,6		28 Déc.	22	55	9	8	15	5,4
	9	22	55	9	19	43	0,2		29	22	55	9	9	16	18,2

OBSERVATIONS DE MERCURE.

Années		Temps moyen à Paris.			Longit. observ.			
264	av. J. C.	14 Nov.	16h	16′	7s	2°	47′	Ces observations ont été réduites & corrigées dans les Mémoires de l'Académie 1766, *pag.* 498, sans cependant tenir compte de la réfraction. Il y en a quelques-unes qu'on ne peut accorder avec les autres.
261		11 Févr.	15	38	9	21	48	
261		25 Avr.	4	31	1	23	8	
261		23 Août	4	42	5	18	58	
256		28 Mai	4	56	2	28	49	
244		18 Nov.	15	20	7	1	52	
236		29 Oct.	15	0	6	13	44	
130	apr. J. C.	4 Juil.	6	21	4	7	22	
132		2 Févr.	4	6	11	2	2	
134		3 Juin	13	55	1	19	48	
134		2 Oct.	15	28	5	21	15	
135		5 Avr.	5	13	1	5	23	
138		4 Juin	6	10	3	8	4	
139		17 Mai	5	54	2	18	34	
139		4 Juil.	13	57	2	21	9	
141		1 Févr.	16	46	9	14	34	
491		8 Sept.	16	25	5	13	30	1 50 B. Walt. Coper. *l.* v. *c.* 30. App.

	Temps vrai à Paris	Longit. obſerv.	Latitude obſervée.
1504 apr. J.C.	8 Janv. $17^h\,55'$	$9^s\ 3°\ 20'$	0 45 B Schoner, *Ibid.*
1504	18 Mars 6 55	0 26 6	3 0 B Schoner, *Ibid.*
1504	18 Mars 6 40	0 26 29	Suiv. Boull. *Aſt. Phil. p.* 383. *vr.*

Années N. St.	Temps vrai.	Longit. obſerv.	Latitude obſervée.
1585	24 Nov. $18^h\,18'$	$7^s\ 13°\ 4'\ 0''$	$2°\ 18'\ 0''$ B { *Aſt. Dan.* 422. *Aſt. Phil.* 378.
1585	3 Déc. 18 38	7 25 3 0	1 25 0 B *Aſtr. Dan. vr.*
1586	3 Nov. 18 28	6 22 35 0	*Ibid.*
1586	7 Nov. 17 48	6 26 33 0	2 17 0 B *Ibid.*
1587	19 Janv. 4 6	10 17 48 0	0 1 0 B *Tych. Epiſt. p.* 56.
1587	24 Janv. 4 33	10 21 7 0	1 21 0 B *Ibid. vr.*
1587	25 Janv. 4 39	10 21 20 0	1 40 0 B *Ibid. vr.*
1587	19 Janv. 4 8	5 17 48 0	0 1 0 B *Aſtr. Dan.* 422. *vr.*
1589	12 Avr. 7 23	1 11 28 30	2 23 40 B *Aſt. Ref. p.* 345. *vr.*
1589	13 Avr. 7 28	1 12 48 0	2 30 30 B *Ibid. p.* 346.
1589	14 Avr. 7 33	1 14 1 0	2 36 50 B *Ibid. vr.*
1589	16 Avr. 7 38	1 16 8 30	2 45 0 B *Ibid. vr.*
1590	16 Mars 6 8	1 13 44 0	1 42 0 B *Aſtr. Dan. vr.*
1592	13 Fév. 4 58	11 12 20 0	0 47 *dout.* B *Ibid. vr.*
1593	21 Mai 8 48	2 23 16 0	2 0 0 B *Ibid. p.* 422. *dout. vr.*
1593	22 Mai 8 48	2 24 19 0	*Aſt. Phil.* 358. *app.*
1607	25 Avr. 8 18	1 21 5 0	1 40 B *Aſt. Dan. p.* 422 *vr.*
1610	15 Déc. 18 18	8 2 42 0	. . . . . *Ibid. vr.*
1625	13 Févr. 6 21	11 13 27 0	Boulliaud, *Aſtr. Philol.* 358. *vr.*
1630	11 Déc. 19 8	7 29 13 0	Boulliaud, *Ibid.*
1632	30 Juil. 15 0	3 24 25 47	0 33 30 B Gaſſen. *Ib.* 361. *vr.*
1634	2 Janv. 5 48	10 1 31 0	0 57 0 A *Ibid. p.* 356. *app.*
1634	4 Janv. 5 48	10 3 31 0	0 30 0 A *Ibid. app.*
1634	6 Janv. 5 48	10 5 1 0	0 1 52 B *Ibid. app.*
1634	2 Oct. 17 18	5 22 7 8	1 25 0 B *p.* 356 & 372. *vr.*
1634	3 Oct. 17 18	5 22 59 26	1 29 18 B *Ibid. app.*
1634	4 Oct. 17 18	5 23 59 47	1 19 16 B *Ibid. app.*
1634	12 Oct. 17 33	4 5 6 0	. . . . . *Ibid. p.* 363. *vr.*
1635	16 Janv. 17 18	9 4 24 32	2 1 19 B *p.* 363. *vr.*
1635	22 Janv. 17 18	9 8 21 50	1 39 0 B *Ibid. p.* 356. *app.*
1635	24 Janv. 17 18	9 10 4 55	1 14 8 B *Ibid. app.*
1635	25 Janv. 17 18	9 11 6 36	0 59 48 B *Ibid. app.*
1635	17 Sept. 16 18	5 7 4 0	Gaſſendi,
1635	1 Déc. 5 11	9 0 26 0	Gaſſendi,
1636	26 Juin 8 16	3 23 17 47	1 36 55 B *p.* 367. *vr.*

Années	Temps vrai à Paris.				Longit. obſerv.				Latitude obſervée.				
	27		8h	10′	3s	24°	57′	34″	2°	0′	0″	B	p. 375. vr
	14	Juil.	8	10	4	19	31	16	1	4	0	A	367. vr.
	15		8	10	4	20	33	15	0	33	0	A	Ibid. vr.
	16		8	10	4	21	26ou46		0	41		A	p. 367 & 374. vr.
	16		8	20	4	21	33	0	.	.	.	.	p. 368. vr.
	3	Sept.	16	45	4	24	37ou38		.	.	.	.	p. 373. vr.
1699	21	Oct.	22	58 56	6	12	5	58	2	7	9	B	Mém. Acad. 1706.
	22	Oct.	23	0 20	6	13	31	44	2	5	32	B	Ibid.
	23	Oct.	23	1 54	6	14	59	22	2	4	54	B	Ibid.
	26	Oct.	23	7 10	6	19	34	52	1	56	43	B	Ibid.
1701	11	Sept.	22	54 56	5	1	54	54	0	5	25	B	Ibid.
	19	Sept.	23	2 12	5	10	50	43	1	37	33	B	Ibid.
	20	Sept.	23	4 30	5	12	24	48	1	39	32	B	Voy. ci-après.
	23	Sept.	23	12 18	5	17	20	13	1	51	4	B	Ibid.
	24	Sept.	23	15 2	5	19	2	22	1	52	13	B	Ibid.
	25	Sept.	23	17 56	5	20	47	50	1	53	29	B	Ibid.
1705	17	Juil.	22	47 5	3	8	27	48	0	29	16	A	Ibid.
	24	Juil.	23	16 8	3	21	33	33	0	51	2	B	Ibid.
	26	Juil.	23	25 49	3	25	38	27	1	8	32	B	Ibid.
1707	12	Avr.	1	11 34	1	11	24	30	2°	34	47	B	Mém. 1753, p. 320.
	13	Juin	22	37 24	2	2	53	23	1	55	1	A	Mém. Ac. 1707, p. 199.
	15	Juin	22	39 56	2	4	32	6	1	44	16	A	Mém. Ac. 1707, p. 199.

Obſervations calculées avec ſoin pour ſervir à ma théorie de Mercure.

Années.	Temps moy. à Paris.				Longit. vraie.				Latitude vraie.				
1672	21	Mai	8h	9′ 18″	2s	24°	9′	45″	Mémoires de l'Académie, 1766 & 1767.				
1673	4	Mai	7	53 25	2	5	52	5					
1683	13	Déc.	19	39 15	8	3	48	23					
1701	20	Sept.	22	57 28	5	12	23	55					
1731	15	Juil.	22	38 12	3	3	2	35	M. Caſſini.				
1744	29	Mai	8	51 52	3	2	0	0					
1750	16	Avr.	22	49 52	0	6	53	1					
1750	5	Oct.	1	19 42	7	7	18	19	1	50	23	A	Mém. 1753, p. 277.
1751	6	Mai	0	57 7	2	0	50	36	1	51	15	B	
1753	25	Sept.	22	47 51	5	15	41	35					
1758	9	Mai	1	22 54	2	10	1	46					
1759	19	Août	1	41 34	5	22	58	35					
1763	17	Nov.	18	30 8	7	6	13	34					

Années.	Temps moyen à Paris.			Longit. obſerv.						
1763	3 Juin	9h	28′ 28″	3s	5° 23′	1″				
1763	13 Nov.	18	0 49	7	2 41	28	2	22 21	B	
1764	24 Mai	8	7 50	2	26 50	35	1	51 11	B	
1764	17 Juil.	15	58 4	3	6 59	6	1	7 9	A	

TABLE des longitudes de Mercure en conjonction dans ſes douze paſſages ſur le Soleil, obſervés juſqu'à préſent.

	Temps moy. à Paris.				Long. réd. à l'écl.				Lat. géoc. vraie.			
1631	6 Nov.	19h	36′	20″	7s	14°	41′	35″	3′ 22″	B	*M. Caſſini, p. 592. Phil. Tranſ. n. 386.*
1631	6 Nov.	18	50	0	. . .	. .	. .	. .	4 28	B	*Mſſ. de M. de l'Iſle.*
1651	2 Nov.	13	2	30	7	10	26	29	12 0	A	*Aſtr. Br. p. 312. dout.*
1661	3 Mai	4	48	28	1	13	33	27	4 30	B	*M. Caſſini, p. 587, 608.*
1677	7 Nov.	0	23	0	7	15	44	20	4 3	B	*M. Caſſini, p. 591.*
1690	9 Nov.	18	6	0	7	18	20	46	12 20	B	*M. Caſſini, p. 595, 608.*
1697	2 Nov.	17	42	0	7	11	33	50	10 42	A	*M. Caſſini, p. 598.*
1723	9 Nov.	5	16	0	7	16	47	20	6 0	B	*Phil. Tranſ. n. 386. M. Caſſini, p. 601.*
1736	10 Nov.	22	59	23	7	19	23	38	14 7	B	*Mém. Ac. 1736.*
1740	2 Mai	10	36	37	1	12	43	19	14 59	B	*Phil. Tranſ. n. 471.*
1743	4 Nov.	22	26	8	7	12	37	32	9 7	A	*Mém. Ac. 1736.*
1753	5 Mai	18	29	50	1	15	48	0	2 25	A	*Mém. 1754, p. 599.*
1756	6 Nov.	16	17	28	7	15	13	41	0′ 58,8	A	*Mém. 1758, p. 154.*

OBSERVATIONS DE VÉNUS.

	Temps vrai à Paris.				Long. obſerv.			
271	av. J. C.	11 Oct.	14h	20′	5s	3° 36′		Dout.
127	de J. C.	11 Oct.	14	50	5	1 18		
129		19 Mai	14	15	0	11 37		D.
132		8 Mars	6	0	1	2 32		
134		17 Fév.	14	30	9	12 58		D.
136		18 Nov.	5	20	9	13 53		D.
136		25 Déc.	5	10	10	20 39		
138		15 Déc.	14	56	7	7 34		
140		18 Fév.	5	40	0	14 54		
140		29 Juil.	13	20	2	19 34		D.

De ces dix obſervations, il y en a cinq qui different entre elles de plus d'un degré; & la première s'écarte du calcul de plus de quatre degrés; ainſi il eſt difficile de pouvoir les faire ſervir à la théorie de Vénus. Voici une partie de ces obſervations telles que M. Caſſini les a employées, n'ayant pas fait aux obſervations de Ptolomée les corrections que j'ai indiquées ci-deſſus, *pag.* 393.

Années.	Temps vr. à Paris.	Lon. obſerv.	Latitude.
117 13 Oct.	16h 16′	5s 1° 43′½	. . . . *M.Caſ. p.534.*
129 18 Mai	16 8	0 10 33	1° 30′ A *M.Caſ. p.535.*
132 8 Mars	4 8	1 1 55	. . . . *p.536.*
134 17 Fév.	16 8	9 12 27	. . . . *Ibid.*
136 18 Nov.	4 0	9 12 50	. . . . *p.537.*
136 25 Déc.	4 0	10 20 14	. . . . *Ibid.*
138 15 Déc.	14 53	7 6 53	. . . . *p.538.*
140 18 Fév.	4 8	0 14 28½	. . . . *Ibid.*
140 29 Juil.	16 8	2 18 46½	. . . . *p.539.*
Nouv. Style.			
1585 24 Sept.	17 33	4 15 58	2 8 A *Aſ.Dan.p.407.*
1587 19 Janv.	4 58	11 13 5	1 38 B *Tyc.Ep. p.56.*
1587 24 Janv.	4 8	11 16 20	2 29 B *Ibid.*
1587 25 Janv.	3 58	11 16 55	2 39 B *Ib.Aſ.Dan.app.*
1587 3 Mars	5 23	11 16 1	8 56 B *Aſtr. Dan. app.*
1587 12 Mars	16 48	11 10 7	8 26 B *Ibid. app.*
1588 24 Déc.	18 58	5 17 10	3 10 B *Ibid. vr.*
1590 27 Déc.	19 18	8 20 0	0 27 B *Aſtr. Dan. vr.*
1592 22 Fév.	17 30	9 27 18	. . . . *Aſtr. Phil.*
1594 17 Déc.	5 0	10 22 58	1 7 A
1594 25 Déc.	4 28	10 21 0	1 16 A *Aſtr. Dan. vr.*
1600 21 Fév.	20 27	9 38 22	
1601 9 Mai	8 30	1 19 4	
1610 22 Déc.	3 58	10 17 58	1 29 A *Aſtr. Dan. vr*
1616 19 Mars	16 18	10 15 24	*Aſtr. Dan. vr.*

J'ai averti que dans les obſervations tirées de l'*Aſtr. Danica*, il paroît que l'on a employé une parallaxe trop forte.

Conjonctions

Conjonctions de Vénus au ſoleil, rapportées par M. Caſſini, pag. 561. auxquelles j'ai ajouté celles de 1639, 1691, 1751, 1761 & 1769.

Années.	T. vr. de la conjonc.	Longit. de Vénus.	Latit. géocent.
1639	4 Déc. 6 18′½ inf.	8ˢ 12° 31′ 55″	0ʰ 8′ 50″ ou 9′.
1689	25 Juin 13 46 inf.	3 4 53 40	3 1 40 B
1691	15 Nov. 11 4 ſup.	*par M. de la Hire.*	*Anc. Mém. T. X. p. 25.*
1692	3 Sept. 19 7 inf.	5 12 33 0	
1693	25 Juin 17 38 ſup.	3 5 5 35	17ʰ 30′½ *ſuiv. M. de la H.*
1696	1 Sept. 0 58 ſup.	5 9 52 55	1 21 20 B
1698	15 Avr. 22 2 ſup.	0 26 50 40	
1699	30 Janv. 7 6 inf.	10 11 14 47	7 36 0 B
1699	13 Nov. 12 0 ſup.	7 21 24 0	0 32 20 B
1700	2 Sept. 11 20 inf.	5 10 20 20	8 40 15 A
1705	21 Juin 22 0 inf.	3 0 36 52	2 25 10 A
1706	14 Avr. 9 45 ſup.	0 24 26 30	1 3 10 A
1707	28 Janv. 18 20 inf.	10 8 47 5	
1708	31 Août 0 30 inf.	5 8 2 0	
1709	22 Juin 6 0 ſup.	3 0 56 30	
1710	10 Avr. 18 7 inf.	0 20 55 0	
1711	27 Janv. 12 52 ſup.	10 7 33 51	
1712	28 Août 14 53 ſup.	5 5 43 34	
1713	19 Juin 15 15 inf.	2 28 29 35	
1714	12 Avr. 2 0 ſup.	0 22 15 38	
1715	26 Janv. 8 19 inf.	10 6 22 58	7 10 33 A
1716	28 Août 16 36 inf.	5 5 49 2	8 34 9 A
1718	8 Avr. 10 13 inf.	0 18 42 13	6 57 22 B
1719	10 Nov. 9 17 inf.	7 17 55 34	4 6 18 B
1729	14 Juin 23 56 inf.	2 24 11 16	1 26 53 A
1737	12 Juin 15 43 inf.	2 22 0 30	1 8 12 A
1751	31 Oct. 11 47⅓ inf.	7 8 13 0	5 23 1 A
1761	5 Juin 17 50⅓ inf.	2 15 36 10	0 9 30½ A
1769	3 Juin 10 13⅓ inf.	2 13 27 19	0 10 16,4 B

Digreſſions de Vénus, rapportées par M. Caſſini, p. 570.

Années.	Temps.	Digreſſion.	Anom. moy.	Diſt. de Vénus au ☉.
1689	4 Sept.	45° 57′ 20″	2ˢ 24° 16′	72432
1690	21 Nov.	47 13 20	2 14 26	72500
1691	5 Avr.	46 0 50	9 20 30	72432

Années.	Temps.	Digreſſion.	Anom. moy.	Diſt. de Vénus au ☉
1692	23 Juin	45° 23′ 30″	9ˢ 13° 30′	72419
1697	13 Avr.	45 36 0	7 5 20	71905
1697	4 Sept.	45 52 0	2 25 48	72382
1698	21 Nov.	47 14 20	2 15 35	72515
1699	10 Sept.	46 15 0	9 28 18	72532
1705	12 Avr.	45 48 50	7 3 16	71927
1705	28 Août	45 48 0	2 14 10	72479
1706	17 Nov.	47 10 40	2 9 8	72540
1707	9 Avr.	46 19 10	9 27 32	72540

	Temps moyen.	Longitude.
1746	21 Déc. 10ʰ 37′ 30″ t. m.	10ˢ 3° 52′ 17″ (1340).
1767	31 Juil. 2 58 51	5 23 6 45 (1318).
1769	7 Août 20 52 57	3 0 19 54 (1318).

OBSERVATIONS DE MARS.

Temps moyen à Paris.			Long. héliocent	Latitude.	
130	13 Déc.	11ʰ 48′	2ˢ 21° 22′ 50″	*M. Caſſini, p.* 467.	
135	19 Fév.	4 0	4 29 40 0	*Ibid.*	
139	26 Mai	9 1	8 2 53 0	*Ibid.*	
1580	28 Nov.	0 49	2 6 28 35	1 40	B *Kep. de St. M. p.* 90.
1583	7 Janv.	13 16	3 16 55 30	4 6	B
1585	9 Fév.	18 32	4 21 36 10	4 32 10	B
1587	16 Mars	6 41	5 25 43 0	3 41	B
1589	24 Avr.	5 41	7 4 23 0	1 12 45	B
1591	18 Juin	7 1	8 26 43 0	4 0	A
1593	4 Sept.	16 45	11 12 16 0	6 2 30	A
Selon mon calcul,		14 32	11 12 17 56		
1595	9 Nov.	23 57	1 17 31 40	0 8	B
Suiv. M. Caſſini,		22 8	1 17 32 48	*Elém. d'Aſ. p.* 489.	
1597	23 Déc.	15 12	3 2 28 0	3 33	B
1600	28 Janv.	13 20	4 8 38 0	4 30 50	B
1602	2 Mars	13 31	6 12 27 0	4 10	B
1604	7 Avr.	15 41	6 18 37 10	2 26	B *p.* 342
1608	3 Août	1 18	10 11 10 0	*Aſtr. Dan. p.* 342.	
1610	18 Oct.	16 8	0 25 30 0	*Ibid.*	

Voyez Képler, *de Stella Martis*, 90. Longomontanus, *Aſtr. Dan. pag.* 342. Boulliaud, *Aſtr. Phil. pag.* 287; Riccioli, *Aſtron. Reform. pag.* 316. On y trouve une obſervation faite 272 ans avant J. C. mais ſur laquelle on n'eſt pas d'accord.

Oppoſitions de Mars rapportées dans les tables de Halley.

Années.	Temps moy. à Paris.	Long. hélioc. rédt à l'écliptique.	Anom. moyenne de Mars.
1659	1 Déc. 11h 42′	2s 9° 51′ 2″	8s 29°
1662	9 Janv. 6 9	3 19 52 14	10 13
1666	18 Mars 12 15	5 28 39 49	1 4
1670	21 Juin 15 47	9 0 46 42	4 10
1672	8 Sept. 11 33	11 16 56 4	6 14
1674	12 Nov. 17 1	1 21 11 32	8 11
1676	25 Déc. 19 14	3 5 29 55	9 26
1679	30 Janv. 14 59	4 11 27 59	11 8
1781	4 Mars 16 27	5 15 16 16	0 18
1683	10 Avr. 23 40	6 21 39 18	2 0
1685	28 Mai 1 9	8 7 38 15	3 18
1687	8 Août 1 9	10 15 56 5	5 18
1689	21 Oct. 17 29	0 29 28 52	7 20
1691	11 Déc. 3 15	2 19 53 50	9 9
1694	17 Janv. 4 56	3 28 11 52	10 22
1696	20 Fév. 9 9	5 2 18 4	0 3
1698	26 Mars 18 29	6 7 4 17	1 13
1700	8 Mai 7 49	7 18 5 16	2 28
1702	8 Juil. 12 59	9 16 10 10	4 23
1704	26 Sept. 10 3	0 3 45 46	6 28
1711	8 Fév. 5 31	4 19 24 6	11 16
1713	13 Mars 13 3	5 23 20 30	0 27
1717	11 Juin 9 29	8 20 38 46	4 0

Années.	Temps moy. à Paris.	Long. hélioc. réd. à l'écliptique.	
1683	11 Avr. 0h 11′	6s 21° 41′ 30″	*M. Caſſini, p.* 465.
1687	8 Août 0 0	10 15 54 0	6 50 40A. *p.* 449.
1691	11 Déc. 3 8	2 19 54 28	*Ibid. p.* 472.
1694	17 Janv. 4 31	3 28 12 0	*Ibid. p.* 474.
1696	20 Fév. 9 15	5 2 18 8	*Ibid. p.* 472.
1698	26 Mars 18 0	6 7 4 18	*Ibid. p.* 474.
1700	8 Mai 7 38	7 18 5 0	*Ibid. p.* 472.
1702	8 Juil. 13 2½	9 16 10 23	*Ibid. p.* 474.
1709	4 Janv. 5 54	3 14 18 25	*Ibid. p.* 469.
1713	13 Mars 16 49½	5 23 30 30	*Ibid. p.* 470.
1715	21 Avr. 10 58½	7 1 9 30	*Ibid. p.* 464.
1717	11 Juin 9 10	8 20 37 15	*Ibid. p.* 465.
1730	5 Avr. 7 7	6 15 43 36	*Ibid. p.* 465.

Oppoſitions obſervées à Paris depuis quelques années

Années	Temps moy. à Paris.	Long. hélioc. réd. à l'écliptique.	Latit. de Mars.
1741	12 Janv. 8h 14′ 23″	3s 22° 49′ 16″	
1743	15 Fév. 19 17 40	4 27 16 32	*Mém. Ac.* 1755,
1745	21 Mars 14 19 17	6 1 34 44	*p.* 218.
1747	1 Mai 7 3 0	7 10 55 59	
1749	26 Juin 2 6 12	9 4 55 41	
1751	14 Sept. 8 28 0	11 21 35 0	
1753	16 Nov. 10 28 33	1 24 47 24	
1760	7 Mars 17 44 7	5 18 9 8	3° 58′ 57″ ½ B
1764	1 Juin 1 2 10	8 11 22 24	2 20 8 A
1768	25 Oct. 19 35 44	1 3 25 35	1 27 29 A

Obſervations de Mars hors de ſes oppoſitions, les trois premières ſont de M. de la Caille, Aſtron. Fund. *pag.* 244.

Temps vrai à Paris.	Long. géoc. réd. à l'écliptique.	Latitude géocen. de Mars.
1747 14 Mai 10h 50′ 43″	7s 6° 15′ 20″	0° 0′ 25½ B
1751 13 Sept. 11 8 38	11 21 48 6	5 33 16 A
1753 3 Nov. 9 31 46	1 29 29 38½	0 0 27½ A
1768 3 Déc. 8 47 24	0 27 11 47	0 33 57 B

OBSERVATIONS DE JUPITER.

Oppoſitions de Jupiter obſervées par divers aſtronomes.

Temps vrai à Paris.	Longitude.	Latitude géocen.
133 15 Mai 23h 3′	7s 23° 22′ 22″	Ces 3 Obſervations ſont tirées de Ptolomée.
136 1 Sept. 4 10	11 7 47 35	
137 8 Oct. 3 18	0 14 19 0	*M. Caſſini*, *p.* 416.
1520 28 Avr. 15 56	7 17 59 0	Ces 3 Obſervations ſont de Copernic.
1526 28 Nov. 1 58	2 15 51 0	
1529 30 Janv. 21 0	4 21 15 50	*M. Caſſini*, *p.* 416.
1583 V.S. 6 Sept. 17 13	11 23 33 22	1 34 53 A
1584 13 Oct. 7 20	1 0 22 0	
1585 18 Nov. 0 12	2 6 17 30	0 52 25 A

Années.	T. vrai à Paris.	Longitude.	Latitude géocent.	
1586	21 Déc. 16ʰ 2′	3ˢ 10° 19′ 4″	0° 8′ 17″	B
1588	22 Janv. 8 8	4 12 18 34	0 58 47	B
1589	21 Fév. 0 36	5 12 57 8	1 14 32	B
1590	23 Mars 12 20	6 12 54 30	1 32 6	B
1591	23 Avr. 19 6	7 13 7 20	1 17 10	B
1592	25 Mai 16 21	8 14 25 1	0 35 56	B
1594	5 Août 5 35	10 22 21 4	1 12 31	A
1595	12 Sept. 1 25	11 28 53 10	1 39 18	A
1596	18 Oct. 8 30	1 5 40 0	1 25 45	A
1607	17 Nov. 11 ½ *dout.*	0 4 10 0	Les 12 premieres obſ. furent faites par Tycho, les trois dernieres par Longomont.	
1610	30 Déc. 14 40	3 19 36 0		
1613	1 Mars 22 0	5 21 45 0		
1620 N.S.	7 Nov. 10 0	1 15 58 0	Ces 2 obſ. ſont de Gaſ. & & les 10 ſuiv. d'Hévélius.	
1633	17 Déc. 2 0	2 26 3 20		
1657	26 Déc. 13 40	3 5 54 37	0 9 30	A
1659	27 Janv. 11 18	4 8 8 56	0 48 43	B
1661	28 Mars 16 52	6 8 57 55	1 38 25	B
1666	15 Sept. 23 50	11 23 43 28	1 37 25	A
1667	23 Oct. 8 25	1 0 33 21	1 33 41	A
1671	31 Janv. 18 4	4 12 35 0	0 59 0	B
1672	2 Mars 12 10	5 13 18 13	1 28 27	B
1674	3 Mai 6 0	7 13 28 43	1 21 17	B
1676	8 Juil. 18 15	9 17 36 18	0 12 21	A
1678	21 Sept. 6 3	11 28 58 41	1 37 10	A

Oppoſitions de Jupiter obſervées à Paris.

(Voyez M. Caſſini, pag. 418).

	Temps vrai à Paris.	Longitude.	Latitude.	
1672	2 Mars 9ʰ 0′	5ˢ 13° 18′ 0″		
1673	2 Avr. 1 0	6 13 19 0	1° 37′ 15″	B
1683	5 Févr. 5 0	4 17 10 0		
1688	13 Juil. 12 ¼ *dout.*	9 22 15 50		
1689	19 Août 19 20	10 27 28 10		
1690	26 Sept. 7 18	0 4 5 40	1 39 40	A
1691	2 Nov. 13 30	1 10 52 0		
1692	6 Déc. 21 36	2 16 24 30		
1694	9 Janv. 3 0	3 20 1 3		
1695	9 Févr. 15 3	4 21 43 30	1 7 54	B
1696	11 Mars 4 28	5 22 8 23	1 34 10	B

Oppoſitions obſervées à Paris depuis quelques années

Années	Temps moy. à Paris.	Long. hélioc. réd. à l'écliptique.	Latit. de Mars.
1741	12 Janv. 8h 14′ 23″	3s 22° 49′ 16″	
1743	15 Fév. 19 17 40	4 27 16 32	*Mém. Ac.* 1755,
1745	21 Mars 14 19 17	6 1 34 44	*p.* 218.
1747	1 Mai 7 3 0	7 10 55 59	
1749	26 Juin 2 6 12	9 4 55 41	
1751	14 Sept. 8 28 0	11 21 35 0	
1753	16 Nov. 10 28 33	1 24 47 24	
1760	7 Mars 17 44 7	5 18 9 8	3° 58′ 57″ ½ B
1764	1 Juin 1 2 10	8 11 22 24	2 20 8 A
1768	25 Oct. 19 35 44	1 3 25 35	1 27 29 A

Obſervations de Mars hors de ſes oppoſitions, les trois premières ſont de M. de la Caille, Aſtron. Fund. *pag.* 244.

	Temps vrai à Paris.	Long. géoc. réd. à l'écliptique.	Latitude géocen. de Mars.
1747	14 Mai 10h 50′ 43″	7s 6° 15′ 20″	0° 0′ 25½ B
1751	13 Sept. 11 8 38	11 21 48 6	5 33 16 A
1753	3 Nov. 9 31 46	1 29 29 38½	0 0 27½ A
1768	3 Déc. 8 47 24	0 27 11 47	0 33 57 B

OBSERVATIONS DE JUPITER.

Oppoſitions de Jupiter obſervées par divers aſtronomes.

	Temps vrai à Paris.	Longitude.	Latitude géocen.
133	15 Mai 23h 3′	7s 23° 22′ 22″	Ces 3 Obſervations ſont tirées de Ptolomée.
136	1 Sept. 4 10	11 7 47 35	
137	8 Oct. 3 18	0 14 19 0	*M. Caſſini*, *p.* 416.
1520	28 Avr. 15 56	7 17 59 0	Ces 3 Obſervations ſont de Copernic.
1526	28 Nov. 1 58	2 15 51 0	
1529	30 Janv. 21 0	4 21 15 50	*M. Caſſini*, *p.* 416.
1583 V.S.	6 Sept. 17 13	11 23 33 22	1 34 53 A
1584	13 Oct. 7 20	1 0 22 0	
1585	18 Nov. 0 12	2 6 17 30	0 52 25 A

Années.	T. vrai à Paris.	Longitude.	Latitude géocent.	
1586	21 Déc. 16h 2′	3s 10° 19′ 4″	0° 8′ 17″	B
1588	22 Janv. 8 8	4 12 18 34	0 58 47	B
1589	21 Fév. 0 36	5 12 57 8	1 14 32	B
1590	23 Mars 12 20	6 12 54 30	1 32 6	B
1591	23 Avr. 19 6	7 13 7 20	1 17 10	B
1592	25 Mai 16 21	8 14 25 1	0 35 56	B
1594	5 Août 5 35	10 22 21 4	1 12 31	A
1595	12 Sept. 1 25	11 28 53 10	1 39 18	A
1596	18 Oct. 8 30	1 5 40 0	1 25 45	A
1607	17 Nov. 11 ½ dout.	0 4 10 0	Les 12 premieres obſ. furent faites par Tycho, les trois dernieres par Longomont.	
1610	30 Déc. 14 40	3 19 36 0		
1613	1 Mars 22 0	5 21 45 0		
1620 N.S.	7 Nov. 10 0	1 15 58 0	Ces 2 obſ. ſont de Gaſ. & les 10 ſuiv. d'Hévélius.	
1633	17 Déc. 2 0	2 26 3 20		
1657	26 Déc. 13 40	3 5 54 37	0 9 30	A
1659	27 Janv. 11 18	4 8 8 56	0 48 43	B
1661	28 Mars 16 52	6 8 57 55	1 38 25	B
1666	15 Sept. 23 50	11 23 43 28	1 37 25	A
1667	23 Oct. 8 25	1 0 33 21	1 33 41	A
1671	31 Janv. 18 4	4 12 35 0	0 59 0	B
1672	2 Mars 12 10	5 13 18 13	1 28 27	B
1674	3 Mai 6 0	7 13 28 43	1 21 17	B
1676	8 Juil. 18 15	9 17 36 18	0 12 21	A
1678	21 Sept. 6 3	11 28 58 41	1 37 10	A

Oppoſitions de Jupiter obſervées à Paris.

(Voyez M. Caſſini, pag. 418).

	Temps vrai à Paris.	Longitude.	Latitude.	
1672	2 Mars 9h 0′	5s 13° 18′ 0″		
1673	2 Avr. 1 0	6 13 19 0	1° 37′ 15″	B
1683	5 Févr. 5 0	4 17 10 0		
1688	13 Juil. 12 ¼ dout.	9 22 15 50		
1689	19 Août 19 20	10 27 28 10		
1690	26 Sept. 7 18	0 4 5 40	1 39 40	A
1691	2 Nov. 13 30	1 10 52 0		
1692	6 Déc. 21 36	2 16 24 30		
1694	9 Janv. 3 0	3 20 1 3		
1695	9 Févr. 15 3	4 21 43 30	1 7 54	B
1696	11 Mars 4 28	5 22 8 23	1 34 10	B

Années.	T. vrai à Paris.	Longitude.	Latitude.
1697	10 Avr. 17h 32′	6s 22° 1′ 15″	1° 35′ 22″ B
1698	12 Mai 5 46	7 22 20 32	1 9 32 B
1699	14 Juin 10 8	8 23 52 42	0 23 7 B
1700	19 Juil. 16 40	9 27 16 22	0 33 36 A
1701	25 Août 20 34	11 2 42 54	1 20 30 A
1702	2 Oct. 17 29	0 9 28 7	1 38 18 A
1703	8 Nov. 17 33	1 16 8 30	1 16 8 A
1704	12 Déc. 18 50	2 21 26 2	0 28 10 A
1706	14 Janv. 16 2	3 24 40 40	0 29 56 B
1707	14 Févr. 23 2	4 26 6 55	1 13 26 B
1708	16 Mars 9 9	5 26 23 51	1 36 52 B
1709	16 Avr. 0 49	6 26 19 0	1 32 58 B
1710	17 Mai 18 24	7 26 47 17	1 4 50 B
1711	20 Juin 6 37	8 28 36 0	0 15 50 B
1712	24 Juil. 21 25	10 2 20 10	0 40 25 A
1713	31 Août 6 9	11 8 2 16	1 25 26 A
1714	8 Oct. 0 26	0 14 53 2	1 38 10 A
1715	13 Nov. 20 19	1 21 23 13	1 11 8 A
1716	17 Déc. 12 31	2 26 20 43	0 19 26 A
1718	19 Janv. 1 55	3 29 17 20	0 35 45 B
1719	19 Févr. 4 3	5 0 31 18	1 17 30 B
1720	20 Mars 15 43	6 0 43 19	1 37 33 B
1721	20 Avr. 9 48	7 0 40 3	1 29 32 B
1722	22 Mai 8 43	8 1 17 41	0 57 15 B
1723	25 Juin 4 0	9 3 21 22	0 7 29 B
1724	30 Juil. 0 28	10 7 19 49	0 50 11 A
1725	5 Sept. 14 44	11 13 18 0	1 31 31 A
1726	13 Oct. 6 0	0 20 4 10	1 37 0 A
1727	18 Nov. 17 39	1 26 4 47	1 5 57 A
1728	22 Déc. 3 9	3 1 8 2	0 12 40 A
1730	23 Janv. 11 5	4 3 49 30	0 41 23 B
1731	23 Févr. 9 56	5 4 53 3	1 21 20 B
1732	24 Mars 22 4	6 5 0 27	1 36 40 B

Dans les tables de M. Halley, il y a de même une ſuite d'oppoſitions obſervées depuis 1658 juſqu'en 1719.

Oppoſitions calculées par M. le Gentil d'après les regiſtres de l'Obſervatoire. (Mém. acad. 1754, pag. 327).

Années.	Temps moyen à Paris.	Long. hélioc. réd. à l'écliptique.	Latitude géoc.
1733	24 Avr. 19h 6′ 4″	7s 5° 0′ 27″	1° 26′ 23″ B
1734	26 Mai 23 38 9	8 5 48 31	
1735	30 Juin 1 38 *dout.*	9 8 7 17	0 0 19 A
1736	4 Août 4 26 26	10 12 22 58	0 53 14 A
1738	18 Oct. 9 51 13*	0 25 18 25	1 33 34 A
1739	23 Nov. 16 4 22	2 1 30 6	0 58 59 A
1740	26 Déc. 18 48 49*	3 5 57 13	
1742	27 Janv. 22 2 56*	4 8 25 17	0 49 37 B
1743	27 Févr. 18 23 16*	5 9 18 37	1 25 42 B
1744	29 Mars 5 23 3	6 9 20 44	
1745	29 Avr. 4 52 18*	7 9 22 36	1 22 46 B
1746	31 Mai 13 1 8*	8 10 16 2	0 45 37 B
1747	4 Juil. 20 2 21	9 12 45 18	0 8 12 B
1748	9 Août 4 32 8	10 17 16 42	1 1 46 A
1749	15 Sept. 21 0 55	11 23 32 16	
1750	23 Oct. 11 11 55*	1 0 26 20	1 31 28 A
1751	28 Nov. 11 56 36	2 6 29 2	0 51 6 A
1752	31 Déc. 9 54 30	3 10 45 9	0 4 21 B
1754	1 Fév. 8 18 13	4 13 0 16	0 55 10 B
1755	4 Mars 1 53 22	5 13 42 53	

Les ſept oppoſitions marquées par des étoiles, ſont les ſeules où Jupiter ait été comparé à des étoiles fixes, dans les autres on ne s'eſt ſervi que du ſoleil.

Oppoſitions de Jupiter obſervées à Paris depuis quelques années.

	Temps moyen à Paris.	Long. hélioc. réd. à l'écliptique.	Latitude hélioc.
1756	2 Avr. 12h 52′ 29″	6s 13° 40′ 34″	1° 18′ 2 2″ B
1757	3 May 15 13 33	7 13 45 38	1 3 46 B
1758	5 Juin 4 53 0	8 14 49 13	0 29 34 B
1759	9 Juil. 19 3 40	9 17 35 14	0 13 11 A
1760	14 Août 10 3 23	10 22 24 33	0 55 5 A
1761	21 Sept. 6 9 15	11 28 54 10	1 18 6 A

Années.	T. moyen. à Paris.	Long. hèlioc. réd. à l'écliptique.	Latit. hélioc.
1762	28 Oct. 16h 5′ 17″	1s 5° 44′ 12″	1° 9′ 50″ A
1763	3 Déc. 10 38 0	2 11 34 57	0 34 44 A
1765	4 Janv. 23 25 53	3 15 30 1	0 12 16 B
1766	5 Fév. 15 59 2	4 17 27 48	1 1 32 B
1767	8 Mars 6 39 39	5 18 0 9	1 30 48 B
1768	6 Avr. 18 13 11	6 17 55 29	1 35 37 B
1769	8 Mai 0 50 0	7 18 6 38	1 13 37 B

Parmi les oppoſitions précédentes les huit premières ont été calculées par M. Jeaurat (*Mém. acad.* 1763, *pag.* 252 & années ſuivantes); j'ai conclu les quatre autres de mes propres obſervations.

OBSERVATIONS DE SATURNE.

Temps moyen à Paris,	Long. obſer.	Lieu du ſoleil.	Latit.
228 av. J.C. 1 Mars 4h 23′	5s 9° 6′	11 7 26	2° 45′ B
127 de J.C. 26 Mars 4 14	6 2 14	0 3 53	
133 3 Juin 2 8	8 10 42	2 10 33	
136 7 Juil. 22 9	9 15 17	3 14 5	
138 22 Déc. 6 11	10 10 19	9 0 20	

De ces cinq obſervations anciennes, il y en a trois d'où M. Caſſini a conclu, par des calculs différens le temps de l'oppoſition, c'eſt par celles-là que commence la ſuite des oppoſitions que nous allons rapporter.

Temps vrai de l'oppoſ.	Longitude.	Latitude.
127 25 Mars 10h 30′	6s 1° 20′ 58″	*M. Caſſini, Elém. d'Aſtr. p.* 354.
133 4 Juin 1 20	8 9 40 10	
136 9 Juil. 22 51	9 14 9 20	
1582 v. ſt. 20 Août 23 12	11 7 27 47	2° 1′ 53″ A *Ib.*
1583 4 Sept. 21 40	11 19 49 ½ dout.	2 22 36 A
1584 15 Sept. 6 30	0 2 34 0	
1585 28 Sept. 18 0	0 15 44 dout.	
1586 12 Oct. 9 0	0 29 6 5	2 45 32 A
1587 26 Oct. 7 0	1 12 49 44	2 21 38 A
1588 8 Nov. 8 32	1 26 47 30	
1589 22 Nov. 12 18	2 10 54 10	1 52 11 A
1590 6 Déc. 19 40	2 25 14 ½ dout.	
1591 20 Déc. 22 14	3 9 23 14	0 20 53 A

1593

Années.	T. vrai de l'oppoſ.	Longitude.	Latitude.	
1593	3 Janv. 1h 20″	3s 23° 32′ 0″	0° 13′ 16″	B
1594	17 Janv. 3 0	4 7 30 0	0 45 52	B
1595	30 Janv. 23 0	4 21 15 0		
1596	13 Fév. 10 28	5 4 38 12	1 57 23	B
1597	25 Fév. 19 0	5 17 45 30	2 22 35	B
1598	10 Mars 23 0	6 0 33 35		
1599	23 Mars 18 40	6 13 0 0		
1608 a. ſt.	19 Juil. 3 0	9 26 53 0		Ces obſervations ſont de Longomontanus. *Aſtron. réform.*
1609	31 Juil. 13 0	10 8 31 0		
1610	12 Août 12 0	10 20 10 0		
1611	25 Août 16 0	11 2 12 0		
1642	13 Sept. 11 25	11 21 37 27		Ces obſervations ſont du P. Riccioli. *Mém. Ac.* 1746. *M. Caſſini. p.* 356.
1642	28 Sept. 8 45	11 22 1 50		
1644	9 Oct. 19 12	0 17 38 0		
1647	20 Nov. 6 50	7 28 24 25		
1654	10 Fév. 19 0	4 22 54 0		Ces 2 obſ. furent faites par Muti à Majorque.
1657	21 Mars 23 0	6 2 18 0		
1657	22 Mars 9 29 1/5	6 2 11 5		*Mém. Ac.* 1746.
1658	3 Avr. 17 13	6 14 35 28	2 46 18	B
1659	16 Avr. 10 11	6 26 47 52	2 46 53	B
1660	27 Avr. 22 48	7 8 41 32	2 42 42	B
1661	10 Mai 6 2	7 20 22 24	2 26 30	B
1662	22 Mai 11 0	8 1 52 20	2 7 39	B
1664	14 Juin 13 4	8 24 27 27		
1665	26 Juin 15 23	9 5 43 51	0 47 27	B
1670	27 Août 7 20	10 3 44 1/6 dout.	1 55 52	A
1671	8 Sept. 8 56	11 16 5 0	2 18 13	A
1672	20 Sept. 12 39	11 28 42 22	2 35 13	A
1673	3 Oct. 21 4	0 11 37 8	2 45 18	A
1674	17 Oct. 12 0	0 24 52 40	2 47 51	A
1675	30 Oct. 7 10	1 8 28 0	2 39 14	A
1676	13 Nov. 7 36	1 22 19 40	2 22 15	A
1683	4 Fév. 23 32	4 16 57 15	1 15 58	B

La ſeconde obſervation de 1642 n'eſt point une oppoſition.

Les 15 oppoſitions précédentes furent obſervées par Hévélius à Dantzic. On trouvera dans les tables de M. Halley une ſuite d'oppoſitions de Saturne calculées par cet auteur, avec l'erreur de ſes tables, depuis 1657 juſqu'en 1719.

Oppoſitions de Saturne obſervées à Paris.

Années	T. vrai de l'opp.	Longitude.	Latitude.	
1685	3 Mars 4h 0′	5s 13° 48′ 40″	2° 13′ 45″	B
1686	16 Mars 10 28	5 26 47 6	2 34 3	B
1687	29 Mars 11 11	6 9 25 26	2 44 35	B
1688	10 Avril 6 26	6 21 44 40	2 48 15	B
1689	22 Avr. 21 34	7 3 48 53	2 45 4	B
1690	5 Mai 7 13	7 15 35 19	2 32 19	B
1691	17 Mai 13 45	7 27 10 30	2 15 35	B
1692	28 Mai 17 15	8 8 35 0	1 54 27	B
1693	9 Juin 19 32	8 19 54 41	1 27 7	B
1694	21 Juin 19 30	9 1 6 40	*douteuſe*	
1695	3 Juil. 23 45	9 12 29 52	0 25 14	B
1696	15 Juil. 3 32	9 23 51 26	0 7 16	A
1697	27 Juil. 9 43	10 5 20 15	0 40 56	A
1698	8 Août 19 8	10 16 59 0	1 13 36	A
1699	21 Août 8 54	10 28 50 50	1 39 44	A
1700	3 Sept. 3 14	11 10 57 40	2 7 30	A
1701	16 Sept. 2 0	11 23 21 16	2 27 45	A
1702	29 Sept. 8 51	0 6 9 30	2 41 5	A
1703	12 Oct. 20 12	0 19 14 21	2 48 15	A
1704	25 Oct. 11 48	1 2 36 23	2 45 38	A
1705	8 Nov. 9 40	1 16 18 35	2 32 25	A
1706	22 Nov. 10 37	2 0 16 23	2 10 53	A
1707	6 Déc. 15 3	2 14 24 27	1 40 9	A
1708	19 Déc. 19 26	2 28 37 11	1 4 0	A
1710	2 Janv. 23 47	3 12 50 16	0 25 24	A
1711	17 Janv. 1 4	3 26 54 36	0 16 26	B
1712	31 Janv. 0 6	4 10 51 12	0 56 20	B
1713	12 Fév. 19 4	4 24 33 34	1 32 10	B
1714	26 Fév. 8 15	5 7 56 46	2 3 0	B
1715	11 Mars 16 55	5 21 3 14	2 25 0	B
1716	23 Mars 19 4	6 3 48 1	2 40 34	B
1717	5 Avr. 16 27	6 16 13 56	2 47 40	B
1718	18 Avr. 8 45	6 28 24 13	2 46 36	B
1719	30 Avr. 20 15	7 10 17 42	2 39 15	B
1720	12 Mai 4 39	7 21 59 13	2 24 30	B
1721	24 Mai 9 17	8 3 28 12	2 4 20	B
1722	5 Juin 13 9	8 14 52 3	1 36 30	B

Années.	T. vrai de l'oppoſ.	Longitude.	Latitude.
1723	17 Juin 15h 53′	8ˢ 26° 12′ 6″	1 12 15 B
1724	28 Juin 17 53	9 7 29 35	0 39 0 B
1725	10 Juil. 21 6	9 18 49 40	0 7 5 B
1726	23 Juil. 1 42	10 0 13 33	0 25 20 A
1727	4 Août 9 54	10 11 48 7	0 58 15 A
1728	15 Août 22 50	10 23 36 50	1 29 32 A
1729	28 Août 14 18	11 5 35 2	1 56 20 A
1730	10 Sept. 12 27	11 17 53 57	2 19 6 A
1731	23 Sept. 15 51	0 0 30 50	2 36 55 A
1732	6 Oct. 0 26	0 13 27 20	2 47 0 A

Les obſervations précédentes ſont tirées des élémens d'aſtronomie de M. Caſſini : les 8 ſuivantes ſont celles dont M. le Monnier a fait uſage dans ſes recherches ſur Saturne, & qu'il a diſcutées avec le plus grand ſoin ; quoiqu'elles ne ſoient pas toutes en oppoſition, ce ſont néanmoins des longitudes réduites au ſoleil.

Temps moyen à Paris.	Longit. hélioc.	
1686 16 Mars 11h 10′ 30″	5ˢ 26° 46′ 38″	*Mém. Ac.* 1746. *p.* 217.
1672 21 Sept. 8 40 30	11 28 44 0	*Ibid. p.* 215.
1583 4 Sept. 8 33 15	11 19 55 28	*Ibid. p.* 699.
1598 13 Mars 11 9 30	6 0 39 10	*Ibid. p.* 222.
1701 16 Sept. 11 57 0	11 23 24 44	*Ibid. p.* 704.
1702 6 Oct. 11 33 55	0 6 22 51	*Ibid. p.* 709.
1716 17 Mars 12 37 16	6 3 33 33	*Ibid. p.* 219. 695.
1731 23 Sept. 8 40 30	0 0 29 5	*Ibid. p.* 215.

Temps moyen à Paris.	Longitude.	Latitude.
1733 19 Oct. 15h 42′ 39″	0ˢ 26° 45′ 26″	*Mém. Acad.* 1754.
1734 2 Nov. 10 46 0	1 10 18 50	*p.* 330.
1735 16 Nov. 12 6 18	1 24 10 53	
1737 13 Déc. 19 31 15	2 22 27 31	1° 21′ 40″
1738 28 Déc. 1 6 42	3 6 42 55	0 55 21
1740 11 Janv. 4 57 17	3 20 54 9	
1741 24 Janv. 5 33 57	4 4 55 12	0 38 38
1742 7 Fév. 3 3 18	4 18 44 22	1 18 5
1743 20 Fév. 18 23 38	5 2 16 56	1 50 24
1744 5 Mars 4 41 42	5 15 30 4	
1745 18 Mars 10 43 29	5 28 26 58	2 34 16

Années.	Temps moy. à Paris.	Longitude.	Latitude.
1746	31 Mars 10h 50′ 31″	6s 11° 3′ 44″	2 44 43
1747	13 Avr. 5 49 15	6 23 22 33	2 47 0
1748	24 Avr. 20 2 0	7 5 24 42	2 42 21
1749	7 Mai 6 8 17	7 17 12 31	2 30 43
1750	19 Mai 13 8 19	7 28 47 52	2 13 24
1751	31 Mai 17 6 55	8 10 14 46	1 50 15
1752	11 Juin 20 0 32	8 21 35 41	1 23 29
1753	23 Juin 22 17 24	9 2 53 49	0 53 28
1754	6 Juil. 1 10 57	9 14 13 0	
1755	18 Juil. 4 55 37	9 25 35 21	0 10 34 hélioc.

Les obſervations précédentes ſont tirées en partie des calculs de M. le Gentil, (*Mém. acad.* 1754), & en partie de ceux de M. de la Caille.

	Temps moy. à Paris.	Long. hélioc. réd. à l'écliptique.	Latitude. hélioc.	
1756	29 Juil. 11h 16′ 59″	10s 7° 5′ 59″	0 40 8	A
1757	10 Août 22 17 14	10 18 46 51	1 8 38	
1758	23 Août 12 25 30	11 0 40 44	1 35 47	
1759	5 Sept. 7 30 8	11 12 50 24	1 56 48	
1760	17 Sept. 8 10 42	11 25 18 7	2 30 16	géoc.
			2 14 15	hélioc.
1761	30 Sept. 14 7 7	0 8 4 21	2 42 58	géoc.
			2 25 0	hélioc.
1762	14 Oct. 1 25 5	0 21 9 53	2 29 40	
1763	27 Oct. 18 14 20	1 4 34 49	2 43 20	géoc.
1764	9 Nov. 15 46	1 18 17 37	2 30 40	
1765	23 Nov. 17 6	2 2 14 44	2 7 36	A
1766	7 Déc. 20 19	2 16 21 12	1 37 10	A
1767	22 Déc. 0 52	3 0 32 45	1 0 32	A
1769	4 Janv. 4 34	3 14 43 39	0 20 26	A
1770	18 Janv. 6 1	3 28 48 26	0 20 38	B

Les oppoſitions de 1760 & 1761 ſont tirées des obſervations de M. de la Caille qui s'étoit contenté de donner la latitude géocentrique obſervée; cinq autres ont été calculées par M. Jeaurat, qui en a déduit ſeulement la latitude héliocentrique; & j'ai obſervé les dernières avec un très-grand ſoin, pour ſervir de vérification à ce que j'ai dit des dérangemens ſinguliers de Saturne, (art. 1168).

LIVRE SEPTIEME.

DE LA LUNE.

1400. LA LUNE eſt après le ſoleil le plus remarquable de tous les aſtres; nous n'ayons parlé dans le premier livre que des apparences les plus générales de ſon mouvement (55), nous allons en ſuivre les circonſtances, & en donner l'explication détaillée.

Phaſes de la Lune.

Les premiers phénomènes que les hommes apperçurent dans le mouvement de la lune, furent les changemens de figure que nous appellons ſes *phaſes*, & dont nous avons déja donné quelque idée. Après avoir diſparu pendant quelques jours, la lune commence à ſe montrer le ſoir du côté de l'occident, peu après le coucher du ſoleil ſous la forme d'un filet de lumière, ou d'un croiſſant dont la lumière eſt foible, parce qu'elle eſt diminuée par l'éclat du crépuſcule. Hévélius n'a jamais obſervé la lune plutôt que 40 heures après ſa conjonction, ou 27 heures avant, (*Selenog. pag.* 276 & 408). Il ajoute que ſi la lune dans le premier cas avoit eu une déclinaiſon plus ſeptentrionale, étant au nord de l'écliptique, & qu'elle eût été en même temps périgée & dans les ſignes aſcendans, on auroit pu la voir 24 heures après la conjonction; mais l'aſſemblage de ces trois circonſtances eſt rare; on n'apperçoit guère la lune que le troiſième jour après ſa conjonction; quoique Képler ait dit qu'on pouvoit voir la lune, même en conjonction, lorſque ſa latitude eſt de 5 degrés (*Aſtr. Pars Opt. Cap.* 6, *pag.* 257). Ce croiſſant paroît donc au plus tard le 3e. jour du côté du couchant, & le ſoir à l'entrée de la nuit; ſes pointes ſont élevées & tournées à l'oppoſite du ſoleil; il devient un peu plus fort le lendemain, & dans l'eſpace de cinq à ſix jours il prend la forme d'un demi-cercle : la partie

lumineuſe eſt alors terminée par une ligne droite, & nous diſons que la lune eſt *dichotome*, (a) ou qu'elle eſt en quadrature, c'eſt ſon PREMIER QUARTIER.

Premier Quartier.

Après avoir paru ſous la forme d'un demi-cercle lumineux, la lune continue de s'éloigner du ſoleil & d'augmenter en lumière pendant 8 jours; elle paroît alors tout-à-fait circulaire; ſon diſque entier & lumineux brille pendant toute la nuit & c'eſt le jour de la PLEINE LUNE, ou de l'oppoſition: on la voit paſſer au méridien à minuit & ſe coucher dès que le ſoleil ſe leve, tout annonce alors qu'elle eſt directement oppoſée au ſoleil par rapport à nous, & qu'elle brille parce que le ſoleil l'éclaire en face & non pas de côté.

Pleine Lune.

Après la pleine lune, arrive le décours, qui donne les mêmes phaſes & les mêmes figures que nous venons d'indiquer en parlant de l'accroiſſement de la lune; elle eſt d'abord ovale, puis *dichotome* ou ſous la forme d'un demi-cercle, & c'eſt le DERNIER QUARTIER.

Dernier Quartier.

Bientôt le demi-cercle de lumière diminue & prend la forme d'un croiſſant qui devient chaque jour plus étroit, & dont les cornes ſont toujours du côté le plus éloigné du ſoleil; la lune alors ſe trouve avoir fait le tour du ciel, & ſe rapproche du ſoleil; on la voit ſe lever le matin un peu avant le ſoleil, dans la même forme qu'elle avoit le premier jour de l'obſervation elle ſe rapproche du ſoleil & ſe perd enfin dans ſes rayons, c'eſt ce qu'on appelle la NOUVELLE LUNE, ou la conjonction, autrefois la néoménie (b).

Nouvelle Lune.

1401. La meſure la plus naturelle du temps fut celle que préſentoient ces phaſes de la lune; cet aſtre en changeant tous les jours d'une manière ſenſible le lieu de ſon lever & de ſon coucher, en variant ſans ceſſe de figure, & recommençant enſuite un nouvel ordre de changemens tous ſemblables, offroit une règle publique & des nombres faciles, ſans le ſecours

(a) Διχότομος, *dimidiatus*, Δίχα *bis*, Τέμνω *ſeco*. Copernic ſe ſert du mot *Luna dividua*.

(b) Νέος *novus*, Μήν *Luna*.

de l'écriture, des calculs, des dates, des almanacs; les peuples trouvoient dans le ciel un avertiſſement perpétuel de ce qu'ils avoient à faire; les familles nouvellement formées, & diſperſées dans les pleines de Sennaar, ſe réuniſſoient ſans mépriſe au terme convenu de quelque phaſe de la lune.

Fête de la Néoménie.

La Néoménie ſervit à régler les aſſemblées, les ſacrifices, les exercices publics; ce culte & ces fêtes n'avoient pas la lune pour objet, mais pour indication. On comptoit la lune du jour qu'on commençoit à l'appercevoir. Pour la découvrir aiſément on s'aſſembloit le ſoir ſur les hauteurs; quand le croiſſant avoit été vu, on célébroit la néoménie ou le ſacrifice du nouveau mois qui étoit ſuivi de fêtes ou de repas. Les nouvelles lunes qui concouroient avec le renouvellement des quatre ſaiſons, étoient les plus ſolemnelles; il ſemble qu'on y trouve l'origine de nos quatre temps, comme on trouve celles de la plupart de nos fêtes dans les cérémonies des anciens, (*Caſali de comparatione rituum Chriſt. & Pagan*).

1402. On retrouve dans les hiſtoires de tous les peuples du monde cette coutume de ſe réunir ſur les hauts lieux ou dans les déſerts, d'obſerver la nouvelle phaſe, de célébrer la néoménie par des ſacrifices ou des prières; la ſolemnité particulière de la nouvelle lune qui concouroit avec les ſemailles, ou celle qui ſuivoit l'entière récolte des productions de la terre ſe trouve dans toutes les hiſtoires; les fêtes & les ſacrifices de la nouvelle lune & du commencement de chaque mois ſont rappellés en pluſieurs endroits de l'écriture, comme un ancien uſage: *Iſaiæ I*, 13. *Num. X*, 10. XXVIII, 11. *Reg.* I, 9. *v.* 12 & 20. *v.* 5. Spencer a fait une diſſertation toute entière pour prouver que les Juifs avoient reçu des Payens cet ancien uſage, Spencer cite à ce ſujet un grand nombre d'auteurs, & répond à toutes les objections. Jo. Spencer *de legibus Hebræorum ritualibus. Lipſiæ* 1605, *in*-4°. *l. III, c.* 1. *Diſſert.* 4. *pag.* 1043.

La nouvelle lune étoit annoncée par le bruit des trompettes, Judith VIII, 6. *Pſalm.* 80. *v.* 4. Scaliger *de emendatione temporum*, *l.* 3. *pag.* 223, édit de 1629 Horace fait mention de ces fêtes ſous le nom de *Triceſima ſabbata*, *l.* I, *ſat.* 9, *v.* 69. *Cœlo ſupinas ſi tuleris manus naſcente lunâ*, *l.* III, *od.* 23. Les Juifs obſervent encore la lune quand elle eſt nouvelle, & ils en font l'objet d'une cérémonie religieuſe. *Buxtorfi ſynagoga judaïca*, *Baſileæ in*-8° 1641, *c.* 17, *pag.* 336. De-là l'uſage de ſacrifier ſur les montagnes où on alloit pour obſerver la nouvelle lune. Cet uſage étoit déja dans l'Egypte, *Maimonid ou Moſſei dux dubitantium*, *l.* III, *c.* 46. auſſi-bien que celui de ſacrifier dans les nouvelles lunes, *ibid. c.* 47.

La fête de la nouvelle lune avoit lieu chez les Ethiopiens d'Afrique, *Itinerarium Alexandri Geraldini*, *Romæ* 1631, *l.* IX, *pag.* 150. Chez les Sabéens de l'Arabie heureuſe, *Hottinger*, *hiſtoria orientalis*, *l.* I, *c.* 8. *pag.* 279. *ed. in*-4°. 1660. Chez les Perſes, *Halcuit's*, *voyages tom.* II, *pag.* 399. Chez les Grecs, comme le prouve fort au long Jean Meurſius, *Græcia feriata*, *Lugd. Batav.* 1619, *in*-4°. *pag.* 210, au mot Νουμηνια. Les Olympiades établies par Iphitus commençoient à la nouvelle lune, Samuel Petit, *Leges Atticæ*, *in-fol.* 1635, *pag.* 59. Les Romains avoient auſſi cette fête, Macrobe *Saturn.* I, 15. *pag.* 181, *ed. de* 1694. La cérémonie du Guy chez les Gaulois ſe faiſoit à la nouvelle lune, & le Druïde portoit un croiſſant comme on le voit dans les figures anciennes. M. Pelloutier, hiſt. des Celtes à Berlin, 2 *vol. in*-12. On a trouvé cet uſage chez les Chinois, Scaliger *pag.* 118; parmi les Caraïbes de l'Amérique, *Huetii Demonſtratio evangelica* 1679, *in-fol. pag.* 84. Chez les Péruviens, Garciſaſo de la Vega, *Comentarios réales de los Incas* VII. 5 & 7. M. Goguet, I. 219, *in*-4°. Il étoit également chez les Turcs, *Geuffraus de Turcarum religione*, *l.* 2, *pag.* 53.

1403. Il ſe paſſe à peu-près 29 jours & demi d'une nouvelle lune à l'autre, c'eſt une obſervation facile,

&

& les premiers paſteurs ne manquerent pas de la faire; c'eſt ce qu'on appelle *mois lunaire*, LUNAISON, ou révolution ſynodique de la lune : nous en verrons bientôt une détermination rigoureuſe (1422). Cette lunaiſon fut la plus ancienne meſure du temps (58, 277).

Eclipſes de Soleil cauſées par la Lune.

1404. En obſervant avec tant d'exactitude les phaſes de la lune on dut remarquer naturellement que les éclipſes de ſoleil qui paroiſſent au moins tous les 4 à 5 ans, arrivent entre le dernier croiſſant d'un cours de lune fini & la première phaſe d'une nouvelle lune, c'eſt-à-dire, entre le temps où la lune s'approche le plus du ſoleil & celui où elle commence à s'en éloigner par le côté oppoſé : on apperçoit alors ſur le ſoleil un corps rond & parfaitement noir, on le voit ſe gliſſer peu à peu devant le diſque du ſoleil & en intercepter la lumière, du moins en partie; quelquefois ſe placer dans le milieu de ſon diſque, & y paroître environné d'une couronne de lumière; d'autres fois enfin le couvrir en entier & nous plonger dans les ténèbres, comme en 1724. (art. 1791).

Les premiers obſervateurs comprirent bientôt que ce corps obſcur ne pouvoit être autre choſe que celui de la lune qu'on avoit vu les jours précédens s'avancer de plus en plus vers le ſoleil, & qu'on voyoit enſuite un ou deux jours après ſe placer de l'autre côté ou à l'orient du ſoleil, & s'en éloigner avec la même vîteſſe.

Opacité de la Lune.

La lune après avoir intercepté la lumière du ſoleil en plein jour paroiſſoit abſolument noire & opaque; on comprit par-là qu'elle ne brilloit qu'autant qu'elle étoit éclairée, & que le côté qu'elle tournoit vers nous dans le temps d'une éclipſe de ſoleil ne pouvant recevoir aucune lumière du ſoleil, ne nous en rendoit aucune. C'eſt ainſi que les premiers obſervateurs dûrent comprendre que la lune étoit un globe opaque & maſſif qui n'avoit pas de lumière par lui-même, & qui n'étoit lumineux que dans la partie éclairée par le ſoleil; on voyoit d'ailleurs que la lune n'étoit jamais plus lu-

mineuſe & plus reſplendiſſante que quand elle étoit oppoſée au ſoleil, de manière à être vue de face, & à nous réfléchir toute la lumière que le ſoleil envoyoit ſur ſa ſurface ou ſur ſon diſque ; preuve qu'elle ne renvoyoit vers nous qu'une lumière empruntée.

Eclipſes de Lune.

1405. Quatorze ou quinze jours après une éclipſe de ſoleil, il arrive quelquefois une éclipſe de lune. Avant qu'elle commence on voit la lune pleine, ronde, lumineuſe & oppoſée au ſoleil ; elle ſe lève le ſoir au coucher même du ſoleil, elle paſſe toute la nuit ſur l'horiſon ; c'eſt le temps de l'OPPOSITION ou de la PLEINE LUNE, (1400) ; mais en peu de temps la lune perd cette grande lumière & diſparoît même pour quelque temps à nos yeux, on voit que la terre placée entre la lune & le ſoleil eſt l'obſtacle qui empêche la lune d'être alors éclairée par le ſoleil.

Explication des Phaſes.

La lune eſt donc un corps opaque & qui n'a point de lumière par lui-même, cela eſt démontré par les éclipſes de ſoleil & même par celles de la lune ; elle nous cache le ſoleil lorſqu'elle paſſe devant lui, & le cache de manière à nous jetter dans les plus profondes ténebres, comme cela eſt arrivé à Paris en 1724 : voyons donc de quelle manière elle eſt éclairée par le ſoleil.

Le ſoleil éclairant toujours la moitié du globe lunaire, nous ne pouvons voir la lune pleine que quand nous appercevons cette moitié qui eſt éclairée, & que nous l'appercevons toute entière ; ſi nous ſommes placés de côté, enſorte que nous ne puiſſions voir que la moitié de la partie éclairée, c'eſt-à-dire, de l'hémiſphère expoſé au ſoleil, nous ne verrons que la moitié de ce qui paroiſſoit dans la pleine lune, c'eſt-à-dire, que nous ne verrons qu'un demi-cercle de lumiére ; la lune paroîtra en quartier, & ainſi des autres ſituations ; telle eſt la cauſe des phaſes de la lune, que nous allons tâcher de rendre plus ſenſible.

Hémiſphère éclairé & hémiſphère viſible.

1406. Soit *S* le ſoleil, (*fig.* 80) *T* la terre autour de laquelle tourne la lune dans ſon orbite ; *EO* le

Fig. 80.

gſobe de la lune placé entre la terre & le ſoleil, c'eſt-à-dire, en CONJONCTION, ou au temps de la nouvelle lune; alors la partie *E* eſt ſeule éclairée du ſoleil; au contraire la partie *O* eſt la ſeule viſible pour nous qui ſommes en *T*: ainſi *l'hémiſphère éclairé* eſt préciſément celui que nous ne voyons point, & *l'hémiſphère viſible* eſt celui qui n'eſt point éclairé du ſoleil, telle eſt la cauſe qui rend alors la lune inviſible pour nous, vers le temps de la nouvelle lune (1400). Fig. 80.

Au contraire, quand la lune eſt oppoſée au ſoleil, l'hémiſphère éclairé *L* eſt préciſément celui que nous voyons, parce que nous ſommes placés du même côté que le flambeau dont elle eſt éclairée, & il n'y a rien de perdu pour nous de la lumière que la lune répand; ſon diſque viſible *L* eſt le même que ſon diſque éclairé; c'eſt pourquoi la lune nous paroît pleine, c'eſt-à-dire, ronde & lumineuſe, quand elle eſt en OPPOSITION.

Quand la lune eſt éloignée de 90 degrés du ſoleil ou environ, c'eſt-à-dire à peu-près à moitié chemin de *O* en *L* ou de la *conjonction* à *l'oppoſition*, l'hémiſphère viſible eſt *AQZ*; l'hémiſphère éclairé par le ſoleil eſt *MZQ*; ainſi nous ne voyons que la moitié de cet hémiſphère éclairé, qui paroiſſoit tout entier & comme un cercle complet dans le temps de l'oppoſition; nous ne voyons donc qu'un demi-cercle de lumière, tel qu'il eſt repréſenté ſéparément en *N*; la rondeur lumineuſe étant toujours du côté du ſoleil.

1407. Lorſque la lune eſt à 45° du ſoleil, nous diſons qu'elle eſt dans ſon PREMIER OCTANT, alors la partie éclairée ou qui regarde le ſoleil eſt *CDF*, la partie viſible eſt *BCD*; ainſi nous n'appercevons que la partie *CD* de l'hémiſphère éclairé: alors la lune paroît ſous la forme d'un croiſſant, tel qu'on le voit en *G*, nous ne voyons alors que la huitième partie du globe lunaire, & la lune eſt éloignée du ſoleil de la huitième partie d'un cercle: c'eſt ce qui a fait appeller cette phaſe un *octant*; mais la partie éclairée n'eſt Des Octans.

Fig. 80. qu'à peu-près la ſeptième partie de la ſurface de ſon diſque viſible.

Dans le SECOND OCTANT, qui arrive après la quadrature, l'hémiſphère viſible eſt *HIK*, l'hémiſphère éclairé par le ſoleil eſt *IKP*; ainſi il ne manque à notre vue que la petite portion *IH*, pour que nous puiſſions voir la partie éclairée toute entière; nous verrons alors plus de la moitié du diſque lunaire, & la lune paroîtra ſous la forme *R*; ce qui manque à ſon cercle eſt de la même grandeur que la partie éclairée dans le premier octant, quand la lune étoit en *C*.

Le troiſième octant *V* qui arrive 45° au-delà de l'oppoſition, eſt ſemblable au ſecond octant; & le quatrième octant *X* eſt pareil au premier octant *G*.

Calcul de la portion éclairée.

1408. Pour calculer exactement la portion lumineuſe & viſible du diſque lunaire, ſoit *S* le ſoleil (*fig.* 81), *T* le centre de la terre, *C* le centre de la lune, *AE* le diamètre de la lune, perpendiculaire au rayon du ſoleil, & qui ſépare la portion éclairée *ANE*, de la portion obſcure *ADE*; le diamètre lunaire *ND* perpendiculaire au rayon *TC* de la terre, ſépare la partie viſible *DAN* de la partie inviſible *DEN*; on abaiſſera de l'extrémité *A* du demi-cercle lumineux *ENA* une perpendiculaire *AB* ſur le diamètre *ND* de la lune, & la ligne *NB* ſera la largeur apparente de la partie viſible de l'hémiſphère lumineux; en effet, de tout l'hémiſphère lumineux *ANE* il n'y a que la partie *AN* qui ſoit compriſe dans l'hémiſphère viſible *DAN*, & l'arc *AN* ne peut paroître à nos yeux que de la largeur *BN*, par la même raiſon que le demi-cercle entier *NAD* ne paroît que comme un ſimple diamètre *NBD*, & qu'un hémiſphère entier ne paroît que comme un cercle ou un plan dont il eſt la projection (1827). La portion *NB* du diamètre viſible *NBCD*, eſt le ſinus verſe de l'arc *NA*; cet arc *NA*, ou l'angle *NCA*, eſt égal à l'angle *CTF*, en ſuppoſant *TF* parallele à *CS*; car l'angle *NCA* eſt le complément

Fig. 81.

de l'angle *FCT*, à cauſe de l'angle droit *NCT*; mais l'angle *FCT* eſt le complément de l'angle *FTC* à cauſe du triangle rectangle *CFT*; donc l'angle *NCA* eſt du même nombre de degrés que l'angle *FTC*; cet angle *FTC* eſt égal à l'élongation de la lune ou à la diſtance de la lune au ſoleil, parce que le ſoleil eſt ſuppoſé ſur la ligne *TF* de même que ſur la ligne *CS*, à cauſe de la diſtance qui eſt prodigieuſe en comparaiſon de *CF*, donc l'arc *NA* eſt égal à l'élongation de la lune; donc dans les différentes phaſes de la lune *la largeur du ſegment lumineux de la lune, eſt égale au ſinus verſe de l'angle d'élongation*, en prenant pour rayon le rayon même du diſque de la lune, ou la demi-diſtance des cornes du croiſſant. Par exemple, quand la lune quatre à cinq jours après ſa conjonction, eſt à 60° du ſoleil, ſa partie lumineuſe *NB* paroît la moitié du rayon *NC* ou le quart du diamètre entier *ND* de la lune, parce que le ſinus verſe de 60° dans un cercle quelconque eſt la moitié du rayon de ce cercle. Si le diſque lunaire eſt exprimé par un cercle *GNH* (*fig.* 83), dont *C* ſoit le centre, *NB* égal à la moitié du rayon *CN*, on aura *NB* pour la largeur du croiſſant de la lune, à 60 degrés d'élongation.

Meſure de la partie lumineuſe.

Planche VII. Fig. 83.

1409. Les réflexions précédentes font voir que ce n'eſt pas exactement le ſinus verſe de l'élongation, mais plutôt le ſinus verſe de l'angle extérieur du triangle formé au centre de la lune par les rayons qui vont au ſoleil & à la terre. En effet, nous avons ſuppoſé dans la démonſtration précédente, que les lignes *CS* & *TF* menées au ſoleil, ſoit de la terre, ſoit de la lune, étoient ſenſiblement paralleles; cela n'eſt vrai qu'à peu-près, & à cauſe de la grande diſtance du ſoleil qui eſt 360 fois plus loin de nous que la lune. (*Voyez livre IX*); mais ſi les rayons *ST* & *SV* (*fig.* 82) qui vont du ſoleil à la terre & à la planète ne ſont pas paralleles, on aura l'angle extérieur *TVO* du triangle *SVT* égal à l'angle *NVA*: l'un & l'autre étant le complément de l'angle *AVT*; or la partie

Fig. 82.

Règle plus générale.

éclairée & visible *NB* est égale au sinus verse de l'angle *NVA*, donc le diamètre entier est à la largeur de la partie éclairée & visible d'une planète, comme le diamètre du cercle est au sinus verse de l'angle au centre de la planète, extérieur au triangle formé au soleil à la terre & à la planète.

Planche VII. Fig. 83.

1410. La courbure *GBH* (*fig.* 83) qui forme l'intérieur du croissant est une *ellipse*, dont le grand axe *GH* est égal au diamètre même du disque lunaire : pour le prouver nous nous contenterons d'observer que *GBH* est la circonférence du cercle *terminateur* de la lumière & de l'ombre, ou du cercle qui sépare l'hémisphère éclairé de l'hémisphère obscur de la lune ; ce demi-cercle est vu de côté, sous une inclinaison qui est le complément de l'angle d'élongation, c'étoit l'angle *ACT* (*fig.* 81) : or un cercle vu obliquement paroît toujours sous la forme d'une ellipse (1828), comme on le verra dans le Xe. livre ; donc *GBH* étant une circonférence vue obliquement doit paroître le contour d'une ellipse.

Je dis encore que son grand axe est le diamètre même *GH* du disque lunaire ; car tous les grands cercles d'un globe se coupent en deux parties égales, ainsi le cercle visible *GNH* & le cercle terminateur *GBH* sur le globe de la lune se coupent en deux parties égales, & en deux points diamétralement opposés, donc le diamètre *GCH* est la commune section de ces deux cercles. C'est pourquoi les cornes *G* & *H* du croissant sont toujours éloignées entre elles d'un demi-cercle, & l'on peut en tout temps mesurer le diamètre de la lune en mesurant la distance des cornes.

Quantités négligées.

1411. J'ai négligé dans l'article 1408 la petite erreur qui peut provenir de ce que les rayons menés du soleil à la lune & à la terre, ne sont pas exactement paralleles entr'eux ; mais la différence ou l'angle que ses rayons font en divergeant n'est que d'environ un sixième de degré, il est insensible dans ces sortes de calculs. J'ai négligé de même la différence entre les grosseurs du soleil & de la lune, qui fait que le soleil

éclaire toujours un peu plus de la moitié du globe lunaire, mais la différence ne va qu'à un degré de la circonférence de la lune de chaque côté. On pourroit remarquer auſſi que nous ne voyons pas la moitié de la lune ; mais la différence qui en réſulte ſur le diamètre apparent de la lune, ne va pas à un quinzième de ſeconde : car le ſinus verſe d'un arc de 15 minutes, 0, 0000096 n'eſt pas la cent millieme partie du rayon ; ainſi nous n'inſiſterons point là-deſſus.

1412. On voit diſtinctement après la nouvelle lune que le croiſſant qui en fait la partie la plus lumineuſe, eſt accompagné d'une lumière foible répandue ſur le reſte du diſque, qui nous fait entrevoir toute la rondeur de la lune ; & qu'on appelle LA LUMIÈRE CENDRÉE. Lumière cendrée.

La terre réfléchit la lumière du ſoleil vers la lune, comme la lune la réfléchit vers la terre : quand la lune eſt en conjonction pour nous avec le ſoleil, la terre eſt pour elle en oppoſition ; c'eſt proprement pleine terre pour l'obſervateur qui ſeroit dans la lune, comme dit *Hévélius*, & la clarté que la terre y répand eſt telle que la lune en eſt illuminée beaucoup plus que nous ne le ſommes par un beau clair de lune qui nous fait appercevoir tous les objets. La lune étant bien plus petite que la terre, la lumière que la terre y répand doit être bien plus grande que celle qu'elle en reçoit, il n'eſt donc pas étonnant que la lune puiſſe la réfléchir juſqu'à nous, & que cette lumière nous faſſe voir la lune. Nous l'appercevrions toute entière lorſqu'elle eſt en conjonction, ſi le ſoleil que nous voyons en même temps n'abſorboit entiérement cette lueur terreſtre réfléchie ſur le globe lunaire, & n'empêchoit alors de voir la lune ; mais quand le ſoleil eſt couché & le crépuſcule preſque fini, nous appercevons très-diſtinctement la lumière cendrée.

Les anciens eurent beaucoup de peine à expliquer la cauſe de cette lumière ſecondaire ; les uns l'attribuoient à la lune même, ou tranſparente, ou phoſphorique. Les

autres aux étoiles fixes (*Riccioli Almag. novum I.* 199). Képler aſſure que Tycho l'attribuoit à la lumière de Vénus ; & que Mœſtlinus ſon maître fut le premier qui expliqua en 1596 la véritable cauſe de cette lumière cendrée. (Képler, *Aſtr. pars optica*, *pag.* 254) ; il y a des Italiens qui attribuent cette remarque à *Leonardo del Vinci* célébre peintre Toſcan mort en 1518, & le P. Friſi m'a aſſuré qu'elle ſe trouve dans un de ſes manuſcrits ſur les Rivieres, que l'on conſerve à Londres. Galilée en donna la même explication (*Sidereus nuncius* 1610, *pag.* 26), comme l'ayant trouvée depuis pluſieurs années ; quoi qu'il en ſoit, la cauſe eſt depuis long-temps de la dernière évidence. (Hevel. *Selenog.* 288, 400).

Cette lumière paroît beaucoup plus vive quand on ſe place près d'un mur, de manière à ne point voir la partie lumineuſe de la lune, qui efface un peu la lumière cendrée ; celle-ci eſt ſuffiſante alors pour nous faire diſtinguer les grandes taches de la lune, telles que la mer des criſes, ſur-tout vers le troiſième jour de la lune, & le matin aux environs de l'équinoxe du printemps.

Quoique la lumière cendrée doive aller en diminuant, du jour même de la nouvelle lune, c'eſt cependant vers le troiſième jour qu'elle eſt la plus ſenſible pour nous, parce que la lune eſt alors plus dégagée des rayons du ſoleil ; c'eſt auſſi aux environs de l'équinoxe du printemps, quand la lune ayant une grande latitude ſeptentrionale ſe couche long-temps après le ſoleil, que cette lumière eſt la plus ſenſible. Elle diſparoît preſque entiérement quand la lune eſt en quadrature, 1°. Parce que la terre envoye alors quatre fois moins de rayons vers la lune, 2°. Parce que la phaſe de la lune devenue 4 à 5 fois plus grande nous empêche de la diſtinguer. Par la même raiſon cette lumière cendrée paroît un peu plus vive ſuivant le témoignage d'Hévélius, quand la lune eſt dans ſon décours, & qu'elle paroît le matin, quoiqu'à même diſtance du ſoleil &

à



68.



Fig. 69.



Fig. 70.



Fig. 72.



Fig. 73.



Fig. 74.



Fig. 77.





Fig. 78.







Fig. 79.



Fig. 80.



Fig. 81.

à pareille phaſe, parce que la lumière de la partie orientale de la terre eſt plus vive, tandis que celle de la partie orientale de la lune eſt un peu plus foible à cauſe des taches obſcures qui s'y trouvent; d'ailleurs la prunelle eſt plus dilatée après les ténèbres de la nuit qu'après l'éclat du grand jour. (Hevel. *Senelog. pag.* 307, 399).

La lumière cendrée eſt cauſe d'un autre phénomène optique, fort ſenſible, & qu'Hévélius explique aſſez mal par la compreſſion de la lumière (*pag.* 287), c'eſt la dilatation apparente du croiſſant lumineux, qui paroît être d'un diamètre beaucoup plus grand que le diſque obſcur de la lune; cela vient de la force d'une grande lumière placée à côté d'une petite, l'une efface l'autre, & la tue comme diſent les peintres à l'occaſion des couleurs, le croiſſant paroît enflé par un débordement de lumière qui s'éparpille dans la rétine de l'œil, & élargit le diſque de la lune; l'air ambiant éclairé par la lune augmente encore cette illuſion.

Lumière de la Lune.

1413. La lumière de la lune n'eſt accompagné d'aucune chaleur, M. Tſchirnauſen avec ſes verres brûlans ne put la rendre ſenſible (*Hiſt. acad.* 1699, *pag.* 94). M. de la Hire le fils expoſa le miroir concave de l'obſervatoire qui a 35 pouces de diamètre aux rayons de la pleine lune, lorſqu'elle paſſoit au méridien dans le mois d'Octobre 1705, & il raſſembla ces rayons dans un eſpace 306 fois plus petit que dans l'état naturel: cependant cette lumiere concentrée ne produiſit pas le moindre effet ſur le thermométre de M. Amontons, qui étoit très-ſenſible; (*Mém. Acad.* 1705 *pag.* 346).

1414. M. Bouguer a trouvé par expérience que la lumiere de la lune eſt 300 mille fois moindre que celle du ſoleil, & cela en les comparant l'une & l'autre avec la lumiere d'une bougie placée dans l'obſcurité. (*Tr. d'Opt. ſur la gradat. de la lumiere*, *in*-4°, 1760, *pag.* 89).

DE LA RÉVOLUTION DE LA LUNE.

1415 Les plus anciens Philoſophes comprirent d'abord que la lune tournoit chaque mois tout autour de la terre, qu'elle en étoit la compagne; &, comme nous diſons actuellement, *le Satellite*; Ariſtote, au rapport d'Averroës, diſoit que la lune lui paroiſſoit comme une terre éthérienne; on peut voir dans Macrobe & dans Plutarque, tout ce que les Philoſophes avoient dit à ce ſujet.

Toutes les raiſons qu'on a eu de changer l'ancienne opinion par rapport au mouvement des planètes ceſſent par rapport à la lune; on voit évidemment qu'elle paroit tourner autour de la terre, & on ne voit aucune objection qui puiſſe nous faire abandonner cet idée; ainſi il ne s'agit plus que de connoître la durée de ſa révolution; nous allons la rechercher à peu-près: mais pour la connoître bien exactement, il faudra dans la ſuite faire uſage de la connoiſſance que nous aurons acquiſe de ſes inégalités.

Les premiers Obſervateurs dûrent reconnoître bien facilement que dans l'eſpace de 59 jours la nouvelle lune arrivoit deux fois, en ſorte que la durée d'une lunaiſon étoit de 29 jours & demi; mais cette règle à peu-près vraie, étoit ſujette à pluſieurs exceptions & à pluſieurs inégalités qu'on ne développa que bien longtemps après.

Cycle de Méton.

1416. La première connoiſſance exacte que l'on ait eue dans la Grèce du mouvement de la lune, ou de la durée exacte de ſa révolution, fut celle que donna Méton, qui vivoit environ 430 ans avant J. C. Il avoit reconnu ou plutôt il avoit appris des Orientaux qu'en 19 années ſolaires il ſe paſſoit 235 mois lunaires complets; & cette détermination n'eſt en défaut que d'un jour ſur 309 ans

(1559); ainſi la règle de Méton étoit aſſez exacte pour les uſages de la ſociété.

Cette découverte parut ſi belle à Athènes & dans pluſieurs villes de la Grèce qu'on en expoſa le calcul en lettres d'or dans des endroits publics, pour l'uſage des citoyens, & qu'on appella *nombre d'or* cet eſpace de 19 ans qui ramenoit exactement la lune en conjonction avec le ſoleil au même point du ciel, ou au même jour de l'année ſolaire; c'eſt encore aujourd'hui le cycle lunaire (1556).

1417. Calippus remarqua 330 ans avant J. C. que le cycle de Méton avoit un quart de jour de trop, il y ſubſtitua une période quadruple, ou de 76 ans, dans laquelle il ne mettoit que 27759 jours au lieu de 27760 qu'il y avoit dans quatre cycles de Méton, (*Doctrina temporum l. II, c.* 16).

Hipparque apperçut enſuite que dans 4 périodes calippiques ou 304 ans, le retour étoit plus exact, & de 3760 mois lunaires; c'eſt ce que Cenſorinus appelle l'année d'Hipparque (*Doct. tempor. II*, 33. *Cenſorinus, c.* 18, *pag.* 95); mais Hipparque y ſubſtitua lui-même dans la ſuite la période plus exacte de 126007 jours, & une heure, pour 4267 lunaiſons, ce qui donnoit pour chacune $29^j\ 12^h\ 44'\ 3''\ 26222$ (Ptolomée IV, 2).

1418. Ce mois ſynodique (a) de $29^j\ 12^h$, qu'on appelle auſſi lunaiſon, ne finit que quand la lune après avoir fait le tour du ciel eſt revenue en conjonction avec le ſoleil; mais dans cet intervalle de temps le ſoleil a fait lui-même 29° par ſon mouvement propre d'Occident en Orient; ainſi la lune a fait 29° de plus que le tour entier du ciel; d'où il eſt aiſé de voir qu'elle n'auroit employé que 27 jours & un tiers à faire les 360°, c'eſt-à-dire, à revenir à un même point du ciel; c'eſt cette révolution de 27^j & un tiers qu'on appelle MOIS PÉRIODIQUE (b), & c'eſt celui que nous

Mois ſynodique & Mois périodique.

(a) Σὺν, *cum* ὁδὸς, *via*; parce que c'eſt le retour de la Lune au Soleil (1173).

(b) Περὶ, *circum*, ὁδὸς, *via*; parce que c'eſt la révolution complette autour de la Terre.

allons déterminer par les anciennes obſervations.

1419. La plus ancienne obſervation que nous avons eſt une éclipſe de lune obſervée à Babylone par les Caldéens, la première année de la captivité des Juifs ſous Salmanazar, au temps d'Ezéchias & de Tobie, elle ſe rapporte au 19 Mars 720 avant J. C. $6^h\ 48'$ au méridien de Paris, ſuivant le calcul de M. Caſſini; car je ne trouve que $6^h\ 0'$, de même que M. Dunthorn (*Philoſ. tranſ. vol.* 46); le lieu de la lune oppoſé à celui du ſoleil étoit, ſuivant M. Caſſini, $5^s\ 21^\circ\ 27'$. Il compare cette éclipſe à celle du mois de Septembre 1717, dans laquelle le lieu de la lune s'eſt trouvé de $11^s\ 27^\circ\ 34'$ le 9 Septembre (*v. ſtyle*) à $6^h\ 2'$ du ſoir; l'intervalle eſt de 2437 années, dont 609 ſont biſſextiles, plus 174 jours; ou de 890288 jours, moins 46 minutes: pendant ce temps il y a eu 32585 révolutions de la lune, plus $6^s\ 6^\circ\ 7'$; ce qui donne la révolution moyenne de la lune à l'égard des équinoxes de $27^j\ 7^h\ 43'\ 5''$. (M. Caſſini, *Elém. d'aſtron. pag.* 293).

1420. Cette détermination eſt la plus exacte que l'on puiſſe trouver par des obſervations éloignées; il n'y auroit d'autre correction à y faire que celle qui provient des différentes inégalités de la lune dans ces deux obſervations; mais la lune étoit dans les deux cas à peu-près à la même diſtance de ſes apſides, comme l'on pourra s'en aſſurer quand nous aurons parlé du mouvement de l'apogée; il nous ſuffira de dire qu'après beaucoup de recherches ſemblables, cette révolution périodique s'eſt trouvée de $27^j\ 7^h\ 43'\ 4''\ 6480$, par rapport aux équinoxes pour le commencement de ce ſiècle-ci on en conclut le mouvement diurne de la lune $13^\circ\ 10'\ 35'',02847$ le mouvement ſéculaire $10^s\ 7^\circ\ 53'\ 35''$. Le mouvement ſéculaire par rapport aux étoiles $1732559381''$ en comptant les 1336 révolutions completes de la lune qu'il y a dans un ſiècle.

Révolution de la Lune par rapport aux équinoxes.

1421. Il faut ajouter environ $7''$ à la révolution de la lune que nous venons de trouver, quand on veut avoir la révolution moyenne de la lune par rap-

port aux étoiles fixes, parce que dans l'eſpace d'un mois lunaire les équinoxes rétrogradent d'environ 4″ de degré, en ſorte que la lune rencontre plutôt l'équinoxe qu'elle n'eût rencontré une étoile fixe ſituée au même point du ciel (1160), & la différence eſt pour la lune de 7″ de temps. La révolution moyenne ſidérale de la lune eſt de $27^j\ 7^h\ 43'\ 11''\frac{1}{4}$ de temps moyen. Par rapport aux étoiles.

Connoiſſant la révolution périodique avec exactitude, il eſt aiſé de trouver la révolution ſynodique, c'eſt-à-dire, par rapport au ſoleil, ou la durée d'une lunaiſon moyenne, en diſant : *la différence des mouvemens de la lune & du ſoleil, eſt au mouvement de la lune ſeule, comme la révolution périodique eſt à la révolution ſynodique.* En effet, le mouvement de la lune par rapport au ſoleil ou la différence des mouvemens du ſoleil & de la lune eſt ce qui détermine la longueur du mois ſynodique, tandis que le mouvement de la lune ſeule détermine le mois périodique ; ces deux mois ſont donc entr'eux dans la raiſon inverſe de ces mouvemens, c'eſt-à-dire, comme le mouvement abſolu de la lune eſt à ſon mouvement relatif ou par rapport au ſoleil. Révolution ſynodique.

Ptolomée ſuppoſoit la révolution ſynodique ou le mois lunaire de $29^j\ 12^h\ 44'\ 3''\ 26222$, Boulliaud de $29^j\ 12^h\ 44'\ 3''\ 9'''\ 37^{IV}\ 9^V\ 59^{VI}\ 15^{VII}\frac{1}{4}$. M. Mayer ſuppoſe cette révolution pour l'an 300 avant J. C. de $29^j\ 12^h\ 44'\ 2''\ 9494$, & pour le commencement de ce ſiècle ou vers l'année 1700 de $29^j\ 12^h\ 44'\ 2''\ 8921$, parce qu'à cauſe de l'accélération de la lune (1483), la longueur du mois lunaire ou de la révolution ſynodique a diminué de $0''\ 0573$ ou $3'''\ 26^{IV}$ de temps, dans l'eſpace de 2000 ans.

1422. En partant du mouvement ſéculaire qui eſt employé dans les dernières tables, on peut avoir ces révolutions avec toute la préciſion qu'on voudra, en diviſant le nombre 4089864960000000 qui eſt le produit d'un ſiècle & de 360° réduits en ſecondes, 1°. par le mouvement ſéculaire de la lune par rapport aux équinoxes 1732564415″, 2°. par le mouvement ſéculaire

relativement aux étoiles 1732559381″ ; 3°. par le mouvement ſéculaire relativement au ſoleil 1602961591 9″. Par ce moyen l'on trouve la révolution périodique par rapport aux équinoxes 27j 7h 43′ 4″ 6480 ; la révolution ſidérale 27j 7h 43′ 11″ 5069, & la révolution ſynodique 29j 12h 44′ 2″ 8921.

DES QUATRE GRANDES INÉGALITÉS DE LA LUNE.

1423. Les révolutions moyennes de la lune que nous venons de déterminer ſuppoſent dans la lune un mouvement toujours égal & uniforme ; cependant il n'eſt aucun aſtre dont les mouvemens ſoient auſſi compliqués & auſſi irréguliers ; comme l'obſervoit déja Pline le naturaliſte : *Multiformi hæc ambage torſit ingenia contemplantium, & proximum ignorari maximè ſydus indignantium* (*Hiſt. nat. L. 2, cap. 9*). C'eſt ce que diſoit encore M. Halley dans ces vers ſur la théorie de la lune.

Quâ cauſâ argentea Phœbe
Paſſibus haud æquis graditur, cur ſubdita nulli
Hactenus aſtronomo, numerorum frœna recuſet ;
Cur remeant nodi, curque auges progrediuntur.

Ce ſont ces inégalités dont nous allons traiter, en nous réduiſant à ce que les obſervations ſeules ont fait connoître immédiatement, ſans le ſecours des calculs de l'attraction ; nous parlerons enſuite des petites inégalités que l'attraction a indiquées, & qu'on connoît à peu-près depuis qu'on a combiné de cent manières différentes, les obſervations avec les différentes ſituations du ſoleil.

Quatre inégalités principales.

Ces inégalités que l'obſervation ſeule fit découvrir ſont au nombre de quatre principales, ſans compter le mouvement de l'apogée de la lune, & le mouvement du nœud : la première eſt l'équation de l'orbite, la

ſeconde eſt l'évection, la troiſième eſt la variation, la quatrième eſt l'équation annuelle. A l'égard des petites inégalités que la théorie de l'attraction a indiquées, du moins à peu-près, je tâcherai auſſi d'en donner une idée; mais on les a reconnues, ſoit par le calcul, ſoit par l'obſervation, à force d'eſſais, de tentatives & de combinaiſons; il eſt encore fort douteux qu'on les connoiſſe bien, & perſonne n'a donné le détail prodigieux de ces calculs. Ainſi je n'entreprendrai pas d'en donner une explication, qui ne les feroit connoître même que d'une manière imparfaite & peu sûre : il ne faut regarder les 10 petites équations dont nous parlerons ci-après (1454 *& ſuiv.*), que comme une hypothèſe qui explique & qui repréſente à peu-près les obſervations qu'on a faites juſqu'ici du mouvement de la lune.

1424. Pour ſuivre le progrès des Aſtronomes dans cette partie, nous ſommes obligés de recourir au livre de Ptolomée, (*Almag. L.* IV. *c.* 1) ou l'on trouve toujours l'hiſtoire de l'ancienne Aſtronomie. Ptolomée nous avertit d'abord qu'il faut choiſir les éclipſes de lune pour établir la théorie de la lune, parce que ces éclipſes nous paroiſſent de la même maniere que ſi nous étions au centre même de la terre, auquel ces mouvemens doivent néceſſairement ſe rapporter; au lieu que dans toute autre ſituation la diverſité d'aſpect, ou la parallaxe, ajoute à ces recherches une nouvelle difficulté, (1620).

Les inégalités de la lune ſont ſi grandes & ſi variées, qu'il parut d'abord aux anciens aſtronomes fort difficile de déterminer ſeulement la durée d'une révolution *moyenne* de la lune, c'eſt-à-dire, d'une révolution qui ne fut point augmentée ni diminuée par les inégalités périodiques de la lune.

1425. Pour parvenir à connoître cette révolution moyenne, en ſe ſervant toujours des éclipſes de lune, les anciens cherchèrent combien il falloit prendre de mois ou de jours pour avoir un mouvement de la lune qui fût toujours de la même quantité dans le

même intervalle de temps ; ils trouvèrent 6585 jours & 8 heures, qui font 223 mois lunaires ou 18 ans & 10 jours, c'eſt-à-dire, qu'ils reconnurent que quand deux éclipſes de lune avoient été éloignées de 18 ans & 10 jours, il en revenoit toujours une ſemblable au bout d'un pareil eſpace de temps, lorſque le ſoleil avoit fait 18 révolutions avec 10° & 40′. Dans cet intervalle, toutes les inégalités de la lune avoient eu leur cours & recommençoient toutes enſemble ſoit en longitude ſoit en latitude. (*Almag.* IV. 2, *pag.* 77). Hipparque reconnut que cette période de 223 lunaiſons n'étoit pas rigoureuſement exacte ; mais nous la prendrons ſeulement pour exemple.

Période de 18 ans.

1426. Dans cet eſpace de 223 lunaiſons ou retours de la lune au ſoleil, les anciens remarquerent que le retour de l'équation, ou de l'inégalité de la lune qui étoit d'environ 5 degrés, avoit recommencé 239 fois ; la révolution de la latitude 242 fois, & celle de la longitude 241 fois avec 10° 40′ de plus ; ainſi la lune avoit été 241 fois au même degré de longitude, 239 fois à ſa diſtance moyenne ou au point de ſa plus grande inégalité, & 242 fois à ſon nœud, à quelque choſe près : il n'en falloit pas davantage pour reconnoître les trois principales circonſtances du mouvement de la lune, c'eſt-à-dire, ſon moyen mouvement ; le mouvement de ſon apogée, & celui de ſon nœud ; circonſtances néceſſaires pour trouver les quatre inégalités dont nous avons à parler ; car les méthodes que nous avons employées dans le VIe. livre pour les planètes ne ſauroient s'appliquer à la lune à cauſe du mouvement rapide de ſon apogée & de ſon nœud.

Cette période de 223 lunaiſons que les anciens avoient employée pour calculer les retours égaux des éclipſes, ramenoit la lune à une même latitude, auſſi bien qu'à une même longitude, ou à un même degré du Zodiaque ; Ptolomée ajoute que ſi l'on ne s'attache pas aux éclipſes & qu'on veuille ſeulement conſidérer l'inégalité de la lune dans ſon mouvement en longitude le long

du

du Zodiaque, en allant d'une pleine lune à l'autre, on aura des retours égaux de la lune en 251 mois, pendant leſquels il y aura eu 269 reſtitutions des inégalités de la lune ; mais alors la latitude aura été différente.

Tel eſt donc l'aſpect ſous lequel les plus anciens aſtronomes commencèrent à conſidérer la lune, quand ils voulurent parvenir à déterminer ſes inégalités ; ils virent que des éclipſes de lune arrivées dans le même point du ciel, & dans la même ſaiſon de l'année ne ſe trouvoient point à des diſtances égales pour le temps ; ils firent une table des intervalles de temps obſervés entre pluſieurs éclipſes de lune, & ils chercherent s'il n'y auroit pas entr'elles deux intervalles de temps qui fuſſent exactement égaux, cela ne ſe rencontra que ſur 223 lunaiſons ou 18 ans ; on reconnut ainſi que la lune ne revenoit pas toujours au même degré d'anomalie ou d'inégalité, quoiqu'elle revînt au même point du ciel, & en oppoſition avec le ſoleil.

Premiere inégalité, ou équation de l'orbite.

1427. En examinant la lune dans l'eſpace d'un mois, il n'étoit pas difficile de voir que tous les 7 jours elle avoit cinq à ſix degrés d'inégalité ; qu'au bout de 14 jours cette inégalité diſparoiſſoit, & ainſi de ſuite ; qu'il y avoit toujours dans le mois deux points éloignés tout à la fois d'une demi-révolution en temps, & d'un demi-cercle en longitude ; c'eſt-à-dire, deux moitiés égales parcourues en temps égaux : enſorte que les inégalités recommençoient toujours au bout de 27 jours & demi environ. Mais en faiſant la même recherche en différens mois ou en différentes années, on remarqua bientôt que le point de la plus grande inégalité ne ſe trouvoit pas au même point du ciel ; mais toujours un peu plus avancé dans le Zodiaque, & cela d'environ 3 degrés à chaque révolution, enſorte que le mouvement de la lune par rapport à ſon apogée, ou ſon mouvement d'anomalie étoit plus petit de $\frac{1}{11}$ que le mouvement abſolu.

Pour expliquer cette première inégalité, on ſuppoſa que la lune décrivoit un cercle excentrique, comme

nous l'avons expliqué pour le ſoleil (865); ou bien un épicycle placé ſur un cercle concentrique (868), & en même temps que la ligne des apſides (864), c'eſt-à-dire, la ligne qui va de l'apogée au périgée changeoit de poſition & s'avançoit vers l'Orient d'environ 3 degrés par mois.

1428. Ptolomée employa, pour déterminer cette premiere inégalité, 3 éclipſes de lune obſervées à Babylone dans les années 719 & 720 avant J. C. & il la trouva de 5° 1′ (*Almag. IV*, 6 & 11). C'eſt cette première inégalité que nous appellons *équation de l'orbite*, ou *équation du centre* (a), & qui eſt appellée dans Képler *inæqualitas ſoluta*. Nous donnerons ci-après ſa véritable quantité avec plus d'exactitude (1434).

Trouver l'apogée de la Lune.

1429. Pour déterminer le lieu de l'apogée de la lune en différens temps, à la manière des anciens, je ſuppoſe qu'on ait raſſemblé pluſieurs lieux de la lune déterminés par obſervation, dans l'intervalle d'une même révolution, l'on prendra l'intervalle du temps moyen entre une de ces obſervations priſe pour époque, & chacune des autres obſervations; on calculera le mouvement moyen de la lune en longitude pour cet intervalle de temps, au moyen du mouvement diurne (1420); on les ajoutera au vrai lieu de la lune pour le temps de l'époque; on aura pour le temps de chacune des autres obſervations une longitude, différente de celle qui aura été obſervée. Ayant fait la même opération ſur un grand nombre de longitudes, on choiſira celles où la différence entre le lieu calculé & le lieu obſervé, aura été la plus grande, en plus & en moins, la ſomme des deux différences ſera le double de l'équation de l'orbite. S'il ſe trouvoit deux obſervations où cette différence fût égale entre le lieu moyen & le lieu vrai, mais en ſens contraire, en plus & en moins, ce ſeroit une preuve que la lune au temps de l'époque

(a) Elle eſt dans Ptolomée ſous le nom de πρώτης καὶ ἁπλῆς ἀνωμαλίας, ou de premiere & ſimple inégalité.

choiſie, étoit dans ſon apogée ou dans ſon périgée, & que ſon lieu moyen étoit le même que ſon lieu vrai : ainſi l'on connoîtra le lieu de l'apogée de la lune. S'il ne ſe trouve pas deux obſervations où les différences ſoient égales, & en ſens contraires on cherchera celles où les différences ſeroient égales & dans le même ſens, elles indiqueront des obſervations voiſines de l'apogée & du périgée, puiſque l'erreur étant la même, c'eſt une preuve que le mouvement vrai a été égal au mouvement moyen dans cet intervalle de temps, & cela indique les apſides (1279).

1430. Depuis la découverte des lunettes on a un moyen encore plus ſimple de trouver l'apogée de la lune, en obſervant les diamètres apparens de la lune ; car ce diamètre varie depuis $29' \frac{1}{2}$ juſqu'à $33' \frac{1}{2}$, (1505) ; l'on eſt donc aſſuré que la lune eſt apogée toutes les fois que ſon diamètre apparent n'eſt que de $29' \frac{1}{2}$, & qu'elle eſt périgée lorſque ce diamètre eſt de $33' \frac{1}{2}$; cette méthode ſeroit ſuffiſante pour trouver le lieu de l'apogée de la lune à très-peu près, ſi l'on ignoroit ſon mouvement. Autre méthode.

1431. Mais il y a une manière encore plus exacte de trouver le lieu de l'apogée de la lune par le moyen de ſes diamètres, c'eſt d'en obſerver la quantité vers les moyennes diſtances, lorſque le diamètre eſt environ de $31' \frac{1}{2}$. Si on l'a trouvé deux fois de la même quantité, c'eſt une preuve que dans ces deux obſervations la lune étoit à des diſtances égales de ſes apſides ; ainſi prenant un milieu entre les deux temps où l'on a obſervé, on aura le temps où la lune a été apogée.

Exemple. Le 15 Septembre 1762 à midi le diamètre de la lune étoit de $33' 14''$, réduit à l'horizon (1509), le lendemain il étoit plus grand ; mais le 18 à midi il étoit revenu à la même grandeur que trois jours auparavant, & il étoit de $33' 14''$; cela prouve que dans le milieu de l'intervalle ou à minuit du 16 au 17 la lune avoit été dans ſon périgée.

C'eſt en obſervant ainſi les diamètres de la lune que

Horoccius vers l'an 1638, trouva qu'il falloit admettre un balancement de l'apogée & un changement d'excentricité pour expliquer la ſeconde équation trouvée par Ptolomée, dont nous parlerons ci-après (1434).

Mouvement de l'apogée.

1432. Après avoir ainſi déterminé pluſieurs fois le lieu de l'apogée de la lune en différens temps, on a trouvé qu'il faiſoit le tour du ciel par rapport aux étoiles dans l'eſpace de 8 années communes & 311 jours ou $3232^j\ 11^h\ 14'\ 31''$, 0, & par rapport aux équinoxes en $3231^j\ 8^h\ 34'\ 57''$, 6, ainſi ſon mouvement conſidéré par rapport aux équinoxes eſt de $6'\ 41''\ 069815$ par jour. De-là il ſuit que le mouvement moyen de la lune (1420) par rapport aux étoiles fixes étant pris pour unité, celui de ſon apogée $6'\ 40''$, 931992 eſt égal à la fraction décimale 0, 0084522595, dont le logarithme eſt 7, 9269211; & que la révolution anomaliſtique de la lune eſt de $27^j\ 13^h\ 18'\ 34''$, 022 : on la trouvera en diſant la différence des mouvemens ſéculaires de la lune & de ſon apogée 1717915265 eſt à un ſiècle ou 3155760000'', comme 360 degrés ou 1296000'' ſont à 2380714''.

1433. Juſqu'au temps de Ptolomée on s'étoit borné principalement à obſerver des éclipſes de lune; & la première inégalité de 5° (1428) étoit la ſeule qui pût s'y manifeſter. Ptolomée reconnut qu'il y en avoit une autre qui étoit fort ſenſible dans les quadratures (*Almag. liv. V. ch.* 1), & qu'on appercevoit par les diſtances de la lune au ſoleil. En obſervant avec ſoin l'ordre de cette inégalité », nous avons reconnu, dit-il, qu'il n'y avoit » que la première & ſimple inégalité dans les conjonc- » tions & les oppoſitions, & même dans les quadratu- » res, quand la lune eſt apogée & périgée; mais on » s'aſſurera facilement qu'elle ne ſuffit pas pour calculer » les mouvemens particuliers de la lune obſervés dans » les autres aſpects. La seconde inégalité ſe rapporte » aux diſtances de la lune au ſoleil; elle ſe rétablit & » diſparoît dans les conjonctions & dans les oppoſitions; » elle eſt la plus grande dans certaines quadratures;

» nous avons découvert cette différence par les obſer-
» vations de la lune que nous avons d'Hipparque, &
» par celles que nous avons faites au moyen d'un inſ-
» trument conſtruit exprès pour meſurer les différences
» de longitude le long du Zodiaque entre le ſoleil &
» la lune ».

Ces diſtances de la lune au ſoleil obſervées par Hipparque & par Ptolomée, s'accordoient quelquefois avec le calcul de la première inégalité ou de la première ſuppoſition, (1427); quelquefois auſſi elles en étoient plus ou moins éloignées. Ayant examiné avec ſoin la marche de cette inégalité, Ptolomée reconnut qu'il n'y avoit aucune erreur ou différence dans les quadratures lorſque la lune étoit apogée ou périgée (a); mais qu'il y avoit une différence de $2^{\circ}\frac{1}{3}$ quand la lune en quadrature, ſe trouvoit être à 3 ſignes de ſon apſide. (*Almag. V.* 3. *in fine*). Alors en effet l'inégalité qui ſeroit de 5°, ſuivant les règles établies ci-deſſus (1428), ſe trouve être de $7^{\circ}\frac{1}{3}$, c'eſt-à-dire, plus grande de $2^{\circ}\frac{1}{3}$ en vertu de la ſeconde inégalité. Ptolomée ſuppoſe en conſéquence que l'épicycle de la lune eſt porté dans un cercle excentrique, & qu'il eſt plus près de nous dans les quadratures que dans les conjonctions & dans les oppoſitions, enſorte que pour expliquer ces deux inégalités enſemble il ſe ſert d'un excentrique & d'un épicycle (*L. V. c.* 2 & 4).

Seconde inégalité, ou évection.

Ptolomée ſuppoſe que dans un jour le centre de l'épicycle allant ſuivant l'ordre des ſignes fait 13° 14′, & que l'apogée ou la ligne des apſides de l'excentrique fait 11° 9′ contre l'ordre des ſignes, ainſi tous les 14 jours l'apogée de l'excentrique rencontrera l'épicycle, & tous les 7 jours ils ſeront oppoſés entre eux. La petite équation de 5° aura donc lieu dans toutes les conjonctions & oppoſitions, parce qu'alors l'épicycle ſera toujours dans l'apogée de l'excentrique, & l'équation

(a) *In quadraturis verò utriſque, in minimo vel in nullo erratur, cùm Lunæ vel in maximâ, vel minimâ epicycli longitudine ſit.* Ptol. L. V. cap. 2.

de $7^\circ \frac{1}{3}$ aura lieu quand l'épicycle ſera plus près de la terre, ce qui arrive dans les quadratures ; le diamètre de l'épicycle paroiſſant alors plus grand produira une inégalité plus conſidérable. (*Almag.* V. 2, *pag.* 102) ; mais il faut ſuppoſer d'ailleurs toutes choſes égales, & la lune au point de la plus grande équation.

Mais dans l'explication que donne Copernic de cette inégalité, (*de Revol. lib. IV, cap.* 8), en ſuivant les mêmes données que Ptolomée, il employe deux épicycles. Le petit épicycle parcourt dans l'eſpace d'une révolution anomaliſtique, & contre l'ordre des ſignes, la circonférence du grand épicycle, & la lune elle-même parcourt, contre l'ordre des ſignes, le petit épicycle en $14^j\ 18^h$, c'eſt-à-dire, dans l'eſpace de temps néceſſaire pour aller de la conjonction à l'oppoſition, ou d'une ſyzygie (a) à l'autre ; ſon mouvement dans le petit épicycle eſt double du mouvement de la lune au ſoleil, enſorte que dans toutes les ſyzygies la lune ſe trouve en dedans du grand épicycle pour former la plus grande équation de 5°, & que dans les quadratures elle eſt au dehors pour former une équation de $7^\circ \frac{1}{3}$. C'eſt ainſi que la ſeconde inégalité découverte par Ptolomée, & que l'on appelle aujourd'hui *Evection*, s'expliquoit encore du temps de Tycho, c'eſt-à-dire, juſques vers l'an 1600. Ptolomée l'appelloit προσνευσιν, *epicycli quaſi annutum* ; Copernic l'appelloit *proſtaphæreſim ſecundi vel minoris epicycli* ; Tycho l'appelloit *proſtaphæreſim excentricitatis*, nous l'appellons *évection*, à l'exemple de Boulliaud, parce qu'elle porte le calcul à une plus grande préciſion.

1434. Puiſque l'inégalité de la lune alloit depuis 5° juſqu'à 7° 40′, ſa quantité moyenne étoit ſuivant les anciens de 6° 20′, on l'employe actuellement de 6° 18′ 32″ (1480), ainſi Hipparque par le ſeul ſecours des éclipſes de lune, & Ptolomée en y employant les qua-

(a) Συζυγία, *conjugatio, unio*, ce mot comprend indifféremment les nouvelles Lunes & pleines Lunes, les conjonctions & les oppoſitions.

dratures, avoient déterminé avec une exactitude assez singulière ces deux premières inégalités.

1435. Cette seconde inégalité que les anciens avoient expliquée par le moyen d'un épicycle sur un excentrique, ou d'un épicycle sur un épicycle, fut expliquée d'une manière différente par Horoccius vers l'an 1640; mais sa théorie ne fut connue qu'en 1673; alors Flamsteed calcula de nouvelles tables de la lune sur les principes & sur les nombres donnés par Horoccius; & ces tables furent publiées par Wallis dans les œuvres posthumes d'Horoccius en 1678, (505). La théorie d'Horoccius a quelque rapport avec l'hypothèse d'Arzachel (392). Cet astronome Arabe qui observoit en Espagne vers l'an 1080 avoit cru appercevoir par les observations de Ptolomée & celles d'Albategnius, comparées avec les siennes, que l'apogée du soleil avançoit & reculoit alternativement, en même temps que l'excentricité paroissoit avoir diminué considérablement; cela lui fit imaginer l'hypothèse suivante, que Copernic imita dans la suite (*Liv. III, chap.* 20).

Soit T le centre de la terre (*fig.* 84), C le centre de l'orbite ou du cercle qu'une planète est supposée décrire, enforte que TCA soit la ligne des apsides, & TC l'excentricité de la planète; si l'on suppose que le centre de l'orbite au lieu d'être fixe en C décrive la circonférence d'un petit cercle AGB, il en résultera un double effet. 1°, La ligne des apsides TA changera de position, & au lieu d'être constamment sur la direction TCA, elle passera par exemple en TG, & fera avec la première situation un angle ATG. 2°, L'excentricité au lieu d'être égale à TC deviendra TG, TB, &c. Telle fut l'hypothèse dont Horoccius fit usage pour la lune, afin de représenter la seconde inégalité (1433). *Fig.* 84.

1436. Il est vrai que Képler dans sa préface des éphémérides pour 1618 avoit déja annoncé qu'il employoit une excentricité de l'orbite lunaire, variable à chaque année, & l'on verra que la manière dont Tycho

expliquoit cette inégalité (1443) par le moyen d'un cercle *CETD* (*fig.* 86), conduiſoit auſſi à imaginer un changement d'excentricité ; ainſi il n'eſt pas étonnant qu'Horroccius ait fait uſage pour le mouvement de la lune de l'hypothèſe d'Arzachel, ſur-tout en reconnoiſſant par les obſervations que non-ſeulement il falloit changer l'équation de l'orbite lunaire ou ſon excentricité tous les ſix mois ; mais encore avancer ou reculer l'apogée. Fig. 86.

1437. Horoccius dut en effet être conduit à cette hypothèſe, par l'obſervation des diamètres de la lune, qui pouvoient ſervir à faire connoître le lieu de l'apogée, comme nous l'avons expliqué (1431) ; il dut s'appercevoir par leur moyen que l'apogée de la lune ſe trouvoit dans un lieu du ciel plus avancé de 25 degrés lorſque la diſtance du ſoleil à l'apogée de la lune étoit de 45° ou de 225°, que lorſqu'elle étoit de 135° & de 315° ; de ſorte que le mouvement de l'apogée n'étoit point uniforme, mais ſujet à un balancement annuel de plus de 12° ; ce changement de l'apogée étant une fois reconnu, ſa liaiſon avec le changement de l'excentricité étoit aiſée à appercevoir.

Les tables de Flamſteed où cette théorie d'Horoccius étoit employée avec des augmentations conſidérables parurent dans le cours de mathématiques de Jonas Moore, qui a pour titre : *A new ſyſteme of the mathematics*, 2 *vol. in*-4° 1681. Enfin, les tables de Flamſteed refaites, augmentées & perfectionnées ſur la théorie de Newton, mais dans la même forme que celles d'Horoccius, ont été inſérées en 1746 par M. le Monnier, avec des additions, dans ſes inſtitutions aſtronomiques. Newton & Halley ſe ſervirent de la même hypothèſe ne voyant pas qu'on pouvoit repréſenter les deux effets par une ſeule opération (1440).

1438. Suivant la théorie de Newton (*Liv. III*, *prop.* 35), le centre *A* de l'orbite de la lune (*fig.* 84) décrit un cercle *AGB*, la terre étant en *T*, enſorte que *TC* exprime l'excentricité moyenne de la lune 55050, Fig. 84.

TA

TA la plus grande excentricité, & TB la plus petite; TC étant à CB comme l'excentricité moyenne eſt ſa différence à la plus petite, ou comme le ſinus total eſt au ſinus de $12^{\circ}\ 18'$ qui eſt la plus grande équation de l'apogée, l'on aura $CB = 11727, 31$. Il ſuppoſe que ſi l'on fait l'angle ACG égal au double de l'argument annuel, ou de la diſtance entre le ſoleil & l'apogée de la lune, l'angle CTG ſera l'équation de l'apogée, & TG l'excentricité actuelle de l'orbite lunaire, ainſi dans le triangle TCG dont on connoît deux côtés & l'angle compris, l'on dira la ſomme de TC & CG eſt à leur différence, comme la tang. de la moitié du ſupplément de ACG, c'eſt-à-dire, la tangente de l'argument annuel, dont le double eſt l'angle ACG, eſt à la tangente de la demi-différence des angles inconnus.

La ſomme des côtés TC & CD 66777, 31 & leur différence 43322, 69 étant des termes conſtans, la différence de leurs logarithmes ou plutôt le complément arithmétique de cette différence eſt le logarithme conſtant que l'on ajoutera toujours au logarithme de la tangente de l'argument annuel pour avoir celui de la tangente de l'argument corrigé; en effet, la demi-ſomme des angles inconnus, G & T eſt l'argument annuel moyen, & leur demi-différence eſt l'argument corrigé, c'eſt-à-dire, la moitié de l'angle ACG moins l'angle T car la moitié de l'angle C en ôtant l'angle T eſt la même choſe que la moitié de la différence entre les angles G & T, puiſque $C = G + T$, $\frac{1}{2}C = \frac{G}{2} + \frac{T}{2}$, & $\frac{1}{2}C - T = \frac{G}{2} - \frac{T}{2}$, donc la demi-différence trouvée eſt l'argument annuel, moins l'angle T qui eſt ſon inégalité, ou l'équation de l'apogée.

Dans cette hypothèſe où l'on ſuppoſe l'excentricité moyenne $TC = 55050$, $CB = 11727, 31$, le complément arithmétique du logarithme de la différence entre TA & TB, ou 98120864 eſt le logarithme conſtant qu'il faut ajouter à la tangente de la moitié de l'argu-

ment annuel moyen, pour avoir l'argument annuel corrigé, qui ajouté avec le lieu du ſoleil donne le vrai lieu de l'apogée de la lune ; c'eſt la forme que M. Halley avoit employée dans ſes tables, ſans en donner la démonſtration.

1439. Cette hypothèſe d'Horoccius produit le même effet que celle de Ptolomée ou de Copernic (1433) ; en effet, on conçoit facilement que ſi l'apogée de la lune concourt avec la ligne des ſyzygies l'excentricité TA eſt aſſez grande, pour produire une équation de $7^\circ \frac{1}{3}$, la lune étant dans ſa moyenne diſtance, & en quadrature tout à la fois, il y aura donc $7^\circ \frac{1}{3}$ d'équation, dans cette hypothèſe, ainſi que l'exigeoient les obſervations de Ptolomée, mais ſi l'apogée de la lune concourt avec la ligne des quadratures l'excentricité ſera plus petite ou égale à TB, & la plus grande équation ne ſera jamais que de 5 degrés.

En faiſant varier ainſi l'excentricité de la lune, il falloit avoir différentes tables d'équations pour les différentes excentricités, ou bien calculer à chaque fois directement l'équation de l'orbite pour l'excentricité actuelle ; ce calcul étoit facile & exact par le moyen d'un artifice que M. Halley avoit employé dans ſes tables, pour éviter l'inégalité des parties proportionnelles, l'embarras des tables à double entrée, ou leur trop grande étendue.

L'hypothèſe elliptique ſimple, (1252), contient en effet une méthode aiſée pour trouver l'anomalie vraie qui répond à l'anomalie moyenne, & M. Halley dans ſes tables de la lune en fit uſage ; mais comme elle s'écarte un peu de l'hypothèſe de Képler qui eſt la ſeule exacte, il fallut y apporter une petite correction, je vais en donner ici l'explication, parce que l'auteur lui-même ne l'a jamais donnée. M. Halley prit la peine de calculer pour les différentes excentricités, & les différentes anomalies vraies de la lune, quelle étoit l'anomalie moyenne qui y répondoit dans l'hypothèſe exacte de Képler, & dans l'hypothèſe elliptique ſimple ; la

différence de ces deux anomalies moyennes qui donneroient le même réſultat par rapport à l'anomalie vraie, forme la petite quantité d'une table qu'il appelle, *Tabula pro expediendo calculo æquationis centri lunæ.* Ainſi M. Halley, ſans avoir des tables d'équation pour chaque excentricité donnoit un moyen de la calculer par une ſeule opération ; l'hypothèſe elliptique ſimple lui auroit ſuffit ; mais comme elle ne donne pas le même réſultat que l'hypothèſe de Képler, il en avoit cherché la différence ; non pas celle des équations qui répondroient à la même anomalie moyenne, mais ce qui revient au même celle des anomalies moyennes qui produiroient la même anomalie vraie.

Exemple. Je ſuppoſe que l'on ait pour la moitié de l'anomalie moyenne 74° 3′ 30″ avec l'excentricité 53662, & que l'on veuille trouver l'anomalie vraie correſpondante ; cette anomalie calculée rigoureuſement eſt de 4ˢ 24° 40′ 30″ ; mais dans la règle que nous avons donnée (1253), l'équation ſeroit plus petite de 2′ 10″ 6, & il faudroit qu'il y eût 74° 2′ 24″ 7 pour la moitié de l'anomalie moyenne, afin de trouver 72° 20′ 15″ pour la moitié de l'anomalie vraie, c'eſt donc 1′ 5″ 3 qu'il faut ôter de la moitié de l'anomalie moyenne pour qu'elle nous faſſe trouver l'anomalie vraie 144° 40′ 30″, c'eſt-à-dire, pour lui faire produire le réſultat convenable ; or la table conſtruite par M. Halley indique cette quantité-là, qui dépend de l'anomalie moyenne de la lune, & de ſon excentricité ; c'eſt pourquoi il avoit mis en tête les premiers chiffres du *Logarithme pour l'équation de la lune.*

Ce logarithme employé par M. Halley eſt le complément arithmétique du logarithme de la diſtance apogée diviſée par la diſtance périgée de la lune, pour chaque excentricité ou pour chaque diſtance du ſoleil à l'apogée de la lune. Dans l'exemple précédent, c'eſt 9, 9533449.

1440. C'eſt ainſi qu'on a employé long-temps une double opération en corrigeant le lieu de l'apogée, &

en cherchant l'excentricité de la lune pour chaque inſtant donné afin d'en conclure le vrai lieu de la lune, ou le lieu corrigé par les deux premières équations. Flamſteed, Newton ni Halley ne remarquèrent pas qu'il y avoit une méthode facile, pour calculer cette équation, ſans ſuppoſer une excentricité variable, & un balancement dans l'apogée; c'eſt celle qu'a employée M. Euler, & dont on n'a point encore donné de démonſtration, en voici une aſſez ſimple. Soit L la lune (*fig.* 84), T la terre, C le centre moyen de l'orbite lunaire, G le centre pour un moment donné; CT l'excentricité moyenne de la lune, CLT la moitié de la moyenne équation de l'orbite, GLT la moitié de l'équation pour le temps donné, repréſentée comme dans la méthode de Newton (1438); CLG eſt la différence de ces deux équations, ou l'effet que produit ſur la demi-équation le changement de l'excentricité & la libration de l'apogée. Pour trouver, par une ſimple opération cet angle CLG qui eſt la moitié de l'évection, je conſidère que quand cet angle eſt le plus grand, ou lorſque LC eſt perpendiculaire ſur CG, l'angle CLG eſt de 40′, c'eſt-à-dire, que le rapport entre CL & CG eſt tel qu'il n'en peut réſulter que 40′ pour l'angle L, ou 1° 20′ environ pour l'évection toute entière. Lorſque l'angle LCG ſera oblique, l'angle CLG diminuera, & cela dans le rapport de la perpendiculaire GD, à la ligne CG ou de ſin. DCG au rayon; donc l'évection ſera 80′ ſin. DCG; mais l'angle $DCG = ACL - ACG$ eſt l'anomalie moyenne de la lune, moins deux fois la diſtance du ſoleil à l'apogée de la lune, ou, ce qui revient au même (a), deux fois la diſtance de la lune

Méthode plus ſimple pour l'évection.

Fig. 84.

(a) L'anomalie de la lune eſt égale à la longitude de la lune moins celle de l'apogée, ou à 2 ☾ — ☾ — ap. ☾; ſi l'on en ôte le double de l'argument annuel ou 2 ☉ — 2 ap. ☾, on aura 2 ☾ — 2 ☉ — ☾ + ap. ☾, ou 2 (☾ — ☉) — (☾ — ap. ☾), c'eſt-à-dire, deux fois le lieu de la lune moins celui du ſoleil, dont on aura ôté le lieu de la lune moins celui de ſon apogée, ou l'anomalie moyenne de la lune; donc l'anomalie de la lune moins le double de l'argument annuel équivaut à l'argument de l'évection.

au ſoleil moins l'anomalie moyenne de la lune, qui forme l'argument de l'évection : donc la demi-évection, ou l'angle GLC eſt égale à 80′ ſin. (2 dif. ☾☉ — an. ☾); c'eſt la forme ſous laquelle elle ſe trouve actuellement dans toutes les tables de la lune ; mais il faut remarquer qu'elle eſt ordinairement jointe avec une autre équation, comme dans la table de la cinquième équation de la lune où elle eſt jointe à une équation de 36″ qui a pour argument le double de celui de l'évection.

Quantité de l'évection.

1441. Cette ſeconde équation de la lune, qui ſuivant Ptolomée, étoit de 1°19′ $\frac{1}{2}$, & ſuivant Tycho, 1° 15′, eſt dans les tables de Flamſteed 1° 18′ 50″; dans les premieres tables de M. Mayer 1° 20′ 42″, & dans les nouvelles 1° 20′ 34″; dans celles de M. Euler, 1° 18′ 49″ dans celles de M. d'Alembert 1° 18′ 18″, & dans celles de M. Clairaut 1° 16′ 18″; mais M. d'Alembert obſerve que cette équation de M. Clairaut ne répond qu'à une partie équivalente, à 1° 16′ 12″ dans les anciennes tables de Mayer, parce que la forme des équations étant différente, il faut les décompoſer pour pouvoir les comparer enſemble. (*Recherches ſur différens points du Syſt. du Monde III.* 27). Nous donnerons dans le XXIIe livre une idée de la maniere dont l'attraction du ſoleil produit cette inégalité (3479).

Recherches de Tycho-Brahé.

1442. La troiſième inégalité de la lune étant une découverte de Tycho-Brahé ; il eſt néceſſaire de remonter à l'origine de ſes recherches ſur la théorie de la lune ; elle étoit entrée pour beaucoup dans le projet que Tycho avoit conçu de réformer toute l'aſtronomie, & de lui donner une nouvelle face ; cependant comme les mouvemens de la lune lui parurent les plus compliqués & les plus difficiles à démêler, il fut long-temps ſans oſer ſe décider, & il ne comptoit pas en parler dans ſon livre des *Progymnaſmes*, où il traita des autres parties fondamentales de l'aſtronomie : néanmoins ce livre qu'il avoit fait imprimer chez lui à différentes repriſes, n'ayant vu le jour qu'après ſa mort par les ſoins de ſes héritiers, qui le firent achever en 1610, on y

ajouta pour lors un appendix de 28 pages pour la théorie de la lune, qui eſt à la ſuite de la théorie du ſoleil, & qui interrompt l'ordre des chiffres entre les pages 112 & 113. Ce petit abrégé de la théorie de la lune avoit été achevé en 1601 par Tycho, aidé de Longomontanus, (comme les éditeurs en avertiſſent à la page 819 du même livre), & on le trouva dans ſes papiers. Je vais en donner l'extrait comme d'une pièce originale qui contient la découverte de la VARIATION ou de la troiſième inégalité de la lune ; mais comme je ne puis ſéparer celle-ci des deux autres, il eſt néceſſaire de rappeller la maniere dont il enviſage les deux premieres inégalités

Fig. 86. 1443. Soit T le centre de la terre, (*fig.* 86.) TF le rayon de l'*excentrique*, ou du cercle principal, par lequel on repréſente les mouvemens de la lune ; nous le ſuppoſons diviſé en cent mille parties : on prendra TB de 2174 parties, & l'on décrira un cercle $TECD$, ſur lequel on fera mouvoir le centre de l'excentrique, de maniere que dans les ſyzygies, c'eſt-à-dire, les conjonctions & les oppoſitions, le centre ſoit en T au centre même de la terre, que dans toutes les quadratures il ſoit au contraire en C, à la plus grande diſtance de la terre, & que dans les octans il ſoit en D & en E. L'équation qui en réſultera ou l'angle BRT, eſt de 1° 15′ ; car 2174 eſt à peu-près le ſinus de 1° 15′ pour un rayon de cent mille ; cette équation eſt proportionnelle au ſinus du double de l'élongation de la lune au ſoleil, puiſque le cercle eſt décrit tout entier dans une demi-révolution, & elle eſt ſouſtractive dans la premiere quadrature, parce que le mouvement de la lune ſe fait de F en R ; enſorte que l'angle FTR vû de la terre eſt plus petit que l'angle formé en C autour du vrai centre de l'orbite lunaire : cette hypothèſe ſert à expliquer à l'évection (1441).

1444. Le grand épicycle dont le rayon FG eſt de 5800, exprime une partie de l'équation du centre, & produit 3° 19′ d'inégalité ; le centre du petit cercle

MNL eſt ſuppoſé en *G* lorſque la lune eſt apogée, il deſcend vers *H* & ſe trouve en *I* lorſqu'elle eſt périgée, ce qui arrive, ſuivant Tycho, à la moitié des $27^j\ 13^h\ 18'\ 35''$, qui forment la durée de ſa révolution anomaliſtique.

Le troiſième épicycle *MLKN* eſt celui ſur lequel la lune même eſt placée; ſon rayon *GM* eſt de 2900, c'eſt-à-dire, la moitié du grand épicycle, & il produit par conſéquent une inégalité de $1^\circ\ 40'$. La lune ſe meut ſur cet épicycle, de maniere que quand le centre du petit cercle eſt apogée en *G*, la lune ſoit en *K* dans la partie inférieure de ce petit cercle *MNK*; mais quand le centre du petit cercle ſera en *H* ou en *O*, & que l'équation de l'orbite ſera la plus grande, la lune ſera en *M*, & à la plus grande diſtance poſſible du centre *F* du grand épicycle; parce que la lune parcourt ce troiſième épicycle en $13^j\ 18^h\ 39'\ 17''\frac{1}{2}$, moitié de ſa révolution anomaliſtique; la ſomme de ces deux équations, qui répondent à la diſtance *FM*, eſt de $4^\circ\ 58\frac{1}{2}$; c'étoit, ſuivant Tycho, la plus grande équation, qui par l'évection devenoit quelquefois de $7^\circ\ 28'$, moindre de $12'$ que dans Ptolomée & Copernic.

1445. Mais, ajoute l'auteur, j'ai éprouvé par un grand nombre d'obſervations exactes, que ces trois cercles ne ſatisfont pas encore aux obſervations, & que dans les octans, c'eſt-à-dire, à 45° des ſyzygies & des quadratures, il y a une autre différence ſenſible; j'ai donc été obligé d'ajouter un petit cercle en *F* pour expliquer cette VARIATION, & je ſuppoſe que le centre *F* du grand épicycle en parcourt non pas la circonférence, mais le diamètre *VX* perpendiculaire au rayon *BF*, par un mouvement de libration qui ſoit réglé cependant de même que s'il ſe faiſoit ſur la circonférence, comme fait Copernic dans d'autres occaſions, c'eſt-à-dire, proportionnellement aux ſinus des arcs parcourus; il en réſulte une équation qui depuis les ſyzygies juſqu'aux quadratures, doit toujours s'ajouter à la longitude moyenne de la lune par rapport au ſoleil, pour avoir la véritable

Troiſième inégalité ou variation.

ſituation du centre de l'épicycle, mais qui eſt ſouſtractive dans le ſecond & le quatrième octant. Cette libration dépend donc du double de la vraie diſtance de la lune au ſoleil, & produit la *Variation*, inégalité qui va à 37′ 4″ dans les octans. On remarquera que Tycho avoit encore déterminé cette inégalité avec bien de la préciſion, puiſque les dernieres tables ſuppoſent actuellement la variation de 37 à 40′; elle eſt dans M. Clairaut de 39′ 54″, dans les anciennes tables de Mayer 40′ 43″; dans celles de Flamſteed 40′ 34″, ſuivant la théorie de M. d'Alembert 37′ 50″. (*Recherches, &c. III.* 28), & dans les nouvelles tables de Mayer 37′ 4″, en y comprenant les petites équations que la même table renferme.

Tycho ſe propoſoit de donner l'explication & les preuves de toute ſa théorie, dans un ouvrage particulier, mais il n'en eut pas le temps, & il ne nous en laiſſa que le réſultat renfermé dans les hypothèſes que je viens d'expliquer.

1446. Dans les tables de la lune qui ſont jointes à cet ouvrage, on trouvera les trois inégalités, dont je viens de raconter la découverte, ſous le nom d'*Equation de l'orbite*, *évection & variation*, (Equat. V, XI & XII); mais les quantités en ſont déterminées par les recherches & les obſervations nouvelles. Les deux dernieres ſont appellées dans Képler *Inæqualitates menſtruæ*, l'évection en particulier y eſt nommée *Æquatio temporanea*, & la variation *Æquatio perpetua* ou *variatio*, (Képler, *Epitome*, *pag.* 790, 793), parce que celle-ci revient perpétuellement à chaque mois, & que l'autre ne revient que de temps en temps; Boulliaud appella la premiere *Evection* & ce nom lui eſt reſté. Quand à la ſeconde, Képler lui donnoit le nom de *Variation* avec Tycho qui en étoit l'inventeur, (Képler, *Epit. pag.* 811.): Boulliaud l'appelle *Variation* ou *Réflexion*. La variation ſe détermine aſſez bien par la théorie, c'eſt-à-dire, par le principe de l'attraction (3469); elle dépend uniquement de la maſſe du ſoleil & de ſa diſtance

à

à la terre, & ſubſiſteroit quand même les orbites du ſoleil & de la lune ſeroient circulaires & concentriques. Pour la déterminer, M. Mayer avoit ſuppoſé dans ſes premieres tables la parallaxe du ſoleil de $11'' \frac{1}{2}$, au lieu de $9''$ qu'elle paroît devoir être ; mais dans ſes nouvelles tables, il emploie la parallaxe de $7''$ 8 d'après la valeur de l'équation $1' 55''$ dif. ☾ ☉ déterminée par les obſervations, & comparée, dit-il, avec la théorie.

1447. On remarque comme une choſe aſſez ſingulière que cette quantité moyenne de la variation dans certaines tables eſt exactement la moitié de l'évection ; je dis cette quantité moyenne, parce que la variation change ſuivant la diſtance du ſoleil & de la lune à la terre, ce qui produira d'autres inégalités (1467) : ce rapport ſi ſimple entre deux des plus fortes inégalités de la lune, ne paroît pas une ſuite néceſſaire de la théorie de l'attraction, mais c'eſt un fait qui méritoit d'être remarqué, quoique dans nos nouvelles tables il y ait une petite différence.

1448. L'ÉQUATION ANNUELLE de la lune, qui eſt d'environ $11' 16''$ eſt la dernière de celles que les obſervations ſeules avoient fait découvrir ; elle eſt indiquée par Tycho, à la ſixième page de la théorie de la lune qui eſt inſérée dans ſes progymnaſmes, où il dit qu'une expérience répétée de pluſieurs façons lui a fait connoître que les mouvemens moyens de la lune exigent, pour être uniformes, une équation des jours, différente de celle que donnent les mouvemens du ſoleil. Tycho donne, en effet, une table de l'équation du temps qu'il faut employer pour calculer le lieu de la lune ; mais cette équation ne s'accorde pas avec l'équation annuelle que nous employons actuellement.

1449. Képler chercha comme Tycho une équation du temps pour la lune ; il écrivoit à Bernegger en 1625, *in lunâ poſt omnem apparatum Tychonis & meum tranſigi de eclipſibus non poſſe puto niſi introductâ inſuper æquatione annua, ſive in motus lunæ ſive in temporis æquationem uſitatam*, (*Epiſt. Kep. & Bern. pag.* 72).

1450. Enfin Horoccius dans ſa théorie de la lune en fit également uſage, Flamſteed en publia les réſultats en 1673, avec des tables conſtruites d'après les nombres qu'Horoccius avoit laiſſés manuſcrits (*Horoccii op. poſth.*). Il eſt vrai que Horoccius n'employoit expreſſément que les deux équations données par les anciens, avec la variation de Tycho; mais il corrigeoit le temps vrai pour lequel il vouloit calculer le lieu de la lune par une équation du temps, additive dans les ſix premiers ſignes de l'anomalie moyenne du ſoleil, & qui alloit à 13′ 24″ de temps dans les moyennes diſtances, ce qui revenoit au même que s'il eût ajouté 7′ 21″ aux longitudes de la lune, tandis qu'il négligeoit une partie de la véritable équation qui auroit dû être de 7′ 42″ de temps ſouſtractive, de ſorte que par-là il ajoutoit 4′ 14″ au lieu moyen de la lune; le total revenoit à 11′ 34″ pour la plus grande équation annuelle; or M. Mayer ajoute en effet dans ſes nouvelles tables 11′ 16″ pour l'équation annuelle, ainſi l'on peut dire qu'elle étoit véritablement & exactement employée dans les tables d'Horoccius, quoique ſous un nom différent. Flamſteed remarqua enſuite avec raiſon que l'équation employée par Horoccius, n'eſt pas proprement l'équation du temps dans le ſyſtême ſolaire, ſuivant les démonſtrations que Flamſteed avoit données à ce ſujet, depuis la mort d'Horoccius (972); cependant, ajoute-t-il, cette équation phyſique doit être employée dans les calculs de la lune, & elle lui eſt particulière; c'eſt un ſatellite qui eſt affecté par le mouvement de la terre; & il ſe meut un peu plus lentement autour d'elle quand elle eſt aphélie, ou fort éloignée du ſoleil, que quand elle en eſt plus proche; il avoit eu envie d'exprimer auſſi en degrés cette équation particulière de la lune; mais il la conſerva en temps par reſpect pour l'uſage qu'en avoit fait Horoccius, & pour ne pas paroître ſurcharger encore le ſyſtême lunaire d'une nouvelle équation (*Hor. op. pag.* 492, 496).

Quelques années après Halley donnant à la ſuite de

ſon catalogue des étoiles auſtrales, publié en 1679, quelques réflexions ſur la théorie de la lune, remarqua qu'elle paroiſſoit aller plus vîte quand le ſoleil étoit plus éloigné, que lorſqu'il étoit plus proche de la terre; il fixa pour lors cette équation à la neuvième partie de celle du ſoleil, c'eſt-à-dire, à treize minutes environ.

1451. Newton reconnut auſſi que cette équation ſuivoit de ſa théorie; en effet la peſanteur de la lune vers la terre étant diminuée par l'attraction du ſoleil, le ſera encore plus quand le ſoleil ſera plus proche de la terre; or la lune étant retenue dans ſon orbite par une moindre force s'éloignera du ſoleil; l'orbite ſe dilatera davantage, & le temps de la révolution ſera plus long. (1224). Cette équation annuelle qui ſe trouve de 11′ 49″ dans les tables de Flamſteed & de Halley eſt accompagnée de deux équations analogues, de 20′ pour l'apogée, & de 9′ $\frac{1}{2}$ pour le nœud, que Newton a introduites. Elles ſont également employées dans les nouvelles tables de Mayer, l'une de 8′ 50″, l'autre de 23′ 12″.

1452. Cette équation annuelle eſt de 11′ 49″ dans les tables de Flamſteed; de 11′ 20″ dans celles de M. Euler. (*Alman. de Berlin* 1750); de 12′ 57″ dans celles de M. d'Alembert. (*Recherches, &c. pag.* 230); M. Mayer l'a faite comme M. Euler de 11′ 20″, & dans ſes dernieres tables de 11′ 16″, ſans doute d'après les obſervations; car la théorie de l'attraction ne la détermine pas d'une manière aſſez exacte, M. Clairaut ne la faiſoit que de 10′ 36″ dans ſes premières tables. Valeur de l'Équation annuelle.

1453. On comprend aſſez, ſans que j'en donne ici d'exemple, comment il a été poſſible à Tycho, Képler, Horoccius & Halley de découvrir l'équation annuelle; il ne s'agiſſoit que de calculer pluſieurs lieux de la lune ou pluſieurs obſervations d'éclipſes en différens temps de l'année, ſur les tables où l'on employoit déja l'équation de l'orbite, l'évection & la variation; tous ces calculs s'accordoient avec les obſervations au

mois de Janvier & au mois de Juillet ; ils s'en écartoient conſtamment d'abord au mois de Mars, enſuite au mois de Septembre en ſens contraire ; cela ſuffiſoit pour faire voir qu'il y avoit une inégalité attachée à l'équation de l'orbite ſolaire, & qui étoit à ſon *maximum* toutes les fois que le ſoleil étoit dans ſes moyennes diſtances. Cette équation annuelle eſt la plus grande dans les diſtances moyennes du ſoleil, quoiqu'elle dépende du plus grand & du plus petit éloignement, par la même raiſon que l'équation de l'orbite eſt nulle dans les deux apſides, & la plus grande dans les moyennes diſtances (1256). Auſſi-tôt que la vîteſſe actuelle ceſſe d'excéder la vîteſſe moyenne, la ſomme des excès accumulés juſqu'alors, c'eſt-à-dire, l'équation totale ſe trouve la plus forte & elle eſt à ſon *maximum* ; cette équation provenant de l'excès de la vîteſſe doit augmenter ſans ceſſe, tant que cette vîteſſe ſurpaſſe la moyenne, quelque petite que ſoit la différence.

DES PETITES INÉGALITÉS DE LA LUNE.

1454. Juſqu'alors la théorie de la lune n'étoit compoſée que des quatre équations dont nous avons parlé ; Horoccius les avoit employées de la manière la plus exacte. M. Halley en 1679 lui rendoit cette juſtice en diſant : *Unica vero* (theoria) *Horoccii noſtratis ad veritatem naturalem accedere videtur* ; en même temps il aſſure que l'évection & la variation peuvent ſe calculer à la fois par une ſeule hypothèſe, en ſuppoſant que dans la ligne des ſyzygies l'orbite de la lune eſt comprimée au-dedans & vers la terre d'environ la 90e. partie de la diſtance moyenne, & qu'elle eſt alongée d'autant dans la ligne des quadratures ; M. Halley n'accompagne ſon idée d'aucune eſpèce de calcul, il ſe contente de dire que cela eſt très-d'accord avec les lieux de la lune obſervés par M. Caſſini. Paris étoit

alors preſque le ſeul endroit de la terre, où l'on faiſoit & en très-grand nombre d'excellentes obſervations.

1455. Des trois inégalités de la lune découvertes avant le temps de Képler, les deux dernières avoient un rapport trop viſible avec le ſoleil pour que ce génie actif & pénétrant n'en cherchât pas la cauſe phyſique. La lune, diſoit-il, eſt miſe en mouvement par deux forces : ſavoir une qualité qui émane de la terre & qui entraîne la lune autour d'elle, & une autre force qui provient des rayons ſolaires, enſorte que quand la lune a fait 90° depuis ſa conjonction juſqu'à ſa quadrature, il y en a 88 qui proviennent de la force de la terre, & deux qui viennent de la lumière du ſoleil, (*Epit. aſtr. Cop. pag.* 552, 564, 780). Les idées phyſiques de ce grand homme firent naître dans la ſuite l'explication encore plus ſatisfaiſante que l'attraction nous donna enfin de toutes ces inégalités, (*v. Liv. XXII*), & cette même attraction a fait reconnoître une multitude d'autres inégalités dont nous avons à parler.

Képler entrevoit la cauſe de ces inégalités.

On a écrit ſans fondement que M. Halley avoit propoſé une autre correction pour la théorie d'Horoccius, c'eſt-à-dire, celle qui a été fixée depuis par M. Newton à 2′ 25″ (1463). Halley n'en avoit aucune idée, il indiquoit ſeulement une cauſe des changemens de latitude que Tycho avoit découverts, en diſant que le ſoleil qui envoyoit obliquement ſes rayons à la lune, l'obligeoit par une certaine puiſſance de s'approcher de lui; *efficit potentia quadam inſita ut propius ad ſe accedat*, (*Halley catal. ſt. auſtr.* 1679); mais Newton pluſieurs années auparavant avoit déja eu des idées de l'attraction univerſelle (3381).

1456. Les obſervations ſeules n'avoient pu faire découvrir aux aſtronomes que des inégalités qui alloient à pluſieurs minutes; peut-être l'équation annuelle n'eût pas même été reconnue par les obſervations, ſi elle n'avoit eu un retour conſtant dans les mêmes ſaiſons de l'année, ce qui la rendoit remarquable (1453). Auſſi toutes les autres petites inégalités dont il nous reſte

à parler, n'ont été d'abord ſoupçonnées que par l'idée de l'attraction, & n'ont été déterminées qu'en comparant avec cette théorie un grand nombre de bonnes obſervations ; il étoit réſervé à Newton de faire le plus grand pas dans la théorie de la lune, comme dans tout le reſte ; guidé par le principe de la gravitation univerſelle, & aidé des obſervations de Flamſteed, il détermina la quantité de pluſieurs nouvelles équations, avec les époques, & les moyens mouvemens. Cette belle théorie parut en 1702. Voy. *Davidis Gregorii aſtronomiæ phyſicæ & geometricæ elementa*, *Oxonii* 1702, *folio*. *Poſtea Genevæ* 1726, 2 *vol. in*-4°.

Théorie de Newton.

C'étoit la partie la plus précieuſe de cet ouvrage de Gregori qui contient d'ailleurs la plupart des grandes découvertes qu'on a faites dans la phyſique céleſte. La théorie de Newton, reparut de nouveau cinq ans après avec des explications & des tables, (*Prælectiones aſtronomicæ Cantabrigiæ habitæ à Guillelmo Whiſton*, 1707, 8°). Newton la publia auſſi dans la ſeconde édition de ſon fameux ouvrage intitulé : *Philoſophiæ naturalis principia mathematica*, 1713, 4°. Ce fut alors que l'on commença de conſtruire des tables conformes à ces nombres.

1457. M. de l'Iſle fut le premier qui vers 1715 ou 1716 calcula des tables de la lune d'après les nombres de Newton. M. Horrebow, profeſſeur à Copenhague, publia dans un journal littéraire de Hall, (*Bibliotheca noviſſima*), quelques tables de la lune qu'il aſſujettit autant qu'il put à la théorie de Newton, il les compara avec plus de 30 obſervations qui s'y accordoient aſſez bien. Le P. Grammatici, Jéſuite, publia en 1726 de petites tables de la lune, V. *Tabulæ lunares ex theoria Newtonis, a quodam Uranophilo e Soc. Jeſu, Ingolſtadii*, 1726, & calcula plus de 60 obſervations choiſies ſur ces tables, ſans y trouver d'erreurs ſenſibles. Leadbetter publia en 1728 de nouvelles tables de tous les mouvemens céleſtes, tirées de différens auteurs, & l'année ſuivante des tables particulières de la lune faites ſur la théorie de Newton, qui ont été réimpri-

mées depuis, (*Uranoſcopia or the contemplation of the Heavens, By Charles Leadbetter*, London, 1735, 2 *vol.* 8°).

1458. ROBERT WRIGHT publia la même année une adreſſe aux Lords prépoſés pour examiner les mémoires ſur la découverte des longitudes, où il fit voir par le calcul de pluſieurs obſervations comparées avec les tables, que la théorie de la lune étoit ſuffiſante pour remplir cet objet, il publia enſuite ſes tables avec le détail du calcul de 30 obſervations, dont la plupart ſont des éclipſes de lune, (*New and correct tables of the lunar motions, according to the Newton theory by Robert Wright*, 1732, 4°).

ANGE CAPELLI, chanoine de Parme, donna en 1733 des tables de la même nature. V. *Aſtroſcopia numerica in*-4°. *Venetiis*, & il calcula le lieu de la lune pour tous les jours de l'année 1736; afin que les aſtronomes puſſent y comparer leurs obſervations. V. *Commercium litterarium ad aſtronomiæ incrementum*, Tomus I, *autore Michaele Adelbulnero, Norimbergæ*, 1735, 4°. Ce journal ceſſa au mois de Mai 1736, 1739. Il parut encore d'autres tables calculées ſur le même principe. V. *The practical aſtronomy of the moon, or new tables of the moon's motions, exactly conſtructed from ſir Iſaac Newton's theory by Richard* DUNTHORNE, *Cambridge*, 1739, 8°.

1459. Flamſteed qui depuis ſes dernières tables publiées en 1681, n'avoit pas ceſſé de travailler à la même théorie, calcula auſſi des tables que M. le Monnier a publiées depuis, avec des augmentations conſidérables. V. *Inſtitutions aſtronomiques*, à Paris 1746, 4°. *pag.* 145. Ces tables ne diffèrent pas beaucoup de celles de M. Halley.

Enfin celles de M. Halley qui étoient imprimées depuis 1719, ont été rendues publiques en 1749; M. Halley y a négligé de petites équations, dont il ne croyoit pas la détermination aſſez sûre, & M. Newton diſoit à M. de l'Iſle en 1724, que ſi M. Halley eût employé toutes ces petites équations, & qu'il eût ajouté

une minute & demie à la longitude de la lune pour ſon accélération phyſique dans notre ſiècle (1483), il n'auroit trouvé preſque aucune différence entre l'obſervation & le calcul. V. *les lettres de M. de l'Iſle ſur les tables aſtron. de Halley*, dans les mémoires de Trévoux pour les mois de Janvier & Février 1750.

D'un autre côté Halley négligea deux des équations de Newton, parce qu'il trouva qu'il n'étoit pas poſſible de les déterminer par les obſervations que l'on avoit; il diſoit que ſi les erreurs de ſes tables alloient quelquefois à 5', c'étoit dans la partie de l'orbite lunaire, où Flamſteed l'avoit rarement obſervée, & où par conſéquent la théorie de Newton avoit manqué de ſecours; ajoutons que les obſervations de Flamſteed n'avoient pas toujours le degré d'exactitude néceſſaire pour un objet ſi délicat. Halley lui-même reconnut l'imperfection de ſes tables, & il l'expoſa aux yeux du Public avec le moyen qu'il croyoit propre à y remédier ou la table des erreurs pendant 18 ans (1501).

1460. Juſqu'alors c'étoit la théorie de Newton, & même les nombres qu'il avoit calculés, qui avoient produit toutes les tables de la lune; mais un géomètre auſſi laborieux que profond, commençoit vers 1745 à attaquer le problême des trois corps dans toutes ſes branches, c'étoit M. Euler; il vit bientôt que Newton n'avoit pas tiré des calculs de l'attraction, tout ce qu'on pouvoit en conclure, & il donna dans ſes opuſcules en 1746 de nouvelles tables de la lune, où il avoit fait uſage de la théorie autant qu'il lui avoit été poſſible juſqu'alors, mais il les donna beaucoup mieux encore trois ans après dans l'Almanach aſtronomique de Berlin pour 1750.

M. d'Alembert & M. Clairaut qui s'occupoient à peu-près vers le même temps des mêmes queſtions donnèrent auſſi des tables de la lune en 1754. Mais M. Mayer, aſtronome de Gottingue, ayant comparé les tables de M. Euler avec les obſervations, trouva moyen de les corriger avec tant de ſuccès qu'il publia en 1753, dans

le

le ſecond volume des mémoires de l'académie de Gottingen, des tables qui ne s'écartoient jamais de l'obſervation de 2′ (1471), tandis que dans les tables même de Halley il y avoit quelquefois des erreurs de 7 à 8′.

Nouvelles tables de Mayer.

Le ſuccès de Mayer dans ſes premieres tables l'encourageoit à les perfectionner encore ; il s'occupa lui-même de la théorie, il chercha l'équation générale de l'orbite d'après les calculs de l'attraction, il en rectifia tous les coefficiens par un grand nombre d'obſervations, & en 1755 il envoya de nouvelles tables à Londres, comme étant dignes de concourir au prix des longitudes. Après ſa mort, arrivée en 1762 (594), ſa veuve envoya à Londres une copie de ces tables encore perfectionnées, que M. Bradley vérifia par ordre des Commiſſaires de la longitude, & qui furent trouvées ſi exactes & ſi précieuſes pour la navigation, qu'on donna à ſa veuve une récompenſe de 3000 livres ſterling, (ou 68500 liv. de France). On a fait imprimer ces tables aux dépens de l'Etat en 1770 ; ce ſont celles que je publie de nouveau dans cet ouvrage, & dont je vais donner une idée.

J'ai déja dit qu'a l'équation annuelle de la lune, fixée par Horoccius, Newton avoit joint une équation annuelle pour l'apogée & une pour le nœud : ces trois équations ſont proportionnelles à l'équation de l'orbite du ſoleil, parce qu'elles ne dépendent, comme nous l'avons dit (1451), que de la diſtance du ſoleil, qui lorſqu'il eſt plus près de la terre dilate l'orbite de la lune & retarde par conſéquent ſon mouvement : il augmente au contraire le mouvement de l'apogée & des nœuds, qui n'ayant pas d'autre cauſe que l'action du ſoleil devient plus fort lorſque la cauſe augmente. La plus grande équation annuelle de la lune eſt dans Newton de 11′ 51″ pour la lune, 20′ 0″ pour l'apogée, & 9′ 30″ ſeulement pour le nœud, dont le mouvement eſt plus lent que celui de l'apogée ; elles ſont dans les nouvelles tables de 11′ 16″, 23′ 12″ & 8′ 50″.

Équation ſemeſtre.

1461. L'équation ſemeſtre de 3′ 45″ ou la ſeconde

équation, qui dans Newton dépend du double de l'*argument annuel*, fait partie de la Xe équation des tables de Mayer, qu'on trouvera dans cet Ouvrage; elle vient de ce que la force perturbatrice du ſoleil eſt plus grande lorſque le grand axe de l'orbite de la lune eſt dirigé vers le ſoleil, & doit produire une inégalité que Newton trouva, en effet, par les obſervations d'environ 3′ 45″ dans les moyennes diſtances du ſoleil, lorſque la ligne des apſides eſt éloignée de 45° du ſoleil; elle n'eſt que de 58″ dans les tables de Mayer; M. Clairaut la faiſoit de 2′ 13″, & M. d'Alembert la fait de 2′ 28″ (III. 28); cette équation, au lieu d'être 3′ 45″, ſuivant Newton, ne devroit être que de 3′ 34″ quand le ſoleil eſt dans ſon aphélie, & devenir de 3′ 56″ lorſqu'il eſt le plus proche de la terre; mais M. Halley négligea cette petite correction qu'il jugeoit de peu de conſéquence. Il négligeoit auſſi la ſeptième équation de Newton qui dépendoit de la ſimple diſtance de la lune au ſoleil, & qui étoit de 2′$\frac{1}{3}$ dans les quadratures, ſuivant la théorie de Newton (1465); celle-ci eſt de 1′ 57″ dans les tables de Mayer; de 2′ 5″ dans M. d'Alembert, & de 3′ 40″ dans M. Clairaut; elle fait partie de la XIIe équation dans les tables de cet ouvrage.

1462. L'équation de 58″ qui dépend de la double diſtance du ſoleil au nœud, ou l'équation ſemeſtre de Halley, & la neuvième dans M. Mayer, (V. les tables de la lune), vient de ce que l'action du ſoleil ſur la lune eſt un peu plus grande quand la ligne des nœuds paſſe par le ſoleil; elle étoit de 47″ dans Newton où elle formoit la troiſième équation. M. Clairaut la fait de 1′ 21″, M. d'Alembert de 1′ 9″ (*Recherches, &c. pag.* 28). M. Mayer l'a faite de 58″.

1463. L'équation de la lune que M. Halley appelle la quatrième équation, & qu'il ne faiſoit que de 2′ 25″, eſt appellée par M. Newton la ſixième équation, ou *la ſeconde équation du centre*; ſon argument ou la quantité dont elle dépend & qui en règle la meſure & les retours (3603), eſt la ſomme de la diſtance de la lune

au ſoleil & de la diſtance de leurs apogées ; ou le double de la diſtance de la lune au ſoleil moins l'anomalie moyenne de la lune, plus l'anomalie moyenne du ſoleil. On voit en général que ſi la lune étoit en conjonction & qu'elle fût apogée, le ſoleil étant périgée elle ſeroit le plus près du ſoleil qu'il ſoit poſſible, & par conſéquent plus expoſée à l'effet de la gravitation du ⊙, qui diminue ſa peſanteur vers la terre. Newton qui faiſoit ſa ſixième équation de 2′ 10″ l'employoit après l'équation de l'orbite, de ſorte qu'il employoit le vrai lieu de la lune pour la trouver ; mais Halley employoit celle-ci avant l'équation de l'orbite, afin que le lieu de la lune étant plus rapproché du vrai, il pût faire trouver l'excentricité & l'équation de l'orbite avec plus de préciſion ; cette équation eſt de 2′ 9″ dans nos tables où elle eſt la ſixième.

1464. M. Halley n'employoit dans ſes tables que ces trois petites équations avec l'équation annuelle ; ce n'étoit pas aſſez pour parvenir à la préciſion d'une minute : M. Mayer en a ajouté ſix autres ; M. Clairaut en employe 18 indépendamment des quatre grandes équations, & de celles de la latitude.

1465. La ſeptième équation de la lune dans Newton & dans les tables de Flamſteed eſt de 2′ 20″, dans les quadratures ; elle dépend de la diſtance de la lune au ſoleil ; & elle eſt ſouſtractive dans les ſix premiers ſignes de la diſtance ; M. Mayer la fait de 1′ 57″, elle eſt compriſe dans la douzième table (1461).

1466. L'inégalité que nous avons appellée avec M. Boulliaud *évection*, (1441) ; eſt variable à raiſon des diſtances du ſoleil à la terre ou de celles de la lune à la terre : car quand le ſoleil ou la lune s'éloignent de la terre, l'évection diminue : on trouvera dans la table V^e^. la quantité moyenne de l'évection ; mais ſes acceſſoires ou ſes variations ſont contenues dans les tables V^e^. VIe. VIIe. & dans la Xe. qui dépend de l'argument annuel. Dans la table X^e^ de la variation, qui eſt la douzième équation, M. Mayer a encore ajouté une

autre petite équation qui a le même argument & qui tient à l'évection (1465). M. d'Alembert a décomposé ces équations pour examiner la manière dont sa théorie s'accordoit avec les équations supposées dans les premières tables de Mayer; il faut voir la table qu'il en donne dans ses *Recherches*, &c. Tom. III, *pag.* 28.

1467. La variation que nous avons expliquée ci-devant (1445), & qui est un effet de la force du soleil qui accélère ou retarde le mouvement de la lune dans son orbite (3469, 3481), se trouvera dans la table XIIe. quant à sa partie moyenne; mais elle devient plus grande quand le soleil s'approche de la terre ou que la lune s'en éloigne; les changemens qu'elle éprouve par la distance du soleil à la terre & qui dépendent de l'anomalie moyenne du soleil sont renfermés dans les tables II. & III; & ceux qui proviennent du changement de distance de la lune à la terre, par l'équation IV. & une partie de la Ve. Newton admettoit un changement de 2′ 10″ en plus & en moins dans la variation; il faisoit la plus grande variation de 37′ 25″, le soleil étant périgée, & de 33′ 4″ le soleil étant apogée; les équations précédentes produisent à peu-près le même résultat.

1468. L'équation VIII. de 34″ est un supplément nécessaire de l'équation annuelle (1448); car cette inégalité vient de la force du soleil sur la lune, en tant que l'orbite du soleil est excentrique, & que sa distance à la terre est variable; mais cette équation annuelle étant considérable, elle ne peut manquer de changer lorsque la distance de la lune à la terre varie; car alors non-seulement la lune est plus ou moins près du soleil; mais sa vîtesse devenue différente, donne aussi plus ou moins de prise à l'action du soleil: pour cet effet, M. Mayer y a ajouté l'équation qui sera marquée la huitième dans nos tables, dont l'argument est l'anomalie moyenne de la lune moins celle du soleil; & comme cette table ne suffit pas encore pour représenter toute l'inégalité, il a renfermé le reste d'une façon

particulière dans l'équation de 23′ 12″ qu'on applique à l'anomalie moyenne, & qui ſuit les petites équations du moyen mouvement; elle renferme auſſi l'inégalité annuelle du mouvement de l'apogée (1451).

1469. Les équations renfermées dans les tables IX. & XIII. dépendent de l'inclinaiſon de l'orbite lunaire, parce que la force du ſoleil agit plus ou moins obliquement ſur la lune, ſuivant qu'ils ſont l'un & l'autre plus ou moins éloignés des nœuds, & ſitués dans des plans plus ou moins différens; dès-lors le mouvement de la lune en eſt diverſement affecté; à cela ſe joint l'excentricité qui rend cette force plus grande dans l'apogée de la lune. Voila pourquoi l'équation de la table XIII. dépend du double de l'argument de latitude moins l'anomalie de la lune.

1470. Indépendamment des trois grandes équations & des 9 petites dont j'ai tâché de donner une idée générale, il y en a encore quelques-unes que M. Mayer dit avoir réunies aux précédentes (quand il a pu les aſſujettir à un même argument) ſur-tout à l'équation de l'anomalie moyenne; il y en a d'autres enfin qu'il a regardées comme négligeables par leur petiteſſe, ou dont il n'a pu détermier aſſez exactement la véritable quantité par les obſervations; M. Clairaut emploie plus de vingt équations, mais il y en a pluſieurs qui reviennent à une partie de celles qui ſont dans les tables de Mayer.

Exactitude des tables de Mayer.

1471. M. Mayer au moyen de ces 10 petites équations, combinées & ajuſtées ſur 200 obſervations de la lune, tant de ce ſiècle-ci que du précédent, étoit venu à bout dès 1753 de repréſenter ces obſervations avec la préciſion la plus grande qu'on eût encore obtenue: à peine ſur ce grand nombre s'en trouvoit-il dix dont le calcul s'écarta d'une minute & demie; aucune des erreurs ne montoit à deux minutes, & le nombre de celles qui n'alloient qu'à quelques ſecondes étoit conſidérablement le plus grand; M. de Chaligny ayant pris la peine de calculer pour moi ſur ces tables 104 obſer-

vations, faites depuis le 15 Septembre 1760 juſqu'au 31 Décembre 1761, n'en trouva que 6 où l'erreur fût au-delà d'une minute, il n'y en avoit qu'une dont l'erreur étoit de 1′ 52″, & une de 1′ 19″. Si l'on conſidère enſuite la ſimplicité & la commodité de ces tables, on ne ſera pas ſurpris que je les aie préférées juſqu'ici aux autres tables de la lune, pour mes calculs annuels de la connoiſſance des temps ; c'eſt par la même raiſon que je les avois inſérées dans la connoiſſance des temps de 1761, & dans la première édition de cette aſtronomie ; le P. Hell, M. Maskelyne, M. de Charniere & M. l'Abbé de Rochon les firent encore imprimer dans d'autres ouvrages ; mais celles qui ſe trouvent dans cette nouvelle édition & qui viennent d'être imprimées à Londres ſont encore plus parfaites (1460).

1472. Ces nouvelles tables ne ſont pas exactement conformes aux équations que M. Mayer avoit données dans ſa théorie, qui vient d'être imprimée à Londres avec les mêmes tables, parce qu'il avoit corrigé les équations, même après avoir envoyé ſa théorie à Londres. Voici les équations telles qu'elles réſultent des tables, que j'ai décompoſées pour donner ſéparément celles qui ſont réunies enſemble dans une même table.

Pour former les argumens de ces équations ; on commence par chercher le vrai lieu du ſoleil, par les élémens qui ont été donnés ci-devant (1278, 1312, 1330), enſuite le lieu moyen de la lune de ſon apogée & de ſon nœud (1480) pour le moment donné ; le lieu de l'apogée retranché du lieu moyen de la lune donne ſon anomalie moyenne ; on applique enſuite à cette anomalie moyenne de la lune l'équation annuelle qui vient des inégalités de l'apogée = 23′ 12″ ſin. anom. moy. ☉, & au ſupplément du nœud ſon équation annuelle — 8′ 50″ ſin. anom. ☉ ; mais on n'emploie l'anomalie de la lune corrigée auſſi bien que le nœud corrigé, que pour la onzième équation pour laquelle on corrige encore l'anomalie avec toutes les dix pre-

mières équations ; pour la douzième, on applique à la distance de la lune au soleil même la onzième équation ; pour la treizième on employe la longitude corrigée par la douzième, & pour la quatorzième on employe la longitude vraie de la lune dans son orbite.

Table I. Equat. ann.	+	11′ 16″		sin. anomalie moyenne du ☉
	−	0	3	sin. 2 anomalie moy. ☉
II.	−0	0	54	sin. 2 distance moy. ☾☉ + anomalie moy. ☉
III.	−0	1	9	sin. 2 dist. moy. ☾☉ — anomalie moy. ☉
IV.	+0	0	57	sin. 2 dist. moy. ☾☉ + anom. moy. ☾
V. Evection.	−1	20	33	sin. 2 dist. moy. ☾☉ — anom. moy. ☾
	+	0	36	sin. 4 dist. moy. ☾☉ — 2 anom. moy. ☾
VI.	+	2	9	sin. arg. évection + anom. moy. ☉
VII.	+	0	49	sin. arg. évection — anom. moy. ☉
VIII.	+	0	34	sin. anom. moy. ☾ — anom. moy. ☉
IX.	+	0	58	sin. 2 dist. moy. ☾☉ — 2 arg. moy. de latit. ou sin. 2(☊ − ☉)
X.	+	0	16	sin. dist. moy. ☾☉ — anom. moy. ☾, ou sin. (apog. ☾ − ☉)
	−	0	58	sin. 2 dist. moy. ☾☉ — 2 anom. ☾, ou sin. 2 (ap. ☾ − ☉)
XI. Equation de l'orb.	−6	18	15	sin. anom. ☾ corrigée par les équ. précéd. & par son éq. A.
	+	12	58	sin. 2 anom. ☾
	−		37	sin. 3 anom. ☾
XII. Variat.	−	1	57	sin. dist. ☾☉ corrigée par les équations précédentes.
	+	35	43	sin. 2 dist. ☾☉
	+		2	sin. 3 dist. ☾☉
	+		10	sin. 4 dist. ☾☉
XIII.	+	1	23	sin. 2 arg. latit. corrigée — anomal. corrigée.
XIV. Réduct.	−	6	43	sin. 2 argum. latit. (1130)
XV. Nutation.	−	0	18	sin. longit. moy. ☊ (2863)

1473. On pourra voir dans la seconde édition des tables de M. Clairaut, faite en 1765, une semblable formule, dans laquelle on n'emploie que les longitudes moyennes du soleil & de la lune, ce qui en rend l'usage plus

facile, mais le nombre des équations eſt un peu plus conſidérable, & j'ignore ſi l'exactitude de ces tables approche de celle que donne la formule précédente.

Réflexions générales.

1474. J'aurois bien ſouhaité de pouvoir donner ici une notion plus diſtincte de toutes ces inégalités de la lune, leur quantité, la maniere dont on les a découvert & dont on peut les conſtater; mais dans tout ce qui s'eſt fait juſqu'ici ſur cette matiere, il y a encore trop d'incertitude & d'obſcurité, M. Clairaut emploie 22 équations, mais les géomètres qui s'en ſont occupés depuis 25 ans, n'ont point donné les détails de leurs procédés, & ne ſont point d'accord ſur les quantités des équations, ſur leur utilité, ſur leur exactitude; il ſe paſſera plus de 50 ans avant qu'on puiſſe donner de pareils détails dans un traité d'aſtronomie, avec de la briéveté & de l'exactitude.

Des tables faites ſur la ſeule théorie.

1475. Les tables de la lune données par Képler, Horoccius, Flamſteed, Caſſini & Mayer, ont pour fondement les obſervations mêmes; car quoique Newton eût trouvé à peu-près la forme de ſes équations par le principe de l'attraction, il en avoit déterminé la quantité par les obſervations de Flamſteed; Mayer chercha de même dans la théorie & les calculs de M. Euler la forme de ſes tables, mais il paroît qu'il les ajuſta ſur les obſervations de M. Bradley, à force de tentatives, d'eſſais & de calculs.

Cependant le ſeul principe de l'attraction en raiſon inverſe du carré de la diſtance, devroit ſuffire, ce ſemble, pour calculer, ſans le ſecours de l'obſervation, toutes les petites inégalités de la lune; c'eſt ce qu'ont entrepris les plus fameux géomètres de ce ſiècle, M. Euler, M. Clairaut, M. d'Alembert, & pluſieurs autres après eux; mais ils conviennent tous qu'il eſt douteux qu'on puiſſe parvenir à fixer par la ſeule théorie toutes ces petites inégalités. M. d'Alembert, (dans le mercure de Sept. 1757, *pag.* 109), dit que la valeur des coëfficiens des équations lunaires, trouvés par la théorie, eſt encore fort incertaine; il me paroît très-douteux, (ajoute-t-il),

(ajoute-t-il) , qu'on puiſſe parvenir à les fixer par la théorie ſeule ; il ne faut pas ſe preſſer d'aſſurer aux tables de M. Mayer l'exactitude aſtronomique ; d'ailleurs il y a employé un tâtonnement fait ſur les ſeules obſervations. M. d'Alembert dit à peu-près la même choſe en pluſieurs endroits de ſes *Recherches*, ſur la néceſſité d'avoir recours aux obſervations pour déterminer ces coëfficiens, (III , 31).

1476. M. Clairaut, dans le journal des ſavans (Déc. 1757), répondit que M. Mayer n'avoit omis dans ſes tables aucune des équations qui ſont eſſentielles pour la longitude de la lune, & qui ne demandent pas une extrême attention dans les calculs de la théorie ; mais cette réponſe même n'indique-t-elle pas que dans les autres équations qu'on peut ajouter à celles de M. Mayer, il reſte quelque doute du côté de la théorie ; je ſais d'ailleurs que M. Clairaut a fait un grand uſage des obſervations pour rectifier les coëfficiens de ſes équations, & qu'il a varié beaucoup ſur la valeur de quelques-unes, ſur-tout de celles qui dépendent de t, $2t - 2y$, z, $y+z$, $2s-y$; t eſt la diſtance de la lune au ſoleil ; y eſt l'anomalie ; s l'argument de latitude ; & z l'anomalie du ſoleil.

On trouvera dans le XXIIe livre la formé & les principes de ces recherches (3468) ; nous n'en ſuivrons pas le détail pour chacune des inégalités de la lune, parce que ce détail eſt prodigieux, & qu'il exigeroit des volumes : d'ailleurs ceux qui ont eu la conſtance de les faire, n'ont pas encore pû ſe déterminer à les publier ; on trouvera tout ce qui s'eſt fait là-deſſus dans trois ouvrages que nous allons indiquer, qui ſont de MM. d'Alembert, Clairaut & Euler.

1477. L'ouvrage de M. Euler a pour titre : *Theoria motûs lunæ exhibens omnes ejus inæqualitates, authore L. Eulero, Petropoli*, 1753, *in*-4°. 347 *pag.* La pièce du même auteur qui a remporté le prix de l'académie en 1770, contient ſur la même matiere beaucoup de nouvelles recherches.

1478. L'ouvrage de M. Clairaut eſt la *pièce qui a remporté le prix de l'académie Impériale des ſciences de S. Péterſbourg, propoſé en* 1750, *ſur la théorie de la lune*, elle fut imprimée à Péterſbourg dès l'année 1752, en 92 *pag. in*-4°. & M. Clairaut en a fait imprimer une nouvelle édition, à Paris chez Deſaint & Saillant 1765, avec des tables de la lune.

1479. L'ouvrage où M. d'Alembert a approfondi cette matiere, eſt intitulé : *Recherches ſur différens points importans du Syſtême du Monde*, Iere partie, 1754, *in*-4°. 260 *p.* On y trouve des tables de la lune de M. d'Alembert ; elles ont été publiées de nouveau avec des corrections dans le ſecond volume de ſes *Opuſcules mathématiques* en 1762, avec pluſieurs nouvelles conſidérations ſur la théorie de la lune. Les volumes ſuivans de ſes recherches & de ſes opuſcules, contiennent beaucoup de ſupplémens à ce travail. On peut ajouter à ces trois ouvrages primitifs ceux de Mayer, de Simpſon, du P. Walmſley, du P. Friſi, &c. ſur la même matiere.

Élémens principaux de la théorie de la Lune tirés de l'obſervation ſelon divers Auteurs.

1480. Mouvement ſéculaire pour cent années Juliennes, dont 25 ſont biſſextiles, ou 36525 jours moyens.

Képler & Horoc.	10^s^	7°	48′	51″
Newton, Flamſteed & Halley,	10	7	50	25
la Hire,	10	7	50	1
Caſſini,	10	7	49	52
Mayer, *an. tab.*	10	7	52	20
Nouv. tab.	10	7	53	35

Mouvement de l'apogée pour cent années Juliennes.

Képler & la Hire,	3	19	14	16
Horoccius,	3	19	4	16
Flamſteed, Halley, & Mayer, *dans les deux éditions*,	3	19	11	15
Caſſini,	3	19	14	16
Bailly, (*mém. ac.* 1763)	3	19	5	0

Mouvement séculaire du Nœud.	Képler, Horoccius & la Hire,	4ˢ	14°	11°	7″
	Flamst. & Halley,	4	14	11	15
	Cassini,	4	14	11	5
	Mayer, *An. & nouv. tables*,	4	14	11	15
Epoque de la longitude moyenne de la Lune pour 1750.	Képler,	6	8	13	49
	Horoccius,	6	8	12	49
	la Hire,	6	8	18	5
	Flamsteed,	6	8	16	19
	Halley,	6	8	15	19
	Cassini,	6	8	14	55
	Mayer, *Anc. tab.*	6	8	16	53
	Nouv. tab.	6	8	17	19
Epoque ou longitude de l'apogée pour 1750.	Képler,	5	21	30	33
	Horox,	5	20	30	33
	La Hire,	5	20	40	54
	Flamsteed,	5	20	58	52
	Halley,	5	20	58	52
	Cassini,	5	21	1	21
	Mayer, *Anc. tab.*	5	20	56	47
	Nouv. tab.	5	20	55	51
Epoque ou longit. du Nœud pour 1750.	Képler,	9	10	33	14
	Horox,	9	10	15	14
	La Hire,	9	10	21	0
	Flamsteed,	9	10	15	0
	Halley,	9	10	13	59
	Cassini,	9	10	18	8
	Mayer, *An. & nouv. tables*,	9	10	19	9
Equation du centre.	Flamsteed, *moyen.*	6	18	43	
	Euler,	6	18	18	
	D'Alembert, III, 29,	6	18	43	
	Clairaut,	6	18	1	
	Mayer, *Anc. tab.*	6	18	44	
	Nouv. tab.	6	18	32	

Je ne compare pas avec ces tables celles de M. de la Hire, de M. Caſſini, de M. Halley, quant à l'équation de l'orbite & à l'évection, parce que ces deux équations y étoient combinées d'une façon particulière.

L'excentricité moyenne, employée par M. Clairaut, eſt comme dans M. Halley 0, 05505, ou 5505 parties, dont la diſtance moyenne contient 100000. Enſuite il la diminuée de $\frac{1}{171}$ pour rapprocher ſa formule des obſervations auxquelles il l'avoit comparée, mais il a conſervé la première dans ſa ſeconde édition *pag.* 59. Cette excentricité donne pour équation 6° 18′ 18″ 4; mais pour trouver celle de Mayer 6° 18′ 32″, il faut ſuppoſer l'excentricité 0, 055083, parce que ſa table de l'équation de l'orbite renferme encore quelque partie des perturbations du ſoleil (V. M. d'Alembert, III. 29). L'excentricité, ſuivant. M. Mayer, étoit de 5454, enſuite il l'augmenta de $\frac{1}{30}$ ce qui donne 5472 (Théor. *pag.* 50). Cette excentricité dans une orbite elliptique donneroit pour équation 6° 16′ 3″.

Sur les autres équations de la lune, voyez les articles précédens; ſur la parallaxe de la lune & ſon diamètre, voyez le Livre IXe.

Révolutions. 1481. Les révolutions de la lune, de ſon apogée & de ſon nœud peuvent ſe déduire de leurs mouvemens ſéculaires : en ſuppoſant la préceſſion de 1° 23′ 54″ par ſiècle, & les moyens mouvemens tels qu'ils ſont dans les nouvelles tables (1480), je trouve les révolutions de la manière ſuivante.

Révolution tropique de la lune,	27^j	7^h	43′	4″,65
Révolution ſidérale de la lune,	27	7	43	11, 51
Révolution ſynodique,	29	12	44	2, 89
Année lunaire de 12 révolutions ſynodiques,	354	8	48	35
Révolution anomaliſtique,	27	13	18	33, 92
Révolution par rapport au nœud,	27	5	5	49, 17
Révolution tropique de l'apogée 8 ans 311^j ou	3231,	8	34	57, 6
Suivant M. Caſſini, *pag.* 312	3231	8	0	

Révolution ſidérale de l'apogée,	3232^j	11^h	14′	31″,	0
Révolution tropique du nœud 18 années communes & 228^j ou	6798	4	52	52,	3
Suivant M. Caſſini, *pag.* 288,	6798	7	0		
Révolution ſidérale du nœud	6803	2	55	18,	4
Mouvement diurne de la lune par rapport à l'équinoxe,	13°	10′	35″,	02847365	
Mouvement diurne de l'apogée,	0	6	41,	06981520	
Mouvement diurne du nœud,	0	3	16,	38603696	

Le mouvement de la lune par rapport aux étoiles fixes étant pris pour unité, celui de l'apogée eſt 0, 0084522592, & celui du nœud 0, 0040160476, auſſi par rapport aux étoiles; c'eſt celui dont on a beſoin dans la théorie de l'attraction.

1482. La diſtance moyenne de la lune à la terre eſt de 85393 lieues, (chacune de 2283 toiſes, ou de 25 au degré) (1718). Diſtance.

Le diamètre vrai de la lune (1717) nous apprendra que ſon volume eſt la 49e. partie de celui de la terre. La maſſe ou la quantité de la matière de la lune eſt $\frac{1}{70}$ de celle de la terre, comme nous le dirons en parlant de ſa denſité dans le livre XXII. (3414). Groſſeur.

Accélération du moyen mouvement de la Lune.

1483. L'ÉQUATION SÉCULAIRE qu'on trouvera dans les tables de la lune exprime une accélération qu'on a remarquée depuis long-temps dans les moyens mouvemens de la lune; la durée de ſa révolution en mettant à part toutes ces inégalités, eſt plus courte actuellement de 22 tierces de temps qu'elle n'étoit il y a 2000 ans; ce qui produit un degré d'erreur ſur le lieu de la lune quand on le calcule pour l'année 300 avant J. C. en employant le mouvement de la lune qui convient aux obſervations modernes, c'eſt-à-dire, 10^s 7° 53′ 35″ par ſiècle.

Auteurs qui en ont parlé.

M. Halley ſur la fin du dernier ſiècle fut le premier qui remarqua cette accélération phyſique dans le mouvement de la lune, (*Philoſ. tranſ.* n°. 204 & 218 : il en parla en 1693 & 1695 à l'occaſion des obſervations d'Albategnius & des ruines de Palmyre ; Newton dans la ſeconde édition de ſes principes, *pag.* 481, cite M. Halley comme ayant reconnu le premier cette accélération ; M. Dunthorn a examiné enſuite cette matière (*Philoſ. tranſ.* 1749 & 1750, n°. 491 *pag.* 162) ; M. Mayer en parle dans le ſecond volume des mémoires de Gottingen, (*Comment. ſoc. Gotting.* 1752, *pag.* 383) ; enfin j'ai diſcuté cette matière avec encore plus de ſoin & de détails dans les mémoires de l'académie pour 1757, *pag.* 426. Voici en peu de mots le réſultat de mes recherches à ce ſujet.

1484. Pour connoître l'inégalité du moyen mouvement de la lune entre les anciennes obſervations de l'an 720 avant J. C. & celles de notre ſiècle ; il faut néceſſairement en avoir qui ayent été faites dans un ſiècle intermédiaire, & l'on en trouve très-peu. Les obſervations les plus remarquables que l'on puiſſe y employer ſont deux éclipſes de ſoleil obſervées à Geſſa qui étoit à 6 ou 7 milles du Caire, l'an 977 & 978, par les aſtronomes du Roi Abu-Haly-Almanzor le Sage, qui commandoit en Egypte ; ces obſervations ſont dans un manuſcrit d'Ibn Junis. Pour repréſenter ces éclipſes j'ai trouvé qu'il falloit ſuppoſer le moyen mouvement ſéculaire de la lune $10^s\ 7^\circ\ 53'\ 21''$ dans ce ſiècle-ci, plus grand de $3'\frac{1}{2}$ que dans M. Caſſini, & y appliquer une équation ſéculaire de $9''\ 886$ pour le premier ſiècle. Mayer qui ne la faiſoit que de $7''$ dans ſes premières tables la fait de $9''$ actuellement. Cette équation de $9''$ augmente enſuite comme le carré des temps (1166), & devient de $1^\circ\ 26'\ 24''$ pour l'année 700 avant J. C. Cette équation ſéculaire fait que la durée de la révolution de la lune n'eſt dans ce ſiècle ici que de $27^j\ 7^h\ 43'\ 4'',\ 648$, tandis qu'elle étoit de $27^j\ 7^h\ 43'\ 5'',\ 1386$ il y a 2000 ans,

1485. Je dois cependant avertir que M. Griſchow étant à Leyde en 1749, engagea M. Schultens, profeſſeur en langue Arabe à faire la recherche & la traduction du Mſſ. Arabe, dont ces obſervations ſont tirées ; M. Bevis m'a communiqué cette traduction ; on y trouve des obſcurités, & M. Bevis penſe même qu'on y a mêlé le calcul avec de véritables obſervations ; il ſeroit à ſouhaiter qu'on s'aſſurât mieux d'un fait auſſi intéreſſant ; les perſonnes inſtruites dans les langues Orientales, & qui n'ont encore preſque rien fait pour nos ſciences, n'auroient pas de meilleures occaſions de rendre leurs études utiles. Il y a dans le même manuſcrit une éclipſe de lune du 14 Mai 979, qui étoit mal rendue dans la traduction de Skikardus, mais qui s'accorde avec le calcul quand on rectifie la traduction. Incertitude à ce ſujet.

Au reſte la néceſſité de cette équation ſéculaire paroît être prouvée encore par les obſervations faites depuis 60 ans ; en effet, M. Mayer a trouvé le mouvement pour 60 ans de $1^s\ 10^\circ\ 44'\ 9''$, plus grand de deux minutes que ne le donnent les anciennes obſervations. Toutes les éclipſes du dernier ſiècle s'accordent à la minute avec cette accélération, tandis que les erreurs vont à 2 ou 3 minutes quand on employe le mouvement moyen des autres tables. Enfin 42 obſervations de M. de la Hire calculées avec ſoin par M. de la Caille & par M. Bailly indiquent qu'il faut ajouter environ $38''$ au mouvement pour 60 ans établi par M. Mayer dans ſes premières tables (*Mém. acad.* 1763, *pag.* 24), & dans les nouvelles tables Mayer a effectivement ajouté $45''$. Ainſi l'équation ſéculaire eſt de $9''$ pour le premier ſiècle ou de 1° pour 2000 ans, & le mouvement moyen pour le commencement du 18e ſiècle eſt de $4^s\ 9^\circ\ 23'\ 5''$ par année, ce qui feroit $10^s\ 7^\circ\ 53'\ 35''$ par ſiècle s'il étoit uniforme pendant cent ans.

DES NŒUDS ET DE L'INCLINAISON DE L'ORBITE LUNAIRE.

1486. L'ORBITE de la lune eſt inclinée ſur l'écliptique, de même que celles de toutes les autres planètes (1116); ainſi la lune traverſe l'écliptique deux fois dans chaque révolution, & ſept jours après avoir traverſé l'écliptique dans un de ſes nœuds elle s'en éloigne de 5 degrés : ſans cette inclinaiſon nous aurions tous les mois une éclipſe de ſoleil le jour de la conjonction, & une éclipſe de lune le jour de l'oppoſition; mais au contraire il y a des années entières où il n'arrive aucune éclipſe de lune (par exemple, en 1763), parce qu'au moment de chaque oppoſition la lune eſt trop éloignée de ſon nœud, & ſe trouve par conſéquent au-deſſus ou au-deſſous de l'écliptique où reſtent toujours le centre du ſoleil, & l'ombre de la terre.

LE NŒUD ASCENDANT de la lune où celui par lequel elle traverſe l'écliptique en s'avançant vers le nord s'appelle quelquefois *la tête du dragon*, & ſe déſigne par ce caractère ☊ : le nœud deſcendant ou queue du Dragon par celui-ci ☋.

1487. Ce qu'il y a de plus remarquable dans les nœuds de la lune c'eſt la promptitude de leur mouvement; ſi la lune traverſe l'écliptique dans le premier point du Bélier ou dans le point équinoxial (comme cela arrivoit au mois de Juin 1764) dix-huit mois après c'eſt dans le commencement des poiſſons qu'elle coupe l'écliptique, c'eſt-à-dire, que ſon nœud a rétrogradé de 30 degrés ou d'un ſigne entier; & il fera de même tout le tour du ciel dans l'eſpace de 18 années communes 228 jours $4^h\ 52'\ 52''$. Ce mouvement des nœuds fut aiſé à reconnoître en voyant la lune éclipſer par exemple la belle étoile du cœur du Lion ou *Regulus* qui eſt ſur l'écliptique même : quand la lune éclipſe *Regulus* (comme cela arrivoit au mois de Juin, 1757) elle

Révolution des Nœuds.

elle eſt évidemment dans ſon nœud ; mais quelques années après ; on voit qu'au lieu d'éclipſer *Regulus* elle paſſe 5° plus haut ou plus bas, au nord ou au midi de l'étoile : donc le nœud de l'orbite lunaire n'eſt plus alors au point de l'écliptique où ſe trouve *Regulus* ; mais à 90° degrés de-là ; il en eſt de même des autres étoiles. Toutes les fois que la lune a été en conjonction avec une étoile, de manière à en paſſer fort près ; elle ſe trouve le mois ſuivant plus éloignée de l'étoile, & toujours de plus en plus. Au bout de 19 ans on la voit revenir par les mêmes points du ciel & couvrir les mêmes étoiles, ce qui prouve aſſez que le nœud de la lune fait le tour du ciel dans cet eſpace de temps.

1488. Les éclipſes de lune ſont de la même grandeur quand la lune eſt à la même diſtance de l'écliptique ou à la même diſtance de ſon nœud (1786). *Hipparque* ayant comparé entr'elles des éclipſes de lune obſervées depuis les Chaldéens juſqu'à lui, trouva que dans l'eſpace de 5458 mois lunaires la lune avoit paſſé 5923 fois par ſon nœud. Cela lui ſervit à trouver le mouvement diurne de la lune par rapport à ſon nœud de 13° 13′ 45″ 39‴ $\frac{2}{3}$, (Riccioli, *Almag. tom. I, pag.* 252), & ce réſultat s'eſt trouvé fort exact : car, ſuivant Boulliaud (*Aſtron. philol. pag.* 154), il eſt de 13° 13′ 45″ 39‴ 38^{iv}, & ſuivant Riccioli 13° 13′ 45″ 29‴ 28⁗ en y employant deux obſervations bien choiſies. Cet élément eſt ſi facile à déterminer par les éclipſes de lune obſervées (1419) & comparées avec les nôtres, qu'il n'y a là-deſſus aucune incertitude. J'ai donné ci-deſſus les réſultats de différentes tables pour le mouvement ſéculaire du nœud (1480), dans celles de Mayer, il eſt de 4^{s} 14° 11′ 15″ pour cent années Juliennes, outre les cinq révolutions completes, par rapport aux équinoxes.

Mouvement par rapport au Nœud.

1489. Le mouvement total du nœud en 100 ans par rapport aux équinoxes eſt de 6963075″ & de 6958041″, par rapport aux étoiles fixes, celui de la lune eſt de 1732559381″ ; d'où il eſt aiſé de conclure

que le mouvement moyen de la lune par rapport aux étoiles étant pris pour unité, celui de ſon nœud eſt égal à la fraction décimale 0, 00401604 76 dont le logarithme eſt 7, 6037988; le mouvement de la lune par rapport à ſon nœud eſt donc 1, 00401604 76. La révolution de la lune par rapport au nœud ſe trouveroit en diviſant par ce dernier nombre la révolution ſydérale $27^j\ 7^h\ 43'\ 11''\ 51$; car la révolution par rapport aux étoiles eſt à la révolution par rapport au nœud, comme le mouvement par rapport au nœud eſt au mouvement par rapport aux étoiles. On la trouvera auſſi en diſant: la ſomme des mouvemens ſéculaires de la ☾ & du nœud 1739517422″, eſt à un ſiècle comme 360° ſont à un quatrième terme 2351149″ 1709, ainſi cette révolution de la lune par rapport au nœud qui étoit de $27^j\ 5^h\ 5'\ 36''$ ſuivant Riccioli, eſt ſelon nous de $27^j\ 5^h\ 5'\ 49''$ 1709.

Révolution par rapport au Nœud.

1490. L'orbite de la lune fait avec l'écliptique un angle d'environ cinq degrés, c'eſt-à-dire, que la lune lorſqu'elle eſt à 90° de ſes nœuds a environ 5° de latitude; mais cette plus grande latitude qui n'eſt que de 5° dans les nouvelles lunes ou les pleines lunes qui arrivent à 90° des nœuds, ſe trouve de 5° 18′ dans les quadratures, lorſquelles ſont obſervées de même à 90° des nœuds, c'eſt-à-dire, que l'inclinaiſon de l'orbite lunaire eſt la plus petite dans les ſyzygies, & la plus grande dans les quadratures; Ptolomée ne connoiſſoit pas cette différence: il ſuppoſoit l'inclinaiſon conſtante & toujours de 5°. Copernic lui-même (*Lib. IV. cap.* 4), n'avoit pas examiné la choſe de plus près. Tycho-Brahé fut le premier qui fit cette remarque importante pour la théorie de la lune; & après avoir découvert la troiſième inégalité de la lune par ſes obſervations (1445), il découvrit auſſi le changement de l'inclinaiſon, & l'inégalité du mouvement des nœuds de la lune, comme il le dit à la 26e. page du petit appendix que j'ai déja cité (1442).

1491. On s'eſt perſuadé mal à propos, dit Tycho,

que les limites de la plus grande latitude de la lune étoient toujours les mêmes & alloient conſtamment à 5°. Ptolomée, Albategnius, Alphonſe, ont été ſuivis en cela par Copernic avec trop de confiance, comme dans pluſieurs autres occaſions : on a eu tort de croire auſſi que les nœuds de la lune avoient un mouvement uniforme & régulier. Des obſervations faites depuis quelques années avec le plus grand ſoin, nous ont forcé d'abandonner les anciennes traditions ſur leſquelles nous avions compté juſqu'alors ; nous avons trouvé que dans les nouvelles & pleines lunes la latitude de la lune eſt de 4° 58′½, à peu-près comme l'établiſſoit Ptolomée ; mais dans les quadratures elle va juſqu'à 5° 17′½, & nous nous en ſommes aſſurés par des obſervations exactes & multipliées faites dans les limites auſtrales & boréales, & dans les deux tropiques, en tenant compte des réfractions & des parallaxes.

Inégalité découverte par Tycho.

1492. Tycho reconnut auſſi dans les nœuds de la lune une inégalité qui dans les nouvelles & pleines lunes n'étoit pas ſenſible, auſſi elle n'avoit pas été remarquée par les anciens qui n'obſervoient preſque jamais la lune, ſi ce n'eſt dans les éclipſes ; mais dans les autres ſituations il trouvoit 1° 46′ de différence ſur le lieu du nœud, ce qui faiſoit environ 12 minutes de plus ou de moins ſur la latitude de la lune aux environs des nœuds.

Inégalité du Nœud.

1493. Enfin Tycho vit que ces deux inégalités de l'inclinaiſon & du nœud pouvoient ſe repréſenter à la fois par le mouvement du pole de l'orbite lunaire dans un petit cercle tel que *ECFG* (*fig.* 85), dont le diamètre *GC* étoit de 19′ ; le centre *D* de ce petit cercle étant ſuppoſé à une diſtance *DA* du pole *A* de l'écliptique égale à 5° 8′ qui eſt la moyenne inclinaiſon ou la moyenne diſtance des poles de l'écliptique & de l'orbite de la lune ; c'eſt-à-dire, que ſuivant Tycho l'arc *AD* eſt de 5° 8′. L'exactitude de cette détermination eſt remarquable, car l'inclinaiſon a été reconnue de 5° 8′ 52″ par les plus récentes obſervations, & la

Maniere de repréſenter ces deux effets.

Fig. 85.

Fig. 85. valeur de GD 8′ 49″; ce qui diffère à peine des quantités trouvées par Tycho-Brahé. Le pole de l'orbite lunaire eſt ſuppoſé ſe mouvoir ſur la circonférence GEC, de manière qu'il ſoit en G dans les ſyzygies, en C dans les quadratures, en F dans les octans; ſon mouvement étant proportionnel au double de la vraie diſtance de la lune au ſoleil; cela ſuppoſé en calculant le triangle ſphérique ADF, on trouve que l'angle DAF eſt de 1° 46′; c'eſt la plus grande équation du lieu du pole D, & par conſéquent du lieu du nœud de la lune ſur l'écliptique, éloigné toujours de 90° du lieu du pole (1353). Dans un autre point comme H, l'angle HAG ſera auſſi l'équation du nœud, & AH la diſtance actuelle des poles de l'écliptique & de l'orbite lunaire ou l'inclinaiſon de l'orbite de la lune pour le temps donné, l'angle ADH étant toujours égal au double de l'élongation de la lune ou de ce qui lui manque pour aller à 180°, c'eſt-à-dire, au double de la diſtance de la lune à ſa conjonction ou à ſon oppoſition.

1494. Tycho-Brahé n'apperçut pas qu'il réſultoit de cette hypothèſe & de cette conſtruction une manière très-ſimple de corriger la latitude de la lune par une ſeule équation; Képler, Newton, Halley, & M. Euler même continuèrent d'employer une équation pour l'inclinaiſon & une pour le nœud, d'où ils tiroient enſuite la latitude de la lune par la réſolution d'un triangle ſphérique; c'eſt T. Mayer qui dans ſes premières tables de la lune ſut prendre une voie plus ſimple : je vais la démontrer ici, car l'auteur ne nous en a point laiſſé de démonſtration.

Equation de la latitude.

1495. Soit L la lune, E le pole de ſon orbite dans un temps quelconque; enſorte que LE ſoit de 90°, parce que le pole d'un cercle eſt toujours éloigné de ſa circonférence de 90°; l'arc LD ou la diſtance de la lune au pole moyen eſt plus ou moins grande que la diſtance au pole vrai, de toute la quantité de l'équation de la latitude que nous cherchons. Si du pole moyen D on abaiſſe le petit arc perpendiculaire DM ſur le

cercle *LE* prolongé en *M*; on aura *LM*=*LD*, & par conſéquent *EM* ſera la différence cherchée entre la diſtance au pole vrai & la diſtance au pole moyen; ou entre la latitude vraie & la latitude moyenne. Puiſque *AD* eſt le cercle de latitude qui paſſe par les poles de l'orbite de la lune, & qui lui eſt perpendiculaire aux points de la plus grande digreſſion; l'arc de cercle *DB* perpendiculaire au premier ſera celui qui paſſe par les nœuds de la lune, & l'angle *LDB* ſera la diſtance de la lune à ſon nœud ou l'argument de latitude meſuré au pole de ſon orbite; ce qui revient au même que s'il étoit compté ſur l'orbite même de la lune. L'angle *ADM* eſt égal à l'angle *LDB*; car ſi des angles droits *ADB* & *LDM* on ôte la partie commune *MDB*, on aura les reſtes égaux *ADM* & *LDB* : ainſi *ADM* eſt auſſi égal à l'argument de latitude; mais *ADE*, ſuivant l'hypothèſe & les obſervations de Tycho (1493) eſt égal au double de la diſtance de la lune au ſoleil, donc *MDE* eſt égal au double de cette diſtance moins l'argument de latitude. Le petit triangle rectangle *DME* ſenſiblement rectiligne, donne, ſuivant la règle ordinaire de la trigonométrie rectiligne, *ME*=*ED* ſin. *MDE*; donc *l'équation de la latitude de la lune eſt égale à* 8′ 49″ *multipliées par le ſinus de la double diſtance de la lune au ſoleil moins l'argument de latitude.* Règle.

1496. Il réſulte auſſi de ce changement dans les nœuds & l'inclinaiſon de l'orbite lunaire une inégalité dans la réduction à l'écliptique; mais M. Mayer l'a renfermée dans la table de la *variation*, parce qu'on a reconnu qu'en diminuant de quelques ſecondes la variation, on produiſoit le même effet; M. d'Alembert remarque dans ſa théorie de la lune, *pag.* 97, que les quantités qui proviennent de l'équation du nœud & de celle de l'inclinaiſon, ſe détruiſent mutuellement, à l'exception d'une équation de 23 ſecondes qui a le même *argument* que la variation de la lune.

1497. Puiſque l'hypothèſe que je viens d'expliquer eſt la ſeule employée dans les tables que je publie, je

ne dirai qu'un mot de la manière dont M. Newton, & après lui Flamſteed, Halley & tous les auteurs qui ont ſuivi, ont conſidéré ces variations dans la latitude de la lune. Newton ſuppoſa que l'inclinaiſon de l'orbite de la lune étoit ſujette à un balancement alternatif de 9′, & le nœud à une inégalité de 1° 29′ 39″, il conſidéroit ces deux choſes ſéparément. Dans cette hypothèſe, on trouve que lorſque le ſoleil eſt dans le nœud de la lune, ce nœud a moins de mouvement, car ſon équation augmente en plus, juſqu'à ce que le ſoleil ſe trouve à trois ſignes du nœud, alors l'équation additive eſt de 1° 29′ 39″, elle ceſſe alors d'augmenter, & le mouvement du nœud eſt le même que s'il n'y avoit point d'inégalité, c'eſt-à-dire, égal au mouvement moyen.

1498. L'inclinaiſon de l'orbite lunaire eſt la plus grande quand le ſoleil eſt dans le nœud, alors Newton la ſuppoſe de 5° 17′ 30″, elle eſt au contraire la plus petite ou de 4° 59′ 30″, lorſque le ſoleil répond aux limites de la plus grande latitude, & qu'il eſt à 90° des nœuds de la lune. C'eſt ainſi que Newton changeoit l'angle d'inclinaiſon & le lieu du nœud de la lune; après quoi connoiſſant la diſtance de la lune à ſon nœud, & l'angle d'inclinaiſon, il cherchoit la réduction à l'écliptique & la latitude. On verra dans le XXIIe. livre (3515) le principe de ces ſingularités par le moyen de la loi de l'attraction, il ne s'agit ici que de l'hypothèſe aſtronomique trouvée par le moyen des obſervations de Tycho, & adoptée par Newton à cauſe de ſa conformité avec les loix qu'il avoit reconnues.

1499. J'ai dit que Newton avoit auſſi introduit une équation annuelle (1451), de 9′ 27″ pour le nœud; elle eſt plus petite que celle de l'apogée, dans le même rapport que le moyen mouvement du nœud eſt plus petit que celui de l'apogée; mais l'équation du nœud eſt ſouſtractive quand les autres ſont additives, parce que le mouvement du nœud ſe fait en ſens contraire du mouvement de la lune & de celui de ſon apogée; ces équations ſont

auſſi employées dans les tables de M. Mayer que l'on trouvera dans ce livre.

1500. Enfin le calcul rigoureux de l'attraction du ſoleil a fait voir que cette grande inégalité de la latitude ne pouvoit repréſenter qu'à une ou deux minutes les latitudes obſervées, & que les différentes manieres dont s'exerce l'attraction du ſoleil ſur la lune, donnoient lieu à neuf autres équations qui méritoient d'entrer dans le calcul. Voici les nombres ſur leſquels ſont faites les onze tables que nous publions d'après lui ; ils ne ſont pas conformes à la théorie imprimée, parce ce qu'il paroît que Mayer corrigeoit encore ſes tables en 1762, même après avoir envoyé à Londres ſa théorie. On ſuppoſe dans ces tables que l'argument de latitude a été formé en ôtant du vrai lieu de la lune dans ſon orbite, le lieu du nœud corrigé, & la diſtance de la lune au ſoleil en ôtant du vrai lieu de la lune dans ſon orbite, le vrai lieu du ſoleil.

Ces inégalités dans les latitudes de la lune ſont aſſez petites pour qu'on puiſſe ſouvent les négliger, ſans faire ſur la latitude de la lune des erreurs de plus d'une minute & demie ; nous allons cependant rapporter ici la formule qui exprime toutes les équations contenues dans les nouvelles tables.

TABLE I. Latitude.	{	5° 8′ 46″	ſin. Argument de latitude.
	{ —	6	ſin. 3 Argumens de latitude.
II.	+	8 49	ſin. 2 diſt. ☾ ☉ — Argument de latitude.
III.	+	2	ſin. Argument latitude — anom. ☉
IV.	—	17,4	ſin. Argument latit. — anom. moy. ☾
V.	—	24,1	ſin. Argum. latit. — 2 anom. moy. ☾
VI.	+	2,7	ſin. Argum. latit. — 3 anom. moy. ☾
VII.	—	8,3	ſin. 2 diſt. ☾ ☉ — Argum. latit. + anom. ☉
VIII.	—	3,7	ſin. 2 diſt. ☾ ☉ — Argum. latit. — anom. ☉
IX.	—	2,2	ſin. 2 diſt. ☾ ☉ — Arg. latit. + anom. moy. ☾
X.	+	15,0	ſin. 2 diſt. ☾ ☉ — Arg. latit. — anom. moy. ☾
XI.	—	6,0	ſin. 2 diſt. ☾ ☉ — Arg. latit. — 2 anom. moy ☾

Parmi les autres équations que donne la théorie, il n'y en a aucune qui paſſe 2″, & l'auteur les a négligées dans ſes tables ; il paroît même que dans les XI précédentes, on en pourroit négliger 5 ou 6, quant à préſent.

DE LA PERIODE CALDEENNE de deux cents vingt-trois Lunaiſons.

1501. Nous avons dit, (330, 1425) que les anciens aſtronomes, long-temps avant Hipparque, avoient apperçu le retour conſtant des éclipſes au bout de 223 mois lunaires, ou de 18 ans & dix jours, (*Almag.* IV. 2). Pline le Naturaliſte dit auſſi qu'il eſt certain que les éclipſes retournent dans le même ordre dans l'eſpace de 223 mois, (*L. II. cap.* 13). C'eſt pourquoi M. Halley appelle cette période *la Période de Pline*, (*Philoſ. Tranſ.* 1692. *n°.* 194. *Acta Erudit.* 1692. *pag.* 529).

Les éclipſes ne pouvoient revenir dans le même ordre, malgré les inégalités de la lune, à moins que ces inégalités n'euſſent auſſi la même période, d'où M. Halley conclut que les inégalités & les erreurs des tables, quoiqu'imparfaitement connues, devoient cependant revenir les mêmes au bout de 223 lunaiſons, enſorte qu'une erreur obſervée devoit ſuffire pour annoncer celle qui auroit lieu 18 ans après, malgré l'imperfection des tables de la lune. C'eſt cette période que M. Halley appelle auſſi *Saros*, ou *Période Caldaïque* ; mais au ſujet du Saros, voyez l'art. 1566.

M. Halley dès l'année 1684 avoit fait uſage des 18 ans pour prédire les éclipſes : on avoit obſervé le 22 Juin 1666, V. Style, une éclipſe de ſoleil, à Londres & à Dantzick ; il s'en ſervit pour prédire celle du 2 Juillet 1684, en y employant la même erreur qu'il avoit reconnue dans les tables pour le 22 Juin 1666, & ſa prédiction ſe trouva vérifiée à la minute ; enfin, il trouva que même hors des ſyzygies, les erreurs des tables ſe retrouvoient preſque les mêmes ; il en conclut que les défauts

défauts de la théorie avoient une régularité, & pour le reconnoître parfaitement, il forma dès-lors le deſſein d'obſerver la lune ſans interruption pendant une période entiere de 18 ans (588).

1502. On trouve dans les tables de M. Halley un catalogue des éclipſes de lune & de ſoleil, arrivées depuis 1701 juſqu'en 1718; il donna pour chacune le temps moyen du milieu de l'éclipſe, l'anomalie moyenne de du ſoleil, l'argument annuel, & la latitude de la lune. Pour que cette table pût ſervir à trouver les éclipſes dans d'autres périodes, il y joignit deux autres tables pour corriger la période; parce qu'en effet le retour n'eſt pas aſſez exact pour qu'on puiſſe en tirer des concluſions certaines. Boulliaud en avoit fait la remarque long-temps avant Halley; l'éclipſe de lune du 31 Janvier 1580 avoit été totale, celle du 10 Février 1598, ne fut que de $11\frac{1}{2}$ doigts; celle du 14 Mars 1634 ne fut que de 11 doigts; celle du 27 Avril 1706 de $5\frac{1}{2}$; celle du 29 Mai 1760 de trois cinquièmes de doigt: enfin le 10 Juin 1778, après dix périodes accomplies, il n'y aura plus d'éclipſe, parce que la période ne ramene pas la lune à même diſtance du nœud. (M. le Gentil, *Mém. Acad.* 1756, *pag.* 58). Par la même raiſon, les erreurs des tables doivent devenir différentes après quelques périodes: le 18 Octobre 1641, celle des tables de Flamſteed étoit, ſuivant M. le Gentil, de $2' 6''$ en excès, mais le 23 Décembre 1749, elle étoit de $1' 11''$ en défaut; l'erreur des tables a donc varié de $3' 17''$ dans l'eſpace de 6 périodes, ce qui fait $33''$ de changement pour chacune. De même l'éclipſe du 20 Janvier 1647, comparée avec celle du 27 Mars 1755, donne $45''$ pour la différence de l'erreur des tables de Flamſteed à la fin de chaque période. Ainſi quoique cette maniere de connoître & de prédire l'erreur des tables, fût bonne dans le temps où l'on craignoit de la part des tables pluſieurs minutes d'erreur, elle eſt peu néceſſaire actuellement, que nous avons des tables dont l'erreur ne paſſe pas une minute.

Retour des éclipſes.

Concluſion.

Du Diamétre de la Lune.

1503. Les anciens qui comme Ptolomée ne pouvoient meſurer le diamètre apparent de la lune qu'avec des pinules, ne pouvoient guère s'en aſſurer avec préciſion; Hipparque & Ptolomée ſe contenterent de dire que le diamètre de la lune dans ſon apogée étoit égal à celui du ſoleil, c'eſt-à-dire, de 30′; mais que dans le périgée il paroiſſoit plus grand que celui du ſoleil.

Albategnius dit que le diamètre moyen de la lune eſt de 32′ 25″, & qu'il varie depuis 29′ 30″ juſqu'à 35′ 20″, Copernic le trouve de 27′ 34″ à 35′ 38″. (*L. 4. ch.* 22). Enſorte que le diamètre moyen eſt de 31′ 36″, nous le trouvons aujourd'hui de 31′ 29″.

Tycho-Brahé voyant que la lune dans les éclipſes perdoit cette lumière étrangère qui dans les pleines lunes la fait paroître plus large, établiſſoit le diamètre moyen de la lune de 26′ 50″ dans les conjonctions, & de 34′ 0″ dans les oppoſitions (*Progymn. pag.* 134).

Képler, avant la découverte des lunettes, le trouvoit de 32′; mais il étoit dans l'incertitude de 20″ environ (*Aſtron. pars opt. pag.* 349); quoiqu'il eût diſcuté cet article fort en détail avec des obſervations & des méthodes propres à trouver les diamètres du ſoleil & de la lune, dans cet ouvrage qui a pour titre: *Ad vitellionem paralipomena, quibus aſtronomiæ pars optica traditur*, 1604, *in*-4°. Mais dans la ſuite & après l'invention des lunettes d'approche, Képler trouva les diamètres de la lune de 30′ 0″ à 32′ 44″, c'eſt-à-dire, le diamètre moyen 31′ 22″ (*Epit. aſtron. Coper. pag.* 861). Horoccius dans ſa théorie de la lune le ſuppoſoit de 31′ 0″.

1504. Nous voyons dans l'hiſtoire de l'académie des ſciences par M. Duhamel que dans l'éclipſe de ſoleil du 2 Juillet 1666, dont les différentes phaſes furent obſervées avec ſoin, dans la maiſon de M. Colbert, par MM. Huygens, Roberval, Auzout, Frénicle &

Buot ; on reconnut que le diamètre de la lune étoit plus petit que celui du ſoleil, & que les tables aſtronomiques le faiſoient plus grand, en même-temps qu'elles faiſoient le diamètre du ſoleil plus petit qu'il n'étoit réellement ; ainſi le diamètre de la lune étoit trop grand dans les tables de Képler.

Le 8 Juillet 1666 à $8^h \frac{1}{2}$, la lune étant périgée & en quadrature, ſon diamètre fut meſuré & trouvé de 33′, & le 22 à 3h du matin la lune étant apogée, elle avoit 29′ 50″. Ces meſures qui n'avoient plus que quelques ſecondes d'incertitude étoient beaucoup plus exactes que toutes celles qu'on avoit priſes juſques-là, elles furent faites avec des fils placés au foyer d'une lunette ſuivant la deſcription rapportée en 1667 par M. Galloys dans les éphémérides de la même année, c'eſt-à-dire, après l'invention du micromètre (2348).

Depuis ce temps-là M. de la Hire, dans ſes tables ſuppoſa les diamètres de la lune 29′ 30″ & 33′ 30″ ; M. Caſſini dans ſes tables, 29′ 30″ & 33′ 38″ ; M. le Monnier dans ſes inſtitutions aſtronomiques (*pag.* 184) donne pour les diamètres de la lune 29′ 28″ & 33′ 42″.

Diamètre par les dernieres obſervations.

1505. Suivant les obſervations exactes que j'en ai faites avec un héliomètre de 18 pieds, le diamètre moyen de la lune eſt de 31′ 29″, les extrêmes ſont à peu-près 29′ 25″, lorſque la lune eſt apogée & en conjonction, & 33′ 34″, lorſqu'elle eſt périgée & en oppoſition ; mais les différentes inégalités de la lune mettent dans ces diamètres beaucoup de diverſités. Il faut bien obſerver que ce que j'appelle ici *diamètre moyen de la lune*, eſt un milieu arithmétique entre le plus grand & le plus petit diamètre. L'on ne trouveroit que 31′ 9″, ſi l'on vouloit prendre la quantité conſtante à laquelle s'ajoutent toutes les équations, ou les inégalités du diamètre, pour avoir le diamètre actuel dans un temps donné (1712).

1506. Les variations obſervées dans le diamètre de la lune, indiquent celles de ſa diſtance ; auſſi la découverte des lunettes d'approche a donné le moyen

de reconnoître exactement les augmentations & les diminutions de la distance de la lune. Non-seulement le diamètre de la lune diminue quand la lune avance vers l'apogée, mais Horroccius trouva vers l'an 1638 que la lune étant apogée, n'étoit pas toujours à même distance de la terre, & qu'elle en étoit plus éloignée lorsqu'elle se trouvoit alors en conjonction ou en opposition; cela lui fit établir cette augmentation d'excentricité dans l'orbite de la lune, qui a lieu, selon lui, toutes les fois que la ligne des apsides concourt avec la ligne des syzygies (1435).

M. Picard fit avec soin ces mêmes observations du diamètre de la lune, pour en conclure ce changement des distances de la lune à la terre; il reconnut que la lune périgée & en quadrature, paroissoit sous un angle plus petit que la lune périgée & en syzygie. Cette augmentation du diamètre de la lune dans les syzygies, vient de deux inégalités dans les distances de la lune, dont nous parlerons à l'occasion de la parallaxe de la lune (1710).

Changement du diamètre.

Elles ont été observées depuis que les micromètres nous ont donné le moyen de mesurer exactement les diamètres de la lune dans ses diverses positions; on a observé que quand l'argument de l'évection étoit de 0 signes, le diamètre étoit diminué de 18″ ou 20″, & que l'argument de l'évection étant de 6 signes, il étoit au contraire augmenté de 18″, quoique la ☾ fût à la même distance de son apogée. On a vu de même par rapport à l'argument de la variation, que lorsqu'il étoit nul, ou égal à 6 signes, le diamètre de la lune augmentoit de 14 ou 15″, & diminuoit d'autant vers 3 ou 9 signes, c'est-à-dire, dans les octans à même distance de l'apogée.

1507. Ces observations faites dans le dernier siècle en Angleterre & en France, étant conformes à la théorie de Newton, c'est-à-dire, à l'effet que doit produire l'attraction du soleil; Newton s'en servit pour

corriger la parallaxe de la lune, par les deux argumens de l'évection & de la variation. Suivant la théorie de M. Mayer, le diamètre de la lune pour un temps quelconque eſt exprimé par la formule ſuivante : $31' 9'' - 1' 42'' 3$ cof. anomal. $+ 5'' 4$ cof. 2 anomal. $+ 13'' 7$ cof. 2 diſt. ☾ ☉ $- 20''$ 2 cof. (2 diſt. ☾ ☉ — anomal. ☾) ; les autres équations ſont inſenſibles ; on peut les trouver en prenant les équations de la parallaxe (1714), car toutes ces équations étant multipliées par $\frac{6}{11}$, donneront les équations correſpondantes du diamètre. D'ailleurs lorſqu'on connoît la parallaxe horizontale de la lune pour Paris, on en conclut le diamètre par le rapport conſtant de $54' 56''$ à $30'$ (1711).

1508. M. de la Hire crut reconnoître dans le dernier ſiècle que le diamètre de la lune paroiſſant ſur le ſoleil, dans les éclipſes, paroiſſoit plus petit de $30''$ que quand ſa circonférence étoit lumineuſe (*Tabulæ aſtron. pag.* 41) ; mais M. le Monnier aſſure que c'étoit par des fautes de calcul (*Mém. acad.* 1748, *pag.* 209). M. le Monnier ayant meſuré le diamètre de la lune ſur le ſoleil le 25 Juillet 1748 à $10^h 18'$ le trouva de $29' 47'' \frac{1}{2}$, c'eſt-à-dire, plus grand qu'il ne s'y étoit attendu ; & il reconnut que la diminution propoſée par M. de la Hire n'avoit pas lieu. La même choſe a été reconnue dans l'éclipſe du 1 Avril 1764 : la plus grande phaſe arriva à $10^h 30' 43''$ à Londres, la diſtance du bord de la lune à celui du ſoleil étoit de $2' 26''$, ſuivant l'obſervation de M. Short, le diamètre de la lune meſuré horizontalement ſur le ſoleil étoit de $29' 49'' \frac{1}{2}$, & celui du ſoleil de $31' 59''$; la différence $2' 9'' \frac{1}{2}$ eſt conforme à celle que j'avois annoncée dans mes calculs de la connoiſſance des mouvemens céleſtes ; car le diamètre du ſoleil, ſelon moi, devoit être de $32' 1''$, le diamètre horizontal de la lune $29' 34''$, & le diamètre augmenté à raiſon de ſa hauteur ſur l'horizon $29' 52''$, la différence eſt $2' 9''$. Ainſi cette diminution que M. de la Hire croyoit avoir lieu dans les éclipſes de ſoleil ; n'exiſte point ; l'inflexion de $4'' \frac{1}{2}$ qui a lieu dans

Diminution dans les éclipſes.

dans les rayons qui paſſent ſur le bord de la lune ne change rien à ſon diamètre (1992).

Augmentation par la hauteur.

1509. Lorſque la lune eſt plus près du zénit, elle eſt auſſi plus près de nous; ainſi ſon diamètre apparent paroît plus grand dans la même proportion. Soit T le centre de la terre, (*fig.* 87), O un obſervateur ſitué à la ſurface de la terre, Z la lune ſituée au zénit de l'obſervateur; ſi la diſtance ZO de la lune à l'obſervateur eſt plus petite d'un ſoixantième, que la diſtance ZT de la lune au centre de la terre, le diamètre apparent vu du point O, ſera plus grand d'un ſoixantième que le diamètre vu du centre T de la terre.

Fig. 87.

De même ſi la lune eſt ſituée en L, de manière que ſa hauteur au-deſſus de l'horizon ſoit égale à l'angle LOH, ſa diſtance au zénit étant égale à l'angle LOZ, on voit que la diſtance LO ſera plus petite que la diſtance LT au centre de la terre; le ſeul cas où cette augmentation ſera nulle, eſt celui où la lune ſera dans l'horizon même en H, car alors elle ſera preſque également éloignée du point O & du point T; voilà pourquoi l'on appelle DIAMÈTRE HORIZONTAL de la lune, celui qui eſt vu du centre de la terre, parce qu'il eſt auſſi égal au diamètre que nous obſervons quand la lune eſt à l'horizon.

Diamètre horizontal.

Lorſqu'on connoît le diamètre horizontal de la lune, il eſt aiſé de trouver le *diamètre augmenté* à raiſon de la hauteur ſur l'horizon, puiſqu'ils ſont entre eux comme le côté LO eſt au côté LT. Dans le triangle LOT, l'angle OLT eſt ce qu'on appelle la *parallaxe de hauteur* (1627); l'angle LOZ, ou ſon ſupplément LOT, qui a le même ſinus, eſt la diſtance apparente au zénit, l'angle LTO eſt la diſtance vraie de la lune au zénit, vue du centre de la terre, ou le complément de la hauteur vraie. Dans tout triangle rectiligne les ſinus des côtés ſont comme les ſinus des angles oppoſés; ainſi le côté LO eſt au côté TL, comme le ſinus de l'angle OTL eſt au ſinus de l'angle LOT; donc le diamètre horizontal eſt au diamètre apparent, comme le

ſinus de la diſtance vraie de la lune au zénit, vue du centre de la terre, eſt au ſinus de la diſtance apparente de la lune au zénit, vue du point *O*.

1510. Ainſi pour trouver le diamètre de la lune augmenté à raiſon de ſa hauteur au-deſſus de l'horizon, on fera cette proportion : *Le coſinus de la hauteur vraie eſt au coſinus de la hauteur apparente, comme le diamètre horizontal eſt au diamètre apparent.* C'eſt la différence entre celui-ci & le diamètre horizontal qu'on appelle *Augmentation du diamètre*, & dont j'ai donné une table fort ample dans mon *Expoſition du calcul aſtronomique*, *pag.* 259. On en trouvera une parmi les tables de cet ouvrage. Règle de cette augmentation.

1511. M. de la Caille dit dans ſes leçons d'aſtronomie, que cette augmentation du diamètre de la lune eſt la différence de parallaxe entre le bord ſupérieur & le bord inférieur de la lune; mais cette notion eſt défectueuſe, car elle ne ſauroit s'appliquer au diamètre de la lune meſuré horizontalement, qui cependant eſt augmenté auſſi bien que le diamètre vertical, ſuivant les différentes hauteurs de la lune.

1512. Suivant la démonſtration précédente le diamètre de la lune doit paroître plus petit quand la lune ſe lève, que quand elle eſt parvenue à une certaine hauteur; la lune en s'élevant doit paroître plus grande à nos yeux, & l'obſervation faite avec un inſtrument quelconque prouve ſans ceſſe aux aſtronomes que la lune paroît ſous un angle plus petit quand elle eſt à l'horizon. Cependant un fait généralement reconnu c'eſt que la lune, à la vue ſimple, paroît d'une grandeur extraordinaire lorſqu'on la voit ſe lever à la fin du jour derrière des bâtimens ou des montagnes; il n'y a preſque perſonne qui ne s'imagine la voir alors deux ou trois fois auſſi large que quand elle arrive enſuite à une grande hauteur. C'eſt-là certainement une illuſion optique, & elle a lieu de même pour les autres aſtres; mais il ſuffit de regarder la lune dans une lunette quelconque, dans un tube de papier, & même ſi l'on veut, au travers d'une carte où l'on a fait un trou d'épingle, Grandeur de la Lune à l'horizon.

pour ſe convaincre que l'augmentation n'eſt point réelle & que le diamètre de la lune eſt vu au contraire alors ſous un plus petit angle, que lorſque la lune eſt à une plus grande hauteur.

Regis dans ſon ſyſtême de philoſophie (Tom. IV, l. 8), ſoutenoit que c'étoit un effet de la réfraction; mais au lieu d'étendre les objets, la réfraction les accourcit, & fait paroître les diſtances plus petites (2246).

Jugement involontaire.

Il eſt difficile de ſe former une idée claire de la cauſe de cette illuſion, ſi ce n'eſt en admettant avec tous les opticiens ce jugement tacite, commun & involontaire, par lequel nous eſtimons fort grands les objets que nous jugeons être fort éloignés, en même temps que nous jugeons les objets fort éloignés lorſque nous voyons à la fois beaucoup de corps interpoſés entre nous & ces objets. Roger Bacon en citant l'optique de Ptolomée, (ouvrage qui s'eſt perdu pendant les ſiècles d'ignorance), nous apprend que cet auteur en avoit jugé ainſi; Deſcartes & le P. Mallebranche (*Recherche de la vér. liv. I.*) l'expliquent de la même manière. Voici donc, ce me ſemble, le nœud de la difficulté.

1513. La lune ſe levant à l'horizon derrière une montagne ou à l'extrémité d'une plaine, paroît néceſſairement à la ſuite de pluſieurs objets ſenſibles & variés; au lieu que dans une certaine hauteur on élève la vue pour appercevoir la lune, & l'on ne voit rien entr'elle & nous qui puiſſe nous faire juger de ſa diſtance. Dans le premier cas, notre imagination accoutumée à juger de l'éloignement d'un corps par la multitude des objets qui paroiſſent entre lui & nous, eſtime la lune fort loin de nous, & cela par habitude, par inſtinct & par une ſuite de ſa manière d'eſtimer & de juger des diſtances. Or un même objet que nous jugerons fort éloigné, ſera jugé plus grand que ſi on le croyoit fort près: ainſi la lune dans l'horizon, eſtimée à une plus grande diſtance eſt jugée plus grande par cette première perception; la réflexion ne ſuffit pas

pour

pour empêcher la liaiſon de ces deux jugemens, parce que l'habitude continuelle y a mis une dépendance ſi forte qu'on ne peut plus les ſéparer : on trouvera d'autres preuves de la vérité de ce jugement habituel & involontaire ſur la grandeur des objets, dans le premier volume du grand traité d'optique de Smith, *art.* 160 *& ſuiv.* Tom. I, *pag.* 111, de l'édition du P. Pezenas, Avignon 1767.

1514. Le Pere Gouye ſubſtituoit, ou ajoutoit une autre conſidération à celle-ci, & je crois qu'elles peuvent aller enſemble & ſe fortifier mutuellement. Une colonne qui paroît au-devant d'une muraille, ou qui eſt environnée de pluſieurs objets différens, & même une colonne cannelée, ſemble en général être plus grande que ſi elle étoit ſimple & iſolée ; les vapeurs de l'horizon & le voiſinage de la terre, des montagnes, des arbres, font cet effet ſur la lune : & en la faiſant paroître plus accompagnée, elles la préſentent à notre perception comme ſi elle étoit d'un plus grand volume. (Hiſtoire de l'acad. 1700, *pag.* 8). Remarque du P. Gouye.

1515. Le diamètre de la lune en aſcenſion droite eſt la quantité dont diffèrent entr'elles les aſcenſions droites du bord & du centre de la lune, ſoit *P* le pole du monde (*fig.* 88), *EQ* l'équateur, *PLA* le cercle de déclinaiſon qui paſſe par le centre de la lune & qui marque en *A* l'aſcenſion droite de la lune ſur l'équateur ; *PMB* le cercle de déclinaiſon qui paſſe par le bord de la lune *M*, & qui touchant le limbe de la lune va déterminer en *B* l'aſcenſion droite du bord de la lune ; *AB* eſt donc le demi-diamètre de la lune en aſcenſion droite, & ſuivant ce qu'on a vu pour le ſoleil (894), il faut *diviſer le demi-diamètre horizontal par le coſinus de la déclinaiſon vraie de la lune, pour avoir le demi-diamètre en aſcenſion droite.* Diamètre en aſcenſion droite. *Fig.* 88.

1516. Lorſqu'on veut ſavoir le temps que le diamètre de la lune emploie à traverſer le méridien, *on convertit en temps lunaire le diamètre de la lune en aſcenſion droite.* Je ſuppoſe que le retardement diurne de la Temps que la Lune met à paſſer le méridien.

lune par rapport au ſoleil ſoit d'une heure, c'eſt-à-dire, qu'elle emploie 25 heures de temps moyen à parcourir 360 degrés & à revenir au méridien, le jour pour lequel on calcule ; je ſuppoſe auſſi que ſon diamètre en aſcenſion droite ſoit de 30 minutes, il ne s'agit que de ſavoir combien la lune emploîra de temps à parcourir 30′ par ſon mouvement diurne à raiſon de 25 heures pour 360 degrés ; on fera donc cette proportion : 360° ſont à la révolution diurne, 25 heures, comme le diamètre en aſcenſion droite 30′, eſt au temps cherché qu'on trouvera de 2′ 5″, c'eſt ce que la lune emploie à traverſer le méridien. Les aſtronomes en font un uſage fréquent dans les obſervations de la lune, lorſqu'après avoir obſervé le paſſage du premier bord de la lune au méridien ils veulent ſavoir à quelle heure le centre de la lune y a paſſé : (art. 3944) ; car alors il faut ajouter au temps où le premier bord aura paſſé celui que le demi-diamètre aura dû employer à traverſer le méridien, pour avoir le paſſage du centre de la lune par le méridien. On trouve auſſi le temps qui répond au demi-diamètre de la lune, par le moyen de deux tables, qui ſeront parmi celles de la lune, à la fin de cet ouvrage. L'une contient la réduction du demi-diamètre horizontal en temps lunaire, ſuivant les divers retardemens de la lune d'un jour à l'autre, & les diverſes grandeurs du demi-diamètre de la lune ; l'autre eſt une table de ce qu'il faut y ajouter à raiſon de la déclinaiſon de la lune, en conſéquence de la règle que nous avons donnée (1515), de diviſer le diamètre par le coſinus de la déclinaiſon, pour avoir l'eſpace qui lui répond ſur l'équateur, & en conclure le temps qu'il emploie à paſſer ; on y voit, par exemple, que ſi le diamètre de la lune eſt de 33′ 36″, & le retardement diurne de 62′ ou d'une heure 2′, il faudra 70″ ou 1′ 10″ au demi-diamètre de la lune pour paſſer le méridien ; il ſuffit pour conſtruire cette table de faire la règle de trois que nous venons d'indiquer. La ſeconde table contient la quantité qu'il faudroit ajouter à ce même temps, ſi la

lune au lieu d'être dans l'équateur ſe trouvoit à une certaine déclinaiſon : ainſi la déclinaiſon de la lune étant ſuppoſée de 29°, & le temps calculé ci-deſſus de 1′ 10″, on trouve dans la table 10″ qu'il faut encore y ajouter, & l'on aura 1′ 20″ pour le temps qu'a employé le demi-diamètre de la lune à paſſer le méridien. La partie que renferme cette ſeconde table eſt la différence entre le diamètre *LM* de la lune (*fig.* 88), & la quantité *AB* qui lui répond dans l'équateur, cette différence étant convertie en temps. *Fig.* 88.

1517. Quelques aſtronomes ont cru que pour trouver ainſi le temps du diamètre, il falloit auparavant augmenter le diamètre de la lune, à raiſon de ſa hauteur au-deſſus de l'horizon (1510), au lieu qu'il faut prendre le diamètre horizontal, ou vu du centre de la terre : en effet, lorſque le bord de la lune paroît toucher le méridien, l'obſervateur qui ſeroit au centre de la terre ou celui qui ſeroit à la ſurface, étant tous deux dans le même plan & dans le même méridien, que le bord de la lune, voient tous deux à la fois & ſans aucune différence, le bord de la lune dans le méridien ; je puis dire la même choſe du bord ſuivant ; ainſi le temps que la lune emploie à traverſer le méridien, ſeroit abſolument le même, vu du centre ou vu d'un point quelconque de la ſurface de la terre, ſitué ſous le même méridien ; & il ne dépend en aucune façon de la hauteur de la lune au-deſſus de l'horizon.

Un ſavant, qui même dans un livre imprimé en 1769 avoit fait cette mépriſe, me faiſoit, par lettres, cette objection ; quand j'obſerve le bord de la lune dans le méridien, « je veux ſavoir combien le centre de la lune » en eſt éloigné, mais cette diſtance dépend du demi-» diamètre de la lune, tel qu'il paroît alors, il faut » donc employer dans le calcul le demi-diamètre ap-» parent, ou augmenté à raiſon de ſa hauteur ſur » l'horizon ».

Je réponds en prouvant que la diſtance du centre de la lune au méridien en temps, ne dépend que de la

grandeur apparente du demi-diamètre, vu du centre autour duquel ſe fait le mouvement : un arc de 15′, vu du centre de la terre, traverſe le méridien en une minute de temps ; ſi je m'approche de l'objet aſſez pour qu'il me paroiſſe de 30′ au lieu de 15, il n'en traverſera pas moins le méridien en une minute, parce qu'en même temps que l'objet me paroîtra doublé par ſa proximité, la vîteſſe de ſon mouvement ſera auſſi doublée, & les 30′ traverſeront le méridien dans le même temps que les 15′ employoient à le traverſer auparavant.

Applatiſſement de la Lune.

1518. Cette mépriſe occaſionna celle de M. Godin qui crut trouver la lune ſenſiblement applatie, c'eſt-à-dire, le diamètre vertical du nord au ſud, plus petit que le diamètre meſuré horizontalement d'orient en occident. Dans le commerce aſtronomique que M. le Docteur Adelbulner faiſoit imprimer à Nuremberg, (*tom.* II, *pag.* 81), on trouve l'extrait d'une lettre de M. Celſius, aſtronome Suédois, où il étoit dit que MM. Caſſini & Godin avoient trouvé par leurs obſervations que le diamètre vertical de la ☾ étoit plus grand de 30″ que le diamètre horizontal. M. Celſius entreprenoit d'en rendre raiſon par la parallaxe, mais il ſe trompoit ; cela provenoit uniquement de ce que M. Godin faiſoit au diamètre horizontal de la lune, trouvé par la meſure du temps une correction qu'il ne devoit point faire, & cela rendoit ce diamètre horizontal plus petit que le diamètre vertical.

Suivant les loix de la force centrifuge, le globe de la lune doit être applati, en effet, du nord au ſud, à cauſe de la rotation de la lune ſur ſon axe ; il eſt probable auſſi que la lune eſt alongée vers le centre de terre (3183). Nous parlerons du diamètre abſolu de la la lune après que nous aurons déterminé ſa parallaxe (1717).

MOUVEMENT HORAIRE DE LA LUNE.

1519. Le mouvement horaire eſt le nombre de minutes & de ſecondes que la lune paroît décrire en une heure dans ſon orbite, vue du centre de la terre; on en fait uſage dans le calcul des éclipſes, & il eſt important de le connoître avec préciſion.

La quantité moyenne du mouvement horaire eſt de 32′ 56″, 4; on le trouve en diviſant en 24 parties ſon mouvement diurne, ou en faiſant cette proportion: la durée de la révolution périodique eſt à 360 degrés comme une heure eſt au mouvement horaire.

L'excentricité ſeule de l'orbite lunaire fait que le mouvement horaire de la lune varie de 3′ 45″; l'évection produit une inégalité de 42″, la variation en produit une de 38″; toutes les autres équations de la lune (1472) influent auſſi pour quelque choſe dans l'inégalité du mouvement horaire; enſorte qu'on ne peut trouver exactement le mouvement horaire qu'en y faiſant entrer toutes les équations de la lune.

1520. Les aſtronomes pour avoir exactement le mouvement horaire, calculoient le lieu de la lune avec toutes ſes équations pour deux inſtans éloignés d'une heure l'un de l'autre, la différence des deux longitudes de la lune ſur ſon orbite étoit le mouvement horaire. Mais cette méthode ne donne le mouvement horaire qu'à 3 ou 4 ſecondes près, parce que les tables d'équation n'étant calculées qu'en ſecondes, il peut ſe gliſſer une erreur d'une demi-ſeconde à chaque équation, ſans compter celle des parties proportionnelles où l'on néglige auſſi les demi-ſecondes. C'eſt pourquoi M. Clairaut, M. d'Alembert & M. Mayer ont donné des formules pour le mouvement horaire de la lune, en y employant les dixièmes de ſecondes, ce qui donne une préciſion auſſi grande que celle dont la théorie de chaque équation

peut-être ſuſceptible ; la formule de M. Clairaut eſt démontrée dans les mémoires de 1752, *pag.* 600, & ſe trouve avec les tables dans la connoiſſance des mouvemens céleſtes pour 1765, *pag.* 109.

En nommant y l'anomalie moyenne de la lune, & t ſa diſtance moyenne au ſoleil, les premiers termes ſont $32' 56''4 - 3' 45''4 \text{ cof. } y + 14''8 \text{ cof. } 2y + 42''.5 \text{ cof. } 2t - 37''7 \text{ cof. } (2t - y)$. On trouvera parmi nos tables de la lune celles que M. Mayer a calculées pour avoir auſſi le mouvement horaire.

1521. Quand on a des longitudes calculées de 12 en 12 heures dans des éphémérides comme la connoiſſance des temps, ou le nautical almanach, on peut en conclure le mouvement horaire avec une très-grande préciſion : en effet lorſque l'on prend la douzième partie du mouvement de la lune entre midi & le minuit ſuivant, l'on a le mouvement horaire qui avoit lieu à ſix heures, c'eſt-à-dire, vers le milieu de l'intervalle qu'il y a eu entre les deux longitudes employées; j'ai reconnu par l'examen des interpolations (3928), que malgré toutes les inégalités de la lune, les ſecondes différences ſont ſenſiblement uniformes dans l'eſpace de 24 heures, ainſi le mouvement horaire croît ou décroît d'une manière qui eſt ſenſiblement uniforme depuis midi juſqu'à minuit ; il eſt plus petit ſi l'on veut à midi, il eſt plus grand à minuit que ne ſeroit le mouvement ſuppoſé uniforme dans les 12 heures ; mais dans le milieu de l'intervalle, c'eſt-à-dire, à ſix heures, il a dû ſe trouver exactement de cette quantité moyenne entre le plus petit mouvement qui avoit lieu à midi, & le plus grand qui a lieu à minuit ; donc en prenant le milieu entre le premier & le dernier, ou ce qui revient au même, prenant la douzième partie du mouvement total, on aura le mouvement à ſix heures.

Par la même raiſon ſi l'on prend la douzième partie du mouvement entre le minuit & le midi du lendemain, on aura le mouvement horaire pour 18 heures, comme dans l'opération précédente on l'a eu pour 6 heures :

ayant ainſi le mouvement horaire à 6 heures & à 18, il ne ſera pas difficile de le trouver auſſi à toute autre heure : voici un exemple dans lequel je ſuppoſe qu'on ait les longitudes de la lune de 12 en 12 heures, avec les différences écrites à côté qui ſont les mouvemens ſémi-diurnes ou pour 12 heures. On multiplie ces mouvemens par 5, on prend les minutes pour des ſecondes, & les degrés pour des minutes, & l'on a ainſi les mouvemens horaires qui répondent aux temps intermédiaires.

1757	Longit. de la ☾	Mouv. pour douze heures.	Quintuple ou mouv. hor.	
1 Janv.	1ˢ 27° 57′ 0″			
		6° 0′ 10″	30′ 1″	le 1 à 6ʰ
Minuit	2 3 57 10			
		5 58 41	29 53	le 1 à 18
2 Midi	2 9 55 51			
		5 57 30	29 47	le 2 à 6
Minuit	2 15 53 21			
		5 56 35	29 43	le 2 à 18
3 Midi	2 21 49 56			

Si je veux maintenant connoître le mouvement horaire pour le 1 Janvier à 9ʰ du ſoir ; j'obſerve que le mouvement horaire a diminué de 8″ entre le 1 Janvier à 6ʰ & le 1 à 18ʰ, & que l'heure propoſée eſt trois heures plus tard que 6ʰ. Je ferai donc cette proportion : 12ʰ : 8″ :: 3ʰ : 2″, & ayant retranché 2″ de 30′ 1″, j'aurai 29′ 59″ pour le mouvement horaire à 9ʰ du ſoir.

1522. La même méthode ſert pour trouver le mouvement horaire en aſcenſion droite, & en temps ; car connoiſſant le retardement diurne & inégal de la lune pour 24 heures, on peut trouver le retardement horaire pour une heure quelconque. Je ſuppoſe que le 1 du mois la ☾ ait paſſé au méridien à 4ʰ 0′, le 2 à 4ʰ 50′, le 3 à 5ʰ 45′, enſorte que du 1 au 2 le retardement ſoit de 50′, & du 2 au 3 de 55′, & que l'on veuille chercher le retardement horaire pour le 2 à

l'heure du paſſage au méridien, c'eſt-à-dire, à 4 heures 50 minutes.

On prendra le milieu entre les deux retardemens, & ce milieu ſera $52' 30''$; l'on dira $24^h 52' \frac{1}{4} : 52' 30'' :: 1^h 0' : 2' 6'' \frac{1}{2}$ de temps retardement de la lune en une heure de temps qui eſt exact pour le 2 à $4^h 50'$. On pourroit le trouver par ce moyen pour toute autre heure.

On peut avoir auſſi ce retardement pour un autre intervalle quelconque, par exemple, pour le temps que le diamètre de la lune employe a paſſer par le méridien (1516), & ajoutant le retardement trouvé avec la durée du paſſage, calculée d'abord indépendamment de cette circonſtance, on auroit la véritable durée du temps que le diamètre de la lune employe à paſſer par le méridien; mais pour plus d'exactitude il faudroit connoître auparavant à peu-près la quantité de ce retardement, ou du moins le ſuppoſer d'avance de $4''$ de temps, pour pouvoir trouver avec la dernière préciſion combien la lune retarde pendant la durée de ce paſſage.

Ce que je viens de dire au ſujet du mouvement horaire de la lune, ſoit en longitude, ſoit en aſcenſion droite eſt ſouvent utile, ſur-tout pour trouver la longitude en mer par le moyen de la lune, comme on le peut voir dans l'état du ciel de M. Pingré, pour 1757, *pag.* 189.

DES OBSERVATIONS DE LA LUNE.

1523. Pour établir & confirmer les théories précédentes, on a eu beſoin d'un grand nombre d'obſervations, & ce ſeroit ici le lieu d'en rapporter une ſuite conſidérable pour l'utilité de ceux qui voudroient examiner encore les tables & les perfectionner; mais cet ouvrage étant déja trop volumineux, je me contenterai d'indiquer les ſources où l'on pourra les trouver. Les obſervations anciennes ſont d'abord néceſſaires pour trouver les moyens mouvemens de la lune de ſon apogée

gée & de ſon nœud : telles ſont d'abord trois éclipſes de lune obſervées à Babylone par les Caldéens, (1419) qui ſont les plus anciennes des dix éclipſes Caldéennes que Ptolomée nous a conſervées dans ſon almageſte : celles de Ptolomée lui-même, & celles de Tycho-Brahé, qui ont été calculées par Longomontanus, mais qu'il ſeroit peut-être utile de vérifier par les nouvelles tables. On trouveroit dans l'hiſtoire céleſte de Tycho, un bien plus grand nombre de bonnes obſervations, précieuſes par leur ancienneté ; mais elles auroient beſoin d'être calculées & réduites en y employant les tables que nous avons aujourd'hui ; & faute de ce travail, qui exigeroit un grand nombre de calculateurs exercés, nous ne pouvons, quant à préſent, en tirer que peu de fruit ; il en eſt de même de celles d'Hévélius & même de Flamſteed qui ſont en très-grand nombre. (V. *Machina cæleſtis* & *Hiſtoria cæleſtis*).

1524. Nous avons pour le dernier ſiècle une ſuite de 42 obſervations de M. de la Hire faites dans les années 1683, 1684 & 1685, à l'obſervatoire royal avec un quart de cercle mural ſolidement établi dans le plan du méridien, dont il a donné la deſcription dans ſes tables, & avec un autre quart de cercle mobile de trois pieds de rayon. Ces obſervations ont été calculées par M. Bailly, de l'académie des ſciences, (*Mém.* 1763, *pag.* 28), d'après les recherches que M. de la Caille avoit faites ſur les obſervations de M. de la Hire, pour s'aſſurer de l'état des inſtrumens pendant le cours de ces obſervations, en conclure les élémens de la théorie du ſoleil pour ce temps-là, & les poſitions des principales étoiles fixes. Ces obſervations ſont rapportées dans l'*hiſtoire céleſte*, publiée par M. le Monnier en 1741. Mais elles n'avoient jamais été diſcutées, appréciées, corrigées, réduites & employées, comme elles l'ont été par ce travail ; l'on peut donc regarder ces 42 obſervations comme les plus anciennes qui aient été faites avec la préciſion qu'on exige aujourd'hui, & les plus

exactes qu'on puiſſe avoir du dernier ſiècle ; elles ſeront très-propres à vérifier la théorie & les tables de la lune pour ce temps-là, voici le réſultat de ce travail.

Epoque de la longitude moyenne du ſoleil pour 1684,	$9^s\ 10^\circ\ 58'\ 58''$
Longitude de l'apogée du ſoleil,	3 7 28 0
Excentricité du ſoleil,	0,1685
Aſcenſion droite moyenne de Sirius pour 1684,	97 48 29,7
Déclinaiſon moyenne de Sirius	16 19 20,0

M. de la Caille a reconnu par ces calculs l'accélération de la lune (1485) ; il trouvoit auſſi qu'il faudroit augmenter de 5′ la longitude de l'apogée employée dans les tables de Mayer, cependant cette dernière correction n'eſt pas auſſi évidente à cauſe des inégalités de la lune, dans leſquelles elle ſe trouve compliquée.

Erreur du Mural de M. de la Hire.

1525. M. de la Caille qui faiſoit ces recherches en 1759 ſur les obſervations de M. de la Hire, avec toute l'exactitude qu'il mettoit dans ſes ouvrages, découvrit par l'examen des hauteurs ſolſtitiales du ſoleil que l'erreur du quart de cercle de M. de la Hire, étoit de 6″ au ſolſtice d'hiver, & de 34″ au ſolſtice d'été ; il trouva auſſi que l'erreur du mural de M. de la Hire en 1685 étoit de 15″, ſouſtractive des temps du paſſage à 19 & à 29° de hauteur, de 6″ à 46 degrés ; mais qu'elle étoit de 15″ 7 additive à 65° de hauteur, nulle à 52° de hauteur, & il en dreſſa une table par le moyen de 34 comparaiſons des temps vrais déterminés par des hauteurs correſpondantes du ſoleil, avec les temps des paſſages du ſoleil au mural obſervés par M. de la Hire les mêmes jours.

Obſervations de Halley.

1526. Dans le même temps, c'eſt-à-dire, en 1682, 83, 84, M. Halley obſervoit la lune à Iſlington près de Londres, dans le deſſein de faire ſervir ces obſer-

vations à corriger les tables de la lune par la période de 18 ans, (1501) ces obſervations ſont rapportées à la fin de l'aſtronomie Caroline, édition de 1710. Dans la ſuite M. Halley fit dans la même vue la plus nombreuſe collection qu'on ait vu d'obſervations de la lune; elle commence à 1722, & finit au commencement de 1740. Elle renferme plus de 2000 obſervations, calculées & comparées avec ſes tables, & toutes ces obſervations ont été imprimées à la ſuite de ces mêmes tables in-4° à Londres, & in-8° à Paris; mais comme ces obſervations ſuppoſent les lieux des étoiles fixes tirés du catalogue de Flamſteed & réduits à ce ſiècle-ci, elles ſont expoſées à des erreurs peut-être d'une minute, & il ſeroit important de recourir aux manuſcrits originaux de M. Halley pour rectifier ſes concluſions & vérifier ſes calculs; avec cette précaution on pourroit tirer un grand avantage du travail immenſe de ce célèbre aſtronome.

Parmi les obſervations modernes les plus exactes, nous avons 31 obſervations de la lune faites en 1751 & 1752 à l'occaſion des recherches de la parallaxe de la lune & de ſa diſtance à la terre (1650), le ſoin qu'on apporta à les faire, & celui que M. de la Caille a mis à les calculer aſſure l'exactitude de ces obſervations, & je crois qu'on n'en ſauroit guères trouver de meilleures. Il y a auſſi 104 obſervations de M. de la Caille faites au college Mazarin en 1760 & 1761, les aſcenſions droites ont été obſervées avec un inſtrument des paſſages dont la lunette a 50 pouces de longueur, & les déclinaiſons avec un ſextant de ſix pieds de rayon, & un quart de cercle de trois pieds de rayon qui n'a ſervi que lorſque la lune étoit fort méridionale, parce qu'alors la lunette du ſextant ne pouvoit ſervir commodément dans l'obſervatoire du college Mazarin. Cette lunette méridienne étoit à l'abri des variations de la chaleur & du froid, & placée dans le méridien avec une ſi grande exactitude qu'il n'y avoit en aucun point

2″ d'erreur. C'eſt l'inſtrument dont je me ſers encore actuellement : il eſt ſcellé dans une pierre aſſiſe ſur le maſſif des murs de l'égliſe, enſorte qu'il ne manque rien à l'obſervateur pour opérer avec la plus grande exactitude: j'ai fait avec les mêmes inſtrumens un grand nombre d'obſervations que je donnerai dans une autre occaſion.

Je dois faire mention auſſi d'une des plus belles collections qui exiſte, quoiqu'elle ne ſoit pas encore publique, c'eſt celle d'environ 1200 obſervations de M. Bradley calculées & réduites par lui & par M. Gaël Morris, excellent calculateur, qui m'en a fait voir le manuſcrit à Londres au mois de Mars 1763. Elles ont ſervi à vérifier les nouvelles tables de M. Mayer (1460), & l'on ſe propoſe de les faire imprimer à Londres, aux dépens de l'Etat. M. Bradley avoit déjà envoyé il y a plus de dix ans à M. Euler 130 obſervations faites en 1743, 1744 & 1745; celui-ci les communiqua à M. Mayer, qui en a fait uſage pour ſes tables, & les a données dans les mémoires de Gottingen, (*T.* III, *p.*393). Il y a encore une ſuite intéreſſante dans la nouvelle édition des tables de la lune de M. Clairaut. Toutes les obſervations de M. Bradley paſſerent entre les mains de M. Bliſſ ſon ſucceſſeur à Greenwich, je fus témoin le 9 Juin 1763 d'une délibération de la ſociété royale de Londres qui en ordonna la publication, mais cette déciſion n'a encore eu depuis ſept ans aucune exécution.

1527. Les obſervations de la lune que M. le Monnier fait depuis 1733 avec la plus grande aſſiduité, & dont l'impreſſion eſt déjà commencée au Louvre, in-folio, formeront une ſuite très-importante & également propre à donner à la théorie de la lune le dernier degré d'exactitude; il y en a déja trois cahiers in-folio de publiés, le quatrième eſt ſous preſſe (Mai 1770).

1528. M. Darquier, correſpondant de l'académie à Toulouſe, a fait auſſi un grand nombre d'obſervations depuis pluſieurs années, elles ſeront imprimées ſucceſſi-

vement dans les volumes des mémoires préſentés à l'académie par les Savans étrangers.

1529. On peut conſulter encore la collection d'obſervations de la lune, faites depuis 1737 juſqu'en 1755, à l'obſervatoire royal, & que M. Caſſini de Thury a donnée en 1756, dans les additions aux tables aſtronomiques de M. Caſſini ſon pere. Enfin, on trouveroit dans les manuſcrits du dépôt de la marine, une quantité prodigieuſe d'obſervations de la lune, faites ſucceſſivement par M. de l'Iſle à Péterſbourg, & enſuite à Paris par lui, par moi, & par M. Meſſier qui m'a remplacé dans l'obſervatoire de la marine, où il les continue journellement. Ces obſervations n'ont point encore été calculées.

LIVRE HUITIEME.

DU CALENDRIER.

1530. La Chronologie ancienne, & l'uſage ordinaire que l'on fait du calendrier, appartiennent trop à l'aſtronomie pour ne pas les traiter ici ſéparément. Le fondement de la chronologie conſiſte dans la meſure des années & des jours, & par conſéquent dans les mouvemens du ſoleil & de la lune, comparés entre eux, & avec les divers événemens de l'hiſtoire; ainſi après avoir parlé des moindres parties du temps qui ſont les heures, & les ſemaines, nous parlerons des années, de leurs différentes diviſions, des cycles qui en ſont compoſés, du calendrier, des périodes anciennes, enfin, des époques les plus célèbres : nous dirons auſſi quelque choſe des levers & couchers héliaques des étoiles qui ſont aſſez célèbres parmi les anciens, & que les commentateurs ont ſouvent très-mal interprétés.

Heures Planétaires.

1531. Les heures planétaires uſitées autrefois chez les Juifs & les Romains, commençoient au lever du ſoleil, & recevoient leur nom d'une des ſept planètes. Cet uſage étoit venu des Egyptiens, ſuivant Hérodote, *L.* II, n°. 82, & Dion Caſſius, *L.* 37, *pag.* 42, édition de 1592, ou des Caldéens (*Salmas. de an. climat. pag* 595, M. Goguet, II, 437, M. Sallier, *Mém. des inſcrip. IV*, 65). On croit que l'ordre des planètes dans les jours de la ſemaine venoit de l'influence qu'on leur ſuppoſoit ſur les différentes heures du jour; le Dimanche, au lever du ſoleil, la première heure étoit pour le ſoleil, enſuite venoient Vénus, Mercure, la lune qui étoient ſuppoſées au-deſſous de lui, puis Saturne, Jupiter & Mars qui étoient au-deſſus; par-là il arrivoit que le lendemain commençoit par la lune, & voilà pourquoi le jour de la lune,

c'eſt-à-dire, le lundi fut placé à la ſuite du jour conſacré au ſoleil. (*Clavius in ſphæram, pag.* 45); M. l'Abbé Rouſſier dans un ſavant ouvrage ſur la muſique des anciens, croit que cet arrangement vient des intervalles de la muſique, comme l'inſinue Xiphilin d'après Dion (*L.* 36, *in Pompeio*), & Scaliger l'explique par des triangles faits ſur les côtés d'un eptagone, (*Emend. temp. l. I, de diebus*). Plutarque en avoit fait la matière d'une diſſertation, dont il ne nous reſte que le titre, dans ſes queſtions de tables, *Sympoſium, l. IV, q.* 7. Ces heures étoient *inégales*, parce qu'on diviſoit le jour naturel en douze parties, & la nuit en douze autres parties.

1532. LES HEURES BABYLONIQUES commençoient à ſe compter au lever du ſoleil, (Macrobe, *Saturn. l. I, c.* 3) cela ſe pratique encore à Majorque & à Nuremberg. Celles des Egyptiens & des Romains commençoient à minuit; & cet uſage eſt encore celui de la plupart des nations de l'Europe. Heures Babyloniques.

Tous les aſtronomes commencent le jour à midi, comme faiſoient autrefois les Umbres ſuivant Macrobe, & comme font auſſi les Arabes; les aſtronomes vont auſſi juſqu'à 24 heures; ainſi lorſqu'on compte dans la ſociété le 2 Janvier 8 heures du matin, les aſtronomes diſent le premier Janvier à 20 heures, & c'eſt ce que nous appellons *temps aſtronomique*. Heures Aſtronomiques.

Les Juifs & les Romains diſtinguoient dans le jour artificiel, pris du lever au coucher du ſoleil, quatre parties principales, *Prime*, *Tierce*, *Sexte* & *None*. Prime commençoit au lever du ſoleil; Tierce, trois heures après; Sexte commençoit à midi; & None, trois heures avant le coucher du ſoleil; mais ces heures étoient plus ou moins grandes, ſuivant que le ſoleil étoit plus ou moins long-temps ſur l'horizon; l'on employe encore dans le bréviaire de l'Egliſe Romaine les mêmes dénominations. Ce ſont-là les heures Judaïques, planétaires ou inégales. Heures Judaïques.

1533. Les Athéniens commençoient à compter les heures depuis le coucher du ſoleil ; on en fait de même en Italie, on le faiſoit même autrefois en Pologne, en Autriche, en Bohême ; mais il n'y a plus à Prague que deux horloges de cette eſpèce. Les Italiens commencent leurs 24 heures une demi-heure après le coucher du ſoleil ; j'ai expliqué leur uſage à cet égard dans la préface du livre intitulé : *Voyage d'un François en Italie, fait dans les années* 1765 & 1766, à Paris, chez Deſaint, 1769.

Semaines de ſept jours.

1534. L'uſage de diviſer les temps en ſemaines de ſept jours eſt de la plus haute antiquité : il paroît que les plus anciens peuples de l'Orient s'en ſont ſervis, c'eſt le ſentiment du Syncelle, cité par M. Sallier, (*Mém. de l'acad. des Inſcript. tom.* IV, *pag.* 65). Cet uſage étoit même chez les Péruviens, *Garcilaſo de la Vega, commentarios reales de los Incas, tom.* I. *L.* II. *c.* 23. Scaliger *de emend. Temp. pag.* 9. Spectacle de la Nature, *tom.* IV, *pag.* 47.

M. Goguet penſe que les Grecs furent preſque les ſeuls peuples, qui d'abord ne ſe ſervirent pas des ſemaines de ſept jours. (*T.* I, *pag.* 217 *in*-4°.). Cependant il y a des ſavans qui doutent que cette maniere de diviſer le temps ait été employée ailleurs que chez les Juifs. (Voyez Coſtard, *The hiſtory of aſtronomy, pag.* 150. Spencer, *De legibus Hebræorum, L.* 1. *c.* 4). Quoi qu'il en ſoit, on ne peut diſconvenir que le nombre ſept n'ait été fort remarquable & fort diſtingué parmi les anciens, (S. Clément d'Alex. *Stromatum*, VI. 16. *pag.* 813, édition de 1715. Macrobe, *Somn. Scip.* I. 6. *pag.* 35. Selden, *de jure nat. & gent. L.* III, *c.* 17).

Pluſieurs auteurs ont cru même que la fête du ſeptième jour n'étoit point particulière aux Juifs, mais qu'elle avoit lieu chez les payens. M. Sallier cite un grand nombre de témoignages à ce ſujet, (*Mém de l'acad. des Inſcrip.* IV. 50), ſur-tout Philon & Joſeph ; il les réfute, à la vérité, & ſe détermine pour le ſentiment

timent contraire. (*Ibid. pag.* 64). Mais cela n'empêche pas que l'uſage des ſemaines de ſept jours n'ait eu lieu chez les anciens.

M. Goguet penſe qu'inutilement on a voulu propoſer pluſieurs conjectures ſur les motifs qui ont pu déterminer les différens peuples à s'accorder ſur cette maniere primitive de partager le temps, & qu'il faut la raporter à une tradition générale des ſept jours qu'avoit duré la création du monde. Il eſt ſingulier que cet auteur n'ait pas vu que cet uſage venoit des phaſes de la lune qui ne ſe montre que pendant quatre ſemaines ou 28 jours, ce qui a ſervi à régler le temps chez toutes les Nations (1401) : ces phaſes changent à peu-près tous les ſept jours, & ſi l'on avoit voulu faire des ſemaines de huit jours, on eût trouvé un excès de trois jours au bout du mois. D'ailleurs les années ſolaires de 365 jours ſe partagent, à un jour près, en ſemaines de 7 jours ; au lieu qu'il y auroit eu cinq jours de reſte, ſi l'on eût fait les ſemaines de huit jours ; ainſi l'uſage des mois & des années paroît avoir dû entraîner celui d'une ſemaine de ſept jours.

Années des Anciens.

1535. Nous avons parlé des années qui ſervirent aux premiers peuples du monde (277), & qui furent d'abord de 30 jours ; nous parlerons plus bas des années lunaires, dont ſe ſervent encore les Turcs & les Arabes, & qui ſont de 354 & de 355 jours (1602), mais la premiere règle conſtante qu'il y ait eu pour les années, fut celle des années de 365 jours, qui étoient toutes égales ; c'eſt ce qu'on appelle les années Egyptiennes ; le ſoleil retardoit chaque année de ſix heures ſur une année Egyptienne, & tous les quatre ans l'équinoxe arrivoit un jour plus tard dans l'année civile ; ce retardement formoit une année entiere au bout de 1461 années civiles, ou d'une période caniculaire (1605). Nous en donnerons une table ci-après (1598). Les années

Différentes ſortes d'années.

Années Egyptiennes.

Egyptiennes ſont encore employées dans la Perſe ; mais au ſujet de la forme ancienne & nouvelle de l'année des Perſes, on peut voir les notes de Golius ſur Alfergan, Scaliger, *de Emendatione Temporum*, & le P. Pétau, *Doctrina Temporum.*

Temps où commençoit l'année.

1536. Parmi nous l'année civile eſt tantôt de 365 jours & tantôt de 366 (1539); elle commence au premier Janvier depuis l'année 1567. (Voyez l'édit de Rouſſillon donné en 1564, par Charles IX. art. 9); les anciens Romains la commençoient avec le mois de Mars ſous le règne de Romulus ; les Grecs au mois de Septembre : Numa Pompilius la fixa au mois de Janvier. Sous la ſeconde race de nos Rois elle commençoit à Pâques après la bénédiction du cierge paſcal ; & dans certains endroits elle commençoit à l'Annonciation, c'eſt-à-dire, le 25 de Mars, à peu-près comme chez les Hébreux, dont l'année eccléſiaſtique & civile commençoit à Pâques, *Exod.* 12, quoiqu'ils euſſent une année naturelle qui commençoit au mois de Septembre. *Ezech. c.* 40. Voyez auſſi l'*Art de vérifier les dates*, par D. Clémencet & D. Durand, *in*-4°, 1752. chez *Cavelier*, & la nouvelle édition in-folio 1770. Le P. Petau, *Doct. Temp. Liv.* IX, *c.* 3. *Caſali de veteribus ſacris chriſtianorum ritibus. Romæ*, 1647, fol. *c.* 62.

1537. Le printemps étoit, ce me ſemble, le temps où l'année devoit naturellement commencer :

Dic age, frigoribus quare novus incipit annus,
Qui melius per Ver incipiendus erat? *Faſt. I.* 149.

Mais la raiſon qui détermina les anciens pour le mois de Janvier fut ſans doute qu'au ſolſtice d'hiver le ſoleil recommence à monter vers notre hémiſphère boréal ; ce commencement d'élévation & d'acroiſſement dans les jours leur parut devoir être le commencement de l'année :

Bruma novi prima eſt, veteriſque noviſſima Solis ;
Principium capiunt Phœbus & annus idem. *Faſt. I.* 163.

1538. L'année qui ſe diviſe actuellement en 12 mois ſolaires de 30 ou 31 jours avoit été diviſée par Romulus en dix mois ſeulement, & elle n'avoit que 304 jours. Macrobe, *Saturn.* l. I, c. 12, donne un aſſez long détail du calendrier de Romulus, de même que Solinus, *Memorabilium pars 1, c. 2.* On y voit que Mars étoit le premier mois de l'année, & portoit le nom du Dieu dont Romulus vouloit deſcendre; les mois de Juillet & Août ſe nommoient quintile & ſextile, le mois de Décembre étoit, comme ſon nom l'indique, le dixième & le dernier mois de l'année. Numa ajouta 50 jours à l'année lunaire des Romains, & la fit de 354 jours (*Macr. I*, 13). Solinus dit deux fois qu'il la fit de 355 jours, cependant l'année lunaire ne devoit être que de 354; il avoit peut-être de l'inclination pour les nombres impairs, comme enſuite les Pythagoriciens. Les mois des Romains étoient alors de 29 & de 30 jours alternativement, pour répondre aux mois lunaires qui ſont de $29\frac{1}{2}$: Numa compoſa l'année de 12 mois, changea les ſix mois qui avoient 30 jours pour les rendre impairs; ces ſix jours joints avec 51 jours qu'il avoit ajoutés, en firent 57; il en compoſa deux mois, l'un de 29 jours, l'autre de 28.

Diviſion de l'année Romaine.

Primus oliviferis Romam deductus ab arvis
Pompilius menſes ſenſit abeſſe duos. *Faſt. III*, 151.

Il plaça ces deux mois au commencement de l'année, ſuivant l'opinion de pluſieurs Savans, en faiſant commencer l'année avec l'hiver, parce que c'étoit le temps où les jours commençoient à augmenter : quelques Savans ſont d'une opinion contraire. Ces mois de 29 & de 30 jours formoient une année lunaire de 355 jours, plus petite de 10 jours que l'année ſolaire, en ſorte qu'au bout de trois ans l'hiver n'arrivoit plus au commencement de Janvier, mais de Février. Numa employa donc, auſſi bien que les Grecs, une intercalation, par laquelle l'hiver devoit toujours commencer

avec le mois de Janvier, mais il diſtribua les jours intercalaires d'une façon particulière; lorſqu'il y eut deux années de paſſées, on ajouta 22 jours; lorſqu'il y en eut quatre, 23 jours; à la ſixième, 22 jours; à la huitième, 23; de ſorte qu'en huit ans il y avoit 90 jours intercalaires. (Gaſſendi, *Op. tom. V, pag.* 550).

Les Romains ne remarquèrent pas d'abord qu'il y avoit 8 jours de trop dans cette manière d'intercaler; parce que leur année lunaire avoit un jour de plus que celle des Grecs; il ſe trouva au bout de 30 ans que l'hiver ne commençoit plus avec le mois de Janvier, mais avec celui de Décembre, il fallut donc enſuite reformer cette méthode, & après deux huitaines d'années, on ſe contentoit d'ajouter 66 au lieu de 90 jours à la troiſième huitaine; les Prêtres étoient chargés de ce ſoin; les jours intercalaires s'ajoutoient chez les Grecs à la fin de l'année, pluſieurs auteurs croyent que les Romains à leur exemple choiſirent auſſi la fin de l'année, parce que le mois de Février étoit comme la fin de l'ancienne année qui commençoit au mois de Mars; c'étoit même, diſent-ils, le dernier mois de l'année de Numa, juſqu'au temps des Decemvirs, 450 ans avant J. C.; il ſemble que cette opinion ſoit autoriſée par le témoignage d'Ovide.

Qui ſequitur janum veteris fuit ultimus anni,
Tu quoque ſacrorum, Termine, finis eras. *Faſt. II, 49.*

On voit auſſi par ces vers pourquoi les jours intercalaires ſe plaçoient non à la fin de Février, mais après le 24 de Février appellé VI°. Calend. Martii, c'étoit à cauſe de la fête du Dieu, *Terme* qui ſe célébroit le 23 de Février (VII°. Cal. Martii). Ces jours intercalaires au nombre de 22 ou de 23 formoient tous les deux ans, comme un troiſième mois qui s'appelloit, ſuivant Putarque, *Merkedonius*, ou plus communément intercalaire.

Mais ces intercalations qui étoient confiées aux Prêtres

furent quelquefois altérées, il y eut des temps où par ſuperſtition l'on omit des intercalations; il arriva même, ſelon Cenſorinus & Macrobe, que les Prêtres pour contrarier ou favoriſer des Magiſtrats ou des Traitans firent des années plus ou moins longues (Macrobe I, 14. *Solinus memorabilium pars I, cap.* 4).

Jules Céſar entreprit de corriger le déſordre de ce calendrier, & d'en éclaircir l'obſcurité, 46 ans avant J. C. Il voulut faire correſpondre les années civiles aux années aſtronomiques, en ſorte qu'à ſa même ſaiſon l'on comptât toujours les mêmes mois, & qu'on pût dire que le printemps arrivoit toujours au même temps de l'année. Voyez Cenſorinus, *ch.* 10. Suétone, dans la *vie de Céſar.* Dion Caſſius, *liv. XLIII.* Solinus, *ch.* 3. Macrobe, *Saturn. liv. I, ch.* 14. Jules Céſar étoit curieux d'aſtronomie, il avoit même compoſé divers ouvrages.

Media inter prælia ſemper
Stellarum cœlique plagis ſuperiſque vacavi,
Nec meus Eudoxi vincetur faſtibus annus. *Pharſal. X, 185.*

1539. Il étoit devenu eſſentiel au temps de Jules Céſar de faire dans le Calendrier une entière réformation : Céſar étoit tout à la fois Dictateur & Pontife, & ce ſoin le regardoit principalement. Pour s'en acquitter avec plus d'exactitude, Céſar fit venir *Soſigenes*, mathématicien d'Egypte, qui s'occupa ſérieuſement de ce travail, (Pline XVIII, 25). Cet auteur fait l'éloge de ſon application, en diſant : *Ipſe ternis commentationibus, quamquam diligentior eſſet cæteris, non ceſſavit tamen addubitare, ipſe ſemet corrigendo.* Il fit ſentir à Céſar qu'on ne pouvoit établir une forme conſtante dans les années, à moins qu'on n'abandonnât la lune, pour s'en tenir aux mouvemens du ſoleil; mais comme l'année ſolaire étoit de 365 jours & un quart, il falloit, pour ſuivre ce quart d'excédent, donner un jour de plus à l'année, dans laquelle on raſſembleroit les quatre quarts de jour.

Soſigenes, Auteur du Calendrier Julien.

Soſigenes imagina donc de faire trois années de 365 jours, & la quatrième de 366 : on laiſſa le commencement de l'année d'accord avec le commencement de l'hiver, & du mois de Janvier, ou plutôt de la nouvelle lune qui cette année-là ſuivit le ſolſtice d'hiver, afin de ne pas s'écarter d'une manière trop marquée de l'uſage des Romains. Ce fut dans l'année 45 avant J. C. que ſe fit la réforme, & l'année 44 avant J. C. fut la première année Julienne, l'équinoxe arriva le 25 Septembre : on prolongea l'année de 90 jours juſqu'à la nouvelle lune qui ſuivit le ſolſtice d'hiver, de façon que l'année eut 444 jours pour cette fois ſeulement, elle fut appellée l'*Année de confuſion.* (*Scaliger, de Emend. temporum, l. II, pag.* 187, *l. IV, pag.* 228) ou plutôt 445 ſuivant le P. Petau (*L. IV, c.* 1. *l. X, c.* 61), & *Cenſorinus, c.* 20. Macrobe (*Saturn. I*, 14) dit 443 jours; & Solinus dit qu'il y eut une année de 244 jours (*Memorabilia mundi pars II, c.* 2); mais il paroît que c'eſt par erreur.

Année de 445 jours.

1540. L'année de Numa n'avoit que 355 jours, il fallut donc en ajouter dix; Céſar, à l'exemple de Numa, répartit ces dix jours de manière à ne point toucher aux mois de Mars, Mai, Quintile, (ou Juillet) & Octobre, parce qu'ils avoient été établis de 31 jours par Romulus; il ajouta deux jours à chacun des mois de Janvier, Sextile, (ou Août) & Décembre qui étoient de 29, & devinrent par-là de 31; il ajouta un jour aux mois d'Avril, Juin, Septembre & Novembre qui en avoient 29, pour les faire de 30 jours; il n'ajouta rien au mois de Février (dit Macrobe, *Saturn. I*, 14) : *Ne Deûm inferûm religio immutaretur*, par reſpect pour les morts à qui le mois de Février étoit conſacré, car le mot de Février venoit de *Februus*, Dieu des luſtrations, ou des ſacrifices qu'on célébroit à l'honneur des Dieux mânes.

1541. Juſqu'alors le mois intercalaire avoit été le mois de Février, Céſar plaça de même en Février le jour intercalaire qu'il ajoutoit tous les 4 ans, & cela

après le 23 Février ou le 7e des Calendes de Mars, & avant le régifuge ou la fête inſtitueée en mémoire de l'expulſion de Tarquin, qui ſe célèbroit le VI des Calendes; ce jour au lieu d'être le 24 ſe trouvoit alors le 25, & le 24 qui étoit le jour intercalaire, s'appelloit *bis Sexto Calendas Martias*, parce que le jour du régifuge conſervoit ſon nom de *Sexto Calendas*, & ſe trouvoit le 25, delà vint le nom d'années biſſextiles pour celles où le mois de Février avoit 29 jours, & où le 24 Février s'appelloit *Bis Sexto Calendas*. Toutes les années de l'ere vulgaire, tant avant qu'avant J. C. dont le nombre eſt diviſible par quatre ſont biſſextiles.

Origine du terme de biſſextiles.

1542. Jules Céſar étoit né le 4 des ides du mois *Quintile*; après ſa mort, Antoine qui étoit ſon collegue dans le conſulat, fit ordonner par une loi que ce mois porteroit le nom de Jules Céſar, & il fut toujours appellé le mois de *Juillet*, depuis la ſeconde année de la réformation Julienne (1539). Le mois Sextile fut enſuite appellé *Auguſtus*, Août, en vertu d'un Senatus conſulte rendu après la bataille d'Actium; non que cet Empereur fût né dans le mois *Sextile*, car le jour de ſa naiſſance étoit le IX Cal. Octob. ou le 23 Septembre; mais dans ce mois, dit Macrobe, il étoit parvenu au conſulat, il avoit triomphé trois fois, il avoit conquis l'Egypte, il avoit terminé les guerres civiles, ce qui fut cauſe que le Sénat regardant ce mois comme le plus heureux de l'Empire d'Auguſte, ordonna qu'à l'avenir on l'appelleroit du nom de ce Prince.

Noms de Juil. & Août.

Pluſieurs Empereurs voulurent dans la ſuite, à l'exemple d'Auguſte, donner leurs noms à des mois de l'année; Néron voulut donner ſon nom au mois d'Avril, Commode voulut donner le ſien au mois d'Août, & celui d'Hercule au mois de Septembre, Domitien voulut appeller Germanicus le mois de Septembre, & celui d'Octobre Domitien; mais comme l'obſerve Macrobe après la mort de ce tyran, non-ſeulement on arrachoit les inſcriptions qu'il avoit uſurpées, mais en haine de

ſa mémoire, on changea juſques aux noms qu'il avoit établis pour les mois de l'année.

1543. Après la mort de Jules Céſar, il y eut un petit dérangement dans les intercalations, les Pontifes ne comprenant pas le ſens de la règle qu'il avoit établie, ajoutoient un jour au commencement de l'année au lieu de l'ajouter à la fin; ils rendoient biſſextile celle qui étoit la quatrième en y comprenant la biſſextile précédente, enſorte qu'il n'y avoit que deux années communes, au lieu de trois qu'il doit y avoir entre deux biſſextiles; on s'apperçut de cette erreur au bout de 36 ans, alors il y avoit eu 12 biſſextiles au lieu de 9 qu'il auroit dû y avoir. Pour y remédier Auguſte ordonna que dans les douze années ſuivantes, il n'y auroit aucune intercalation, pour retrancher par-là trois jours de la ſuite & de l'ordre des années établies par Jules Céſar (Solinus I, *pars* 2). Depuis ce temps-là, il n'y a eu dans le calendrier Julien aucune interruption, du moins ſuivant l'opinion commune. M. Euler a penſé qu'il pouvoit y avoir eu un jour d'erreur, ce qui lui ſervoit à expliquer la diſcordance des équinoxes obſervés par Ptolomée; mais j'ai prouvé par les lieux de la lune qu'il n'y avoit point erreur de date, & il paroît que ces obſervations étoient ſuppoſées, ou qu'elles étoient extrêmement défectueuſes (*Mém. acad.* 1757, *pag.* 420). On verra auſſi dans le XIIIe. livre le ſoupçon que Flamſteed a eu ſur la ſituation des armilles de Ptolomée pour expliquer une partie de cette imperfection des équinoxes de Ptolomée (2275).

1544. Malgré l'avantage que le calendrier Julien avoit ſur celui des années Egyptiennes, il étoit encore imparfait, puiſqu'en ſuppoſant l'année de 365 jours 6^h, on ſe trompoit de $11'$ chaque année (886); & les $11'$ avoient produit une différence de dix jours; c'eſt ce qui occaſionna la réformation Grégorienne de 1582, dont nous allons parler; & c'eſt ce qui a produit longtemps une différence de calendrier entre les différens peuples de l'Europe (1548).

De

De la Réformation Grégorienne pour les Années ſolaires.

1545. La réformation du calendrier avoit été propoſée bien des fois depuis qu'on s'étoit apperçu que les équinoxes anticipoient de pluſieurs jours (1544) : un Evêque de Cambrai que les auteurs appellent *Petrum ab Alliaco*, Chancelier de l'Univerſité & Précepteur de Jean Gerſon, préſenta ſon projet au concile de Conſtance, & au Pape Jean XXIII, en 1414, & l'on regarde ſon ouvrage comme ayant été une des premières occaſions de la réforme Grégorienne ; (*Weidler*, *pag.* 295). Le cardinal *Cuſa* écrivit auſſi vers le même temps ſur la réformation du calendrier & ſur la correction des tables Alphonſines ; cet auteur dont nous avons les Œuvres en trois volumes in-folio, mourut en 1464. Le Pape Sixte IV. forma décidément le projet d'exécuter cette réformation du calendrier ; il attira près de lui Régiomontanus dont la réputation & le ſavoir méritoient la plus grande confiance en pareille matière (434) ; mais ce célèbre aſtronome mourut à Rome en 1476, avant que d'avoir pu exécuter cette entrepriſe. Voyez Gaſſendi dans la vie de Régiomontanus, & dans ſon hiſtoire du calendrier, *Op.* tom. V, *pag.* 584. Le Concile de Trente terminant ſes ſeſſions en 1563, laiſſa au Pape le ſoin de travailler à la réformation du calendrier. Enfin le Pape Grégoire XIII. parvint en 1582 à terminer ce grand ouvrage ; & le calendrier qu'il a établi a pris le nom de Calendrier Grégorien. (Voy. Clavius, *Calendar. Gregorianum*, in-fol. Blondel, *Hiſtoire du calendrier Romain* ; Riccioli, *Chronologia reformata* ; Gassendi, *Romanum calendarium*, *in-folio*, *Op. t. V*, *pag.* 545). Il envoya en 1577 à tous les Princes Chrétiens un abrégé des raiſons qu'il avoit d'entreprendre la réformation du calendrier, en les priant de conſulter tous les mathématiciens qu'ils croiroient capables

Les Aſtronomes ſont conſultés.

de lui ſuggérer des idées nouvelles ou des expédiens commodes. Après avoir reçu différens mémoires à ce ſujet, le Pape aſſembla à Rome les gens les plus habiles pour achever ce grand ouvrage. Ce calendrier Grégorien devenu aujourd'hui le calendrier civil dans tous les pays de l'Europe, conſiſte dans une manière de compter les années, telle que les ſaiſons commenceront toujours aux mêmes temps de l'année.

Décret du Concile de Nicée.

1546. Le point fixe d'ou l'on partit dans la réformation du calendrier fut la déciſion du Concile de Nicée tenu l'an 325, qui établit l'équinoxe au 21 de Mars, & ordonne que la fête de Pâque ſera célèbrée le Dimanche *après* le XIVe de la lune du premier mois, c'eſt-à-dire, de la lune dont le 14e arrive *ou le jour même ou après le jour de l'équinoxe* (1571).

On croyoit au temps du Concile de Nicée que l'année étoit à peu-près de 365j 5^h^ 55′ ſuivant le ſentiment de Ptolomée (885): on ſuppoſa donc que l'équinoxe qui arrivoit alors le 21 de Mars arriveroit toujours de même, ou qu'on y remédieroit dans la ſuite; mais comme il y a ſix minutes de moins dans la véritable durée de l'année ſolaire (886), l'équinoxe arrivoit chaque année ſix minutes plutôt qu'on ne croyoit; & du temps de Grégoire XIII. en 1577, il ſe trouvoit arriver le 11 de Mars; il auroit fallu omettre trois jours de l'année tous les 400 ans pour que le 21 de Mars fût toujours près du véritable équinoxe.

Règle du Calendrier Grégorien.

Ce fut le 24 Février 1581 que parut le Bref par lequel Grégoire XIII. ordonna l'obſervation des trois articles qui devoient remplir pour toujours l'intention du Concile de Nicée; les voici en abrégé.

1547. Il eſt dit 1°. qu'après le 4 Octobre 1582, on retranchera 10 jours du mois, enſorte que le jour qui ſuivra la fête de S. François, qu'on a coutume de célèbrer le 4 Octobre, ſera appellé non le 5, mais le 15 d'Octobre, & que la lettre Dominicale G ſera changée en C.

2°. Pour qu'à l'avenir l'équinoxe du printemps ne

puiſſe pas s'éloigner du 21 de Mars, il eſt dit que les années biſſextiles qui avoient lieu de quatre ans en quatre ans n'auront plus lieu dans les années ſéculaires 1700, 1800, 1900, mais ſeulement l'an 2000, & ainſi de ſuite à perpétuité; de ſorte que trois années ſéculaires ſoient toujours communes, & la quatrième biſſextile dans l'ordre ſuivant.

1600, biſſ.	2100, com.	2600, com.	3100, com.
1700, com.	2200, com.	2700, com.	3 00, biſſ.
1800, com.	2300, com.	2800, biſſ.	3300, com.
1900, com.	2400, biſſ.	2900, com.	3400, com.
2000, biſſ.	2500, com.	3000, com.	3500, com.

3°. Pour trouver d'une manière plus sûre le quatorzième de la lune paſchale, & les jours de la lune dans tout le cours de l'année, on ſuprime du calendrier le nombre d'or, & l'on y ſubſtitue le cycle des épactes par lequel la nouvelle lune conſervera toujours ſa véritable place dans le calendrier, nous en parlerons bientôt en détail (1573).

Le Pape ordonne enſuite à tous les Eccléſiaſtiques d'embraſſer la nouvelle forme du calendrier; il exhorte & il prie l'Empereur & tous les Princes chrétiens de le faire recevoir également dans leurs Etats.

1548. La ſuppreſſion de dix jours faite en 1582 dans les Etats ſeulement des Princes catholiques fut cauſe d'une différence qui a ſubſiſté long-temps en Europe dans la manière de compter les jours; toutes les fois, par exemple, que l'on comptoit en Angleterre le 2 Janvier, on comptoit le 12 en France, c'eſt-à-dire, 10 jours de plus; les perſonnes qui craignoient l'équivoque datoient ainſi, $\frac{2}{12}$ Janvier, c'eſt-à-dire, le deux vieux ſtyle ou ſtyle Julien, & le 12 nouveau ſtyle ou ſtyle Grégorien. Lorſqu'en 1700 on eut ſupprimé une biſſextile ſuivant la règle du calendrier Grégorien, la différence ſe trouva de 11 jours; parce que dans le calendrier Julien on avoit fait l'année 1700 plus lon-

Différence du vieux Style & du nouveau.

gue d'un jour ; ce qui faiſoit compter enſuite un jour de moins.

1549. Cette différence du vieux & du nouveau ſtyle a ſubſiſté long-temps entre les pays Proteſtans & les pays Catholiques. On voit dans les tranſactions philoſophiques, n°. 203, 239, 257, 260, ce que l'on penſoit en Angleterre de la réformation ; mais elle y a été adoptée enfin, & le nouveau ſtyle a commencé en Angleterre au mois de Septembre 1752 ; on a retranché alors 11 jours, & l'on s'eſt trouvé d'accord avec le calendrier Grégorien. L'uniformité du calendrier Grégorien eſt reçue actuellement dans tous les Etats policés de l'Europe ; la Ruſſie eſt le ſeul pays où l'on compte encore 11 jours de moins, que dans les autres pays de l'Europe.

Du Cycle ſolaire & des Lettres Dominicales.

1550. On employe dans certaines occaſions le cycle ſolaire qui eſt un intervalle de 28 ans, après lequel les jours de la ſemaine reviennent aux mêmes jours du mois & dans le même ordre, tant que les années ſont biſſextiles de 4 ans en 4 ans. Suivant la manière dont nous comptons actuellement les années de ce cycle, elles commencent 9 ans avant l'ere chrétienne.

Ainſi pour trouver à quelle année du cycle ſolaire on étoit en 1763, on ajoute 9 avec 1763, l'on diviſe la ſomme 1772 par 28, on trouve pour quotient 63 qui nous apprend que le cycle ſolaire a recommencé 63 fois depuis l'ere chrétienne ; mais le reſte de la diviſion ſe trouve de 8, ainſi il y a huit années de plus que les 63 cycles complets, nous ſommes donc à la huitième année, c'eſt-à-dire, que l'on a huit de cycle ſolaire en 1763.

Calendrier perpétuel.

1551. On trouve dans tous nos livres d'égliſes une forme de calendrier perpétuel, où les 12 mois de l'année ſont marqués avec des lettres à côté de chaque jour ; ces lettres ſervent à marquer les jours de la ſe-

maine qui répondent aux quantiemes de mois, ſuivant un ordre qui revient tous les 28 ans. On met un A vis-à-vis le premier jour de Janvier, B vis-à-vis du 2, & ainſi de ſuite; ſi l'année commence par un Dimanche comme cela eſt arrivé en 1758, la lettre A ſera la lettre dominicale, & tous les Dimanches de l'année ſe trouveront indiqués par un A, dans chaque mois du calendrier perpétuel. Après avoir rencontré 52 fois les ſept lettres A, B, &c. dans le calendrier, c'eſt-à-dire, après 52 ſemaines qui font 364 jours, le 365e jour de l'année recommencera par un A, & ſera encore un Dimanche, car l'année commune commence & finit par le même jour du mois, parce que 52 fois 7 font 364. Ainſi l'année ſuivante commencera par un lundi, & aura ſon premier Dimanche le 7 du mois; or dans le calendrier perpétuel, c'eſt un G qui répond au 7 du mois, ainſi la lettre dominicale de cette ſeconde année ſera le G, celle de la troiſième année ſeroit une F, & ainſi de ſuite dans un ordre rétrograde.

Lettres Dominicales.

Mais quand il arrive une année biſſextile, le mois de Février a 29 jours, la lettre D qui commence le mois de Mars doit dénoter alors un jour de plus: ſi elle a été dominicale pendant les deux premiers mois de l'année, elle ſe trouve indiquer enſuite le lundi, & c'eſt la lettre précédente qui devient dominicale. Ainſi dans les années biſſextiles, il y a toujours deux lettres dominicales, une qui ſert pour les mois de Janvier & de Février, juſqu'au jour de S. Mathias excluſivement, l'autre qui ſert pour les dix autres mois.

Deux Lettres dans les années biſſextiles.

En 1756 le cycle ſolaire étoit 1, & les lettres dominicales D & C; dans les 27 années ſuivantes on a B, A, G, F (& E), D, C, B, A (& G); F, E, D, C (& B); A, G, F, E (& D); C, B, A, G (& F); E, D, C, B (& A); G, F, E, après quoi on recommence D & C dans le même ordre pour 28 autres années qui forment un nouveau cycle ſolaire.

1552. On peut trouver la lettre dominicale de deux façons dans ce ſiècle-ci; on ajoutera, par exem-

Trouver la Lettre Dominicale.

ple, cinq au nombre des années de ce ſiècle-ci, & de plus autant d'unités qu'il y a de biſſextiles dans cet intervalle ; la ſomme étant diviſée par 7, le reſte déſignera la lettre dominicale de l'année, en appellant G la première, F la ſeconde, &c. Pour en ſentir la raiſon, on remarquera que les lettres dominicales de 1696 étoient A & G, ainſi l'on avoit 1 pour la lettre dominicale de 1696, & il y en a eu cinq avant 1701. Depuis ce temps-là toutes les années ont eu une lettre, il faut donc prendre autant de lettres que d'années depuis 1700, & cinq de plus; & comme les années biſſextiles ont deux lettres, il faut encore ajouter autant de nombres qu'il y a eu de biſſextiles ; par exemple, en 1763 on ajoutera 63 avec 5 & 15 ; on diviſera 83 par 7, on aura 6 de reſte, c'eſt-à-dire, que la ſixième lettre B ſera la lettre dominicale de 1763.

Seconde Méthode.

La ſeconde manière de trouver la lettre dominicale eſt celle-ci : diviſez le nombre de l'année depuis 1700, plus ſa quatrième partie par 4, retranchez le reſte de 3 ou de 10, vous aurez le chiffre qui indique la lettre dominicale dans la table ſuivante ; je ſuppoſe, par exemple, qu'il ſoit queſtion de l'année 1757, ajoutez à 57 ſon quart 14, la ſomme 71 étant diviſée par 7, le reſte ſera 1, qu'on ôtera de 3, & l'on aura 2 qui dans l'ordre ci-joint fait voir que B ſera la lettre cherchée pour 1757.

A	B	C	D	E	F	G
1	2	3	4	5	6	7

Ces deux règles ne ſerviront que juſqu'en 1799 incluſivement, parce que les années 1800 & 1900 ne ſeront point biſſextiles, comme le ſont les autres années de 4 en 4, ce qui formera une interruption dans le cours ordinaire des lettres dominicales ; car l'année 1800 n'aura que la lettre E au lieu des deux lettres E & D qu'elle auroit dû avoir ſuivant la règle précédente. Les nom-

bres que nous venons de placer ſous chaque lettre ſervent auſſi à trouver quel ſera le premier Dimanche de l'année ; par exemple, quand la lettre dominicale eſt A, le premier Dimanche tombe au 1 Janvier, quand elle eſt B, il arrive le 2, &c.

1553. Pour trouver la lettre qui convient à chaque jour du mois dans une année quelconque, il ſuffit de diviſer par 7 le nombre de jours écoulés depuis le commencement de l'année ; le reſte de la diviſion ſera le nombre répondant à cette lettre, parce que les lettres ſe ſuivent ſans interruption tout le long de l'année ; ſi ce nombre eſt 1, on aura A, s'il eſt 2, on aura B, & ainſi de ſuite, comme dans la petite table précédente. Pour connoître plus aiſément le nombre de jours écoulés depuis le commencement de l'année, nous allons en donner une table pour les premiers jours, & pour les dixième & vingtième de chaque mois, dans laquelle il faut obſerver ſi c'eſt une année biſſextile d'ajouter toujours l'unité après le mois de Février, puiſque ces années-là ont un jour de plus, & qu'il ſe place au mois de Février pour y former un 29ᵉ jour.

Mois de l'année.	Jours écoulés depuis le commencement de l'Année.			
	Le premier.	Le dix.	Le vingt.	
Janvier.	1	10	20	
Février.	32	41	51	
Mars.	60	69	79	
Avril.	91	100	110	
Mai.	121	130	140	
Juin.	152	161	171	
Juillet.	182	191	201	
Août.	213	222	232	
Septembre.	244	253	263	
Octobre.	274	283	293	
Novembre.	305	314	324	
Décembre.	335	344	354	

Ajoutez 1 dans les années Biſſ.

1554. Pour connoître à quel jour de la ſemaine répond un quantieme de mois; par exemple, le 20 Février 1762, à 1761 complet ajoutez le nombre de biſſextiles qui y ſont renfermées, ſavoir 440, ôtez-en 12 jours, & ajoutez-y 51, c'eſt-à-dire, les jours écoulés depuis le commencement de l'année, la ſomme 2240 étant diviſée par 7, il ne reſte rien; ce qui prouve que c'eſt un ſamedi, s'il reſtoit 1 ce ſeroit un Dimanche, & ainſi des autres.

Si l'on vouloit trouver la même choſe en ſuivant l'ancien calendrier, il ne faudroit ôter que 1 au lieu de 12, puiſqu'il y a 11 jours à compter de moins, quand on ſuit le vieux ſtyle.

1555. Voici une autre table qui ſert à trouver quel eſt le jour de la ſemaine qui répond à chaque jour du mois, quand on connoît l'année du cycle ſolaire, ou la lettre dominicale; on trouve ſouvent cette table gravée ſur le revers des cadrans ſolaires, à Bouſſole, que l'on faiſoit communément autrefois. Les chiffres qui ſont au haut de la table indiquent l'ordre des mois en ſuppoſant que le mois de Mars s'appelle 1; les autres chiffres de la table indiquent les jours du mois qui répondent à un des jours de la ſemaine, indiqué par la lettre dominicale qui eſt au bas de la table. Ainſi quand la lettre dominicale eſt G, comme en 1770 le dimanche arrive dans les mois d'Avril & de Juillet, le 1, le 8, le 15, le 22 & le 29; dans les mois de Septembre & de Décembre le 2, le 9, &c. Dans le mois de Juin le 3, le 10, &c. Quand la lettre dominicale eſt *F* comme en 1771, tous les nombres de la table marquent le lundi; car le nombre 1 qui répond aux mois 5 & 2, c'eſt-à-dire aux mois de Juillet & d'Avril, ſe trouve, en effet, indiquer que ces deux mois commencent par le lundi; le nombre 2 qui eſt au-deſſous de 7 & 10, c'eſt-à-dire, de Sept. & Déc. annonce que dans ces deux mois, le 2 eſt un lundi, &c. Lorſque les noms des mois ne ſe trouvent pas gravés dans les deux premieres lignes, & qu'il y a ſeulement 5, 7, &c. 2, 10, &c. Il faut ſe rappeller que 2 eſt le mois d'Avril, que 3 eſt le mois de Mai, & ainſi des autres.

Table pour trouver le quantième du mois qui répond à chaque jour de la ſemaine, quand on connoît la Lettre Dominicale.

Juil.	Sept.	Juin.	Fév.	Août	Mai	Janv.
5	7	4	12	6	3	11
Avril	Déc.		Mars			Oct.
2	10		1			8
			Nov.			
			9			
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				
G	F	E	D	C	B	A
Dim.	Lun.	Mar.	Mer.	Jeudi	Ven.	Sam.

Il arrive ſouvent que la table précédente eſt gravée ſur de petits cadrans ſans que les noms des mois, les lettres dominicales, ni les jours de la ſemaine y ſoient marqués ; elle devient alors une enigme dont j'ai cru devoir donner ici l'explication, qui m'a été demandée plus d'une fois; elle ne ſe trouve, en effet, ni dans Clavius, ni dans le traité des inſtrumens de mathématiques de Bion, où l'on cherche quelquefois auſſi inutilement l'explication de pluſieurs eſpèces de cadrans ou de cercles, gravés en Allemagne ou en France, dans le 16e & le 17e ſiècle.

Du Cycle lunaire & du Nombre d'Or.

1556. Le Cycle lunaire eſt un eſpace de 19 années ſolaires, ou de 6939 jours dans lequel il arrive 235 lunaiſons, enſorte qu'au bout des 19 ans les nouvelles lunes arrivent au même degré du zodiaque, & par conſéquent au même jour de l'année que 19 ans auparavant. On appelle la première année d'un cycle lunaire, celle où la nouvelle lune arrive le 1 de Janvier, du moins, ſuivant le calendrier Grégorien; de ces 235 lunaiſons, on en donne 12 à chaque année, ce qui fait 228 lunaiſons, alternativement de 29 & de 30 jours; il en reſte 7 qu'on appelle lunaiſons emboliſmiques ou intercalaires, il y en a ſix de 30 jours chacune; mais la ſeptième eſt de 29 jours ſeulement, on la place à la fin du cycle ou de la 19e année, où elle forme une irrégularité. Ce cycle fut trouvé par Méton environ 430 ans avant J. C., & fut regardé dans la Grèce comme une découverte ſi belle qu'on en gravoit le calcul en lettres d'or; l'on appelle encore Nombre d'or, l'année du cycle lunaire, dans laquelle on ſe trouve.

Règle pour trouver le nomb. d'Or.

Toutes les fois que la nouvelle lune arrive le 1 jour de Janvier, on recommence un cycle lunaire, & l'on a 1 pour le nombre d'or. Voici la règle générale pour trouver le nombre d'or en tout temps; on ajoute 1 à l'année de notre ere, parce que dans l'année 1 de J. C. le nombre d'or a dû être 2, on diviſe la ſomme par 19; le reſte, s'il y en a un, marque l'année du cycle lunaire où l'on ſe trouve, c'eſt-à-dire, le nombre d'or qui convient à l'année propoſée : ainſi en 1764 après avoir ajouté 1, l'on diviſera 1765 par 19, le quotient ſera 92, parce que le cycle lunaire a recommencé 92 fois depuis J. C.; mais il reſtera 17, & cela nous apprend que le nombre d'or en 1764 eſt 17; ſi l'on ne trouve aucun reſte dans la diviſion, c'eſt une preuve qu'on eſt à la derniere année du cycle & que le nombre d'or eſt 19.

1557. Il eſt bon d'obſerver qu'il y a eu autrefois deux cycles de 19 ans, dont l'un commençoit trois ans plus tard que l'autre; (Voyez l'art de vérifier les dates, par D. Clémencet & D. Durand, premiere édition, *pag.* XXXIV).

Dans la table chronologique de l'ouvrage que je cite, l'année 1. de notre ere répond à 18 du cycle lunaire, & à 2 du cycle de 19 ans, mais le premier n'y eſt pas continué au-delà de l'an 1580; le cycle de 19 ans eſt le ſeul qui aille juſqu'à la fin de la table, c'eſt celui qui a prévalu, & à qui nous avons tranſporté le nom de cycle lunaire, pour nous conformer à l'uſage actuel de tous les aſtronomes.

1558. Pour ſavoir exactement combien le cycle lunaire, dont nous nous ſervons, diffère de 19 années Juliennes de $365^j \frac{1}{4}$ chacune, ou de $6939^j\ 18^h$; il ne s'agit que de multiplier par 235 la révolution ſynodique de la lune qui eſt $29^j\ 12^h\ 44'\ 3''\ 10'''\ 48''''$ ſuivant les tables de Reinhold, ou tables Pruſſiennes qui furent employées dans le calendrier, on trouvera, ſuivant Clavius, (*cap.* 8. *n°.* 4. *pag.* 86), $6939^j\ 16^h\ 32'\ 27''\ 18'''$: ainſi il y a un excès de $1^h\ 27'\ 32''\ 42'''$; donc à la fin des 19 ans les nouvelles lunes arriveront $1^h \frac{1}{2}$ plutôt, puiſque le cycle finira à peu-près $1^h \frac{1}{2}$ avant la fin des 19 ans, ce qui formera après 312 ans $\frac{1}{2}$, la valeur de $23^h\ 59'\ 52''\ 49'''$, c'eſt-à-dire, un jour moins $7''\ 11'''$; car $1^h\ 27' : 19 :: 24^h : 312$. En calculant plus rigoureuſement, on aura l'anticipation exacte d'un jour ſur $312 \frac{1}{2}$ ans plus $23^j\ 17^h$: les 312 ans $\frac{1}{2}$ font, 1°, une équation d'un jour tous les 300 ans; 2°, tous les 2400 ans, il y a 100 ans de retard, & l'équation d'un jour, eſt reculée d'un ſiècle, parce que les $12 \frac{1}{2}$ ans omis tous les 300 ans, font un ſiècle après 2400 ans. C'eſt ſur ce dernier réſultat de $312 \frac{1}{2}$ ans qu'on a réglé l'équation lunaire d'un jour entier pour chaque eſpace de 300 ans, moins un tiers de jour, après 2400 ans, à cauſe des $12 \frac{1}{2}$ ans de plus; on pourroit dire encore moins un tiers de jour, après 481436 ans, à cauſe des $23^j\ 17^h$, qui font alors à peu-près cent

Erreur du Cycle Lunaire.

ans ; mais parce que dans l'uſage civil l'équation ne peut ſe faire que d'un jour, il a été ſtatué qu'après chaque eſpace de 2400 ans, on en laiſſeroit paſſer 100, ſans tenir aucun compte de l'équation lunaire. On néglige la différence qui avoit lieu après 481436 ans, parce que cette période excédoit celle de 300000 ans, pour laquelle principalement le calendrier avoit été dreſſé. (Clavius, *pag.* 133).

1559. Il y avoit du temps de la Réformation Grégorienne (1545), pluſieurs aſtronomes qui, en ſuivant le calcul d'Hipparque, aſſuroient que c'étoit en 304 ans, & non en 312 ans $\frac{1}{2}$, qu'il devoit y avoir un jour à ajouter au cycle lunaire. Si l'on admet avec M. Mayer le mois lunaire vers 1700 de $29^j\ 12^h\ 44'\ 2''\ 8921$, on trouve pour 235 lunaiſons $6939^j\ 16^h\ 31'\ 19''\ 6435$, c'eſt-dire, par rapport aux 19 années ou 6939^j & 18^h, un défaut de $1^h\ 28'\ 40''\ 3565$; or cette quantité eſt à $6939^j\ 18^h$, comme 24^h ſont à 308 années $278^j\ 3^h$; ainſi l'erreur du cycle lunaire ſeroit d'un jour en 308 ans & $278^j\ 3^h$, & non pas 312 ans & demi ; mais comme nous n'avons à expliquer ici que le Calendrier Grégorien, tel qu'il a été établi, nous ſuppoſerons, avec les auteurs de ce Calendrier, que la révolution de la lune eſt exactement telle qu'on la trouve dans les tables Pruſſiennes d'*Eraſme Reinhold* (450) : il avoit comparé les obſervations de Copernic avec celles de Ptolomée & d'Hipparque ; il avoit dreſſé des tables calculées avec encore plus de ſoin que celles de Copernic, & elles paſſoient pour être les meilleures de toutes avant la publication des tables Rudolphines de Képler.

Tables de Reinhold employées dans le Calendrier.

Le cycle lunaire a été long-temps la ſeule manière que l'on eût de trouver les nouvelles lunes de chaque mois ; mais l'imperfection que nous venons de faire voir dans le cycle lunaire, lui a fait ſubſtituer celui des épactes, que nous expliquerons bientôt (1570).

Période Dyoniſienne.

1560. Les combinaiſons du cycle ſolaire & du cycle lunaire, forment une période qui doit ramener les nouvelles lunes aux mêmes jours de la ſemaine, & aux

mêmes jours du mois, puiſque, à la fin de chaque cycle ſolaire, les jours du mois reviennent aux mêmes jours de la ſemaine, & qu'au bout de chaque cycle lunaire, les nouvelles lunes reviennent aux même jours du mois. Si l'on multiplie 19 par 28, ou le cycle lunaire par le cycle ſolaire, on aura 532 ans; c'eſt une période qui fut employée par *Denis le Petit*, l'an 527, (*Janus, hiſt. cycli Dionyſiani*), ce fut lui qui, en réformant le calendrier, établit pour époque la naiſſance de J. C., ce qui fut adopté bientôt dans toute la chrétienté; cette période s'appelle auſſi période Victorienne, & *grand cycle Paſchal*, parce qu'après cet eſpace de 532 ans, les nouvelles lunes reviennent aux mêmes jours de la ſemaine & du mois ainſi que les lettres dominicales, Pâques & les fêtes mobiles ſe retrouvent dans le même ordre. Pour trouver l'année de cette période, où l'on eſt actuellement, il faut ajouter 457 à l'année courante, & diviſer la ſomme par 532, le reſte eſt l'année de la période Dionyſienne; mais depuis la réformation du calendrier, cette période n'eſt plus d'aucun uſage.

Du Cycle d'indiction, de la Période Julienne, & autres Périodes.

1561. Les INDICTIONS ou eſpèces d'ajournemens qu'on employoit dans les tribunaux ſous Conſtantin, & les Empereurs ſuivans, formèrent une période ou un cycle de 15 ans qui s'eſt perpetué ſans cauſe, & comme une forme arbitraire de numération; les indictions commencèrent au 25 Septembre 312. Les Empereurs Grecs, & l'égliſe de Conſtantinople commençoient du 1 Septembre; les Papes qui s'en ſervent auſſi, commencent au 1 Janvier 313; cette période n'a rien de plus remarquable que d'être citée dans les actes de la Cour de Rome.

Si l'on prolonge cette période en remontant, on trouve qu'elle commenceroit 3 ans avant l'ere chrétienne;

il ſuffit donc d'ajouter 3 au nombre de l'année, & de diviſer la ſomme par 15, le reſte de la diviſion ſera le nombre du cycle d'indiction qui convient à l'année propoſée. Ainſi pour 1763, on diviſera 1766 par 15, le quotient 117 nous apprend qu'il y a eu 117 révolutions de ce cycle depuis le commencement de notre ere, & le reſte 11 de la diviſion eſt le nombre d'indiction qui convient à 1763.

1562. La Période Julienne eſt le produit des trois cycles, ſolaire, lunaire & d'indiction, ou de 28, 19 & 15; c'eſt-à-dire, un eſpace de 7980 ans, dans lequel il ne peut y avoir deux années qui aient les mêmes nombres pour les trois cycles; mais au bout duquel les trois cycles reviennent enſemble dans le même ordre. Pour ſavoir combien de temps il y a que cette période a commencé, il ne faut qu'ajouter 4713 à l'année de l'ere chrétienne, & l'on a l'année de la période Julienne qui répond à l'année courante où l'on eſt.

La période Julienne a été propoſée par Joſeph Scaliger comme une meſure univerſelle en chronologie; & nous y réduirons ci-après toutes les époques (1595). Képler & Boulliaud en ont fait uſage dans leurs tables aſtronomiques, & ſur-tout *Mercator* dans ſon aſtronomie imprimée en 1676.

Les époques des mouvemens céleſtes ſont rapportées à la première année de la période Julienne, dans Muller, & celles de la chronologie dans le grand ouvrage du P. Petau, *de Doctrina temporum*. Par exemple, la création du ſoleil, ſuivant le calcul de Scaliger, répond au 22 Octobre 764 de cette période, ou a l'an 730, ſuivant le calcul du P. Petau (1595).

1563. Lorſque pour une année dont on connoît le cycle ſolaire, le nombre d'or & l'indiction on cherche la période Julienne, c'eſt la matière d'un problême indéterminé arithmétiquement, mais déterminé chronologiquement, dont on trouve la ſolution dans preſque tous les livres d'algèbre; il ſe réduit à chercher un nombre qui, diviſé par trois nombres donnés, produiſe trois

reſtes donnés (*Inſtit. aſtr. pag.* 620). En voici une ſolution différente.

Problème. Trouver un nombre qui diviſé par 28 donne pour reſte un nombre a, diviſé par 19 donne un reſte b, & diviſé par 15 donne un reſte c.

Solution. Nommons les trois ~~reſtes~~ quotiens de la diviſion x, y, z, on aura pour le nombre cherché $28x+a=19y+b=15z+c$. Pour réſoudre en nombres entiers l'équation $28x+a=19y+b$ ou $y=x+\frac{9x+a-b}{19}$, je ſuppoſe $m=\frac{9x+a-b}{19}$, $x=2m+\frac{m-a+b}{9}$; j'égale encore cette fraction à n, & j'ai $m=9n+a-b$, donc $x=2m+\frac{m-a+b}{9}=19n+2a-2b$; $28x+a=532n+57a-56b=15z+c$. Pour réſoudre de même en nombres entiers cette équation, je la mets ſous cette forme $z=35n+3a-3b+\frac{7n+12a-11b-c}{15}$ & j'égale la fraction à p, j'en tire $n=2p-a+b+\frac{p-5a+4b+c}{7}$, & faiſant cette fraction $=q$, on a $p=7q+5a-4b-c$, donc $n=2p-a+b+q=15q+9a-7b-2c$; & $532n+57a-56b$ qui eſt la valeur de $15z+c$ ſera $=7980q+4845a-3780b-1064c$; c'eſt auſſi la valeur du nombre cherché qui eſt l'année de la période Julienne. Delà ſuit une règle générale : les produits du nombre d'or par 3780 & de l'indiction par 1064 étant ôtés du produit de 4845 par le cycle ſolaire, (augmenté s'il le faut de 7980), on diviſera la différence par 7980, ſi cela ſe peut, & le reſte de la diviſion ſera le nombre cherché, ou l'année de la période Julienne.

Exemple. En 1770 les cycles ſont 15, 4 & 3, les produits 72675, 15120 & 3192, le quotient 6, & le reſte de la diviſion 6483; c'eſt l'année de la période Julienne qui répond à 1770.

1564. Quoique le cycle lunaire ſoit la période la plus ſimple de celles qui expriment avec quelque exactitude le retour de la lune au ſoleil, il y a cependant

Autres périodes lunaires.

pluſieurs autres périodes qui ont eu de la célébrité, celle de 8 ans employée par Cléoſtrate & Harpalus, la période Caldéenne de 18 ans & dix jours dont nous avons parlé aſſez au long (1501). Celle de 59 ans propoſée par Philolaus & Œnopides, & celle de Calippus.

Période Calippique.] Calippus Cyzicenus, aſtronome Grec, vivoit 330 ans avant J. C., il propoſa le premier la période de 76 ans quadruple du cycle lunaire de Méton, parce qu'en ôtant un jour de 4 cycles il le rendoit plus exact. Voyez Cenſorinus, c. 18. Ptolomée, V. 3. On prétend qu'il reconnut l'erreur du cycle de Méton, dans une éclipſe de lune arrivée 6 ans avant la mort d'Alexandre. Ce cycle ou cette période de Calippus commence à l'automne de l'année de la période Julienne 4383, ou 330 ans avant J. C., il en eſt parlé quelquefois dans l'almageſte de Ptolomée, & dans pluſieurs auteurs tels que Scaliger, *de emend. temp. pag.* 84', 421. Pétau, *de Doctrina temporum II*, 16, & ſuiv. Ptolomée, *Almag.* III, 2. VII, 2 & 3.

Les anciens parlent encore de la période de 82 ans propoſée par Démocrite, de celle de 247 ans par Gamaliel, de celle de 304 ans employée par Hipparque pour les années civiles (Riccioli, *Almag. I*, 243).

Grande année des patriarches. 1565. On trouve auſſi dans les anciens quelques veſtiges d'une période de 600 ans que M. Caſſini a fait valoir comme la plus exacte de toutes les périodes luniſolaires. Joſephe, dans ſes Antiquités Judaïques (*Liv.* 1, *ch.* 4, *art.* 15), dit que les Patriarches n'auroient pu perfectionner l'aſtronomie s'ils avoient vécu moins de 600 ans, *parce que ce n'eſt qu'après la révolution de ſix ſiècles que s'accomplit la grande année.* M. Caſſini obſerve auſſi que 600 années ſolaires qui ſeroient de 365j 5h 51' 37" ½ chacune, & 7421 mois lunaires (ſuppoſés de 29j 12h 44' 3" chacun) font de part & d'autre la même ſomme, ſavoir, 219146 jours 12h 15' ou 189342858500"; il n'y a pour la lune que 3" de plus; or ces périodes ſont peu différentes de celles que nous avons trouvées, ſavoir, pour l'année, 365j 5h 48' 45" ½,

$45'' \frac{1}{2}$, & pour le mois-lunaire, il y a 2000 ans, 29j 12^h $44'$ $2''$ 95. Ainſi dans l'eſpace de 600 ans la lune doit revenir en conjonction avec le ſoleil dans le même point du ciel; & cette période *luniſolaire* parut à M. Caſſini ſi intéreſſante qu'il l'appella PÉRIODE DE LOUIS LE GRAND, (*Anciens mém. de l'acad.* tom VIII, *pag.* 5, Diſſertation de M. de Mairan ſur la période de 600 ans, à la ſuite de ſes lettres au P. Parennin). Période de de Louis-le-Grand.

J'obſerverai ſeulement que ſi l'on employe la durée de l'année que nous connoiſſons, & le mois ſynodique tel que nous l'avons indiqué ci-devant, l'on aura 28^h $33'$ $51''$ de trop dans les 7421 mois lunaires, & la lune retarderoit de plus d'un jour au bout des 600 ans; mais dans ces temps reculés on ne pouvoit connoître l'année ſolaire avec une ſi grande préciſion.

1566. Le Néros des Caldéens n'étoit ſuivant M. Goguet que cette période de 600 ans; mais on diſpute beaucoup ſur la valeur de trois périodes anciennes appellées Sossos, NÉROS, & SAROS. Béroſe, Prêtre de Babylone en parloit dans ſon hiſtoire des Caldéens compoſée 300 ans avant J. C. Cette hiſtoire qui ne ſubſiſte plus, fut citée par *Jule Africain*, auteur du deuxieme ſiècle, qui compoſa une chronique Grecque, mais elle eſt également perdue; George ſurnomné le *Syncelle* qui dans le huitième ſiècle a écrit une chronographie en Grec, cite un paſſage de Béroſe qui avoit été rapporté par Jule Africain, où il s'agit du Soſſos, du Néros & du Saros, & c'eſt-là le ſeul paſſage ancien où il en ſoit parlé. Le Syncelle cite Annianus & Panodorus qui avoient prouvé que le Soſſos étoit de 60 jours, le Néros 600 jours, & le Saros de 3600 jours, ou 9 ans & dix mois; M. Fréret a cru que le Saros étoit de 19 ans & demi, (*Mém. de l'acad. des inſcr.* tom. VI). Le R. P. Giraud de l'Oratoire penſe qu'il eſt de 3600 mois luniſolaires de 30 & de 31 jours qui font 3711 lunaiſons (Mém. de Trévoux Févr. 1760). Des Saros, Neros & Soſſos.

M. Goguet (Tom. III, *pag.* 261) & M. Gibert, (Mém. de Trévoux, Avril 1760) eſtiment le Saros de

600 ans; M. de Mairan a réfuté M. Goguet à la ſuite de ſes lettres au P. Parennin. Cette diſcution me meneroit trop loin; mais je dois remarquer avec M. le Gentil (*Mém. acad.* 1756, *pag.* 64), que Suidas & après lui M. Halley ont attribué le nom de *Saros* à la période Caldaïque de 18 ans & onze jours ou de 223 lunaiſons (1501), mais ſans aucune eſpèce de preuve.

Période lunaire des Egyptiens.

1567. L'année lunaire eſt de 354 jours 9^h; car on peut négliger ici 11 minutes qu'il y a de moins que les 9 heures (1481), ainſi le temps que le commencement de l'année lunaire doit mettre à revenir d'accord avec le commencement de l'année ſolaire eſt de 2835 années ſolaires tropiques, qui font exactement 2922 années lunaires.

Cette période lunaire ſert à M. Gibert (*Mém. de Trévoux*, 1762, *pag.* 197) pour expliquer un paſſage célèbre, mais très-obſcur, d'Hérodote (*L.* 2, *c.* 42).

Paſſage ſingulier d'Hérodote.

Hérodote voyageant en Egypte 450 ans avant J. C. entendit dire aux Prêtres Egyptiens que pendant la durée de 341 regnes qu'ils comptoient dans leur hiſtoire, juſqu'au temps de Séthon, qui étoit ſur le trône quand Sennachérib vint fondre ſur l'Egypte, *le ſoleil s'étoit levé quatre fois des points où il a coutume de ſe lever; & que deux fois il avoit recommencé ſon cours du côté où il ſe couchoit au temps d'Hérodote, deux fois il l'avoit fini du côté où il ſe levoit au même temps.*

1568. M. Gibert penſe que le mot de *ſoleil* doit ſe prendre au figuré; en effet, ſuivant le témoignage de *Phavorinus*, au mot Ἥλιος, on diſoit très-bien un ſoleil pour dire un jour, ou pour dire une année. M. G. évalue les 341 regnes à 11340 ans, à raiſon de 33 ans pour chacun, & il obſerve que dans cet eſpace de temps la période lunaire s'eſt accomplie 4 fois; les 4 renouvellemens de cette période donneront pour ainſi dire quatre levers du ſoleil, ou quatre commencemens d'année Egyptienne aux commencemens de l'année lunaire; mais dans ces 11340 ans l'année avoit commencé

deux fois dans la saison où elle finissoit au temps d'Hérodote, & fini deux fois dans la saison où commençoit l'année ; voila peut-être le sens emblématique du passage. Cette conjecture paroît plus soutenable que les applications forcées qu'on a voulu faire des hypothèses astronomiques à ce passage d'Hérodote. V. M. *Fréret* sur la chronologie de Newton; M. *Goguet sur l'origine des sciences*, & différens volumes des mémoires de l'académie des belles lettres, où ce passage d'Hérodote est discuté.

1569. La précession des équinoxes formoit une grande période appellée chez les anciens Αποχατάςασις, ou *restitutio*, à cause du rétablissement des étoiles aux mêmes positions par rapport aux cercles de la sphère, elle est de 25~~972~~769 ans, comme on le verra dans le XVIe. livre (2745). Les peuples superstitieux firent de ce retour purement astronomique, un retour moral & civil des choses humaines, auquel on croit que Virgile fait allusion :

> Alter erit tum Tiphys, & altera quæ vehat Argo
> Delectos heroas : erunt etiam altera bella,
> Atque iterum ad Trojam magnus mittetur Achilles.
>
> Eclogue IV, v. 34.

DES ÉPACTES OU DE LA RÉFORMATION GRÉGORIENNE pour les années lunaires.

1570. Le calendrier établi par Grégoire XIII. en 1582, avoit pour premier objet de règler les années civiles de manière que l'équinoxe du printemps arrivât toujours aux environs du 21 de Mars, pour faire ensorte que les mêmes saisons revinssent perpétuellement aux mêmes jours du mois : cet objet a été rempli par l'ordre des intercalations que nous avons expliqué (*art.* 1547).

Mais la réformation avoit encore une autre branche,

importante dans les vues du ſouverain Pontife, c'étoit de remettre les nouvelles lunes & ſur-tout le quatorzième de la lune Paſchale au même état où elles avoient été en 325 au temps du Concile de Nicée, & dont elles étoient éloignées de plus de quatre jours.

Règle du Concile de Nicée.

1571. Suivant le Concile de Nicée, on doit célèbrer la fête de Pâque le 1 Dimanche *après* le 14e. de la lune, ſi ce 14e. arrive le 21 de Mars ou après le 21 de Mars; ainſi la fête de Pâque ne doit jamais arriver plutôt que le 22 de Mars, car la règle dit que ce ſera le premier Dimanche *après* le quatorzième; de même elle ne doit jamais arriver plus tard que le 25 Avril; car ſi la pleine lune tombe au 20 Mars, ce ne ſera pas la pleine lune Paſchale, on attendra celle qui ſuit le 21 Mars ou celle du 18 Avril; & ſi le 18 Avril ſe trouve un Dimanche, ce ne ſera encore que le Dimanche ſuivant, 25 Avril, qui ſera le jour de Pâque.

Limites Paſchales.

Le P. Alexandre, (Hiſt. eccléſiaſt. tom. III, *pag.* 378, chap. V. diſſert. V), fait voir combien l'égliſe a pris de ſoin depuis le Concile de Nicée pour empêcher qu'il ne ſe gliſſât quelque erreur dans la célébration de la Pâque; on s'en eſt occupé dans divers ſiècles; mais ce fut ſous Grégoire XIII. en 1582, que la réformation du calendrier fut conſommée à cet égard. Un des premiers qui s'en occupèrent fut S. Hyppolite, Evêque & Martyr qui vivoit l'an 228.

1572. Le cycle Paſchal de S. Hyppolite étoit de 112 ans, il étoit compoſé de 7 cycles de 16 ans; les auteurs ne nous en avoient donné aucune idée; mais en 1551 en fouillant dans les champs, qui ſont aux environs de Rome ſur le chemin de Tivoli, on trouva dans les mazures d'une ancienne égliſe de S. Hyppolite une ſtatue aſſiſe, ayant à ſes côtés ce cycle en lettres Grecques depuis l'an 222 juſqu'à l'an 333. V. la diſſertation de M. Bianchini ſur ce cycle imprimée à Rome en 1703 in-folio, où il parle auſſi d'un cycle lunaire de Céſar trouvé à Rome ſur un marbre antique. Il en eſt auſſi fait mention dans le ſupplément

qui eſt à la fin du XVIIe. volume de l'Encyclopédie.

Il y a eu d'autres cycles relatifs à la fête de Pâques : on trouvera des détails conſidérables ſur toutes les périodes qui ont ſervi à cet uſage dans l'ouvrage intitulé : *Diſſertationes de cyclis Paſchalibus qui Enneadecaëteride Alexandrina nituntur, Dyonyſii ſcilicet & Bedæ, Ravennatenſi Iſidori felicis, Cyrilli, Theophili, Aniani, Panodori Metrodori, Anatolii, Euſebii, Synodi Nicænæ & Athanaſii, ut & de Enneadecaëteridis Alexandrinæ natura & conſtitutione, initio ſeu primo anno, ratione emboliſmi, initio ſingulorum annorum & hujus initii tranſlatione, ut & de computo lunari Alexandrinorum necnon de computo ſolari in genere, & Pauli Alexandrini atque Alexandrinorum in ſpecie. Amſtelædami apud Joannem Boom*, 1736, *petit in*-4°. Cycles pour la Pâque.

Les ſouverains Pontifes s'occupèrent plus d'une fois du projet de cette réformation (1545). Grégoire XIII, raſſembla à Rome des ſavans de divers pays dès l'année 1576 ; un médecin nommé *Aloiſius Lilius* lui préſenta pour lors un projet de calendrier intitulé : *Compendium novæ rationis reſtituendi calendarii*, qui parut très-bien fait, que le Pape adreſſa en 1577, à tous les Princes chrétiens & à toutes les univerſités célèbres pour le faire examiner, & qui fut enfin adopté dans le bref de la réformation (1546).

1573. L'ÉPACTE (a) dans ſon principe eſt ce qu'il faut ajouter à l'année lunaire (1481) pour former l'année ſolaire (886) ; la ſuite des épactes eſt la ſuite des différences qui ſe trouvent entre ces deux ſortes d'années. Il y a des épactes aſtronomiques deſtinées à trouver exactement les ſyzygies aſtronomiques moyennes en heures, minutes & ſecondes (art. 1752). Les épactes du calendrier ſont deſtinées ſeulement à trouver, ſuivant l'intention de l'égliſe, & la règle établie en 1582, les jours des nouvelles lunes eccléſiaſtiques ; je dis ſuivant l'intention & la règle de l'égliſe, parce que les nouvelles lunes eccléſiaſtiques ne ſont pas tout-à-fait d'ac- Epactes du Calendrier.

(a) ἐπάγω, *adjicio*, j'ajoute.

cord avec les N. L. moyennes de l'aſtronomie (1589).

L'épacte qu'on aſſigne à chaque année dans le calendrier eſt le nombre qui indique l'âge de la lune, au commencement de cette année, ſuivant le calendrier eccléſiaſtique ; delà il ſuit que ſi la nouvelle lune arrive le 1 Janvier l'épacte eſt zéro pour cette année-là; mais l'année ſuivante elle ſera de 11^j, parce que l'année lunaire n'eſt que de 354^j, & l'année ſolaire eſt de 365; ce qui fait que la nouvelle lune étant tombée au 20 Décembre, la lune aura 11 jours le 1 Janvier de l'année ſuivante; de même l'année d'après l'épacte eſt de 22 ; la troiſième année elle ſeroit de 33 ſi l'on n'en ôtoit 30 pour former un mois complet, elle ſe réduit donc à 3. Par ce moyen les épactes d'années ſuivent l'ordre naturel des multiples de onze en retranchant toujours 30; ſavoir, 11, 22, 3, 14, 25, 6, 17, 28, 9, 20, 1, 12, 23, 4, 15, 26, 7, 18, 29. Tel eſt l'ordre naturel & primitif des épactes, quand on ſuppoſe les mois lunaires de 29 & de 30 jours, & les années civiles de 365 jours, avec une biſſextile tous les quatre ans.

Calendrier perpétuel.

1574. Pour que l'épacte de l'année ſerve à indiquer la nouvelle lune, tous les mois, on place dans le calendrier perpétuel (1551), c'eſt-à-dire, le calendrier des lettres dominicales, qui eſt joint à tous nos livres d'égliſes, les 30 épactes à côté des jours du mois, en rétrogradant, ſuivant cet ordre, 30, 29, 28, &c. Si la nouvelle lune arrive le 2 Janvier, elle ſera marquée par l'épacte 29, qui ſe trouvera également vers le 1 de Février, le 2 de Mars, & vers tous les autres jours de l'année où il devra y avoir nouvelle lune : on dira que l'épacte de cette année-là eſt 29. L'année d'après, l'épacte ſera plus forte de 11 jours, parce que les nouvelles lunes arriveront onze jours plutôt ; ainſi ôtant 30 de la ſomme, on aura 11 pour l'épacte ſuivante, & toutes les fois que la lune avancera d'un jour, il faudra augmenter l'épacte d'une unité, pour que la nouvelle lune ſoit marquée un jour plutôt dans le calendrier perpétuel. Ainſi au bout de 19 ans, on ajoute 12 au lieu de 11,

& cette addition ſe fait toutes les fois que le nombre d'or paſſe de 19 à 1, parce que la derniere lunaiſon de chaque cycle lunaire n'eſt que de 29 jours, au lieu de 30, (1556), ce qui fait avancer les nouvelles lunes d'un jour.

1575. Cet ordre primitif & régulier eſt celui qu'on ſuppoſe à l'époque du concile de Nicée; mais en s'en éloignant, on obſerve deux défauts dans cette règle; ou deux interruptions, on les appelle *équation lunaire*, & *équation ſolaire*; la premiere vient de ce que le cycle lunaire, de 19 ans, eſt défectueux d'environ $1^h\frac{1}{2}$ (1558), les 235 lunaiſons ne faiſant pas tout-à-fait 19 ans, de ſorte qu'au bout de 312 ans les nouvelles lunes arrivent un jour plutôt, & l'on eſt obligé de prendre l'épacte plus forte d'une unité. La ſeconde équation a lieu à cauſe du retranchement de trois biſſextiles ſur l'eſpace de 400 ans (1547), qui fait que la nouvelle lune arrive plus tard, & qu'il faut diminuer l'épacte. De cette double inégalité, il réſulte que chaque ſiècle exige un nouvel ordre d'épactes; il y en a 30 ſuites différentes qui forment ce qu'on appelle *la table étendue des épactes*, (*Planche VIII*); ces 30 ſuites tiennent lieu de 30 calendriers qu'il auroit fallu avoir, & elles compoſent un total auſſi parfait, que les règles de l'égliſe & de la ſociété civile pouvoient l'exiger.

Table des Epactes. *Planche VIII.*

Ces 30 lignes ſont déſignées par 30 lettres de l'alphabet qui deſcendent dans un ordre rétrograde; mais dans leſquelles on a ſeulement évité d'employer certaines lettres qui pouvoient occaſionner de la confuſion dans les caractères.

1576. En tête de la table on trouve les 19 nombres du cycle lunaire, en commençant par 3, qui au temps du concile de Nicée ſe plaçoit vis-à-vis le 1 Janvier. La premier ligne horizontale de la table, marquée *P*, n'eſt autre choſe que la ſuite des nombres que nous avons indiqués ci-deſſus (1573), en commençant par 0 ou * ſans autre interruption que celle d'un jour de plus, quand le nombre d'or devient 1. (1574); la ſeconde ligne mar-

quée *N* eſt la ſuite des nombres qui ont une unité de moins que la précédente, c'eſt-à-dire, 29, 10, 21, &c. La troiſième ligne *M*, commence par 28, & ainſi des autres juſqu'à la dernière ligne qui commence par 1, 12, &c.

Le progrès des nombres de chaque ligne eſt toujours par XI comme celui de la premiere ligne; il y a dans chacune 19 chiffres qui répondent également aux 19 nombres d'or, qui croiſſent continuellement de XI, en retranchant 30 à chaque fois qu'ils s'y trouvent, exceptés ſous le nombre d'or 1, qui eſt l'avant-dernier de tous, car alors l'épacte augmente de 12, parce que la dernière lune de l'année n'a que 29 jours, quoiqu'elle ſoit une des 7 lunaiſons intercalaires, elle eſt la ſeule exceptée (1574).

TABLE de l'équation des Epactes où l'on voit quelle ligne on doit prendre pour chaque ſiècle dans la table étendue des Epactes. Planche VIII

Années.	Ligne d'Ep.	Années.	Ligne d'Ep.	Années.	Ligne d'Ep.
1582	D	2500	u	3500	p
Biſſ. 1600	D	2600	t	Biſſ.☾ 3600	q
1700	C	☾ 2700	t	3700	p
☾☾ 1800	C	Biſſ. 2800	t	3800	n
1900	B	2900	ſ	☾ 3900	n
Biſſ. 2000	B	☾ 3000	ſ	Biſſ. 4000	n
☾ 2100	B	3100	r	4100	m
2200	A	Biſſ. 3200	r	4200	l
2300	u	☾ 3300	r	☾☾ 4300	l
Biſſ.☾ 2400	A	3400	q	Biſſ. 4400	l

Cette table a été continuée par Lilius & par Clavius juſqu'à l'an 301700, & même quelques ſiècles au-delà, pour faire voir qu'alors elle recommencera dans le même ordre qu'en 1700, *C*, *C*, *B*, *B*, &c. enſorte qu'ils n'avoient

voient beſoin que de 3000 nombres pour exprimer tous les changemens poſſibles des épactes à perpétuité, en ſuppoſant que les moyens mouvemens du ſoleil & de la lune fuſſent dans les ſiècles à venir, tels que les tables Pruténiques les ſuppoſoient; & que les variations du calendrier revinſſent toutes au bout de trois cent mille ans.

Il y a 8 colonnes dans la Planche VIII, depuis le nombre d'or 12, juſqu'au nombre d'or 19, où l'on a mis l'épacte en chiffres Arabes, 25, au lieu de mettre XXV en chiffre romain, ce ſont les 8 ſuites d'épactes qui contiennent vingt-cinq & ving-ſix, & dans leſquelles la nouvelle lune auroit pu être indiquée deux fois en 19 ans pour le même quantième, ſans cette diverſité de caractère, comme nous l'expliquerons à l'occaſion du calendrier perpétuel (1586).

1577. Il ne s'agit plus que d'apprendre à diſtinguer laquelle des 30 lignes doit s'employer à chaque ſiècle, puiſque c'eſt à la fin de chaque ſiècle qu'il ſe fait une interruption, en vertu de l'équation ſolaire & de l'équation lunaire (1575). La premiere ligne marquée *P* fut attribuée dans la réformation du calendrier au ſixième ſiècle; on ſuppoſa que les nombres d'or indiquoient exactement pour ce ſiècle-là les nouvelles lunes; l'on prit pour époque du calendrier l'année 550, temps poſtérieur à celui du concile, parce qu'on voulut que les nouvelles lunes du calendrier fuſſent en retard ſur les nouvelles lunes aſtronomiques moyennes, de peur que la fête de Pâques ne vînt à être célébrée avant le XIV de la lune paſchale, contre l'intention de l'égliſe (1589; or les nouvelles lunes moyennes arrivent quelquefois un peu avant la nouvelle lune vraie, ſur laquelle les Juifs ſe régloient; l'égliſe a donc voulu avoir dans ſon calendrier des nouvelles lunes moyennes qui ne puſſent jamais devancer les vraies, mais qui les ſuiviſſent toujours.

1578. On a pris pour racine l'année 550 (a), ſous

(a) C'eſt pourtant à l'année 500 qu'on a attribué la premiere ligne des épactes P, mais on verra la raiſon de ces 50 ans d'anticipation (1580).

le règne de l'Empereur Juſtinien ; alors les nombres d'or indiquoient les nouvelles lunes environ 16 heures plus tard qu'au temps du concile de Nicée, comme on le voit par les tables aſtronomiques, & il n'y avoit plus de danger qu'elles puſſent être indiquées plutôt que les nouvelles lunes vraies. L'on attribue à l'année 500 & au ſixième ſiècle entier, la première ligne de la table générale des epactes, qui eſt marquée *P* dans Clavius, *pag.* 110, & dans la table que nous avons expliquée ; mais comme au bout de 300 ans, c'eſt-à-dire, l'an 800, il y a une équation lunaire & que la lune anticipe d'un jour dans le calendrier, les nouvelles lunes arrivant un jour plutôt, c'eſt le nombre précédent qui indique les nouvelles lunes, & il faut prendre la dernière ligne a, dont les épactes ſont plus fortes d'un jour ; après un autre intervalle de 300 ans, c'eſt-à-dire, l'an 1100, il y a encore une équation lunaire, la lune anticipe encore d'un jour, il faut donc pour le douzième ſiècle remonter d'une ligne, & l'on aura la ligne b qui commence par 11, XIII, &c. De même en 1400, on aura la ligne marquée c.

En 1582 l'on retrancha dix jours de l'année (1548), les nouvelles lunes arrivèrent donc dix jours plus tard, ainſi il faut deſcendre de dix lignes dans la table générale, & venir à la ligne *D* pour 1583 ; je dis que cela s'appelle deſcendre, parce que de la ligne c à la ligne a, on deſcend d'abord de deux lignes, & ſi l'on diminue encore l'épacte de l'unité, on trouve les nombres de la première ligne *P* qui eſt cenſée deſcendre encore davantage ; car la table générale des épactes eſt comme un cercle dans lequel on recommence dans le même ordre & ſans interruption, lorſqu'on l'a parcouru tout entier.

En 1600, il n'y a eu, ni équation lunaire, ni équation ſolaire, puiſque la première avoit été employée en 1400, & que la ſeconde ne devoit arriver qu'en 1700, 1800 & 1900 (1547), ainſi l'on a conſervé la même ligne *D*, qui commence par XXIII.

1579. En 1700, il y a eu une équation ſolaire, parce qu'on a omis une biſſextile (1547), & que l'année a été plus courte d'un jour; les nouvelles lunes ont dû arriver par cette raiſon un jour plus tard, & pour les indiquer un jour plus tard, il faut avoir l'épacte plus petite d'une unité (1574), ainſi en 1700, il a fallu deſcendre d'une ligne dans la table & prendre la ſuite des épactes qui répond à la lettre *C*, & qui commence par XXII. Cela doit arriver ainſi toutes les fois que l'on omet un jour, ou qu'on paſſe une biſſextile, ce que nous appellons équation ſolaire. Il auroit dû y avoir une équation lunaire en 1700, nous dirons bientôt pourquoi elle fut remiſe à 1800 (1580, 1589).

1580. L'équation lunaire ayant été employée pour l'année 1400, en 1700 il y avoit 300 années d'écoulées, & il auroit fallu encore une équation lunaire (1589), cependant comme la lune anticipe d'un jour ſur le cycle lunaire, non pas en 300 ans, mais ſeulement en 312 $\frac{1}{2}$ ans, ces 12 $\frac{1}{2}$ ans avoient été omis 4 fois depuis l'an 500; ſavoir en 800, 1100, 1400, 1700, ainſi il y avoit 50 ans, dont on avoit anticipé l'équation lunaire, d'ailleurs en partant de l'année 550, c'étoit en 850, 1150, 1450, 1750, qu'on devoit employer l'équation lunaire, ainſi ajoutant encore à 1750 les 50 ans dont on étoit reſté en retard, on trouve qu'en 1800 il faudra employer l'équation lunaire, ce qui feroit une augmentation dans l'épacte (1574); mais en 1800, il y aura un jour intercalaire omis, de même qu'en 1700, & par conſéquent, on devroit de même retrancher un de l'ordre des épactes, & deſcendre d'une ligne dans la table générale; ces deux effets ſe détruiront, les nouvelles lunes ne monteront ni ne deſcendront, elles demeureront aux mêmes jours, la même ligne *C* dans la table générale ſervira pour tout le 19e. ſiècle qui commence en 1800, comme elle avoit ſervi pour le ſiècle précédent.

En 1900, on omettra encore un jour intercalaire, les nouvelles lunes deſcendront d'un jour, & il faudra

deſcendre à la ligne *B* de la table générale. L'année 2000 ne changera point de ligne, parce qu'il n'y a cette année-là, ni intercalaire omiſe, ni équation lunaire. En 2100 l'on omet une intercalaire, & l'on employe l'équation lunaire, parce qu'il y a 300 ans d'écoulés depuis 1800, où l'on a fait la dernière équation, ainſi le 22e. ſiècle qui commence à 2100 conſervera la même lettre *B* que le ſiècle précédent, de même que je l'ai remarqué pour l'année 1800.

En 2200, on omettra une intercalaire, & il n'y aura point d'équation lunaire, ainſi on deſcendra à la ligne *A* de la table générale, & par la même raiſon en 2300 on deſcendra à la ligne marquée u.

En 2400, on aura eu 300 ans depuis la dernière équation lunaire de 2100, il y aura donc une équation lunaire; mais il n'y aura point d'équation ſolaire, ainſi les nouvelles lunes monteront d'un jour (1574), & l'on reviendra à la ligne *A* de la table générale.

2500, Equation ſolaire, on deſcendra à la ligne u.
2600, Equation ſolaire, on deſcendra à la ligne t.
2700, Equat. ſol. & lun. on conſervera la ligne t.
2800, Aucune équation, on conſervera la ligne t.

Ainſi dans les principes de Lilius, il eſt aiſé de continuer à l'infini la table de l'équation des épactes, ſi l'on a égard à l'intercalaire qu'on doit retrancher trois fois en 400 ans, & à l'équation lunaire qui doit arriver tous les 300 ans, d'abord ſept fois de ſuite, & après cela au bout de 400 ans ſeulement; cette différence vient de ce que les 12 ans & demi qu'on néglige tous les 300 ans, ſe trouvent avoir fait 100 ans au bout de 8 fois 300 ou de 2400 ans, il faut renvoyer alors l'équation lunaire à l'année ſéculaire qui ſuivra, comme nous l'avons indiqué, lorſque parvenus à 1700 nous avons rejetté l'équation lunaire à 1800; il arrivera donc toujours que l'équation lunaire ſera différée au bout de 2400 ans à compter de 1800, c'eſt-à-dire, dans les années 4300, 6800, 9300, 11800, & ainſi de

ſuite en allant toujours par 2500 ; alors au lieu d'être employée tous les 300 ans, elle ne le ſera qu'au bout de 400 ans pour cette fois-là ; par ce moyen la lune ne remonte dans le calendrier que de 8 jours en 2500 ans, au lieu qu'elle remonteroit de 8 jours en 2400 ans. Nous avons marqué ces années de retard d'un double caractère ☾☾ dans la table de la page 304.

1581. Cependant Clavius obſerve qu'après l'an 8100, il doit y avoir une erreur dans la méthode de Lilius pour trouver l'équation, en ſorte qu'à l'an 8200 il faudra deſcendre de la ligne *F* à la ligne *D*, c'eſt-à-dire, de deux lignes, & non pas d'une ſeule comme cela arriveroit ſuivant la règle précédente, & il donne une méthode pour conſtruire d'une autre manière la table des épactes après l'an 8100, je ne la rapporterai pas ici, l'auteur convient lui-même que c'eſt aſſez pour nous d'avoir une règle conſtante pour un ſi long eſpace de temps ; d'ailleurs il ſera aiſé, en conſervant même toute la diſpoſition du calendrier, de monter ou de deſcendre d'une ligne dans la table générale, ſi dans la ſuite des temps on vient à s'appercevoir que les nouvelles lunes ont monté ou deſcendu dans le calendrier, ainſi il ſeroit très-inutile de s'occuper ici de la méthode que Clavius a donnée, c'eſt une pure curioſité (*Cap.* 12, *n°.* 10, *pag.* 150). On ne l'a point ſuivie dans le calendrier Grégorien.

Petite erreur du calendrier Grégorien.

Si l'on vouloit pouſſer la préciſion encore plus loin ; il faudroit ajouter une nouvelle équation lunaire au bout de 481436 ans, parce qu'il y avoit outre les $312\frac{1}{2}$ ans 23^h & $17'$ (1558), qui font alors 100 ans ; mais comme cet eſpace de temps alloit au-delà du cycle de trois cent mille ans qu'on a regardé comme le grand cycle qui renouvelle le calendrier, Lilius a négligé cette dernière équation lunaire, bien perſuadé qu'il n'y avoit aucun calcul aſtronomique qui pût ſe trouver encore exact après une ſi longue période.

Autre équation que l'on néglige.

1582. On ſera curieux peut-être de voir ici la raiſon du grand cycle de 300 mille ans qui ramène les

Cycle de trois cent mille ans.

épactes aux mêmes lettres & dans le même ordre : je conſidère d'abord qu'après dix mille ans, c'eſt-à-dire, après 100 ſiècles, on retrouve la même variété dans les lettres de la table générale, mais non pas les mêmes lettres ; après 1600 les deux années ſéculaires ſuivantes 1700 & 1800 ont la même lettre *C*, les trois années ſuivantes 1900, 2000 & 2100 ont la même lettre *B* ; l'année 2200 a la lettre *A*, l'année 2300 la lettre u, l'année 2400 la lettre *A*, l'année 2500 la lettre u, les 3 années 2600, 2700 & 2800 ont la même lettre t, &c. Et ce ſera la même choſe après 10 mille ans ou cent années ſéculaires ; par exemple, commençons à l'an 11600, & nous aurons les lettres ſuivantes.

Après 11600 les deux années 11700 & 11800 auront la même lettre i

Les 3 années 11900, 12000, 12100 auront la même lettre . . . . . h

L'année 12200 aura la lettre . . . . . g
L'année 12300 aura la lettre . . . . . f
L'année 12400 aura la lettre . . . . . g
L'année 12500 aura la lettre . . . . . f

Les 3 années 12600, 12700, 12800 auront la même lettre . . . . . e

Si l'on commençoit dix mille ans plus tard, ou à l'année 21700, on retrouveroit un ordre ſemblable dans la variété des épactes ; en voici la raiſon : dans l'eſpace de 100 années ſéculaires, il arrive 32 équations lunaires, puiſqu'on a vu que la lune en 25 ſéculaires rémonte dans le calendrier de 8 jours, ainſi les dix mille ans qui précèdent une époque, & les dix mille qui la ſuivent ont le même nombre d'équations lunaires, ils ont auſſi le même nombre de biſſextiles omiſes, c'eſt-à-dire, 25, ainſi un même eſpace de dix mille ans voit toujours une même interruption d'épactes ; ſi l'on choiſiſſoit un eſpace moindre, on ne trouveroit pas tout à la fois un nombre d'années ſéculaires diviſible par

25 & par 4, par 25 pour former un nombre complet d'équations lunaires, & par 4 pour former un nombre complet de biſſextiles omiſes.

Dans l'eſpace de 300 mille ans, il y aura non-ſeulement une variété pareille, mais le retour des mêmes lettres dans le même ordre. Pour le prouver, commençons à l'an 1700, où ſe trouve la ligne *C* de la table générale. Dans l'eſpace de dix mille ans, il y aura un changement de 43 lettres juſqu'à k, comme on peut s'en aſſurer en continuant le calcul précédent, pour 100 ſiècles; ſi des 43 l'on retranche les 30 qui font la table entière, on aura changé de 13 lettres; après le ſecond eſpace de dix mille ans, on aura changé de 26. En procédant toujours ainſi de 13 en 13, & retranchant toujours 30, quand ils ſeront de trop, on parviendra enfin à trouver un changement de 30 lettres, mais ce ne ſera qu'après avoir fait cette addition 30 fois, car il n'y a pas de nombre plus petit qui multipliant 13 puiſſe faire un multiple de 30. Ainſi ce n'eſt qu'après 30 intervalles de dix mille ans chacun que la même lettre peut revenir, & en même temps être ſuivie du même ordre & des mêmes variétés dans les lettres de la table générale.

1583. Il nous reſte à parler de quelques artifices qu'on apperçoit dans les calendriers, pour l'ordre des épactes. Nous avons dit que dans le calendrier perpétuel des épactes & des lettres dominicales (1574), on trouve à côté des jours du mois les épactes 30, 29, 28, &c. & les 7 lettres *G*, *F*, *E*, *D*, *C*, *B*, *A*, en commençant par le premier jour de Janvier. Dans ce calendrier tous les jours auxquels répond l'épacte de l'année, ſont ceux des nouvelles lunes cette année-là; mais il y a trois obſervations à faire ſur trois articles particuliers de ce calendrier perpétuel.

Au lieu du nombre 30, on met une étoile * qui tient lieu de 30 & de zéro; en effet, dans les années où il y a nouvelle lune le premier Décembre & le 31, l'é- Signe ambigu.

pacte qui marque l'âge de la lune quand l'année finit; devroit être 30, parce que la lune a 30 jours quand l'année finit; mais elle devroit être zéro, ſi l'on conſidéroit la nouvelle lune du 31, ainſi l'on met un ſigne ambigu qui tient lieu de l'une & de l'autre, & qui s'applique à ces deux cas.

Epactes doublées,

Dans le calendrier perpétuel on a pratiqué ſix interruptions, où l'on a mis enſemble les épactes XXIV & XXV; ſans cela les 12 ſuites d'épactes qui ſont de 30 chacune, formeroient 360 jours, au lieu de 354 qu'elles doivent former pour s'accorder avec l'année lunaire, qui a 11 jours de moins que l'année ſolaire (1481); cette ſuppreſſion de 6 jours a été répartie ſur la ſeconde trentaine, ſur la 4e, la 6e, la 8e, la 10e & la 12e, & les jours où elle tombe ſont le 5 Février, le 5 Avril, le 3 Juin, le 1 Août, le 29 Septembre & le 27 Novembre; ces ſix jours, qui par la diſpoſition précédente, devroient avoir XXV d'épacte ont tout à la fois XXV & XXIV; par-là on gagne un nombre à chaque fois, & il ſe trouve qu'à la fin de Décembre il reſte 11 jours, comme cela doit être, puiſque l'année lunaire n'a que 354 jours (1481).

Les 12 lunaiſons de chaque année ſont alternativement de 30 & de 29 jours (1556), auſſi l'on met alternativement 30 épactes & 29, d'abord les 30 dans le mois de Janvier, enſuite 29, ſeulement en en réuniſſant deux au même jour, puis 30, & ainſi de ſuite; l'épacte XXIV dans Février, & toutes celles qui la ſuivent ſe trouve remontée d'un rang au-deſſus de ſa place naturelle vers le commencement du mois, à cauſe des deux épactes XXV & XXIV qui ſont réunies au 5 de Février; ainſi les lunaiſons qui commencent par les 30 épactes qui précèdent les deux épactes accumulées au 5 de Février, c'eſt-à-dire, par les épactes XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, *, I, II, &c. juſqu'à l'épacte XXIV incluſivement, contiennent ſeulement 29 jours. Il faut dire la même choſe des lunaiſons qui répondent aux 30

épactes

épactes ſemblables qui précèdent dans cinq autres endroits du calendrier la réunion de XXIV & XXV (*Clavius*, *pag.* 101).

1585. Dans les mois qui ont deux épactes au même jour, XXV & XXIV, on pourroit craindre qu'il n'y eût deux nouvelles lunes indiquées au même jour, dans l'eſpace de 19 ans, ſavoir l'une quand l'épacte de l'année ſeroit XXV, & l'autre quand elle ſeroit XXIV, or il ne peut pas y avoir deux nouvelles lunes dans les 19 ans, qui tombent au même jour du mois, puiſqu'elles n'y reviennnent qu'après les 19 ans révolus (1556); pour obvier à cet inconvénient dans la diſpoſition des épactes de la table étendue, on a mis 25 au lieu de XXV dans toutes les ſuites d'épactes, ou dans toutes les lignes où les deux nombres 24 & 25 ſe trouvent enſemble & peuvent revenir dans l'eſpace de 19 ans; ce nombre 25 eſt mis dans le calendrier à côté de XXVI, parce que dans ces mêmes lignes d'épactes les nombres 25 & XXVI ne peuvent pas ſe trouver enſemble dans l'eſpace des 19 ans, dès-lors que 24 & 25 s'y trouvent.

Dans les mois qui ont 25 & XXVI d'épacte au même rang ou au même jour, il ne peut pas arriver, non plus, que la nouvelle lune ſoit indiquée deux fois au même jour en 19 ans, parce que 25 ne ſe trouve point dans les huit ſuites d'épactes qui contiennent vingt-cinq & vingt-ſix, on n'a mis dans celles-ci que le nombre romain XXV, qui, dans le calendrier eſt à coté de XXIV, mais XXV & XXIV ne ſont point enſemble dans ces huit ſuites-là; ainſi l'on a toujours eu ſoin de faire enſorte que les deux figures qui ſont enſemble dans le calendrier à un même jour, ne fuſſent pas dans une même ſuite d'épactes; il eſt bien vrai que les mêmes nombres y ſont; mais l'un eſt en chiffres Romains, & en petites capitales, l'autre en chiffres Arabes; & cette différence de forme les diſtingue aſſez; quelquefois on met le 25 en rouge, comme dans les Bréviaires, ou dans les livres imprimés en deux couleurs.

1586. Toutes les fois que dans un cycle de 19 ans;

l'épacte xxv concourt avec un nombre d'or plus grand qu'onze, c'eſt-à-dire, avec les nombres d'or 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, il y a toujours dans ce même cycle une épacte xxiv; mais ſi pour lors on prend l'épacte 25 qui eſt d'un caractère ou d'une couleur différente, qui dans ſix endroits du calendrier eſt placée à côté de l'épacte xxvi, il ne pourra jamais y avoir deux nombres d'or ou deux nouvelles lunes au même jour, parce que cette épacte 25 marquée d'un autre caractère ou d'une autre couleur répond par-tout à un jour différent de celui qui a l'épacte xxiv.

Quand dans un cycle de 19 ans l'épacte xxv ſe rencontre avec un nombre d'or plus petit que 12 ou avec les nombres d'or 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 & 11, il ne peut pas arriver que dans le même cycle l'épacte xxiv ſe trouve employée avec l'épacte xxv; pour lors on prendra l'épacte xxv, qui dans ſix endroits eſt marquée au même jour que l'épacte xxiv, & puiſque l'épacte xxiv n'aura pas lieu dans ce cycle-là, on ne riſquera point de trouver dans le même cycle deux nouvelles lunes au même jour.

De même, quoique l'épacte 25 qui eſt différente en caractère ou en couleur, ſe trouve dans ſix jours de l'année à côté de l'épacte xxvi, on ne craindra pas, cependant, de trouver deux nouvelles lunes au même jour dans les 19 ans, parce que quand l'épacte xxv ſe trouve avec un nombre d'or, plus grand que 11, (& ce ſont les ſeuls cas où l'on ſe ſerve du caractère 25), l'épacte xxvi n'a jamais lieu dans le même cycle, pour indiquer les nouvelles lunes.

C'eſt ce que l'on peut voir aiſément dans la table étendue des épactes, *Planche VIII*; car dans les 8 lignes marquées *N*, *E*, *B*, r, n, k, e, b, qui chacune répondent à un cycle lunaire, entier de 19 ans (1576), on voit l'épacte 25 diſtinguée par les chiffres Arabes ſous les 8 nombres d'or, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19; l'épacte xxiv ſous les onze autres, & jamais l'épacte xxvi. Mais dans les 22 autres lignes horizontales de

la table où l'épacte XXV ſe trouve ſous les 11 petits nombres d'or, depuis 1 juſqu'à 12, on trouve quelquefois l'épacte XXVI, mais on n'y trouve pas XXIV. Si donc on prend tantôt l'épacte XXV, qui eſt dans le calendrier à côté de XXIV, & tantôt l'épacte 25 qui eſt d'un autre caractère ou d'une autre couleur, & placée dans le calendrier à côté de XXVI, ayant égard aux nombres d'or, petits ou grands, avec leſquels elle concourt, il n'arivera jamais que dans le même cycle de 19 ans, il y ait deux nouvelles lunes au même quantième du mois, quoique dans les ſix endroits ci-deſſus marqués, il y ait au même jour XXV avec XXIV, & XXVI avec l'épacte 25 du caractère différent.

Ainſi l'épacte XXIV ne peut pas avoir lieu quand l'épacte XXV concourt avec un des onze premiers nombres d'or, mais ſeulement quand elle concourt, avec un nombre d'or plus grand que 11, & l'épacte XXVI n'a jamais lieu lorſque l'épacte 25 de caractère différent concourt avec un nombre d'or plus grand que 11.

1587. On a choiſi les épactes XXV & XXIV, pour les accumuler enſemble, quoiqu'on eût pu choiſir deux autres épactes quelconques; mais c'étoit à peu-près vers ces mêmes jours que l'on employoit l'équation de la lune dans l'ancien calendrier des nombres d'or, du concile de Nicée, & l'on a cherché à s'en rapprocher le plus qu'il étoit poſſible, dans la diſpoſition du nouveau calendrier. (Clavius, *pag.* 103). Ces nombres XXV & XXIV que l'on met enſemble, ont même été choiſis, d'ailleurs avec deſſein, pour faire enſorte que preſque toutes les lunaiſons paſchales fuſſent de 29 jours, comme le vouloient les Peres du concile de Nicée, & qu'elles commencaſſent toujours entre le 8 de Mars, & le 5 Avril. Il n'y a dans le nouveau calendrier que deux exceptions à la premiere règle, c'eſt lorſqu'on a pour épacte 25 & XXIV, & que 25 concourt avec un nombre d'or plus grand que 11, ce qui arrive bien rarement, il n'y a que ces deux lunes paſchales qui ſoient de 30 jours. Lorſque les PP. de Nicée aſſignèrent 29

jours aux nouvelles lunes paſchales, depuis le 8 Mars juſqu'au 5 Avril, il étoit facile d'y arranger 19 nombres d'or, de façon que tous donnaſſent des lunaiſons de 29 jours, mais comme il y a 30 épactes, on ne ſauroit les arranger toutes dans 29 jours, à moins qu'on n'en mette deux à la fois au même jour, comme cela arrive au 5 Avril; c'eſt ce qui fait que la lunaiſon de l'épacte XXIV a 30 jours, & par conſéquent auſſi celle de l'épacte 25 placée au-deſſus de XXIV. (Clavius, *pag.* 103).

Si l'équation de la lune, au lieu de ſe faire au 5 Avril, ſe faiſoit à la fin de Janvier & de Mars, comme *Aloyſius Lilius*, premier auteur de ce calendrier, l'avoit pratiqué dans le *Compendium* que Grégoire XIII adreſſa en 1577 aux Princes chrétiens (1572), il y auroit ſept lunaiſons paſchales de 30 jours au lieu de 2, enſorte qu'on ſeroit beaucoup plus éloigné de cette partie de l'ancien uſage de l'égliſe, qu'on a voulu reſpecter autant qu'il étoit poſſible; l'on trouve même dans le calendrier Grégorien les nouvelles lunes, ſur-tout celles de Pâque, rapportées pour le temps du concile de Nicée aux mêmes jours où elles ont été ſuppoſées dans ce temps-là, d'après les nombres d'or de l'ancien calendrier. C'eſt ce qui réſulte de pluſieurs longs chapitres qu'on pourra voir dans le grand traité de *Clavius*, dont il n'eſt poſſible de donner ici que les principes & les principaux réſultats.

Autre réunion de deux épactes.

1588. Le troiſième artifice employé dans la diſpoſition des épactes du calendrier perpétuel, conſiſte à avoir mis à la fin de Décembre à côté de l'épacte XX, une épacte extraordinaire 19, qui eſt auſſi différente ou par le caractère, ou par la couleur; elle ſert uniquement à marquer la nouvelle lune le dernier de Décembre, lorſque l'épacte XIX concourt avec le nombre d'or 19, ce qui n'arrivera plus juſqu'après l'an 8200, & lorſque des trente cycles de la table, celui qui a la lettre *D*, ſera en uſage, comme il l'a été depuis la correction Grégorienne, juſqu'à l'année 1700 excluſive-

ment ; c'eſt dans cette ligne *D* ſeulement que l'épacte XIX ſe trouve ſous le nombre d'or 19. L'épacte 19 placée au 31 de Décembre, doit alors indiquer une nouvelle lune, comme cela eſt arrivé en 1595, 1614, 1633, 1652, 1671, 1690. En effet, dès que le nombre d'or eſt 19, on doit ajouter 12 à l'épacte de l'année pour former celle de l'année ſuivante (1574) ; au lieu qu'on n'ajoutoit que 11 dans les autres cas ; ainſi à l'épacte XIX, lorſqu'elle a lieu avec le nombre d'or 19, il faut ajouter 12, & l'on à 1 d'épacte pour l'année ſuivante ; mais l'uſage de l'épacte I ne ſe trouve dans le calendrier qu'au 30 de Janvier, donc ſi l'épacte 19 n'étoit pas placée dans le calendrier au 31 de Décembre pour y indiquer une nouvelle lune, la lunaiſon de Décembre ne contenant alors que 29 jours (1556), il n'y auroit point de lunaiſon indiquée dans le calendrier depuis le 2 Décembre juſqu'au 29 de Janvier ; car dans le mois de Décembre, il n'y a pas d'autre épacte XIX que celle du 2 de Décembre, & dans le mois de Janvier, il n'y a pas d'épacte XIX avant le 30. Cependant il y a dans le cas dont il s'agit, une lune de 29 jours qui commence le 2 Décembre, & une autre qui commence le 31 de Décembre ; le calcul prouve même qu'il y a en effet une nouvelle lune moyenne ce jour-là, quand le nombre d'or 19 concourt avec l'épacte XIX. (*Clavius pag.* 104).

Mais l'exception dont il s'agit ou l'addition de l'épacte 19 extraordinairement cumulée avec l'épacte XX, au 31 de Décembre, ne fait dans le calendrier aucune confuſion, parce qu'elle eſt à côté de l'épacte XX qui n'a jamais lieu dans le cycle où l'épacte XIX concourt avec le nombre d'or 19 ; en effet, on peut voir dans la table étendue des épactes que la ligne *D* qui a lieu dans le cas prévu ne renferme pas l'épacte XX. Ce nombre ne ſe trouve point dans les 19 épactes de ce cycle, il ne peut donc pas y avoir double emploi, ni deux nouvelles lunes indiquées au même jour dans l'eſpace des 19 ans, quoiqu'il y ait deux épactes au même jour.

Défaut dans les épactes.

1589. Les épactes ne peuvent indiquer que les nouvelles lunes moyennes, c'eſt-à-dire, les nouvelles lunes qui auroient lieu, ſi la lune & le ſoleil alloient toujours d'un mouvement uniforme, & que leur longitude moyenne fût toujours égale à leur longitude vraie; ce ſeroit aſſez pour l'uſage du calendrier civil, car l'on eſt toujours sûr de ne pas ſe tromper de plus d'un jour, même en ſe reſtreignant aux moyens mouvemens; mais nous devons obſerver encore que non-ſeulement les nouvelles lunes déſignées dans le calendrier par les épactes, ne ſont point les nouvelles lunes aſtronomiques vraies qu'on obſerve, & qu'on trouve dans nos éphémérides, mais elles ne ſont pas même exactement d'accord avec les nouvelles lunes moyennes; il y a ſouvent des différences qui deviennent ſenſibles; par exemple, en 1700 la pleine lune moyenne arriva le ſamedi 3 Avril vers les 11^{h} du ſoir, à Rome; Pâque devoit donc ſe célébrer le lendemain, ſuivant la règle (1571); mais dans le calendrier la pleine lune étoit indiquée pour le 4, la fête ſe trouva donc renvoyée au 11 du même mois. (V. *l'Hiſt. de l'acad.* 1701, *pag.* 107). Lors de la correction Grégorienne, on voulut remettre les nouvelles lunes aux mêmes lieux où elles étoient au temps du concile de Nicée, par le moyen du cycle de 19 ans; mais comme en 625 ans le cycle ramene la nouvelle lune deux jours plutôt (1558), il y avoit alors quatre jours de différence entre les nouvelles lunes aſtronomiques & celles du cycle : dans l'exécution on n'a tenu compte que de 3 jours au lieu de 4, delà vient que la pleine lune aſtronomique vient ſouvent un jour avant la pleine lune Paſchale, & que le calendrier n'a point à cet égard la juſteſſe qu'on avoit eu intention de lui donner, delà vient auſſi la contradicton apparente que l'on trouvera quelquefois entre les calculs rigoureux de l'aſtronomie, & les calculs beaucoup moins exacts du comput eccléſiaſtique.

Ainſi dans l'exécution du projet de la réformation l'on n'a pas exactement ſuivi l'intention de la bulle de

Grégoire XIII, il auroit dû y avoir une équation lunaire en 1700 (1579); depuis 1700 l'épacte répondant au nombre d'or 1, auroit dû être 1 au lieu qu'on ne lui attribue que 0 ou *, enſorte qu'on n'a augmenté que de 3 jours les épactes lunaires depuis le Concile juſqu'à préſent, au lieu de 4 jours; cette erreur d'un jour a fait tomber la fête de Pâque en 1704 au 23 Mars, au lieu qu'elle auroit dû être le 20 Avril, parce que dans cette année la pleine lune devoit être marquée au 20 Mars, & qu'elle ne le fut qu'au 21; or le 20 Mars n'eſt point du mois Paſchal, mais le 21 en eſt, (*Hiſt. acad.* 1701). La raiſon de ce défaut eſt que l'objet des réformateurs étoit de demeurer plutôt au-deſſous qu'au-deſſus des véritables nouvelles lunes, pour empêcher que les épactes n'indiquaſſent la nouvelle lune plutôt qu'elle n'arrive réellement, & que la fête de Pâque ne fût célébrée le XIV de la lune ou même plutôt, c'eſt-à-dire, en même temps que chez les Hérétiques quarto-decimans; pour cet effet, on a eu plus d'égard à la pleine lune qu'à la nouvelle lune, on n'a pas craint qu'il arrivât que la fête de Pâque fût célébrée plus tard que le XXI de la lune, mais on redoutoit la célébration qui auroit pû tomber le XIV de la lune, quand il ſe trouve un Dimanche, parce que c'eſt le jour que choiſiſſent les Juifs pour la célébration de la Pâque.

Cette remarque déja faite par Clavius auroit dû prévenir le reproche aſtronomique fait par M. Caſſini, au calendrier Grégorien, ſi ce n'eſt que M. Caſſini ne trouvât pas cette raiſon ſuffiſante pour avoir fait mettre entre le calendrier & l'aſtronomie une ſemblable différence; elle nuit à l'exactitude du calendrier, relativement à l'uſage qu'on en peut faire pour trouver les nouvelles lunes.

Méthode pour trouver l'Epacte & les Fêtes mobiles pour une année quelconque.

1590. Si l'on veut y employer les tables, dont j'ai indiqué ci-deſſus la conſtruction, on commencera par chercher le nombre d'or (1556), parce que l'on a pris les nombres d'or qui ſuivent toujours un progrès uniforme pour ſervir à régler les irrégularités des épactes; ce nombre d'or pris au haut de la table étendue (Pl. VIII.), marquera la colonne dans laquelle doit ſe trouver l'épacte que l'on cherche.

Pour ſavoir dans quelle ligne de la table, & vis-à-vis de quelle lettre il faut chercher l'épacte, on prendra dans la table d'équation (1576), la lettre qui convient au ſiècle où l'on ſe trouve, & ce ſera dans cette ligne qu'il faudra prendre l'épacte répondante au nombre d'or.

Trouver l'épacte d'une année.

1591. Pour avoir une règle particulière dans ce ſiècle-ci & le ſuivant; on multipliera par 11 le nombre d'or de l'année courante, parce que chaque année l'épacte augmente de 11, on ajoutera 19, parce que l'épacte eſt 18 à chaque dernière année du cycle lunaire; on diviſera cette ſomme par 30, & l'on aura pour reſte l'épacte de l'année.

Ainſi pour avoir l'épacte de 1762, on multiplie le nombre d'or 15 par 11, on a 165, on y ajoute 19, & l'on diviſe la ſomme 184 par 30, le reſte de la diviſion eſt 4 qui eſt l'épacte cherchée. On peut la trouver encore autrement : on multiplie par 11 le nombre 62, le produit eſt 694; on ajoute 9 au produit (c'eſt l'épacte de 1700), & de plus autant d'unités que le nombre d'or 1 eſt revenu de fois depuis 1700, ce qui eſt arrivé en 1710, 1729 & 1748, la ſomme 694 étant diviſée par 30, le quotient eſt 23, & le reſte 4 eſt l'épacte de 1762. Cette règle ne ſert que pour le 18e. ſiècle.

1592.

1592. Le calendrier perpétuel dont nous avons déja parlé (1551, 1574), où l'on marque les épactes vis-à-vis de chaque jour, en diminuant toujours d'une unité, & les lettres dominicales A, B, C, &c. ſuffit, quand on a l'épacte de l'année actuelle (1590), pour trouver la fête de Pâque & toutes les autres fêtes mobiles. L'épacte de l'année indique tous les jours de pleine lune dans le calendrier perpétuel : ainſi pour avoir la nouvelle lune Paſchale qui ne peut arriver qu'après le 7 de Mars, il faut voir à quel jour répond l'épacte de l'année, à compter du 8 de Mars incluſivement, & ce ſera celui de la nouvelle lune Paſchale ; le quatorzième jour, à compter de la nouvelle lune incluſivement, ſera le jour de la pleine lune Paſchale, & le premier Dimanche après cette pleine lune excluſivement, c'eſt-à-dire, le premier jour où l'on trouvera la lettre dominicale de l'année (1552), ſera le jour de Pâque. Fêtes mobiles.

1593. Les limites Paſchales ſont le 22 Mars & le 25 Avril (1571), ainſi en 1598, 1693 & 1761, la fête de Pâque eſt arrivée le 22 Mars ; elle s'y trouvera encore en 1818, 2285, 2437, 2505, &c. Au contraire cette fête n'eſt tombée qu'au 25 Avril en 1546, en 1666 & en 1734, & cela arrivera encore en 1886, 1943, 2038, 2190, &c.

La Septuagéſime eſt toujours neuf ſemaines avant Pâque, ou le 64e jour y compris celui de Pâque. Le mercredi des Cendres le 47e jour avant le jour de Pâque, en comptant l'un & l'autre.

On trouve la fête de l'Aſcenſion en comptant 40 jours après Pâque ; la Pentecôte en comptant 50 ; la Trinité 57 jours, & la Fête-Dieu 61 jours après Pâque ; celle-ci arrive toujours le même quantième du mois que le Samedi-Saint.

Le premier Dimanche de l'Avent ne peut arriver que depuis le 27 Novembre incluſivement, juſqu'au 3 Décembre incluſivement ; ainſi ce ſera toujours le Dimanche compris dans cet intervalle.

1594. Les aſtronomes qui calculent des éphémè-

rides ont encore beſoin de connoître les règles du calendrier pour d'autres uſages eccléſiaſtiques ; voici les principales. Les jeûnes des Quatre-Temps, qu'on peut regarder comme des fêtes mobiles, ont été fixés par Grégoire VII, aux quatre époques ſuivantes, 1°. La première ſemaine de Carême ; 2°. La ſemaine de la Pentecôte, 3°. Le mercredi avant la fête de S. Mathieu ou après l'exaltation de Ste Croix qui ſe célèbre le 14 Septembre ; 4°. La troiſième ſemaine de l'Avent. Si Noël arrive le lundi, le mardi ou le mercredi, c'eſt 2 mercredis avant Noël, ſinon ce ſera le mercredi d'auparavant. Il paroît que les jeûnes des Quatre-Temps ont été inſtitués à l'imitation de ceux qui étoient en uſage chez les Juifs. (*Caſali de veteribus ſacris chriſtianorum ritibus, Romæ, 1647 fol. pag.* 252. cap. 63) ; mais pluſieurs de nos fêtes paroiſſent avoir été tirées auſſi des uſages du Paganiſme : *Addimus prædictis, licuiſſe eccleſiæ, quæ apud ethnicos impiè ſuperſtitioſo cultu agebantur feriæ, eaſdem ſacro ritu expiatas ad pietatem chriſtianam transferre, ut majori id eſſet diaboli contumeliæ, & quibus ipſe coli voluerit, Chriſtus & Sancti ejus ab omnibus honorarentur. Caſali, c.* 60, *pag.* 239. Il cite Baronius *in An.* 44 & 58, & *Spondanus, n°.* 36 & 29.

Les Rogations ſont le lundi avant l'Aſcenſion. La fête des cinq Plaies de N. S. eſt le vendredi avant la Quadragéſime. La *Compaſſion*, ou N. D. de pitié le vendredi de la Paſſion, exceptés quand l'Annonciation ſe trouve ce jour-là ; alors la petite fête fait place à la grande. Les jeûnes de Vigiles qui ſe trouvent tomber au Dimanche ſe tranſportent au ſamedi précédent, quand même ce ſeroit une fête.

Les fêtes doubles de S. Mathias, S. André & S. Thomas, qui dans le Carême & l'Avent ſe remettent du Dimanche au lundi ne ſont point chomées par le peuple, & on ne les met pas en italiques ; l'Annonciation & la Conception qui ſont fêtes ſolemnelles ſe fêtent ſeules dans ce cas-là. Quand l'Annonciation tombe depuis le Dimanche des Rameaux, incluſivement, juſ-

qu'au Dimanche de Quaſimodo incluſivement, on la renvoye au lendemain de Quaſimodo, comme cela eſt arrivée en 1758 1766 & 1769. Quand la Conception tombe au ſecond Dimanche de l'Avent, elle ſe renvoye au lendemain. Quand la fête de S. André concourt avec le premier Dimanche de l'Avent, on la célèbre le lendemain ; dans tout autre cas, elle ſe fait le Dimanche. Dans les années biſſextiles, la fête de S. Mathias ſe célèbre le 25 Février au lieu du 24, & Ste Honorine le 28. J'obſerverai à cette occaſion que, quoique l'uſage ancien ſoit de mettre le nom d'un Saint à tous les jours du mois, dans la connoiſſance des temps, il y en a un grand nombre qui ne ſont fêtés, ni à Rome, ni à Paris, mais dont les noms ſe trouvent ſeulement dans le Martyrologe Romain : l'édition de Paris par M. l'Abbé Chatelain eſt la meilleure. On peut conſulter ſur tous ces objets le livre intitulé : *Ordo perpetuus divini officii juxta ritum Breviarii ac miſſalis ſanctæ Romanæ eccleſiæ. Ordinabat monachus Benedictinus e congregatione S. Mauri. Divione apud Fr. Deſventes*, 1759, *in*-12. Et pour le Diocèſe de Paris les *Rubriques générales* qui ſont en tête du Bréviaire, ſur leſquelles M. l'Abbé Joannot compoſe chaque année le *Breve Pariſienſe*, à l'imitation de l'*Ordo divini officii* qui s'imprime pour l'uſage du Bréviaire Romain.

Des Epoques les plus célèbres, & de la manière d'en compter les années.

1595. Je ne parlerai point ici des époques incertaines ſur leſquelles les chronologiſtes ne ſont point d'accord ; le P. Pétau place l'époque de la création du monde, ſuivant les calculs de la Genèſe, à l'an 730, de la période Julienne, 3984 ans avant J. C. ce qui fait 3983, ſuivant notre manière de compter (*Doctrina temporum tom. II, pag.* 282, *édit. de* 1705), mais il y a des Grecs, comme S. Clément d'Alexandrie, qui comp-

tent 5624 ans, depuis la création du monde juſqu'à J. C., ou plutôt juſqu'au commencement de l'ere vulgaire, qui ne commence pas exactement à l'année de la naiſſance de J. C.

Epoques des Olympiades.

L'Ere des Olympiadés commence à l'année 3938 de la période Julienne, 776 ans avant J. C. ; ou 775 ſuivant notre maniere de compter (1330). Le cycle ſolaire étoit 18, le cycle lunaire 5, l'indiction 8. Les Athéniens comptoient ces années de la nouvelle lune la plus voiſine du ſolſtice d'été, c'eſt-à-dire, d'un des jours des mois de Juin ou de Juillet ; il y a ſur cet article quelques différences d'opinions parmi les chronologiſtes ; mais il n'y en a point ſur l'année de cette date. Voyez le Pere Pétau, liv. IX, chapitre 40 & ſuiv.

Fondation de Rome.

1596. La Fondation de Rome, ſelon Varron, ſe rapporte au 21 Avril 3961 de la période Julienne, 753 ans avant J. C. ou 752 ſuivant nous. Cenſorinus & la plupart des Savans, les Empereurs même dans les jeux ſéculaires, ont adopté cette manière de compter, qui forme les années Varroniennes de la fondation de Rome, quoique Rome ait été fondée l'année précédente, ſuivant Tarrutius, & l'année ſuivante ſelon les faſtes du Capitole ; cette année 752 avant J. C. avoit 13 de cycle ſolaire, 9 de cycle lunaire & 1 d'indiction, (Riccioli, *Aſtron. reform. tab. XXII*).

Epoque de Nabonaſſar.

1597. L'Ere de Nabonassar célèbre par les calculs d'Hipparque & de Ptolomée, eſt celle de la fondation du royaume de Babylone, ou de la quatrième & dernière Monarchie de l'Empire des Aſſyriens, Nabonaſſar s'étant emparé de la ville de Babylone qui appartenoit aux Aſſyriens ou aux Medes ; cet événement ne fut pas d'abord extrêmement remarquable, mais un ſiècle après, au temps de Nabopolaſſar & de Nabuchodoſor, ce royaume devint célèbre. L'ere de Nabonaſſar commence à l'an 3967 de la période Julienne ; 747 ans avant J. C. ſuivant la manière de compter des chronologiſtes, ou 746 ſuivant notre méthode (1330).

Le commencement du mois Thoth tombe au 26 Février à midi, au méridien d'Alexandrie ou une heure 52′ avant midi, au méridien de Paris. Cette année-là le cycle ſolaire étoit 19, le cycle lunaire 15, le cycle d'indiction 7. De cette époque ſe comptent les années Egyptiennes de 365 jours; & après 1460 ans complets, la 1461e. année ſe retrouve commencer au 26 Février.

1598. La ſeconde année de Nabonaſſar commença de même le 26 Février 745, & la troiſième le 26 Février 744, parce que les deux premières années étoient de 365 jours dans le calendrier Julien, comme dans le calendrier Egyptien; mais l'année Julienne 744 avant J. C. étant biſſextile & contenant un jour de plus que l'année 3 de Nabonaſſar, la quatrième commence un jour plutôt, ou le 25 Février 743 avant J. C. Les trois années ſuivantes commencent encore le 25 Février; mais la huitième commence le 24 Février 739, la douzième le 23 Février 735; & ainſi de ſuite.

Par cette progreſſion qui eſt fort ſimple, j'ai conſtruit une table de huit cent quatre-vingt-huit années, qui ſe trouvent juſqu'à l'année 140 de J. C., où tombe la dernière obſervation de Ptolomée; en voici un extrait, pour l'uſage des aſtronomes qui veulent réduire les obſervations de l'Almageſte. J'y ai joint une table des mois Egyptiens, & du nombre de jours qu'ils contiennent. On trouve une table pareille des années de Nabonaſſar, mais moins commode que la mienne, dans le P. Riccioli (*Aſtronomia reformata*). On peut voir auſſi M. de la Nauze, (*Mem. de l'acad. des inſcrip. XIV*, 334).

Table du commencement des années de Nabonaſſar, réduites au Calendrier Julien, & des mois Egyptiens.

Années de Nabon.	Ann. Jul. avant J. C.	Années de Nabon.	Ann. Jul. avant J. C.	Mois Egyptiens.		Jours.
1	26 Fév. 746	468	1 Nov. 280	θὼθ.	Thoth. . .	30
2	26 Fév. 745	484	28 Oct. 264	φαωφὶ.	Paophi ou Phaophi. .	60
3	26 Fév. 744	508	22 Oct. 240			
4	25 Fév. 743	592	1 Oct. 156	ἀθὺρ.	Athyr ou Athir.	90
8	24 Fév. 739	596	30 Sept. 152	χοιὰκ.	Chœac, Kiak, ou Chiach.	120
12	23 Fév. 735	600	29 Sept. 148			
16	22 Fév. 731	712	1 Sept. 36	τυβὶ.	Tybi. . . .	150
26	20 Fév. 723	716	31 Août 32	μεχὶρ.	Mechir ou Mekir. . .	180
100	1 Fév. 647	744	24 Août 4			
104	31 Janv. 643	748	23 Août 0	φαμενὼθ.	Phamenoth.	210
224	1 Janv. 523			φαρμοῦθὶ.	Pharmuthi, ou Pharmouthi.	240
227	1 Janv. 520					
228	31 Déc. 520		Après J. C.	παχὼν.	Pachon ou Pakon. . . .	270
232	30 Déc. 516					
348	1 Déc. 400	752	22 Août 4	παῦνὶ.	Payni ou Pauni.	300
		840	31 Juil. 92	ἐπιφὶ.	Epéphi ou Epiphi. . . .	330
		864	25 Juil. 116			
		872	23 Juil. 124	μεσορὶ.	Meſori ou Meſſori. . . .	360
		888	19 Juil. 140	Cinq jours intercalaires.		365

1599. Par le moyen de cette table, on réduit facilement au calendrier Julien les obſervations qui ſont dans Ptolomée. La plus ancienne eſt une éclipſe de lune qui commença à Babylone, la première année de *Mardocempade*, où la 27e de Nabonaſſar, le 29 du mois Thoth une heure entière après le lever de la lune; (*Almag. IV*, 6). L'année 27 de Nabonaſſar commençoit le 20 Février, ainſi le 29 du mois Thoth ſeroit le 48e. de Février; il en faut ôter 29 jours que contient le mois de Février, parce que cette année 720 étoit biſſextile (1541); il reſte le 19 Mars de l'année 720, ſuivant notre manière de compter, & celle de M. Caſſini, (1330); car la plupart des chronologiſtes l'appellent année 721.

Je ſuppoſe qu'on demande à quel jour répond le 17 du mois Kiak de la 86e année de Nabonaſſar, jour où fut faite la ſeconde obſervation de Mercure; on voit par la table précédente que l'année 486 commençoit le 28 Octobre, 262 ans avant J. C., & par la table des mois que le 17 du mois Kiak étoit le cent ſeptième jour à compter du 28 Octobre incluſivement; car le 28 étoit déja de l'année 486; on prendra donc quatre jours qui reſtent du mois d'Octobre, ſavoir, 28, 29, 30, 31, trente du mois de Novembre, 31 du mois de Décembre, 31 du mois de Janvier, 261 avant J. C. La ſomme eſt 96, il en reſte onze pour aller à 107, donc le cent ſeptième étoit le 11 Février 261; c'eſt le jour qui répond au 17 du mois Kiak de l'an 486 de Nabonaſſar, (*Mém. acad.* 1766, *pag.* 465, 480). On remarque que dans cette obſervation faite le 18 au matin pour ceux qui comptent depuis minuit; Ptolomée a ſoin de dire que c'eſt entre le 17 & le 18, c'eſt-à-dire, le 17 en comptant depuis midi, ou le 18 ſi c'étoit vers le lever du ſoleil, parce que du temps de Ptolomée le jour civil commençoit au lever du ſoleil. On trouve cette attention en pluſieurs endroits de l'Almageſte, (*pag.* 59, 225, 226, 233, &c. *édit. de* 1551).

1600. La mort d'Alexandre le Grand, arriva le 19 Juillet, l'an 4390 de la période Julienne, 324 ans avant J. C. ou 323 ſuivant nous; & la ſeptième année de la première période Calippique. Cette époque ſert à réduire les obſervations d'Hipparque, rapportées par Ptolomée aux années de la mort d'Alexandre; par exemple, Hipparque obſerva un équinoxe (*Almag. III*, 2), le 27 du mois Méchir au matin, la trente-deuxième année de la troiſième période Calippique; la 178e depuis la mort d'Alexandre, ou la 602e depuis Nabonaſſar (1330), & les chronologiſtes la rapportent au 24 Mars, 146 avant J. C., ou 145 ſuivant notre manière de compter.

1601. La première année de l'ere chrétienne ou Ere vulgaire.

ere vulgaire eſt la 4714e de la période Julienne ; l'an du monde 3984, ſuivant le calcul du P. Pétau ; cette année on avoit 10 de cycle ſolaire, 2 de cycle lunaire, 4 d'indiction romaine, c'eſt la 46e des années Juliennes, c'eſt-à-dire, la 46e année à compter depuis la réformation du calendrier par Jules Céſar ; elle concourt depuis le 1 Janvier juſqu'au 21 Avril avec l'année de Rome 753, & enſuite avec l'année 754. Avant la nouvelle lune, la plus proche du ſolſtice d'été, elle concourut avec la quatrième année de la 194e. Olympiade, & le reſte de l'année fut dans la première de la 195e. Olympiade. Juſqu'au 23 Août à midi, elle concourut avec l'année 748 de Nabonaſſar, & avec l'année 324 de la mort d'Alexandre ; mais dans le reſte de cette année-là, on compta 749 & 325 (*Aſtr. ref. tab. XXII*). La naiſſance effective de J. C. tombe à la fin de l'année 2 avant l'ere chrétienne, ou 4714e de la période Julienne, ſuivant Baronius & Scaliger ; & même deux ans plutôt ſuivant quelques auteurs ; mais le P. Pétau prouve aſſez qu'il y a là dedans beaucoup d'incertitude (*Liv. XII, c.* 4, 5 & 6). Le P. Alexandre, dans ſa grande hiſtoire eccléſiaſtique, la fixe à la fin de l'année 4709, ou 4 avant J. C. *Diſſert. I, tom. III, pag.* 65 & 66.

Hégire. 1602. L'époque des Turcs, appellée *Hégire* ; commence à la fuite de Mahomet qui ſortit de la Mecque ; elle tombe au vendredi 16 Juillet 622, ou 5335 de la période Julienne. Il y a une autre Secte d'Arabes, (ſuivie dans les tables Alphonſines) qui place le commencement de l'hégire au jeudi 15 Juillet. Les années Arabes ſont de 354j 8h 48′, & les années civiles ſont des années lunaires de 354 & enſuite de 355 jours ; ainſi 12 années Juliennes font 12 ans 130 jours & 14 heures. Ils partagent leurs années en cycles de 30 ans, dans leſquels ils font 19 années communes de 354 jours, & onze de 355, ſavoir, les années 2, 5, 7, 10, 13, 15, 18, 21, 24, 26 & 29, de chaque cycle ; leur cycle a commencé en 1757 le 14 Septembre, avec l'année 1171 de l'hégire.

Années Arabes.

1603.

1603. On trouve des tables détaillées de la correſpondance des années Arabes avec les années Juliennes, dans le P. Petau, liv. VII, c. 22, dans Riccioli, dans le livre *d'Ulug-Beg* intitulé : *Epochæ celebriores*, que Gravius publia à Londres en 1650, & dans le catalogue d'étoiles d'Ulug-Beg, qui fut publié avec des commentaires, par Th. Hyde à Oxfort en 1665, & qu'on y a réimprimé en 1767. En voici un extrait pour le temps où nous ſommes.

Un Savant m'ayant aſſuré qu'il falloit ajouter deux jours à ceux de cette table de Gravius, pour ſe conformer à l'uſage actuel des Turcs, j'ai conſulté M. Cardone, ſavant dans les langues Orientales qui m'a fait voir ſur un almanach perpétuel, dreſſé à Conſtantinople, la même correſpondance que dans la table de Gravius.

Années Grégor.			Hégire
1770	26	Avr.	1184
1771	15	Avr.	1185
1772	4	Avr.	1186
1773	24	Mars	1187
1774	13	Mars	1188
1775	2	Mars	1189
1776	20	Févr.	1190
1777	8	Févr.	1191
1778	29	Janv.	1192
1779	18	Janv.	1193
1780	7	Janv.	1194
1780	27	Déc.	1195

On peut voir la comparaiſon détaillée des calendriers & des époques, uſités chez les Romains, les Egyptiens, les Arabes, les Perſes, les Syriens & les Hébreux, dans le Commentaire ſur le premier chapitre d'Alfragan, ajouté par *Chriſtman* à l'édition de 1590 *in*-8°. dans le P. Riccioli, (*Chronol. reformata*), dans le P. Pétau, &c.

Du lever héliaque Coſmique ou Acronique de différentes Etoiles.

1604. Les Poetes & les Auteurs anciens qui ont écrit ſur l'Aſtronomie, l'agriculture & l'hiſtoire, parlent ſouvent du lever & du coucher des étoiles, & ſur-tout du lever héliaque (218). Ces paſſages ſont ſouvent

obſcurs & même pleins de contradictions ; c'eſt ce qui m'engage à donner ici les principes de cette matière, afin qu'avec un peu d'aſtronomie on puiſſe entendre ces auteurs, & même les éclaircir.

Chaque année le ſoleil par ſon mouvement propre d'Occident vers l'Orient rencontre les différentes conſtellations de l'écliptique, & les rend inviſibles pour nous par l'éclat de ſa lumière. Lorſque le ſoleil après avoir traverſé une conſtellation eſt aſſez éloigné d'elle pour ſe lever une heure plus tard, la conſtellation commence à paroître le matin en ſe levant un peu avant que la lumière du ſoleil ſoit aſſez conſidérable pour la faire diſparoître ; c'eſt ce qu'on appelle *lever héliaque* ou ſolaire des étoiles. De même le *coucher héliaque* arrive lorſque le ſoleil approche d'une conſtellation : car avant qu'il l'ait atteint elle ceſſe de paroître le ſoir après le coucher du ſoleil, parce qu'elle ſe couche trop peu de temps après lui. Il eſt ſur-tout néceſſaire, pour l'intelligence de la chronologie & des Poëtes, d'avoir une idée de ce lever héliaque : commençons par celui de Sirius qui étoit ſi célèbre parmi les Egyptiens. Nous avons ſur cette matière un petit ouvrage de Bainbrigius intitulé : *Canicularia*, augmenté par *Gravius*, & publié à Oxfort en 1648, ce livre eſt fort rare actuellement ; le P. Pétau en a auſſi traité, *Variar. diſſertat.* livre VII, c. 1.

Lever héliaque des étoiles.

Lever héliaque de Sirius.

1605. Le lever héliaque de Sirius il y a 2000 ans arrivoit en Egypte vers le milieu de l'été, lorſque après une longue diſparition cette étoile commençoit à reparoître le matin, un peu avant le lever du ſoleil ; la ſaiſon qui régnoit alors, ou la ſituation du ſoleil, étoit à peu-près la même que celle du 12 Juillet parmi nous ; & c'étoit le temps où le vent Etéſien ſoufflant du Nord ſur l'éthiopie y accumuloit les vapeurs, les nuages & les pluies, & cauſoit les débordemens du Nil ; auſſi le lever de Sirius s'obſervoit avec le plus grand ſoin, c'étoit une des cérémonies religieuſes de ce temps-là,

Spectacle de la nature, tom. IV, *pag.* 307. Hiſt. du Ciel, tom. I, *pag.* 42, 277.

L'année cynique des Egyptiens commençoit au lever héliaque de Sirius; mais pour ce qui eſt de leur année civile qui étoit continuellement de 365 jours (1597), elle ne pouvoit pas s'accorder avec l'année naturelle, & tous les 4 ans le lever de Sirius devoit arriver un jour plus tard dans l'année civile. Après un eſpace de 1460 ans, que Cenſorinus appelle la grande année des Egyptiens, l'année naturelle ſe retrouvoit commencer au même point de l'année civile; ainſi l'an 1322 avant J. C. & l'an 138 après J. C. le lever de Sirius ſe trouva arriver le premier jour du mois *Thoth*, ou le premier jour de l'année civile, qui répondoit au 20 Juillet; c'eſt cette période *Caniculaire* ou *Sothiaque* de 1460 ans dont on trouve des veſtiges dans quelques anciens auteurs. (*Cenſorinus*, *c.* 18. *Plato in timæo*, *Clem. Alexand. Stromatum*, *lib. I. Riccioli*, *Alm. I*, 129. *Petav. var. diſſert. lib. II*, *c.* 4). Les anciens étoient en erreur dans ce calcul de plus de 36 ans, parce qu'ils ne connoiſſoient point l'année ſydérale ou aſtrale qui devoit régler le cycle ſothiaque, ils croyoient que 1460 années ſolaires étoient égales à 1461 années vagues ou civiles; mais comme il y a quelque choſe de moins pour l'année tropique, & quelque choſe de plus pour l'année ſydérale, la période n'étoit point exactement de 1460 ans; au bout de ces 1460 ans l'année civile ou vague ne concouroit réellement, ni avec l'année tropique, ni avec l'année ſydérale. En ſuppoſant l'année ſydérale de $365^j\ 6^h\ 9'\ 11'',2$ (888), il ne faut que 1424 années ſydérales pour faire 1425 années Egyptiennes, vagues ou communes, l'une & l'autre formant le nombre de 520135 jours. En ſuppoſant l'année tropique; de $365^j\ 5^h\ 48'\ 45'',5$ (886), il falloit 1507 années tropiques ou 1508 années communes pour ramener les ſaiſons au même jour de l'année, après un intervalle de 550420 jours; ainſi la période de 1460 ans ne ramenoit point au mê-

Année cynique.

Période Caniculaire.

me jour les levers des étoiles, qui n'exigeoient que 1425 ans, ni les faiſons qui en exigeoient 1508. On peut voir encore ſur cette matière M. Dupuis, *Mém. de l'acad. des Inſcriptions & Belles Lettres, tom. XXIX, pag. 116 & ſuiv.*

Arc d'émerſion de Sirius.

1606. Pour trouver exactement le temps de l'année où devoit arriver en Egypte le lever héliaque de Sirius, nous ſuppoſerons que cette étoile pouvoit être apperçue à ſon lever par des yeux attentifs pourvu que le ſoleil fût encore abaiſſé de 10° ſous l'horizon, quoique Ptolomée donne en général 12° pour *l'arc d'émerſion* des étoiles de la première grandeur (2261). Soit *P* le pole (*fig.* 89) ♈ *C* l'équateur, ♈ *D* l'écliptique, *S* l'étoile dont il s'agit. Sous une latitude de 30° telle qu'on l'obſerve dans la baſſe Egypte, on aura $PZ = 60°$, l'angle $ACS = 60°$, *AS* de 16° 22′; c'eſt la déclinaiſon de Sirius vers l'an 138 où commence la période Sothiacale. En réſolvant le triangle *CAS* on trouvera *CA* de 9° 44′; c'eſt la *différence aſcenſionnelle* qui étant ajoutée à l'aſcenſion droite ♈ *A* de Sirius pour ce temps-là 80° 16′, donne l'aſcenſion oblique ♈ *C* 90° 0′; ainſi le point *C* de l'équateur qui ſe levoit en même temps que l'étoile, avoit 90° d'aſcenſion droite. Dans le triangle ♈ *BC* on trouvera l'arc de l'écliptique ♈ *B* qui répond à l'arc ♈ *C* de l'équateur, l'angle *B* (qui dans le cas préſent ſe trouve être un angle droit), & la déclinaiſon *BC* qui dans notre cas étoit égale à l'obliquité de l'écliptique; nous la ſuppoſerons de 23 degrés 40 min.

Fig. 89.

Dans le triangle *BCD* connoiſſant *BC*, l'angle *B*, & l'angle *BCD*, égal à la hauteur du pole, on trouvera $BD = 13° 3'$; cet arc ajouté à la longitude du point *B* donnera celle du point coaſcendant *D*; on cherchera auſſi l'angle *D*. Si l'on ſuppoſe enfin le ſoleil au point *M* de l'écliptique, 10° au-deſſous de l'horizon; il faudra chercher la longitude du point *M*, & ce ſera le lieu du ſoleil au premier inſtant où Sirius doit s'appercevoir à l'horizon, le ſoleil étant encore aſſez bas

Dans le triangle *MND* l'on connoît l'angle *D* par l'opération précédente, auſſi bien que $MN = 10°$: on trouvera $DM = 11°\ 16'$ qui ajouté à la longitude du point *D*, donnera celle du point *M* de $3^s\ 24°\ 19'$. Telle étoit la longitude du ſoleil le jour du lever héliaque de Sirius, le premier jour où Sirius paroiſſant à l'horizon le matin ſe trouvoit aſſez dégagé du ſoleil pour pouvoir être apperçu : c'eſt la longitude que le ſoleil a maintenant le 16 de Juillet. On trouve cette longitude plus petite de $12° \frac{1}{4}$ en remontant 1460 ans plutôt, ou au commencement de la période précédente, ſuivant le calcul de *Bainbrigius*. Au reſte ces réſultats ne ſont pas ſuſceptibles d'une grande préciſion, non plus que l'obſervation du lever héliaque d'une étoile ; l'état de l'atmoſphère, la ſituation de l'obſervateur, la latitude des différentes Provinces d'Egypte y devoient apporter des différences conſidérables. Il y a des pays où l'on voit Sirius lors même que le ſoleil eſt élevé ſur l'horizon. On trouveroit de la même manière le temps du lever héliaque des autres étoiles pour une époque donnée ; mais il nous ſuffit d'avoir fourni un exemple de la méthode ; tout ceci appartient plus à l'intelligence des anciens qu'à l'hiſtoire de la véritable aſtronomie. (V. le P. Pétau, l. III, diſſ. l. I, c. 2, &c).

Fig. 89.

Longitude du Soleil au lever de Sirius.

1607. Quoique le lever héliaque des étoiles fût le plus remarquable parmi les anciens, ils diſtinguoient encore pluſieurs autres eſpèces de levers & de couchers (*Gemini elementa*) ; les modernes à leur imitation ont diſtingué le lever *coſmique* qu'on peut appeller le lever du matin ; & le coucher *coſmique* ou coucher du matin, auſſi bien que le lever & le coucher *acroniques* (a) qu'il vaudroit mieux appeller le lever & coucher du ſoir. Le moment du lever du ſoleil règle le lever ou le coucher coſmique : lorſque des étoiles ſe lèvent avec le ſoleil ou ſe couchent au ſoleil levant, on dit qu'elles ſe lèvent ou ſe couchent coſmiquement ; mais quand les étoiles ſe lèvent ou ſe couchent le ſoir au mo-

Lever coſmique & acronique.

(a) Ἀκρονύχως, *veſpertinus*.

ment où ſe couche le ſoleil, on dit que c'eſt le lever ou le *coucher acronique*; d'où il ſuit que le coucher acronique ſuit à 12 ou 15 jours près le coucher héliaque, du moins pour les étoiles voiſines de l'écliptique, & que le lever coſmique précède de la même quantité le lever héliaque.

1608. Le P. Pétau a calculé une table fort ample de ces différentes ſortes de levers & de couchers des différentes étoiles pour le temps de Jules Céſar: en voici un extrait. Pour s'en ſervir, il faut obſerver que les quatre ſaiſons de l'année qui commencent en 1772, les 20 Mars, 21 Juin, 22 Septembre & 21 Décembre, arrivoient du temps de Céſar, les 23 Mars, 25 Juin, 25 Septembre & 23 Décembre, c'eſt-à-dire, deux ou trois jours plus tard, ſuivant le calendrier Julien qui fut établi à Rome, 44 ans avant J. C.

TABLE qui marque le lieu du Soleil en ſignes & degrés, pour le temps du lever & du coucher des 12 principales étoiles à Rome, la premiere année de la correction Julienne, 44 ans avant J. C.

	Lever Coſmique.	Lever Héliaque.	Lever Acronique.	Coucher Coſmique.	Coucher Héliaque.	Coucher Acronique.
Antarès.	7ˢ 14ᵈ	7ˢ 27ᵈ	1ˢ 14ᵈ	1ˢ 2ᵈ	6ˢ 3ᵈ	7ˢ 2ᵈ
L'aigle.	8 9	8 27	2 9	3 26	9 10	9 26
Arcturus.	5 14	5 26	11 14	2 3	7 11	8 3
La Chèvre. . . .	11 17	0 17	5 17	8 14	1 28	2 14
Luiſ. de la couron.	5 26	6 10	11 26	3 4	7 15	9 4
Queue du Cygne. .	7 21	8 6	1 21	5 14	11 0	11 14
Queue du Dauphin.	8 17	9 6	2 17	4 5	9 14	10 5
Prem. tête des Gém.	2 14	3 0	8 14	8 28	2 13	2 27
Aldébaran. . . .	1 21	2 11	7 21	7 9	0 26	1 9
Cœur de l'Hydre. .	4 11	4 25	10 11	9 4	2 16	3 4
α de la Balance. . .	6 17	7 11	0 17	0 17	5 24	6 17
Regulus.	4 1	4 18	10 1	10 3	2 27	4 3
Sirius.	3 23	4 8	9 23	7 19	1 6	1 19
η des Pleïades. . .	0 23	1 18	6 23	7 3	0 18	1 3

1609. On trouve dans les élémens d'aſtronomie de *Geminus*, & dans les diſſertations du P. Pétau, *Doctrina temporum*, *tom. III*, pluſieurs circonſtances des différentes ſortes de lever & de coucher, avec pluſieurs diſſertations & pluſieurs tables pour trouver à différens jours de l'année le lever & le coucher de différentes étoiles; ces détails me conduiroient trop loin, je me contenterai de rapporter quelques paſſages des Poëtes latins pour ſervir d'exemple.

Hippocrate même parle de ces circonſtances, il dit qu'on doit obſerver les levers & les couchers héliaques des étoiles, ſpécialement du grand Chien & d'Arcturus, de même que le coucher coſmique des Pléiades, (*Hipp. de Ære*); mais cela doit s'entendre de l'influence des différentes ſaiſons de l'année, de la chaleur, de l'humidité, & des autres qualités de l'atmoſphère dans chaque mois.

Polybe racontant la perte de la flotte Romaine dans la première guerre Punique, attribue ce malheur à l'obſtination des conſuls qui avoient voulu, malgré les pilotes, ſe mettre en mer entre le lever d'Orion & celui du grand Chien, ſaiſon toujours orageuſe. Le lever héliaque d'Orion arrivoit le 26 Juin, ſuivant Pline & Ovide; mais celui du grand Chien arrivoit le 26 Juillet, ſuivant Columele, c'eſt donc dans le mois de Juillet qu'ils naviguoient.

1610. C'eſt ſur-tout dans ſes faſtes qu'Ovide parle ſouvent des étoiles; ce Poëte annonce d'abord qu'il va chanter les principes ſur leſquels étoit fondée la diviſion de l'année Romaine, le lever & le coucher des conſtellations :

Tempora cum cauſis Latium digeſta per annum,
Lapſaque ſub terras, ortaque ſigna canam. *Faſt. I. 1.*

1611. Après avoir parlé des 12 mois de l'année & des divinités qui y préſidoient, il entre dans la partie aſtronomique de ſon ouvrage, en faiſant un éloge pom-

peux des anciens aſtronomes, *Felices animæ*, &c. vers 297. Le lever héliaque de la Lyre eſt le premier dont il parle, & il le fixe au jour des Nones, c'eſt-à-dire, au cinq de Janvier :

Signa dabunt imbres exoriente Lyrâ. *I.* 306.

Il faut convenir que la détermination de ce jour n'eſt point exacte ; le lever héliaque arrivoit dès le 6 Novembre, mais les Poëtes ne ſe piquent pas d'une bien grande préciſion ; on peut voir dans le P. Pétau, *Diſſertationum, lib. II, c.* 8, beaucoup d'inexactitudes & d'erreurs dans différens paſſages des anciens.

1612. Ovide eſt plus exact lorſqu'arrivé au 9 de Janvier, il parle du lever héliaque de la conſtellation du Dauphin,

Interea Delphin clarum ſuper æquora ſidus
Tollitur, & patriis exerit ora vadis. *I.* 457.

Car la conſtellation du Dauphin ſe levoit vers les 6 heures du matin dans cette ſaiſon-là, c'eſt-à-dire, aſſez long-temps avant le ſoleil pour pouvoir être obſervée le matin, & c'étoit le commencement de ſon apparition, ou ſon lever héliaque ; au contraire il place au 19 de Juin le lever acronique, en diſant :

Navita puppe, ſedens Delphina videbimus inquit,
Humida cum pulſo nox erit orta die. *VI.* 470.

Quand les Pléiades (*Atlantides*) ſe couchoient coſmiquement ou au lever du ſoleil, la Couronne ſe levoit héliaquement, paroiſſant avant le ſoleil. *Georg. I.* 222.

1613. Le couchier coſmique paroît indiqué pour le premier Avril au matin.

Dum loquor, elatæ metuendus acumine caudæ
Scorpios, in virides præcipitatur aquas. *IV.* 163.

C'eſt cependant au 15 Avril qu'on le trouve par le calcul, au temps de Céſar, pour l'étoile *Antarès*.

Le

Le lever héliaque des pléïades & le commencement de l'été ſont annoncés pour le 13 de Mai; ce ſeroit le 21, ſuivant le calcul du Pere Pétau.

Pleiadas aſpicies omnes, totumque ſororum
Agmen, ubi ante idus nox erit una ſuper;
Tum mihi, non dubiis autoribus, incipit æſtas. *L. V.* 599.

1614. Puiſque nous en ſommes à des faits aſtronomiques propres à éclaircir les ouvrages des anciens Poëtes; nous dirons un mot du rapport qu'il y avoit entre les conſtellations, & les points Cardinaux de l'écliptique où commençoient les ſaiſons. En 1770, le ſoleil entre dans le ſigne du Bélier, & dans l'équinoxe, en commençant le printemps le 20 de Mars; mais il n'entre dans la *conſtellation*, c'eſt-à-dire, dans les étoiles qui portent le nom de Bélier que le 29 Avril; car la première étoile γ eſt à 29° 58′ de l'équinoxe, parce que les points Cardinaux de l'écliptique, c'eſt-à-dire, les équinoxes & les ſolſtices ont rétrogradé de 30 degrés, depuis le temps où ils étoient d'accord avec les conſtellations. Cette rétroceſſion ou préceſſion des équinoxes eſt fort lente (915), il faut 2145 ans pour qu'elle ſoit d'un ſigne entier, ou de 30 degrés; mais lorſqu'on remonte au ſiècle d'Auguſte, on trouve 25 $\frac{1}{4}$ degrés, & au temps de l'ancienne Grèce 1450 ans avant J. C. on trouve 43 degrés dont les équinoxes étoient plus avancés qu'ils ne le ſont aujourd'hui; le printemps n'arrivoit que lorſque le ſoleil étoit dans le milieu de la conſtellation du Bélier. Il eſt probable, en effet, que les premiers aſtronomes placèrent les ſaiſons, par exemple, le printemps dans le milieu du grouppe d'étoiles qu'ils prirent pour la première conſtellation, c'eſt-à-dire, dans le milieu du Bélier, & l'été dans le milieu de la 4e conſtellation ou de l'Ecreviſſe; c'eſt-à-dire, qu'ils appellèrent l'Ecreviſſe l'aſſemblage des étoiles au milieu deſquelles ſe trouvoit le ſoleil au temps du ſolſtice.

Des ſignes & des conſtellations.

Les anciens prennent le milieu des conſtellations.

1615. La poſition des points cardinaux a du être

Situations des équinoxes.

enſuite fort différente, ſuivant les temps où on l'a obſervée & décrite; auſſi trouve-t-on des auteurs anciens qui placent les équinoxes & les ſolſtices au commencement de chaque ſigne, cela vouloit dire alors, de chaque conſtellation; d'autres qui les mettent au 2e, au 4e, au 6e, au 10e, au 15e degré des mêmes ſignes. Voyez M. Fréret, Défenſe de la chronologie 1758, *pag.* 460, 467 : en voici des exemples.

Au temps d'Hipparque, la premiere étoile du Bélier étoit dans le colure même de l'équinoxe, & le ſoleil entroit dans la conſtellation du Bélier, en même temps que dans l'équinoxe.

1616. Au temps d'Héſiode, 950 ans avant J. C.; les points cardinaux étoient au 8e degré des conſtellations, & le ſoleil entroit dans les aſtériſmes ou conſtellations, 8 jours avant que d'entrer dans les points de la dodécatémorie (a), qui portoient les mêmes noms; ainſi le ſoleil entroit dans la conſtellation du Bélier, 8 jours avant l'équinoxe, c'eſt-à-dire, avant le temps où les jours étoient égaux aux nuits; Columelle (*Liv. IX. chap.* 13) nous dit que les calendriers ruſtiques de Méton, d'Eudoxe (b), & des anciens aſtronomes ſuivoient cette méthode, & que les jours de fêtes qui dépendoient du commencement des ſaiſons étoient réglés ſur ce pied-là; il s'y conforme lui-même, on la trouve dans Varron, Ovide, Vitruve, Pline, Hygin, dans le Scholiaſte d'Aratus, dans Martianus Capella, & même dans les calendriers du vénérable Bede, (né en Angleterre en 672), comme l'obſerve le P. Pétau, *Diſſert. liv. II. c.* 4. *pag.* 43.

Contradictions de Manilius.

Le poëte Manilius, qui n'étoit qu'un compilateur, dit dans un endroit de ſon poëme, que le ſolſtice eſt au premier degré du cancer, (*Liv. I*, vers 605), & dans l'autre que c'eſt au 15e degré, *Livre III.* Il avoit

(a) Δωδεκάτημορια, la douzième partie, c'eſt-à-dire, 30 degrés du cercle de l'écliptique.

(b) A l'égard d'Eudoxe, voyez l'art. 1619.

trouvé cette derniere méthode dans l'ancienne aſtrologie grecque, & il l'explique aſſez clairement, en parlant du Cancer,

> Extenditque diem ſummum, parvoque receſſu,
> Deſtruit, ut quanto fraudavit tempore luces
> In tantum noctes augeſcat. *III.* 622.

c'eſt-à-dire, que le Cancer augmente la durée des jours & la diminue enſuite; mais de ſorte qu'il rende à la longueur des nuits, ce qu'il ôte à celle des jours, tour-à-tour elle leur ôte & leur rend leur durée,

> Inque vicem nunc damna facit, nunc tempore ſupplet. *III.* 636.

& le P. Pétau a fait voir aſſez en détail, qu'Hipparque avoit ſuppoſé les ſolſtices dans la ſphère d'Eudoxe, au moins à 15° vers l'orient, du lieu où ils étoient 162 ans avant J. C.

1617. A l'égard de l'ancienne ſphère grecque, attribuée à Chiron (255), elle ſe rapporte environ à 1350 ans avant J. C. Il y a grande apparence qu'elle avoit été réglée par quelques aſtronomes Egyptiens, (Fréret, *pag.* 459). La diviſion du Zodiaque eſt peut-être encore plus ancienne que Chiron; car il eſt naturel de penſer qu'elle fut faite dans le temps auquel les levers ſenſibles du commencement de chaque conſtellations précédoient de 15 jours les points cardinaux, c'eſt-à-dire, les équinoxes & les ſolſtices (1614). Sphère de Chiron.

1618. Mais au temps d'Héſiode (321), c'eſt-à-dire, 950 ans avant J. C. on avoit fait, ce ſemble, quelque changement à la ſphère ancienne de Chiron, (M. Fréret, *pag.* 460), il paroît qu'on dreſſa de nouveaux calendriers, dans leſquels les levers & les couchers des étoiles étoient marqués d'une maniere plus conforme aux apparences, que dans la ſphère de Chiron. Les idées aſtronomiques commençoient à devenir plus communes dans la Grece, par le commerce des Orientaux; le calendrier fait du temps d'Héſiode fut reçu Sphère d'Héſiode.

par les Grecs, & enſuite par les Romains (1616), qui l'employerent ſans examen, comme s'il eût été fait pour le temps & le climat où ils vivoient. Ainſi il faut ôter environ 38° des longitudes qu'ont les étoiles en 1770, ſi l'on veut faire des calculs qui ſoient d'accord avec les paſſages d'Ovide, de Pline, &c. ſans cependant qu'on puiſſe dire qu'ils ayent ſuivi conſtamment la même règle.

Sphère d'Eudoxe.

1619. Cependant Eudoxe qui écrivit environ 370 ans avant J. C. (337), paroît avoir décrit la ſphère d'après une tradition plus ancienne que le temps d'Héſiode; Newton dans ſa chronologie penſe que c'étoit ſur la ſphère de Chiron, & il en fixe l'époque à 936 ans avant J. C., mais Whiſton dans la réfutation qu'il a faite de la chronologie de Newton, & M. Fréret, après lui, prouvent que la ſphère décrite par Eudoxe, & par le poëte Aratus (346), ſe rapporte à l'an 1353 avant J. C. ou environ. M. Maraldi la fait auſſi remonter à plus de 1200 ans avant J. C. (*Mém. acad.* 1733, *pag.* 438); delà M. Fréret conclut, (*pag.* 459), que ces connoiſſances étoient cultivées depuis long-temps dans l'orient; probablement cette ſphère avoit été réglée par quelques aſtronomes Egyptiens ou Phéniciens qui étoient venus avec les fondateurs des colonies Orientales, & qui avoient abandonné l'Orient avec les Paſteurs chaſſés d'Egypte par Séſoſtris. Mais il eſt ſurprenant qu'on ne fût pas plus avancé au temps d'Eudoxe.

C'eſt ici que je terminerai ce que j'avois à dire du calendrier & de la chronologie, j'ai été trop court pour ceux que la curioſité porte ſpécialement à l'hiſtoire, mais trop long pour ceux qui ne cherchent qu'à pénétrer dans les branches eſſentielles de l'aſtronomie; je reprens donc le fil des théories aſtronomiques, & je commence par les parallaxes qui en ſont une branche eſſentielle, & qui nous conduiront enſuite au calcul des éclipſes.

LIVRE NEUVIEME.

DES PARALLAXES.

1620. LA PARALLAXE (a), eſt la différence entre le lieu où un aſtre paroît, vu de la ſurface de la terre, & celui où il nous paroîtroit, ſi nous étions au centre ; on l'appelle quelquefois *Parallaxe diurne*, pour la diſtinguer de la parallaxe annuelle (1141). Définition de la Parallaxe.

Tous les mouvemens céleſtes doivent ſe rapporter au centre de la terre pour paroître réguliers, car les différens points de la ſurface de la terre étant ſitués fort différemment les uns des autres, un aſtre doit leur paroître dans des aſpects fort différens ; c'eſt au centre qu'il faut ſe tranſporter, afin de voir tout à ſa véritable place, & de trouver la véritable loi des mouvemens céleſtes ; ainſi nous ſommes obligés de calculer ſans ceſſe la parallaxe, pour réduire le lieu d'une planète obſervé à celui que nous euſſions vu du centre de la terre.

1621. Soit T le centre de la terre, (*fig.* 87), O le point de la ſurface où eſt placé l'obſervateur ; TOZ la ligne verticale, ou la ligne qui paſſe par le zénit Z, par le point O de l'obſervateur, par le centre T de la terre, & par le nadir. Une planète P ſituée dans la ligne du zénit, répond toujours au même point du ciel, ſoit qu'on la regarde du centre T, ſoit qu'on l'obſerve du point O ; le point du ciel qui paroît à notre zénit marque également le lieu de l'aſtre dans les deux cas ; ainſi *un aſtre qui paroît au zénit n'a point de parallaxe* : c'eſt le premier principe qu'il faut conſidérer dans cette théorie des parallaxes. La parallaxe eſt nulle au zénit. *Fig.* 87.

(a) Παράλλαξις, *differentia* ; ἀπὸ παραλλάττω, *tranſmuto* ; la parallaxe vient en effet d'un changement de ſituation de la part de l'obſervateur, & produit un changement dans la ſituation apparente de l'aſtre.

Fig. 87. 1622. Si la planète, au lieu d'être sur la ligne du zénit $TOPZ$, paroît sur la ligne horizontale OH, perpendiculaire à la première, sa distance TH au centre de la terre étant la même que la distance TP, le lieu de la planète H vu du centre de la terre, est sur la ligne TH, le lieu de la planète, vu du point O, est sur la ligne OH : ces deux lignes TH & OH ne répondent pas au même point du ciel; car au-delà du point H, où elles se croisent, elles iront en s'éloignant l'une de l'autre; & dans la sphère des étoiles fixes, elles rencontreront deux points différens, & indiqueront pour l'astre situé en H deux situations différentes, cette différence est ce que nous appellons parallaxe.

1623. Comparons ces deux différentes situations, ou ces deux différens points, avec le point du zénit ou le point du ciel qui est sur la ligne COZ menée par le centre & par le point O de la surface : l'angle ZOH formé par la ligne verticale OZ, & par la ligne OH, sur laquelle paroît la planète, est la distance apparente de l'astre au zénit : si nous étions au centre T, l'angle ZTH seroit la vraie distance de l'astre au zénit, ou la quantité de degrés dont la ligne TH, menée à l'astre, différeroit de la ligne TZ menée au zénit.

1624. La distance apparente ZOH est plus grande que la distance vraie ZTH; car dans le triangle rectiligne HTO, dont le coté TO est prolongé en Z, l'angle extérieur ZOH est égal aux deux intérieurs T & H; donc il est plus grand que l'angle T de la quantité de l'angle H : ainsi la distance apparente de l'astre H au zénit est plus grande que la distance vraie ZTH. La différence de ces deux distances est l'angle OHT, qui s'appelle la *Parallaxe horizontale*, si la ligne OH est horizontale, comme nous l'avons supposée, c'est-à-dire, si le lieu apparent de l'astre qu'on observe, est sur l'*horizon apparent* OH, c'est-à-dire, sur la tangente menée par le point O de la surface terrestre. Dans le triangle TOH rectangle en O, on a cette proportion

Parallaxe horizontale.

en prenant l'unité pour rayon ou ſinus total ; 1 : ſin. *OHT* : : *TH* : *OT* : donc le ſinus de la parallaxe horizontale eſt égal à $\frac{OT}{TH}$, c'eſt-à-dire, que le rayon de la terre diviſé par la diſtance de l'aſtre, donne une fraction (3608) qui dans les tables des Sinus indique la parallaxe. *Fig.* 87.

1625. La parallaxe d'un aſtre eſt donc l'angle formé au centre de l'aſtre par deux rayons, dont l'un va au centre de la terre, & l'autre au point de la ſurface où eſt l'obſervateur ; c'eſt l'inclinaiſon des deux lignes qui partent du centre & de la ſurface, pour aller ſe réunir au centre de la planète ; enfin, c'eſt auſſi l'angle ſous lequel paroît le rayon de la terre, ou la diſtance de l'obſervateur au centre de la terre, lorſque cette diſtance ou ce rayon ſont ſuppoſés vus du centre de la planète, & c'eſt ainſi que nous l'avons déja conſidérée, (1396). Définition de la parallaxe.

1626. Le triangle *TOH* s'appelle *Triangle parallactique* ; il eſt toujours ſitué verticalement, puiſque le côté *OT* étant une ligne verticale, le plan du triangle fait ſur *OT*, ne ſauroit être incliné ; ainſi, tout l'effet de la parallaxe ſe fait de haut en bas, dans le plan d'un cercle vertical : d'ailleurs il eſt aiſé de comprendre que le centre de la terre étant perpendiculairement ſous nos pieds (a), c'eſt-à-dire, dans le plan de tous les cercles *verticaux*, l'effet de la parallaxe ne peut pas s'écarter de ces cercles ; ainſi la parallaxe eſt toute en hauteur, c'eſt-à-dire, qu'elle abaiſſe les aſtres du haut en bas, & dans un vertical, ſans faire paroître l'aſtre à droite ni à gauche du vertical. Delà il ſuit que la parallaxe ne change point l'azimut d'une planète ; de même dans le méridien la parallaxe ne change point l'aſcenſion droite d'un aſtre, parce que le vertical eſt alors perpendiculaire à l'équateur, & que tous les points Triangle parallactique. L'effet des parallaxes eſt en hauteur.

(a) On conſidere ici la terre comme une ſphère, ſon applatiſſement changera peu de choſe à la ſituation du centre par rapport au vertical (1684).

Fig. 87. du vertical répondent au même point de l'équateur.

1627. Juſqu'ici nous n'avons parlé de parallaxe que pour le cas où l'aſtre eſt à l'horizon, c'eſt-à-dire, où l'angle ZOH eſt un angle droit, & nous avons appellé *parallaxe horizontale* celle qui a lieu dans ce cas-là (1624): ſi la planète L ſe trouve plus près du zénit, enſorte que l'angle ZOL, diſtance de la planète au zénit, ſoit un angle aigu, l'angle de la parallaxe OLT deviendra plus petit; on l'appelle alors *parallaxe de hauteur*.

Parallaxe de hauteur.

1628. Théoreme. *Le ſinus total eſt au ſinus de la parallaxe horizontale, comme le ſinus de la diſtance au zénit eſt au ſinus de la parallaxe de hauteur*; en ſuppoſant que la diſtance de la planète au centre de la terre ſoit la même dans les deux cas, & que la terre ſoit ſphérique.

Démonstration. Dans le triangle rectangle HOT on a cette proportion : HT eſt à TO, comme le ſinus de l'angle droit O eſt au ſinus de l'angle THO; parce que dans tout triangle rectiligne des côtés ſont comme les ſinus des angles oppoſés. Dans le triangle TOL on a de même cette proportion : TL eſt à TO comme le ſinus de l'angle LOT eſt au ſinus de l'angle TLO; dans cette dernière proportion on peut mettre au lieu de TL, ſon égale HT, puiſque la planète eſt ſuppoſée toujours à même diſtance du centre de la terre; ainſi l'on a ces deux proportions, en nommant R le ſinus de l'angle droit :

$HT : TO :: R :$ ſin. $H.$
$HT : TO :: $ ſin. $LOT :$ ſin. $L.$ } donc $R :$ ſin. $LOT ::$ ſin. $H :$ ſin. L;

mais le ſinus de l'angle obtus LOT eſt le même que celui de l'angle LOZ, ou de la diſtance de la planète au zénit; donc le rayon eſt au ſinus de la diſtance au zénit, comme le ſinus de la parallaxe horizontale H eſt au ſinus de la parallaxe de hauteur L.

Le ſinus de la diſtance apparente au zénit eſt la même choſe que le coſinus de la hauteur apparente, &

& le rayon eſt toujours ſuppoſé être l'unité ; ainſi, 1 : coſin. haut. : : ſin. par. horiz. : ſin. parall. de hauteur ; donc *le ſinus de la parallaxe de hauteur eſt égal au ſinus de la parallaxe horizontale multipliée par le coſinus de la hauteur apparente.* Fig. 87.

1629. La parallaxe horizontale de la lune, qui eſt la plus grande de toutes les parallaxes des planètes, ne va qu'à un degré environ ; or entre le ſinus d'un degré, & l'arc d'un degré la différence eſt à peine de la valeur d'un quart de ſeconde ; ainſi l'on peut prendre l'un pour l'autre, & dire en général que *la parallaxe de hauteur eſt égale à la parallaxe horizontale multipliée par le coſinus de la hauteur apparente.* C'eſt ainſi que j'énoncerai toujours à l'avenir le théorême général de la parallaxe de hauteur, dont je ferai un uſage fréquent ; & nommant p la parallaxe horizontale, & h la hauteur apparente, je ſuppoſerai qu'on a toujours la parallaxe de hauteur $= p.$ cof. $h.$ Règle de la parallaxe de hauteur.

1630. La parallaxe eſt nulle quand l'aſtre paroît au zénit ; nous l'avons déja obſervé (1621), & cela ſe déduit encore de la valeur que nous venons de trouver ; car ſi la diſtance au zénit eſt nulle, ſon ſinus eſt égal à zéro, & la parallaxe de hauteur étant le produit de zéro par la parallaxe horizontale ſera auſſi égale à zéro. Au contraire la parallaxe eſt plus grande à l'horizon, que dans tout autre cas, ou à toute autre élévation ; car le coſinus de la hauteur ne ſauroit être plus grand que le ſinus de 90°, ou le coſinus de zéro ; donc le produit de la parallaxe horizontale par le coſinus de la hauteur apparente, qui forme la parallaxe de hauteur, ne ſauroit être plus grand que lorſque la planète paroît à l'horizon. Dans le cas même où elle ſeroit à l'horizon réel, c'eſt-à-dire, où l'angle OTH ſeroit droit, l'angle TOH étant aigu, le coſinus de TOH ſeroit plus petit que le rayon, & la parallaxe ſeroit plus petite que lorſque l'angle TOH étoit droit, c'eſt-à-dire, lorſque la ligne OH du lieu apparent vu de la ſurface de la terre étoit dans l'horizon. D'ailleurs on voit

Fig. 87. que la perpendiculaire qui ſeroit égale à HT, dans le dernier cas étant plus longue que HO, le rayon TO paroîtroit ſous un plus petit angle que quand l'angle O eſt droit, & que la diſtance perpendiculaire eſt plus petite. On trouveroit de même que quand le triangle HOT eſt iſocelle, l'angle H eſt toujours plus petit que la parallaxe horizontale, parce que la perpendiculaire eſt plus longue que HO; il y a dans ce cas-là un ſeptième de ſeconde, dont la parallaxe eſt moindre que la parallaxe horizontale H.

Changement de la parallaxe de hauteur.

1631. Le changement de la parallaxe de hauteur pour un petit eſpace de temps eſt aiſé à calculer par les formules différentielles, car la parallaxe de hauteur eſt p cof. h, (1629) la différentielle de cof. h eſt dh ſin. h, (3308) donc le changement de p cof. h ſera $p\,dh$ ſin. h; mais p eſt ordinairement exprimé en ſecondes; ainſi pour que $p\,dh$ ſin. h ſoit auſſi exprimé en ſecondes, il faut que dh ne ſoit qu'une fraction, de même que ſin. h, c'eſt-à-dire, qu'il faut l'exprimer en décimales du rayon, en le diviſant par l'arc de 57°, (3359); donc pour un degré de changement ſur la hauteur le changement de la parallaxe ſera $\frac{p \text{ ſin. } h \,.\, 1^\circ}{57^\circ.}$.

Suppoſons que la parallaxe ſoit de 60′, la hauteur de 30°; on trouvera le changement de parallaxe pour un degré de changement en hauteur $= \frac{3600'' \text{ ſin. } 30^\circ \,.\, 3600''}{57^\circ\ 17'\ 44''\ 8.}$ $= 31''.4$; nous ferons uſage de cette formule, quand il s'agira des obſervations de la lune (2540).

La parallaxe eſt en raiſon inverſe de la diſtance.

1632. La parallaxe horizontale d'un aſtre eſt d'autant plus petite que ſa diſtance eſt plus grande; car plus le point H ſe rapprochera du point O, plus l'angle THO augmentera. Dans le triangle THO on a cette proportion, $TH : TO :: R :$ ſin. THO; ſi l'aſtre eſt en N on aura dans le triangle TNO cette proportion $TN : TO :: R :$ ſin. TNO; la première proportion donne cette équation, TH ſin. $THO = R.\,TO$; la ſeconde proportion donne celle-ci, $TN.$ ſin. $TNO = R.$

TO; donc $TH.\text{ſin.}\,THO = TN.\text{ſin.}\,TNO$; donc $TH : TN :: \text{ſin.}\,TNO : \text{ſin.}\,THO$; car en réduiſant cette dernière proportion en équation on a l'équation $TH.\text{ſin.}\,THO = TN\,\text{ſin.}\,TNO$; donc la diſtance TH dans le premier cas, eſt à la diſtance TN dans le ſecond cas, comme le ſinus de la parallaxe dans le ſecond cas eſt au ſinus de la parallaxe dans le premier.

La même démonſtration auroit lieu, quelque fut l'angle TOH, pourvu que les points N & H fuſſent ſur une même ligne ONH; ainſi lorſque la hauteur apparente eſt ſuppoſée la même, les ſinus des parallaxes de hauteur ſont en raiſon inverſe des diſtances.

1633. La parallaxe d'un aſtre augmente dans le même rapport que ſon diamètre apparent; en effet, lorſqu'un aſtre s'éloigne il diminue de grandeur apparente dans la proportion inverſe de ſa diſtance (1384); mais ſa parallaxe horizontale diminue de la même manière & dans le même rapport (1632); ainſi la parallaxe d'un aſtre eſt toujours comme ſon diamètre : ſi ce diamètre apparent diminue de moitié par l'éloignement de la planète, la parallaxe diminuera auſſi de moitié, & le même rapport ſubſiſtera toujours entre le diamètre apparent & la parallaxe horizontale d'un aſtre, quelle que ſoit ſa diſtance.

Elle eſt comme le diamètre apparent.

Exemple. La parallaxe de Vénus a été obſervée le 6 Juin 1761 d'environ 30″, & ſon diamètre paroiſſoit alors de 60, on ſera donc toujours aſſuré que le diamètre de Vénus eſt double de ſa parallaxe; ainſi quand le diamètre paroîtra de 40″, la parallaxe ſera de 20″, & il ſuffira en tout temps d'obſerver le diamètre pour pouvoir en conclure la parallaxe.

1634. Lorſqu'on connoît la parallaxe horizontale d'un aſtre il eſt aiſé de connoître ſa diſtance : en effet, dans le triangle rectangle THO, l'on connoît le demi-diamètre de la terre TO qui eſt de 1432 lieues (chacune de 2283 toiſes), & l'angle HOT qui eſt de 90°, puiſqu'on ſuppoſe la planète dans l'horizon; ſi donc on connoît de plus l'angle THO qui eſt la pa-

Elle ſert à trouver la diſtance.

rallaxe horizontale, il ſera aiſé de réſoudre le triangle *TO H*, & de connoître la diſtance *TH*; c'eſt ainſi qu'on a trouvé les diſtances en lieues rapportées ci-devant (*pag.* 158).

Méthodes pour trouver la Parallaxe horizontale d'une Planète.

1635. Les aſtronomes ont travaillé dans tous les temps à connoître les diſtances des planètes par le moyen de leurs parallaxes, & ſur-tout la parallaxe de la lune qui eſt la plus ſenſible. Les éclipſes de lune fourniſſent une méthode qui pouvoit être aſſez bonne autrefois pour trouver à peu-près la parallaxe de la lune. On obſervera à un inſtant précis la hauteur apparente du centre de la lune, pendant qu'elle eſt en partie éclipſée; on calculera pour le même-temps la dépreſſion du ſoleil au-deſſous de l'horizon, ou ſa diſtance au zénit (1034), l'on aura la hauteur du centre de l'ombre, qui eſt toujours égale à la dépreſſion du centre du ſoleil; par le moyen de cette hauteur du centre de l'ombre & de la latitude de la lune au temps du milieu de l'éclipſe, que je ſuppoſe connue, on trouvera la hauteur vraie du centre de la lune, & cette hauteur vraie comparée avec la hauteur apparente que l'on a d'abord obſervée, donnera la parallaxe de hauteur. On la trouveroit indépendamment de la latitude, en obſervant une éclipſe qui ſeroit centrale, ou à peu-près, car la durée de l'éclipſe donneroit la ſomme des diamètres de la lune & de l'ombre, d'où il ſeroit aiſé de conclure la parallaxe (1772).

Par les éclipſes de lunes.

1636. Halley, dans ſon catalogue des étoiles auſtrales, publié en 1679, employoit d'une autre manière les éclipſes de lune, il cherchoit le diamètre de l'ombre par le moyen de la grandeur de l'éclipſe & de ſa durée, & il étoit perſuadé qu'en faiſant ces obſervations avec beaucoup d'exactitude, on trouveroit auſſi exac-

tement que par toute autre méthode la parallaxe de la lune ; mais ces méthodes ſont inſuffiſantes actuellement.

1637. Il n'y a guère que trois méthodes ſuffiſamment exactes pour trouver la parallaxe ; la méthode des plus grandes latitudes, celle des parallaxes d'aſcenſion droite ; & celle des différences de déclinaiſon déterminées en même temps par des obſervateurs fort éloignés ; elles ont chacune leur avantage & nous les expliquerons ſéparément.

Par les plus grandes latitudes.

PREMIERE MÉTHODE. Ptolomée employa autrefois les plus grandes latitudes de la lune obſervées au nord & au midi de l'écliptique, pour reconnoître la quantité de la parallaxe, (*Alm. liv. V, c.* II, *pag.* 113. *édit.* 1551) ; Tycho-Brahé s'en ſervit également, (*Progym.* 463), M. Halley la propoſoit en 1679, comme s'il eût cru en être l'inventeur ; enfin elle a été employée par M. le Monnier, qui ſe fondoit ſur les plus grandes latitudes de la lune qu'il avoit obſervées, pour diminuer de 28″ la parallaxe de la lune employée par Newton, (*Inſt. Aſtr. pag.* 185).

1638. Suppoſons qu'un obſervateur ſoit ſitué vers 28° ½ de latitude terreſtre ſeptentrionale, & qu'il obſerve la lune paſſer à ſon zénit lorſqu'elle a 28° ½ de déclinaiſon boréale, & qu'elle eſt dans ſa plus grande latitude à 5° au nord de l'écliptique : quinze jours après, la lune étant dans la partie oppoſée du ciel & dans ſa plus grande latitude auſtrale à 5° au-deſſous de l'écliptique, elle doit être éloignée du zénit de 57°, puiſqu'elle eſt à 28° 28′ ½ de l'équateur vers le midi ; comme dans le premier cas elle étoit à 28° ½ vers le nord ; la parallaxe ne changeoit rien à la premiere diſtance de la lune à l'équateur, parce que la lune étoit alors au zénit, mais la ſeconde diſtance doit paroître augmentée ſenſiblement par l'effet de la parallaxe, qui eſt conſidérable à 57° du zénit ; ainſi tout l'effet de la parallaxe conſpire à augmenter la latitude méridionale de la lune, & à la faire paroître plus grande que la latitude ſeptentrionale. Au lieu de

5° elle paroîtra de 5° 50′ au moins ; car ſi la parallaxe horizontale eſt d'un degré, elle doit être de 50′ à 57° du zénit (1629) ; ſi l'on trouve plus de 50′ d'excès dans cette latitude auſtrale, ce ſera une preuve que la parallaxe horizontale eſt plus grande qu'un degré.

Ainſi les plus grandes latitudes de la lune, qui doivent être égales par rapport au centre de la terre, paroiſſent différentes quand on les voit de la ſurface, la latitude méridionale étant toujours plus grande que l'autre, parce que la lune eſt abaiſſée vers le midi par l'effet de la parallaxe quand elle eſt dans ſa plus grande latitude méridionale, & cette différence des deux latitudes obſervées nous fait connoître la parallaxe entiere qui auroit lieu à l'horizon.

1639. On peut employer cette méthode, même dans les lieux où la lune n'eſt jamais au zénit ; car ayant la différence des latitudes apparentes, qui eſt la ſomme des deux parallaxes de latitude, ou bien ayant la différence des parallaxes, à deux hauteurs connues, il ſera aiſé d'avoir la parallaxe horizontale. Soit P la plus grande parallaxe de hauteur, p la plus petite, Z la plus grande diſtance au zénit, z la plus petite, $P : p :: \text{ſin. } Z : \text{ſin. } z$ donc $P - p : p :: \text{ſin. } Z - \text{ſin. } z : \text{ſin } z$ & $p = \frac{(P-p)\,\text{ſin. } z}{\text{ſin. } Z - \text{ſin. } z}$. Ainſi connoiſſant la différence de deux parallaxes ou leur ſomme, il eſt aiſé de trouver chacune ſéparément.

Quand on a obſervé la lune dans deux temps auſſi différens, on trouve ordinairement que la lune eſt plus éloignée de la terre, ou à une latitude un peu plus grande dans une des deux obſervations que dans l'autre ; on a ſoin dans ce cas-là de tenir compte de la différence, en corrigeant une des deux obſervations, pour réduire la latitude à celle qu'on auroit obſervée, ſi la diſtance au nœud & la parallaxe horizontale euſſent été préciſément les mêmes dans les deux obſervations.

Pour tenir compte de l'applatiſſement de la terre dans cette méthode, il ne faut que corriger la parallaxe de hauteur de la maniere qui ſera indiquée ci-après, (1682).

1640. Quoique nous ayons commencé par expliquer la méthode des plus grandes latitudes, celle des aſcenſions droites dont nous allons parler n'eſt ni moins belle ni moins utile ; nous verrons qu'elle a ſervi à déterminer la parallaxe de Mars & par conſéquent celle du ſoleil avec beaucoup de préciſion (1736) ; & M. Maskelyne l'avoit employée avec ſuccès en 1761 à l'Iſle de Sainte Hélène, même pour la lune, malgré l'irrégularité & la viteſſe de ſon mouvement : (*Philoſ. tranſ.* 1764, *pag.* 371). Méthode des aſcenſions droites.

1641. La méthode qui détermine les parallaxes par les aſcenſions droites à ſa premiere origine, ce me ſemble, dans l'ouvrage de Regiomontanus intitulé : *De Cometæ magnitudine longitudineque ac de loco ejus verò, problemata XVI ;* je crois ce livre imprimé en 1544, quoique l'auteur fût mort dès l'an 1476. Sa méthode eſt un peu compliquée ; mais elle ſe réduit néanmoins à trouver la parallaxe de hauteur, par le moyen de la différence des temps écoulés entre deux obſervations.

Cette méthode fut donnée enſuite par Diggeſeus, auteur Anglois, qui publia en 1573, un ouvrage intitulé : *Ala ſeu Scala Mathematica*, à l'occaſion de la nouvelle étoile de Caſſiopée qui parut en 1572. On trouve encore cette méthode dans la ſcience des longitudes de Morin ; dans les éphémérides de Képler pour l'année 1619 ; dans Hévélius qui en fait un uſage fréquent ; dans M. Caſſini, Traité de la comète de 1681 ; & dans l'Hiſtoire céleſte de Flamſteed, à l'occaſion de Mars, qui fut obſervé par tous les aſtronomes dans ſon oppoſition & ſon périgée, en 1672. Auteurs qui l'ont employée.

Pour expliquer cette méthode, je commencerai par le cas le plus ſimple, ce qui rendra la méthode plus claire & les démonſtrations plus sûres. Je ſuppoſe un obſervateur ſitué ſous la ligne équinoxiale, obſervant une planète ſituée auſſi dans l'équateur ; il la verra paſſer à ſon zénit & enſuite deſcendre perpendiculairement à l'horizon ; la parallaxe de hauteur ſera toute entière dans l'équateur, puiſque l'équateur & le vertical de la

planète ſont alors confondus perpétuellement l'un avec l'autre. Il ſuffiroit alors d'obſerver l'aſcenſion droite d'une planète à ſon lever & à ſon coucher ; on auroit la première trop grande, & la ſeconde trop petite, de la valeur de la parallaxe horizontale, ainſi la moitié de la différence obſervée ſeroit la parallaxe que l'on cherche. Dans d'autres ſituations de la planète & de l'obſervateur, la parallaxe d'aſcenſion droite eſt moindre que la parallaxe horizontale, & que la parallaxe de hauteur ; mais on peut les conclure l'une de l'autre, comme nous allons l'expliquer.

Fig. 90. 1642. Soit Z le zénit (*fig.* 90) ; P le pole du monde, EQ l'équateur, LMN le parallele de l'aſtre, M le lieu vrai, & m le lieu apparent qui eſt plus bas que le vrai lieu M, dans le vertical $ZMmT$; ſi du pole P l'on tire deux cercles de déclinaiſons PMV & Pmu, l'un par le lieu vrai de l'aſtre M, l'autre par ſon lieu apparent m, la différence de ces deux cercles de déclinaiſons, l'angle MPm qu'ils font entr'eux au pole du monde, ou l'arc de l'équateur Vu qui en eſt la meſure, ſera la parallaxe d'aſcenſion droite ; or dans le triangle PMm ſi l'on connoît l'angle P, il ne ſera pas difficile de trouver le côté oppoſé Mm, c'eſt-à-dire, que de la parallaxe d'aſcenſion droite obſervée dans un temps ou dans un lieu quelconque on déduira facilement la parallaxe de hauteur.

La queſtion ſe réduit donc à obſerver la parallaxe d'aſcenſion droite, ce qui ſe fait de la manière ſuivante : lorſqu'une planète paſſe dans le méridien & que la parallaxe eſt nulle en aſcenſion droite (1626), on obſerve la différence entre le temps du paſſage de la planète & celui d'une étoile fixe au fil d'une lunette ; cet intervalle de temps, converti en degrés à raiſon de 15 degrés par heure ou de 15″ de degré pour 1″ d'heure, donne la différence d'aſcenſion droite entre l'étoile & la planète (88, 2505).

Six heures après le paſſage au méridien on obſerve encore la même différence de paſſage, & l'on en conclud

clud la différence d'aſcenſion droite ; mais la parallaxe diminue l'aſcenſion droite de la planète lorſqu'elle eſt vers le couchant, en l'abaiſſant & la faiſant paroître plus à l'occident, tandis que la parallaxe ne change rien à l'aſcenſion droite de l'étoile ; ainſi la différence des aſcenſions droites ne ſera plus la même que celle qu'on avoit obſervée dans le méridien, elle ſera plus ou moins grande de toute la parallaxe d'aſcenſion droite.

1643. Nous ſuppoſons à la vérité que le lieu vrai de la planète ſoit exactement à la même diſtance de l'étoile dans chacune des deux obſervations, c'eſt-à-dire, que la parallaxe ſoit la ſeule cauſe de la différence qu'on aura trouvée entre la première & la ſeconde obſervation, & que la planète n'ait eu aucun mouvement propre ; mais il eſt aiſé de corriger cette ſuppoſition : on obſervera deux jours de ſuite au paſſage de la planète par le méridien, la différence vraie d'aſcenſion droite entre la planète & l'étoile, on trouvera de combien elle varie d'un jour à l'autre, & par conſéquent de combien elle avoit dû augmenter en ſix heures par le mouvement propre de la planète, & indépendamment des apparences de la parallaxe ; ſi l'obſervation a donné une différence plus grande que celle qu'on trouve par le calcul, elle ſera l'effet de la parallaxe d'aſcenſion droite ; & l'on ſéparera cet effet d'avec celui du vrai mouvement de la planète.

1644. Pour conclure facilement la parallaxe horizontale de la parallaxe d'aſcenſion droite obſervée à une certaine diſtance du méridien, on peut ſe ſervir de cette expreſſion générale, parallaxe horizontale $=$ $\frac{\text{Par. aſc. droite cof. déclin.}}{\text{ſin. angle hor. cof. haut. du pole}}$. Formule de la parallaxe d'aſcenſion droite.

Démonstration. Suivant la trigonométrie ſphérique l'on a dans le triangle ZPm la proportion ſuivante : ſin. Zm : ſin. ZPm :: ſin. ZP : ſin. ZmP ; mais $Mm = p$ ſin. Zm (1629) ; donc $\frac{Mm}{p} =$ ſin. Zm, & $\frac{Mm}{p}$ ſin. ZmP

$=$ ſin. ZPm ſin. ZP; mais $MA = Mm$ ſin. $Zm P$; donc $\frac{MA}{p} =$ ſin. ZPm . ſin. ZP, ou $MA = p$ ſin. angle horaire coſin. latit. On a encore $MA = Vu$ coſ. déclin. (892) $=$ parall. aſc. dr. coſ. décli., donc parallaxe aſc. dr. coſ déclin. $= p$ ſin. angle hor. coſ. latit. donc la parallaxe d'aſcenſion droite meſurée ſur l'équateur eſt égale à $\frac{p \text{ ſinus angle horaire . coſinus latitude}}{\text{coſin. déclin.}}$; donc $p = \frac{\text{par. aſc. dr. coſ. déclin.}}{\text{ſin. angle hor. coſ. lat.}}$, c'eſt la formule qu'il falloit démontrer, & qui ſert à trouver auſſi la parallaxe d'aſcenſion droite à un moment donné (1648); mais il faut bien remarquer dans l'expreſſion précédente que c'eſt la déclinaiſon apparente & l'angle horaire apparent que l'on doit employer. Cette formule revient au même que la proportion donnée par M. Caſſini, dans ſes élémens d'aſtronomie (*pag.* 27 à la fin).

1645. On a beſoin de la parallaxe d'aſcenſion droite aux environs du méridien pour corriger des différences de paſſages entre la lune & les étoiles, qui ne ſont pas obſervés préciſément dans le fil du milieu de la lunette méridienne (2387). Soit P le pole (*fig.* 215), Z le zénit, C le lieu vrai de la lune, F ſon lieu apparent dans le vertical; l'arc EF eſt ſenſiblement égal eſt à la parallaxe d'aſcenſion droite cherchée, puiſque c'eſt la différence entre l'aſcenſion droite vraie qui eſt marquée par le cercle horaire PCE, & l'aſcenſion droite apparente qui répond au point F, à la diſtance EF du même cercle horaire. Or dans le triangle ſphérique PCZ, on a ſin. $C = \frac{\text{ſin. } P \text{ . ſin. } PZ}{\text{ſin. } ZC}$, la parallaxe de hauteur $CF = p$. ſin. ZC, $EF = CF$ ſin. $C = p$. ſin. P ſin. PZ, & cette quantité réduite à l'équateur (892) $= \frac{p \text{ . ſin. } P \text{ . ſin. } PZ}{15 \text{ ſin. } PC}$, c'eſt la quantité qu'il faut ôter du paſſage de la lune obſervé au fil vertical CF, s'il eſt après le vrai méridien; ce qui revient au même que la formule précédente : on en trouve des tables dans les

Fig. 215.

éphémérides du P. Hell & du P. Pilgram, pour 1770, imprimées à Vienne en Autriche.

1646. Lorſque la planète a été obſervée à égales diſtances avant & après le méridien, on a une différence double de la parallaxe horaire; & ſi les diſtances ne ſont pas égales, on a une différence qui eſt la ſomme de deux parallaxes d'aſcenſion droite, chacune proportionnelle au ſinus de ſon angle horaire; comme on le voit par la formule précédente; pour lors il faut diviſer cette différence, trouvée entre les obſervations, par la ſomme des ſinus des angles horaires, pour avoir la parallaxe horizontale, ou, ce qui revient au même, l'on peut diviſer la différence obſervée, ou l'argument de la parallaxe, en deux parties qui ſoient entr'elles comme les ſinus des angles horaires ou des diſtances au méridien dans les deux obſervations, & n'employer dans la formule précédente qu'une de ces parties avec ſon angle horaire, pour trouver la parallaxe horizontale.

1647. Il ſuffit d'obſerver un aſtre deux heures avant & 2 heures après le paſſage au méridien, pour trouver dans l'aſcenſion droite d'une planète une différence égale à ſa plus grande parallaxe d'aſcenſion droite; car les diſtances au méridien ſont pour cette eſpèce de parallaxe ce que ſont les diſtances au zénit pour les parallaxes de hauteur; or le ſinus de la diſtance au méridien qui répond à deux heures de temps étant la moitié du rayon, on a de chaque côté du méridien une parallaxe qui eſt la moitié de la plus grande parallaxe d'aſcenſion droite.

Il ſuffit de quatre heures d'intervalle.

Si cette méthode étoit employée ſous l'équateur même elle donneroit immédiatement & ſans aucune hypothèſe, la parallaxe horizontale de la lune qui répond au rayon de l'équateur, malgré l'applatiſſement de la terre; c'eſt un avantage particulier à cette méthode, nous verrons bien-tôt quelle correction il faut y faire dans les autres cas, (1691).

Cette méthode eſt indépendante de la figure de la terre.

1648. Je prendrai pour exemple de cette méthode

les obſervations de M. Maraldi, (*Mém. de l'acad.* 1722). Le 15 Août 1719, Mars étant fort près d'une étoile de 5e grandeur qui eſt à la jambe orientale du verſeau, M. Maraldi dirigea le fil d'une lunette de 12 pieds ſuivant le parallèle de l'étoile : à 9^h^ 18′ du ſoir Mars ſuivoit l'étoile de 10′ 17″ de temps, & 7 heures après, ou le 16 à 4^h^ 21′ du matin, il la ſuivoit ſeulement de 10′ 1″. Mais, ſuivant les obſervations faites au méridien pluſieurs jours de ſuite, Mars devoit ſe rapprocher réellement de l'étoile de 14″ de temps, c'eſt-à-dire, qu'après l'avoir ſuivie de 10′ 17″ de temps il auroit dû, 7^h^ après, en être éloigné de 10′ 3″, au lieu de 10′ 1″ qu'obſerva M. Maraldi ; donc il y avoit 2″ de temps pour l'effet & pour l'argument de la parallaxe ; ces 2″ doivent être réduites en temps, multipliées par le coſinus de la déclinaiſon qui étoit de 15°, diviſées par le coſinus de la latitude de Paris ou par le ſinus de 41° 10′, & par la ſomme des ſinus des angles horaires ou des diſtances au méridien qui étoient de 49° 15′ & de 56° 39′, & l'on trouve enfin $27''\frac{1}{2}$ pour la parallaxe horizontale de Mars, d'où il réſulte $10''\frac{1}{5}$ pour celle du ſoleil ; la diſtance de Mars à la terre étant alors $\frac{37}{100}$ de celle du ſoleil.

Pour déterminer plus exactement la parallaxe d'aſcenſion droite, il faudroit meſurer la diſtance de la planète à une étoile, avec plus de préciſion que par les temps & les paſſages, comme l'obſerve M. le Monnier, (*Inſt. aſtr. pag.* 434) ; il propoſoit de placer la lunette avec ſon micromètre, ſur un inſtrument ſemblable à celui de M. Graham, décrit dans l'optique de Smith, & qu'une horloge feroit mouvoir avec l'aſtre ; ce genre d'inſtrument qu'on peut appeller *Héliоſtate*, a été exécuté par Paſſemant pour le cabinet du Roi à la Muete.

La difficulté qu'on trouvoit autrefois à meſurer la diſtance d'une planète à une étoile fixe, & leur différence d'aſcenſion droite, à cauſe du mouvement diurne eſt auſſi levée aujourd'hui par l'uſage des héliomètres (2433) ou micromètres objectifs, qui font le même effet que

l'Hélioſtate ; on a l'avantage dans un héliomètre de meſurer la diſtance de la planète & de l'étoile, avec la même facilité que ſi l'une & l'autre étoit immobile ; mais pour en faire l'application à cette méthode des parallaxes d'aſcenſion droite, il faudroit que la planète & l'étoile fuſſent à très-peu-près ſur le même parallele, ſans quoi la diſtance meſurée à une ſeule étoile, ne donneroit pas la différence d'aſcenſion droite avec aſſez d'exactitude.

Au reſte, quoiqu'il ſoit difficile par la méthode ordinaire de s'aſſurer d'une ſeconde de temps, ſur la différence d'aſcenſion droite qu'on aura obſervée une fois, il eſt probable que ſi l'on répete dix fois dans une nuit la même obſervation, l'on pourra s'aſſurer d'une demi-ſeconde, & même d'un tiers de ſeconde, qui répond à 5″ de degré ; on a ſoin enſuite de doubler l'effet de la parallaxe, en obſervant la différence d'aſcenſion droite à l'orient & à l'occident du méridien (1647), & l'on ſe trouve parvenu à une exactitude de 2″ ou 3″ ſur la parallaxe de la planète qu'on obſerve ; auſſi voyons-nous que par cette méthode on étoit parvenu à connoître la parallaxe horizontale du ſoleil, à une ſeconde près, puiſque M. Caſſini & M. Maraldi l'ont trouvée de 9″½ ou 10″, & qu'on l'a trouvée enfin de 9″ depuis l'obſervation du paſſage de Vénus ſur le ſoleil, qui étoit la plus concluante de toutes.

1649. La troisieme méthode pour déterminer la parallaxe eſt celle qui ſuppoſe deux obſervateurs très-éloignés l'un de l'autre, obſervant tout à la fois la hauteur d'un aſtre dans le méridien ; c'eſt la plus naturelle & la plus exacte ; c'eſt celle que j'ai employée en 1751 lorſque M. l'Abbé de la Caille étoit au Cap de Bonne-Eſpérance, & que j'obſervois en même temps la lune à Berlin, pour trouver la parallaxe de la lune, qui n'avoit jamais été déterminée par une méthode auſſi exacte. (*Mém. de l'acad.* 1751, *pag.* 457).

1650. Le cas le plus ſimple de cette méthode eſt celui où l'on auroit un obſervateur en *O* (*fig.* 87) ; & *Fig.* 87.

Fig. 87. un autre en *D*, qui ſeroit éloigné du premier de la quantité *OD* égale à peu-près à un quart de la terre, le premier étant en *O* obſervreoit un aſtre *H* à l'horizon; le ſecond étant en *D* l'obſerveroit à ſon zénit : dans ce cas l'angle *OHT*, qui eſt parallaxe horizontale, ſeroit égal à l'angle *HTE*, ou au complément de l'arc *OD* qui eſt la diſtance des deux obſervateurs, ou la différence de leurs latitudes; car je les ſuppoſe placés ſous le même méridien.

Il eſt impoſſible que les circonſtances locales nous donnent dans la pratique un cas auſſi ſimple que celui-là; ainſi nous allons voir ce qui arrive quand les deux obſervateurs ſont à une diſtance quelconque, & que l'aſtre leur paroît à des hauteurs quelconques.

1651. Suppoſons, comme en 1751, un obſervateur Fig. 91. *B*, (*fig.* 91) ſitué à Berlin, & un autre en *C* ou au Cap de Bonne-Eſpérance; *L* la lune que nous obſervions tous deux en même temps dans le méridien; (il n'importe que ce ſoit préciſément au même inſtant pourvu qu'on ſache de combien a dû varier la hauteur méridienne dans l'intervalle des deux paſſages); *CLT* eſt la parallaxe de hauteur pour le Cap, *BLT* eſt la parallaxe de hauteur à Berlin (1627), la ſomme de ces deux parallaxes eſt l'angle *CLB*, argument total de la parallaxe horizontale; ce ſeroit leur différence ſi les obſervateurs voyoient tous deux l'aſtre au midi, ou tous les deux au nord. De ces deux parallaxes de hauteur, la première *BLT* eſt égale à la parallaxe horizontale multipliée par le coſinus de la hauteur apparente à Berlin, ou par le ſinus de la diſtance apparente au zénit qui eſt l'angle *LBA* (1628); la ſeconde parallaxe *CLT* eſt égale à la parallaxe horizontale multipliée par le ſinus de la diſtance *LCD* au zénit du Cap; donc la ſomme *BLC* qui eſt la parallaxe totale des deux obſervateurs eſt égale à la parallaxe horizontale multipliée par la ſomme des deux ſinus des diſtances obſervées; donc on aura la parallaxe horizontale en diviſant l'angle obſervé *BLC*, ou l'ar-

Argument de la parallaxe.

On en déduit la parallaxe horizontale.

gument de la parallaxe, par la ſomme des ſinus des diſtances au zénit.

1652. Cette méthode fut auſſi employée pour déterminer la parallaxe du ſoleil, ou plutôt celle de Mars & de Vénus. Le 5 Octobre 1751 le bord boréal de Mars paroiſſoit à 1′ 25″ 8 au-deſſous du parallele de l'étoile λ du verſeau au Cap de Bonne-Eſpérance, 33° 55′ au midi de l'équateur, Mars étant à 25° 0′ du zénit; le même jour à Stockholm qui eſt à 59° 21′ de latitude ſeptentrionale, la même différence de déclinaiſon entre le bord boréal de Mars & l'étoile λ du verſeau paroiſſoit de 1′ 57″ 7, & Mars étoit à 68° 14′ du zénit; ces deux différences de déclinaiſon qui devroient être égales, diffèrent l'une de l'autre de 31″ 9. Si l'on diviſe cette différence par la ſomme des ſinus des diſtances au zénit, 0, 4226; 0, 9287, ou par 1, 3513 l'on aura 23″ 6 parallaxe horizontale de Mars (M. de la Caille, *Leçons d'aſtr. pag.* 216).

1653. L'opération précédente ſuppoſe la terre parfaitement ſphérique; mais lorſqu'il s'agit de la parallaxe de la lune on ne ſauroit négliger l'applatiſſement de la terre; il faut alors diminuer de quelques minutes les deux diſtances au zénit, obſervées, (en ſuppoſant que le zénit de l'obſervateur ſoit entre la lune & le pole élevé); & les multiplier chacune par le rayon correſpondant de la terre avant que d'employer la règle précédente.

Il faut conſidérer l'applatiſſement de la terre.

L'ellipſe *BECP* (*fig.* 92) repréſente une moitié du ſphéroïde terreſtre, *T* eſt le centre, *TP* eſt l'axe de la terre, *E* l'équateur, *B* & *C* ſont les deux obſervateurs que je ſuppoſe placés ſous le même méridien & obſervant à la fois la lune en *L*; *ZBM*, *zCN* ſont les perpendiculaires à la ſurface de l'ellipſe en *B* & en *C*, l'angle *LBZ* eſt la diſtance apparente de la lune au zénit, pour l'obſervateur *B*, *LCz* eſt la diſtance apparente pour l'obſervateur *C*. On calculera les angles *MBT*, *NCT* formés par les perpendiculaires à la ſurface de la terre, en *B* & en *C*, & par les rayons *BT* *Fig.* 52.

Fig. 92. & CT menés au centre de la terre (2679); on les retranchera des diſtances au zénit, & l'on aura les angles LCD, LBA ou les diſtances corrigées, dont on fera à peu-près le même uſage que nous avons fait ci-devant des diſtances au zénit dans la terre ſphérique (1651). Puiſque $TB : TL ::$ ſin. TLB : ſin. TBL ou ABL, on aura lorſque l'angle B ſera droit, $\frac{TB}{TL}$ égal au ſinus de la parallaxe horizontale à Berlin (1624); de même $\frac{CT}{TL}$ eſt le ſinus de la parallaxe horizontale au Cap de Bonne-Eſpérance, ou au point C; ainſi le ſinus de la ſomme, ou de l'angle $BLC = \frac{CT}{TL}$ ſin. $LCD + \frac{TB}{TL}$ ſin. LBA, (3617) en ſuppoſant le coſinus de chaque parallaxe égal à l'unité; donc la diſtance $TL = \frac{CT \text{ ſin. } LCD + TB \text{ ſin. } LBA}{\text{ſin. } BLC}$; & le ſinus de la parallaxe horizontale à Paris, ou dans un autre lieu quelconque dont on connoîtra la diſtance au centre de la terre ſera égal à cette diſtance ou au rayon de la terre multiplié par $\frac{\text{ſin. } BLC}{CT \text{ ſin. } LCD + TB \text{ ſin. } LBA}$. Dans cette formule on fait uſage des deux rayons de la terre TC & TB dont on trouvera la valeur dans le XVe. livre, (2680, 2690), & ci-après (1705).

1654. Nous remarquerons ici que quand la lune eſt au méridien, la parallaxe de hauteur, même dans le ſphéroïde applati eſt exactement proportionnelle au ſinus de la diſtance au zénit LBZ, diminuée de la valeur de l'angle MBT ou ABZ, c'eſt-à-dire, au ſinus de l'angle LBA, ou de l'angle LBT, cela eſt évident par la conſidération ſeule du triangle (1628). Nous ferons uſage de cette conſidération, (3942).

Ces trois méthodes qui ſervent à trouver en général la parallaxe d'un aſtre, ſont applicables à tous les aſtres & en particulier au ſoleil & à la lune; mais il y a des méthodes particulières à ces deux aſtres, telles ſont pour

pour la lune la méthode des éclipſes (1635); pour le ſoleil la méthode des quadratures de la lune (1722), & celle des paſſages de Vénus ſur le ſoleil qui eſt la meilleure de toutes. L'importance des parallaxes du ſoleil & de la lune, la multitude des tentatives qu'on a faites pour les bien connoître, & l'uſage que nous en ferons dans le cours de cet ouvrage, exige que nous en traitions ſéparément avec un certain détail.

PARALLAXE DE LA LUNE.

1655. LES anciens avoient une idée bien imparfaite des diſtances des planètes & de leurs parallaxes; quoique la lune fût celle dont il étoit le plus facile de connoître l'éloignement, on la croyoit beaucoup plus près de nous qu'elle n'eſt réellement.

La diſtance de la Lune inconnue 600 ans av. J. C.

Pythagore jugeoit la diſtance de la lune à la terre de 126 mille ſtades, (*Plin. hiſt. nat. II*, 21); & comme le ſtade étoit d'environ 95 toiſes (2640), cette diſtance ne va pas à 6 mille lieues, au lieu de 80 mille que nous trouvons actuellement, d'où l'on peut juger qu'au temps de Pythagore 612 ans avant J. C., l'on n'avoit encore fait aucune obſervation propre à déterminer cette diſtance.

Hipparque, au rapport de Ptolomée (*Alm. V*, 11), avoit entrepris par de certaines conjectures tirées des éclipſes de trouver les diſtances de la lune à la terre; mais par la difficulté & l'incertitude de ſa méthode, il avoit trouvé des différences conſidérables dans ſes réſultats. Cependant on voit qu'il jugeoit la plus grande diſtance de la lune entre $72\frac{1}{2}$ & 83 demi-diamètres de la terre, & la plus petite entre 62 & 71. Ces limites ſont établies aujourd'hui de 56 à 64; Hipparque avoit donc de la parallaxe une idée beaucoup plus exacte qu'on ne l'avoit eue avant lui.

1656. La diſtance de la lune, ſuivant Poſidonius, étoit de deux millions de ſtades, *Vicies centum millia*

ſtadiorum, Pline II. 23 ; cette diſtance revient à 87165 lieues, & elle approche beaucoup de celle que nous trouvons aujourd'hui ; on lit de même dans la grande édition du P. Hardouin ; mais ce qu'il y a de ſingulier, c'eſt que le P. Hardouin dans ſa note ſur ces mots-là, ſuppoſe qu'il n'y ait point *Millia*, mais ſeulement *Vicies centum*, c'eſt-à-dire, 2000 ſtades, puiſqu'il l'évalue à 250 mille pas, (le ſtade étoit de 125 pas Romains, ou 95 toiſes de Paris), tandis que *Vicies centum millia ſtad.* ſignifie 250000000 pas, mais il eſt clair qu'il faut rejetter la note du P. Hardouin, & s'en tenir au texte, *Vicies centum millia*, parce que Poſidonius ne pouvoit pas ſuppoſer la lune 1000 fois plus près de nous qu'elle n'eſt réellement, ſur-tout les obſervations d'Hipparque ayant été faites avant lui ; d'ailleurs les anciens ne ſe ſervoient jamais de l'expreſſion, *Vicies centum*, pour ſignifier ſimplement deux mille ; mais *Vicies centum millia*, eſt la maniere de parler des anciens auteurs. Voy. ce que j'en ai dit dans les mém. de 1752, *pag.* 84.

1657. Ptolomée obſerva la lune par le moyen de ſes règles parallactiques, lorſqu'elle étoit dans le tropique d'été à $2^\circ \frac{1}{8}$ du zénit d'Alexandrie, & lorſqu'elle étoit dans le tropique d'hiver à $50^\circ\ 55'$, il trouva, par le moyen de ſes tables, que dans le temps de cette derniere obſervation la lune n'étoit véritablement qu'a $49^\circ\ 48'$ du zénit, d'où il conclut une parallaxe de 67 minutes ; enfin il détermina la plus grande diſtance de la lune de 64 demi-diamètres & la plus petite de 34, c'eſt-à-dire la parallaxe entre $54'$ & $1^\circ\ 41'$.

1658. Les Arabes ne corrigèrent point les erreurs de Ptolomée en cette partie ; mais Alphonſe, Roi de Caſtille, diminua beaucoup cette parallaxe. Copernic détermina enſuite par des obſervations faites en 1522, les diſtances de la lune de 68 & 52 demi-diamètres terreſtres ou la parallaxe entre $50'$ & $66'$! On ne ſauroit faire un plus bel éloge de ſon travail, qu'en diſant que Tycho, après un grand nombre de bonnes obſervations faites 60 ans après, avec une prodigieuſe collection d'inſtru-

mens ne trouvoit rien à changer à la plus grande parallaxe de Copernic; il ſe contenta d'augmenter la plus petite parallaxe juſqu'à $56' \frac{1}{4}$.

On verra dans l'Almageſte de Riccioli, & dans un mémoire que j'ai donné ſur la parallaxe de la lune. (*Mém. acad.* 1752, *pag.* 87), les ſentimens de différens auteurs ſur la parallaxe : voici une table où ces diverſes opinions ſont rapprochées.

TABLE des Parallaxes ſelon différens Aſtronomes.

Noms des Auteurs.	La plus grande parallaxe.	La plus petite parallaxe.
Hipparque, 120 ans avant J. C.	48′ 30″	41′ 30″
Le même, par d'autres obſervations.	55 30	47 30
Ptolomée, 147 ans après J. C.	103 0	53 34
Alphonſe, Roi de Caſtille, en 1284.	63 17	53 19
Copernic, mort en 1543.	65 48	50 19
Tycho, mort en 1601.	65 36	56 44
Képler, dans ſes éphémérides, 1616.	60 58	54 41
Dans ſes Tables Rudolphines, 1627.	63 41	58 22
Boulliaud, en 1645.	63 43	53 30
Riccioli, en 1651.	66 56	51 32
M. de la Hire, en 1702.	61 25	52 17
M. Halley, en 1719.	61 7	53 29
M. Caſſini, en 1740.	62 11	54 33
M. le Monnier, *Inſt. aſtr.* 1746.	61 8	53 29
M. Euler, dans ſes Tables, en 1760.	61 15	52 42
Suivant les Tables de M. Mayer.	61 32	53 57
Suivant mes obſervations (1713).	61 29	53 51

Quantité de la parallaxe de la lune.

1659. Comme la méthode des plus grandes latitudes de la lune eſt une des plus avantageuſes pour obſerver la parallaxe de la lune, les aſtronomes ont continué d'en faire uſage auſſi bien que Ptolomée; M. le Monnier, en publiant les tables de la lune de Flamſteed en 1746, obſerva que cet auteur dans ſes premieres tables publiées en 1680, avoit fait la parallaxe horizontale de la lune au temps de ſes moyennes diſtances & dans les ſyzygies, de 58′ 2″ $\frac{1}{2}$, M. Newton de 57′ 30″; mais par les plus grandes latitudes de la lune obſervées depuis 7 à 8 ans, il l'avoit trouvée de 57′ 2″ $\frac{1}{2}$. (*Inſtit. aſtr. pag.* 185). Pour moi je l'ai trouvée de 57′ 26″, beaucoup plus approchante de celle de Newton, & cela par la meilleure de toutes les méthodes, c'eſt-à-dire, par les obſervations ſimultanées faites en 1752 au Cap de Bonne-Eſpérance & à Berlin, dont je donnerai le réſultat ci-après (1711): on verra que la plus grande parallaxe de la lune qui a lieu pour Paris quand la lune eſt pleine & périgée, eſt de 61′ 29″, & la plus petite parallaxe de 53′ 51′, la lune étant nouvelle & apogée (a).

De la parallaxe de la Lune en longitude.

1660. Il ne ſuffit pas dans les calculs aſtronomiques de connoître la parallaxe horizontale, il faut ſouvent en connoître l'effet en longitude; la plupart des auteurs qui ont écrit ſur le calcul des éclipſes de ſoleil, ont employé la parallaxe en longitude pour trouver le lieu apparent de la lune. Quoiqu'on puiſſe s'en paſſer, comme je le ferai voir dans le livre ſuivant, je donnerai cependant ici la méthode la plus sûre de trouver la parallaxe en longitude & en latitude avec un exemple détaillé.

Nonagéſime.

La méthode employée par Képler eſt celle du Nonagéſime; on appelle Nonagésime le point de l'écliptique éloigné de 90 degrés des deux ſections de l'horizon & de l'écliptique, ou des points qui ſe levent

(a) Nous indiquerons (dans le livre XXII), une méthode qui a été employée pour trouver la parallaxe de la lune, par la longueur du pendule à ſecondes, ou par le nombre de pieds que les corps graves parcourent ſous l'équateur (3483).

& qui ſe couchent ; ainſi la longitude du Nonagéſime eſt moindre de trois ſignes que celle du point *aſcendant, de l'horoſcope*, (1055) ou du point orient de l'écliptique, c'eſt-à-dire, du point ſitué à l'horizon du côté de l'orient.

Soit le méridien $HZEC$ (*fig.* 93), l'horizon $HOBC$; *Fig.* 93. l'écliptique $ENRTO$ priſe dans l'hémiſphère oriental ; E le point culminant de l'écliptique, c'eſt-à-dire, le point qui paſſe dans le méridien, & dont l'aſcenſion droite eſt celle du milieu du ciel (1011). Le point O de l'écliptique qui ſe leve au même inſtant, eſt le point orient, ou l'horoſcope (1055) ; l'arc ON étant pris de 90 degrés, le point N eſt le nonagéſime. Si par le pole P de l'écliptique & par le zénit Z on tire un cercle $PZNB$, ce cercle ſera tout à la fois un cercle de latitude, puiſqu'il paſſe par le pole de l'écliptique ; & un vertical, puiſqu'il paſſe par le zénit : il ſera perpendiculaire à l'écliptique en N & à l'horizon en B ; l'arc NB ſera la hauteur du nonagéſime ; mais parce que NO eſt un quart de cercle & que l'angle B eſt droit, le point O eſt le pole de l'arc NB ; & l'angle NOB qui a pour meſure l'arc NB eſt auſſi égal à la hauteur du nonagéſime. Enfin l'arc PZ compris entre le pole & le zénit eſt encore égal à la hauteur du nonagéſime ; car ſi des arcs PN & ZB qui ſont chacun de 90 degrés l'on ôte la partie commune ZN, il reſtera PZ égal à NB, qui eſt la hauteur du nonagéſime.

Si l'angle OEC eſt obtus, l'arc EO de l'écliptique ſera auſſi plus grand que 90° ; c'eſt ce qui arrive quand le point E eſt dans les ſignes aſcendans 9, 10, &c. ou que l'aſcenſion droite du milieu du ciel eſt depuis 18 heures juſques à 24 heures ou 0^h, & depuis 0^h juſqu'à 6 heures, alors le nonagéſime N eſt dans l'hémiſphère oriental, comme dans la *figure* 93 ; mais quand l'aſcenſion droite du milieu du ciel eſt plus grande que 6 heures & moindre que 18, l'angle OEC eſt aigu, & l'arc EO moindre que 90 degrés, le nonagéſime ſe

Fig. 93. trouve en *M* dans la partie occidentale du ciel & de l'autre côté du méridien. Tout cela doit s'entendre des pays qui, comme le nôtre, ſont dans l'hémiſphère boréal de la terre. Si l'on veut une règle plus univerſelle, on remarquera que le triangle *OEC* ſitué dans la partie orientale de l'hémiſphère doit être pris de manière que ſon côté *EC* qui eſt la hauteur du point culminant n'excède jamais 90 degrés, moyennant cette précaution, on aura toujours l'angle *OEC* obtus, l'arc *OE* plus grand que 90 degrés, & le nonagéſime à l'orient dans les ſignes aſcendans *en général* (1662), c'eſt-à-dire, dans ceux où eſt le ſoleil quand il va en montant ou qu'il ſe rapproche du zénit d'un jour à l'autre. Ce ſera tout le contraire dans les ſignes deſcendans en général.

1661. Lorſqu'à un inſtant donné l'on veut connoître la longitude du nonagéſime, on cherche l'aſcenſion droite du milieu du ciel (1011), ou le point de l'équateur qui eſt dans le méridien; enſuite la longitude du point *E* de l'écliptique qui y répond, avec ſa déclinaiſon & l'angle de l'écliptique avec le méridien (898). Cela fait, on a la hauteur du point culminant *E* de l'écliptique, égale à la hauteur connue de l'équateur, plus ou moins la déclinaiſon trouvée.

Ainſi dans le triangle *EOC* rectangle en *C*, connoiſſant la hauteur *CE* du point culminant, & l'angle *CEO* du méridien avec l'écliptique dans ce point-là; on cherchera l'angle *EOC* en diſant, *R* : cof. *CE* :: ſin. *E* : cof. *O* (3669); c'eſt-à-dire, *le rayon eſt au coſinus de la hauteur du point culminant, comme le ſinus de l'angle de l'écliptique avec le méridien eſt au coſinus de la hauteur du nonagéſime.*

Règle pour la hauteur du Nonagéſime.

1662. On a enſuite dans le triangle *OEC* cette autre proportion, *R* : cotang. *CE* :: cof. *E* : cotang. *OE*, (3668); mais l'arc *NE* de l'écliptique compris entre le point culminant & le nonagéſime eſt le complément de *OE*; ainſi l'on aura *R* : cot. *CE* :: cof. *E* : tang. *NE*, ou tang. *CE* : *R* :: cof. *E* : tang. *NE*, c'eſt-à-dire, *la tan-*

gente de la hauteur du point culminant eſt au rayon, comme le coſinus de l'angle de l'écliptique avec le méridien eſt à la tangente d'un arc, qu'il faut ajouter à la longitude du point culminant *E*, ſi ce point eſt dans les ſignes aſcendans pris en général, & retrancher dans les ſignes deſcendans, pour avoir la longitude du nonagéſime *N*. (Voyez *l'Exemple art.* 1675). Les ſignes aſcendans pris en général ſont ceux dans leſquels le ſoleil ſe trouve quand il ſe rapproche du zénit, ou que ſa hauteur méridienne augmente d'un jour à l'autre ; ainſi un pays de la terre ſitué même dans l'hémiſphère boréal à 10 degrés, aura les ſignes aſcendans depuis le Capricorne juſqu'à 26 degrés du Bélier ; & depuis le Cancer juſqu'à 4 degrés de la Vierge. Règle pour la longit. du Nonagéſime.

Ce ſont ces ſignes aſcendans pris en général qu'il faut employer dans la règle précédente ; & il faut rectifier ainſi le paſſage de M. de la Caille, (*pag* 389 *lig.* 21), où il dit qu'on ajoute au point culminant *lorſque ce point eſt dans le premier & dans le dernier quart de l'écliptique*. Cela n'eſt vrai que pour les pays ſitués hors de la Zone torride.

1663. Quand on a la longitude du nonagéſime & la longitude de la lune, on prend leur différence, qui eſt la diſtance de la lune au nonagéſime (1676) ; cette différence jointe avec la hauteur du nonagéſime & la latitude de la lune, ſuffit pour trouver la parallaxe de la lune en longitude & en latitude : voici des formules aſſez commodes pour cet effet. Expreſſion de la Parallaxe en long. t.

Soit *L* le lieu vrai de la lune (*fig.* 93), *S* ſon lieu apparent dans le vertical *ZLS*, *PLR* le cercle de latitude qui paſſe par le lieu vrai de la lune, *PST* celui qui paſſe par le lieu apparent ; *LR* eſt la latitude vraie ; *ST* la latitude apparente, & ayant pris *PI* égal à *PL*, l'arc *IS* eſt la parallaxe de latitude ; l'arc *RT* de l'écliptique eſt la parallaxe de longitude. *Fig.* 93.

Si l'on nomme *p* la parallaxe horizontale de la lune, on aura la parallaxe de hauteur *LS* égale à *p* ſin. *ZS*, (1629) ; dans le triangle rectiligne rectangle *ISL* on a *IL* =

Fig. 93. SL sin. S; donc la parallaxe de longitude $TR = \frac{p.\ \text{sin.}\ ZS\ \text{sin.}\ S}{\text{sin.}\ PS.}$, en calculant suivant l'article 891, & prenant PS pour PI, parce que ces arcs étant toujours forts grands, les différences des sinus d'un degré à l'autre sont fort petites. On a aussi dans le même triangle $IS = IL$ cot. S (3611) $= p.$ sin. $ZS.$ sin. S cotang. $S.$ C'est la parallaxe de latitude; il faut faire évanouir l'angle S des deux expressions précédentes.

Dans le triangle PZS l'on suppose connus deux côtés & l'angle compris, savoir, PZ, PS & l'angle P, c'est-à-dire, la hauteur du nonagésime, les distances apparentes de la lune au pole de l'écliptique & au nonagésime; on a donc (3722) la tangente de l'angle $S = \frac{\text{sin.}\ ZPS}{\text{cot.}\ PZ.\ \text{sin.}\ PS. - \text{cos.}\ P.\ \text{cos.}\ PS.}$ ou bien la cotangente de $S = \frac{\text{cot.}\ PZ.\ \text{sin.}\ PS. - \text{cos.}\ P.\ \text{cot.}\ PS.}{\text{sin.}\ P.}$, & multipliant le numérateur & le dénominateur par tangente PZ, cotang. $S = \frac{\text{sin.}\ PS. - \text{cos.}\ P.\ \text{cos.}\ PS.\ \text{tang.}\ PZ.}{\text{sin.}\ P.\ \text{tang.}\ PZ.}$; cette valeur multipliée par $p.$ sin. $ZS.$ sin. S, donnera celle de IS, paral. de latit. $= \frac{p.\ \text{sin.}\ PS.\ \text{sin.}\ ZS.\ \text{sin.}\ S. - p.\ \text{cos.}\ P.\ \text{cos.}\ PS.\ \text{sin.}\ ZS.\ \text{sin.}\ S\ \text{tang.}\ PZ}{\text{sin.}\ P\ \text{tang.}\ PZ}$; mais sin. $ZS = \frac{\text{sin.}\ PZ.\ \text{sin.}\ P}{\text{sin.}\ S}$, (3710) substituant cette valeur dans l'expression de la parall. en latitude IS, on aura $\frac{p.\ \text{sin.}\ PS.\ \text{sin.}\ S.\ \text{sin.}\ PZ.\ \text{sin.}\ P.}{\text{sin.}\ P.\ \text{tang.}\ PZ.\ \text{sin.}\ S} - \frac{p.\ \text{cos.}\ P.\ \text{cos.}\ PS.\ \text{sin.}\ S.\ \text{tang.}\ PZ.\ \text{sin.}\ PZ.\ \text{sin.}\ P}{\text{sin.}\ P.\ \text{tang.}\ PZ.\ \text{sin.}\ S}$; effaçant tous les termes qui se détruisent, la formule se réduit à $\frac{p.\ \text{sin.}\ PS.\ \text{sin.}^2\ Z}{\text{tang.}\ PZ} - p.$ cos. $P.$ cos. $PS.$ sin. PZ; & mettant cos. PZ à la place de $\frac{\text{sin.}\ PZ}{\text{tang.}\ PZ}$, elle devient $= p.$ sin. $PS.$ cos. $PZ. - p.$ cos. P cos. $PS.$ sin. PZ; mais on a cos. $PZ = \frac{\text{sin.}\ PZ}{\text{tang.}\ PZ}$, & sin. $PS =$ tang. $PS.$ cos. PS; ainsi l'on pourra la mettre sous cette forme: la parallaxe de latitude $= p.$ cos. $PS.$ sin. $PZ\left(\frac{\text{tang.}\ PS}{\text{tang.}\ PZ} - \text{cos.}\ P\right)$.

1664.

1664. Pour trouver la parallaxe de longitude TR, on reprendra ſa valeur donnée ci-deſſus, $TR = \frac{p.\ \text{ſin.}\ ZS.\ \text{ſin.}\ S}{\text{ſin.}\ PS}$ & ſubſtituant pour ſin. ZS ſa valeur $\frac{\text{ſin.}\ PZ.\ \text{ſin.}\ P}{\text{ſin.}\ S}$, (3690) on a la parallaxe de longitude $\frac{p.\ \text{ſin.}\ PZ\ \text{ſin.}\ P}{\text{ſin.}\ PS.}$ *Fig. 63.*

1665. A la place des lettres nous pouvons mettre les choſes qu'elles expriment; par exemple, coſ. PS eſt la même choſe que le ſinus de la latitude apparente ST; ſin. PZ eſt le ſinus de la hauteur du nonagéſime (1660); l'angle P, ou NPT, eſt la diſtance apparente de la lune au nonagéſime, puiſque cet angle eſt meſuré par l'arc TN de l'écliptique compris entre la lune & le nonagéſime; ainſi les expreſſions précédentes de TR & de IS, ſe changeront en celles-ci : par. longit. $= \frac{\text{par. hor. ſin. diſt. au non. ſin. haut. du non.}}{\text{coſ. latit.}}$, & par. latit. $= \left(\frac{\text{cotang. lat.}}{\text{tang. haut. du non.}} - \text{coſ. diſt. au non.}\right)$ (par. horiz. ſin. haut. du non. ſin. latit.).

1666. Si l'on nomme p la parallaxe horizontale, l la latitude apparente, d la diſtance apparente de la lune au nonagéſime, h la hauteur du nonagéſime; on aura la parallaxe de longitude $= \frac{p\ \text{ſin.}\ d\ \text{ſin.}\ h}{\text{coſ.}\ l}$ & la parallaxe de latitude $= p$ ſin. h ſin. $l\left(\frac{\text{cot.}\ l}{\text{tang.}\ h} - \text{coſ.}\ d\right)$. Parallaxe de longit.

1667. Cette expreſſion ſe réduit à celle-ci encore plus commode pour l'uſage p. coſ. h coſ. $l - p$ ſin. l ſin. h coſ. d, parce que ſin. l cot. $l =$ coſ. l & $\frac{\text{ſin.}\ h}{\text{tang.}\ h} =$ coſ. h; je dis qu'elle eſt plus commode, parce que dans le calcul (1677), on ſe contente d'abord, ſi l'on veut, de la première partie p coſ. h coſ. l, & même de p coſ. h, car en ſuppoſant l de $5^\circ\frac{1}{4}$, il n'y a jamais plus de $19''$ d'erreur à craindre dans cette ſuppoſition, lors même que la parallaxe eſt de $61'\frac{1}{4}$.

1668. Ainſi la formule qui exprime la parallaxe de latitude (1667), eſt compoſée de deux parties; la

première qui eſt p cof. h cof. l, ne dépend point de la diſtance de la lune au nonagéſime, & c'eſt la partie principale de la parallaxe en latitude ; dans le calcul des éclipſes de ſoleil la latitude de la lune étant extrêmement petite, ſon coſinus eſt ſenſiblement égal au rayon ou à l'unité : ainſi l'on a pour la première partie de la parallaxe en latitude p cof. h. Pour avoir exactement cette première partie de la parallaxe en latitude, dans tous les cas, il faut *multiplier la parallaxe horizontale de la lune par le coſinus de la hauteur du nonagéſime, & par le coſinus de la latitude.*

Premiere partie de la Parallaxe en latitude,

1669. La ſeconde partie de la parallaxe en latitude eſt p ſin. l ſin. h coſin. d ; on la trouve en *multipliant la parallaxe horizontale par le ſinus de la latitude de la lune, le ſinus de la hauteur du nonagéſime, & le coſinus de la diſtance apparente de la lune au nonagéſime.* Cette ſeconde partie eſt toujours très-petite, parce que le ſinus de la latitude de la lune qui eſt un des facteurs, eſt à peine un dixième de l'unité, lors même que la latitude de la lune eſt la plus grande ; cette ſeconde partie devient comme nulle dans les éclipſes de ſoleil où la latitude n'eſt jamais que d'un demi-degré, & ſin. l environ un centième : dans des éclipſes d'étoiles où la latitude de la lune ſeroit de 6 degrés, & la lune ſituée dans le nonagéſime à $58\frac{1}{2}$ degrés de hauteur, la parallaxe horizontale étant de 1°, cette ſeconde partie ſeroit de $5' 21''$, & ne pourroit ſe négliger.

1670. On peut encore ſimplifier cette ſeconde partie de la parallaxe en latitude, en conſidérant qu'elle eſt égale à la parallaxe en longitude trouvée ci-deſſus (1666), multipliée par le ſinus de la latitude de la lune, & diviſée par la tangente de la diſtance au nonagéſime ; en effet, ſi la parallaxe de longitude eſt égale à $\frac{p \text{ ſin. } d \text{ ſin. } h}{\text{cof. } l}$, ou ſimplément p ſin. d ſin. h dans les éclipſes, on a $p = \frac{\text{par. long.}}{\text{ſin. } d \text{ ſin. } h}$, ſubſtituant cette valeur de p dans

l'expreſſion, p ſin. h ſin. l coſ. d, elle deviendra = $\frac{\text{par. long. ſin. } l \text{ coſ. } d}{\text{ſin. } d.}$; mais $\frac{\text{coſ. } d}{\text{ſin. } d}$ = cotang. d, donc on a par. long. ſin. l cot. d, pour la ſeconde partie de la parallaxe en latitude dans les éclipſes de ſoleil.

Seconde partie de la parallaxe en latitude.

1671. Hors des éclipſes on a $p = \frac{\text{par. longit. coſ. } l}{\text{ſin. } d \text{ ſin. } h}$, donc la ſeconde partie p de la par. = ſin. h ſin. l coſ d = $\frac{\text{par. long. coſ. } l. \text{ ſin. } l. \text{ coſ. } d}{\text{ſin. } d.}$ = par. long. ſin. l. cot. d coſ. l. deuxième partie de la parallaxe en latitude hors des éclipſes. On doit retrancher cette quantité de la première partie, p coſ. h. coſ. l, trouvée ci-deſſus (1668); ſi ce n'eſt dans le cas où la diſtance apparente de la lune au nonagéſime & ſa diſtance apparente au pole élevé de l'écliptique ſont de différente eſpèce, c'eſt-à-dire, l'une aiguë & l'autre obtuſe; car alors la ſeconde partie de la formule eſt additive, parce que ſin. l change de ſigne dès lors que la latitude de la lune eſt méridionale, (en ſuppoſant l'obſervateur dans nos régions ſeptentrionales); & coſ. d change quand la diſtance au nonagéſime ſurpaſſe 90 degrés. Il ne peut y avoir de difficulté pour le cas où la lune ſeroit ſituée entre le pole & le zénit; car le calcul de la formule donneroit une quantité à ſouſtraire d'une autre plus petite, c'eſt-à-dire, une parallaxe négative, & cela même avertiroit que la lune eſt entre le zénit & le pole élevé ou que la parallaxe diminue la diſtance au pole élevé, au lieu de l'augmenter, comme on le ſuppoſoit dans l'article 1663. On ſent bien que cette ſeconde partie doit être en général ôtée de la première, quand la lune eſt du côté du pole élevé, car la latitude boréale de la lune dans nos régions boréales rapproche la lune du zénit, & par conſéquent diminue ſa parallaxe, ainſi le terme qui marque preſque tout l'effet de la latitude doit ſe retrancher dans ce cas-là. S'il y a une exception pour le cas ou la diſtance au nonagéſime ſurpaſſe 90 degrés, c'eſt parce que dans ce cas-là le vertical fait un angle plus grand avec l'écliptique, & que

la lune eſt ſi baſſe, que la diminution de parallaxe provenant de la latitude n'égale pas l'augmentation qui vient de l'angle. Dans le point même qui eſt à 90 degrés du nonagéſime, la latitude ne change preſque rien à la parallaxe en latitude, parce que ſi elle augmente la hauteur, elle diminue l'angle du vertical avec l'écliptique.

1672. Cette ſeconde partie de la parallaxe en latitude renferme *cof. l.*, c'eſt-à-dire, qu'elle eſt multipliée par le coſinus de la latitude apparente; & il eſt néceſſaire d'y avoir égard dans les éclipſes d'étoiles fixes par la lune, car la latitude pouvant aller à 6 degrés, on pourroit commetttre une erreur de 20″ dans certains cas ſur la parallaxe, en ſuppoſant le coſinus de la latitude égal au rayon.

1673. Pour trouver la parallaxe de longitude & de latitude, par le moyen du nonagéſime, le P. Riccioli, (*Aſtr. réfor. præcep. pag.* 21), emploie une table qu'il appelle *Parallaxis mecoplatica* : en tête de la table eſt la parallaxe horizontale ; dans la colonne latérale la hauteur du nonagéſime, & dans la table on a une parallaxe de longitude qui auroit lieu, ſi la lune étoit à l'horizon même, c'eſt-à-dire, *p* ſin. *h*, car les nombres croiſſent comme les ſinus ; dans la même table avec cette parallaxe horizontale de longitude, & la diſtance de la lune au nonagéſime, on trouve la parallaxe *p* ſin. *d* ſin. *h*, qui n'a beſoin d'aucune correction, ſi la lune eſt près de l'écliptique, comme dans les éclipſes de ſoleil, mais à laquelle il faut ajouter une petite correction, à cauſe de cof. *l*, ſi la lune a une latitude. Cette correction ne va qu'à 8″ pour $5^{\circ}\frac{1}{4}$ de latitude, & 32′ de parallaxe de longitude. J'ai donné une petite table où l'on peut prendre cette correction, & autres ſemblables, dans la connoiſſance des mouvemens céleſtes de 1764, *pag.* 118.

Le P. Riccioli, pour trouver la parallaxe de latitude, cherche d'abord la hauteur du nonagéſime dans l'orbite de la lune, en ajoutant à la hauteur du nonag. une lati-

tude de l'orbite lunaire, priſe avec la diſtance du nonag. au nœud ; & dans la même table avec la parallaxe horizontale de la lune & le complément de cette hauteur du nonagéſime, il trouve la parallaxe de la lune en latitude p cos. h, qui eſt plus exacte que ſi l'on avoit employé la hauteur ſimple du nonagéſime, mais qui ne l'eſt pas autant que la formule que j'ai donnée ci-deſſus. Je paſſe à l'application de ces formules.

1674. EXEMPLE. Le 7 Avril 1749 j'obſervai l'immerſion d'*Antarès* à $1^h\ 1'\ 20''$ du matin, temps vrai, à l'hôtel de Clugny ; on demande pour ce moment la parallaxe de longitude & de latitude. Je ſuppoſe qu'on a déjà calculé pour le même temps le lieu du ſoleil, & celui de la lune par les tables ; & qu'on connoiſſe la hauteur du pole avec l'obliquité de l'écliptique : voici les nombres que j'avois employés dans mes premiers calculs, & qui pourront ſervir d'exemple, quoique les réſultats ſoient plus exacts ci-après (1978).

Lieu du ſoleil par les tables de Halley,	0ˢ	17°	19′ 10″
Lieu de la lune par les tables de Halley,	8	5	26 2
Latitude auſtrale de la lune,		3	47 20
Obliq. de l'écl. ſuppoſée pour ce temps-là,		23	28 23
Hauteur du pole du lieu de l'obſervateur,		48	50 10
Hauteur de l'équateur,		41	9 50
Aſcenſ. droite du ſoleil calculée (908),		15	57 44
Le temps vrai $13^h\ 1'\ 20''$ réduit en degrés,		195	20 0
L'aſcenſion du milieu du ciel (1011),		211	17 44
Ou en en retranchant 180 degrés,		31	17 44
La déclinaiſon méridionale qui répond à cette aſcenſion droite (898),		12	42 42
L'angle de l'éclipt. avec le méridien qui répond à la même aſcenſion droite $31°\ 17'\ 44''$ (898),		70	6 4
La long. qui répond à la même aſc. droite (898), ou la long. du point de l'éclipt. qui eſt dans le méridien, (diminuée de 180°),		33	32 3½

Ou en y ajoutant 180°, parce qu'on les avoit ôtés de l'aſcenſion droite, 7ˢ 3° 32′ 3″½

La hauteur de ce point culminant de l'écliptique, ou la différence entre ſa déclinaiſon 12° 42′ 42″ & la haut. de l'équat. 41° 9′ 50″ 28 27 8

On prendroit leur ſomme ſi la déclin. du point *E* étoit du côté du pole élevée.

1675. Le rayon eſt au ſinus de 70° 6′ 4″ qui eſt l'angle *CEO* (*fig.* 93), comme le coſinus de la hauteur du point culminant 28° 27′ 8″ eſt au coſinus de la hauteur du nonagéſime ou de l'angle *NOB* (1661), qui ſe trouve de 34° 14′ 11″. On cherchera auſſi le logarithme de la tangente de *CE*. On fera enſuite cette proportion: la tangente de la hauteur *CE* 28° 27′ 8″ eſt au rayon, comme le coſinus de l'angle *E* = 70° 6′ 4″ eſt à la tangente de l'arc *NE* de l'écliptique, compris entre le nonagéſime & le méridien, cet arc ſe trouvera de 32° 8′ 1″; étant ôté de la longitude du point culminant 7ˢ 3° 32′ 3″, puiſque la lune eſt dans les ſignes deſcendans (1662), il donnera la longitude du nonagéſime 6ˢ 1° 24′ 2″. Voici l'ordre & la diſpoſition du calcul.

Fig. 93.

T. longit.	17°	19′	10″	9,4939285	Cotang. Aſc.	31°	17′	44″ 10,2161655
Coſ. obl. écl.	23	28	23	9,9624865	coſ. obl. écl.			9,9624865
Tang. aſc. dr.	15	57	44	9,4564150	cot. long. *E*	33	32	3 10,1786520
T. vr. en deg.	195	20	0					
Somme,	211	17	44	ôtez 180°				
Sinus aſc. d.	31	17	44	9,7155461	ſin. *E*	70	6	4 9,9732640
Tang. obliq.	23	28	23	9,6377431	coſ. haut. *CE*	28	27	8 9,9440950
Tang. décl.	12	42	42	9,3532892	coſ. h. non.	34	14	11 9,9173590
Haut. équat.	41	9	50					
Haut. *CE*	28	27	8,	ou du point culmin.				
Coſin,	31	17	44	9,9317116	coſin. *E*	70	6	4 9,5319412
Sin.	23	28	23	9,6002296	ôtez tang. *CE*	28	27	8 9,7339002
Coſ. ang. *E*	70	6	4	9,5319412	tang. *NE*	32	8	1 9,7980410
					ou	1ˢ	2°	8′ 1″
Otez de la longitude du point culminant *E*, . .						7	3	32 3
Reſte la longitude du Nonagéſime *N*. . . .						6	1	24 2

1676. Pour avoir avoir la distance de la lune au nonagésime, il faut prendre la différence entre la longitude de la lune & celle du nonagésime, en ôtant la plus petite de la plus grande ; mais si la différence surpasse 6 signes, il faut ôter la plus grande de la plus petite en ajoutant 12 signes à celle-ci, par ce moyen la différence cherchée sera toujours moindre que 6 signes, & la lune sera à l'orient du nonagésime, si c'est le nonagésime que l'on a retranché; la lune sera occidentale, si c'est sa longitude qu'on a ôtée de celle du nonagésime, soit qu'on ait employé ces longitudes toutes seules, soit qu'on en ait augmenté une de 12 signes. Dans notre exemp. on ôte $6^s\ 1^\circ\ 24'\ 2''$, de $8^s\ 5^\circ\ 26'\ 2''$, il reste $64^\circ\ 2'$ pour la distance de la lune au nonagésime, la lune est orientale. On verra l'usage de cette considération, (1876).

1677. Connoissant la hauteur du nonagésime & sa distance à la lune, nous allons chercher les parallaxes de longitude & de latitude par les formules précédentes (1668 *& suiv.*).

Premier calcul ou approximation.

Log. paral. horiz. p, $57'\ 16''$ ou $3436''$	3,5360532
Log. sin. de la hauteur du nonag. h,	9,7502063
Log. sin. dist. de la lune au nonag. $64^\circ\ 2'$	9,9537833
Log. de p. sin. h sin. d.	3,2400428
Otez le log. du cos. de la lat. vr. $3^\circ\ 47'\ 20''$	9,9990497
Reste le log. de $29'\ 2''$ paral. de long. à peu-près,	3,2409931

On ajoutera cette parallaxe avec la distance vraie de la lune au nonagésime $64^\circ\ 2'$, & l'on aura la distance apparente $64^\circ\ 31'\ 2''$ qu'il faudra employer dans le calcul de l'article 1678.

Logarit. de la parallaxe horiz. p. $57'\ 16''$	3,5360532
Log. cos. de la hauteur du nonagésime,	9,9173603
Log. de $47'\ 21''$, paral. de latit. à peu-près.	3,4534135

On ajoutera cette parallaxe avec la latitude vraie 3° 47′ 20″, parce que la latitude de la lune eſt oppoſée au pole élevé de l'écliptique, & l'on aura la latitude apparente 4° 34′ 41″, qu'il faudra employer dans le calcul ſuivant pour plus d'exactitude.

1678. Logarit. de la parall. horiz. ou de p, 3436″ 3,5360532

Second calcul plus exact.

Log. ſin. h haut du nonag. 34° 14′ 11″	9,7502063
Log. ſin. d ou diſt. apparente de la lune au nonagéſime, 64° 31′ 2″	9,9555505
Log. p. ſin. h ſin. d.	3,2418100
Otez le log. coſ. latit. app. l, 4° 34′ 41″.	9,9986121
Reſte le log. de la parallaxe de longitude plus exacte 1750″ 4, ou 29′ 10″ 4	3,2431979

On employera les mêmes nombres pour la parallaxe en latitude.

Log. p. . . .	3,5360532	Log. p.	3,5360532
Log. coſ. h. .	9,9173603	Log. ſin. latit. ap.	8,9020962
Log. coſ. lat. ap.	9,9986121	Log. ſin. h. . .	9,7502063
Log. 2831″,6.	3,4520256	Log. coſ. diſ. ap. d.	9,6337106
		Log. 66″,4. . ,	1,8220663
C'eſt la premiere partie de la parallaxe en latit. (1668).		Seconde Partie.	

Ces deux parties de la formule étant ajoutées enſemble parce que ſin. l. & coſ. d. ſont de même eſpèce (1671), on aura exactement la parallaxe totale en latitude 2898″ ou 48′ 18″.

1679. Pour avoir la longitude apparente de la lune, on ajoute la parallaxe de longitude à la longitude vraie, ſi la lune eſt orientale, ou ſi c'eſt le nonagéſime que l'on a retranché; la parallaxe eſt ſouſtractive, ſi c'eſt le lieu de la lune qu'on a retranché de la longitude du nonagéſime.

L'on verra l'uſage de ces parallaxes de longitude & de latitude, dans le calcul des éclipſes, & des longitudes des pays de la terre, (1876, 1970).

1680.



Fig. 84.



Fig. 85.





Fig. 87.



Fig. 88.



Fig. 90.



Fig. 91.



Fig. 93.

Digitized by Google

1680. On abrege toutes les opérations des articles 1674 & 1675, par le moyen de la table du nonagéſime & de ſa hauteur, pour la latitude de Paris, que j'ai publiée dans la connoiſſance des temps de 1767 & de 1768; ſa forme eſt encore plus commode que celle des tables qui ſe trouvent dans Ptolomée, Copernic, Magini, Muler, Képler, Rénérius, Boulliaud & Riccioli; elle ne ſuppoſe que l'aſcenſion droite du milieu du ciel (1011). Par exemple, le 6 Avril 1749 à 13^h $1'$ $20''$ de temps vrai, la ſomme du temps vrai réduit en degrés & de l'aſcenſion droite du ſoleil, eſt de $211°$ $17' \frac{1}{4}$ (1674): on regarde la table vis-à-vis de $210°$ ou de 14^h $0'$, & ayant pris les parties proportionnelles, on trouve 6^s $1°$ $24'$ pour la longitude du nonagéſime, & $34°$ $14'$ pour la hauteur du nonagéſime à Paris, à peu-près comme dans les calculs précédens (1675). Cette table ſera d'une grande commodité dans tous les calculs, où l'on voudra ſavoir promptement & à peu-près la parallaxe de longitude & de latitude. L'aſcenſion droite du ſoleil en temps eſt toute calculée dans la connoiſſance des temps que je publie chaque année, car elle eſt le complément à 24^h de la diſtance de l'équinoxe au ſoleil (991).

1681. On trouveroit auſſi la longitude du nonagéſime par les tables des Maiſons (1057), & par celles des aſcenſions obliques, inſérées dans tous les vieux livres d'aſtrologie. (Voyez la *Connoiſſ. des mouv. cél.* 1767, *pag.* 227).

Equations de la Parallaxe dans le ſphéroïde applati.

1682. La terre ayant la figure d'un ſphéroïde applati vers les poles (2672), les différens points de la terre ne ſont pas à la même diſtance du centre, & la parallaxe horizontale de la lune, qui dépend de la diſtance qu'il y a du centre de la terre à la ſurface, ne

ſauroit être la même dans ces différens points.

Auteurs qui ont parlé de ces équations.

Depuis long-temps, les aſtronomes ont vu que l'applatiſſement de la terre qui eſt de $\frac{1}{230}$ environ, pouvoit produire ſur la parallaxe de la lune une erreur de 16″, qui ſeroit encore plus grande, ſi l'on admettoit avec M. Bouguer un applatiſſement de $\frac{1}{178}$; il étoit donc important de faire entrer la figure de la terre dans le calcul des parallaxes. Newton conſidéra le premier cette différence des parallaxes de la lune (*Princ. liv. III. prop.* 38. *cor.* 10). Depuis ce temps-là M. Manfredi, le P. Grammatici, M. de Maupertuis dans ſon traité de la parallaxe de la lune, M. Euler, dans les mémoires de Berlin pour 1749, & M. de l'Iſle (*Mém. acad.* 1757, *pag.* 490), donnèrent des méthodes pour tenir compte de l'applatiſſement dans les calculs aſtronomiques.

1683. Toutes ces méthodes étoient ſujettes à l'inconvénient d'une extrême longueur ; elles exigeoient une préciſion ſcrupuleuſe & fatiguante dans le calcul trigonométrique ; enſorte que les aſtronomes n'avoient point encore admis cette conſidération de l'applatiſſement de la terre dans le calcul des éclipſes, juſqu'au temps où je donnai dans les mémoires de l'académie pour 1756, & dans la connoiſſance des temps pour 1762, une méthode & des tables d'un uſage extrêmement commode, dont je vais expliquer la conſtruction & les principes. Toutes les autres méthodes étoient bonnes pour être appliquées à un exemple ; mais elles étoient de nature à ne pas être employées deux fois. L'objet que je me propoſai dans ces recherches fut de renfermer l'effet de l'applatiſſement de la terre dans une petite équation, qui ne changeroit rien à la méthode ordinaire de calculer les parallaxes, & qui pourroit ſe prendre ſans aucune partie proportionnelle, ou ſe négliger ſuivant les cas. M. du Séjour a donné enſuite une méthode analytique pour les éclipſes, dans laquelle il fait entrer la figure de la terre ſans alonger ſenſiblement le calcul (*Mém. acad.* 1764, *pag.* 215) ; mais

il eſt néceſſaire de donner ici des formules qui ſoient relatives à nos méthodes aſtronomiques.

1684. L'ellipſe *POE* (*fig.* 94), repréſente un méridien de la terre, *P* le pole élevé, *O* le lieu de l'obſervateur, *ON* la verticale ou la perpendiculaire à l'horizon & à la ſurface de la terre en *O*; *CNH* la méridienne horizontale, ou la commune ſection du méridien avec l'horizon; *CON* l'angle de la verticale avec le rayon *CO*, qui eſt à Paris d'environ 15′ à 19′ ſuivant les diverſes hypothèſes (1708), & que j'appelle *a*. La perpendiculaire *ON* eſt ſenſiblement égale au rayon *CO*, à cauſe de la petiteſſe de l'angle *CON*; la parallaxe qui auroit pour baſe *ON* ſeroit plus petite d'un cent millieme que la parallaxe horizontale, qui a pour baſe *CO*; mais on peut négliger ici cette différence, qui ne va qu'à un trentième de ſeconde (a). Si l'obſervateur *O* étoit ſitué en *N*, il verroit encore la lune dans le même vertical où il la voit du point *O*, & au même point d'azimut ſur l'horizon; mais cet azimut ou la lune paroît, vue du point *O* ou du point *N*, quand la lune n'eſt pas au méridien, eſt différent de celui où elle paroîtroit, ſi on l'obſervoit du centre *C* de la terre; les rayons menés du point *C* & du point *N* juſqu'à la lune, font alors un angle que j'appelle la PARALLAXE D'AZIMUT. Si le rayon dirigé vers la lune eſt perpendiculaire à *CN*, cette ligne *CN* ſera la ſous-tendante ou la meſure de la parallaxe d'azimut; puiſque dans les arcs très-petits les ſinus & les tangentes ne diffèrent pas ſenſiblement des arcs, & ſi l'on appelle *p* la parallaxe horizontale qui répond au rayon *CO* ou *ON*, l'on aura 1 ou *CO* : ſin. *a* ou *CN* :: *p* : parallaxe d'azimut; ainſi cette parallaxe qui répond à *CN* ſera = *p* ſin. *a*, la lune étant à l'horizon & ayant 90 degrés d'azimut, c'eſt-à-dire, étant dans le premier vertical.

Planche IX. Fig. 94.

Parallaxe d'azimut.

(a) Car le coſinus d'un angle de 15′, ne diffère du rayon que de 0,0000096, qui ſur 1° ne fait que un trentième de ſeconde.

1685. Si la lune s'éloigne vers le nord & que ſon azimut compté depuis le midi ſoit plus grand que 90 degrés, l'angle dont CN eſt la baſe, deviendra plus petit. Soit CN (*fig.* 95), la même ligne que dans la fig. 94, tracée ſéparément, & qui s'étend horizontalement du midi au nord depuis le centre de la terre juſqu'à la verticale; que le rayon CMR ſoit dirigé vers le point de l'horizon où la lune répond & qui marque l'azimut de la lune, égal à l'angle NCM, que j'appellerai z; la perpendiculaire NM abaiſſée du point N ſur CR ſera la meſure de la parallaxe d'azimut, au lieu de CN; en effet, c'eſt la même choſe, quant à cette parallaxe, que la lune ſoit vue du point C ou du point M, l'un & l'autre point étant dans un même vertical, & d'ailleurs il vaut mieux quant à la meſure de cette parallaxe conſidérer la lune comme vue du point M. Or $MN = CN$ ſin. NCM, ou CN ſin. z; la parallaxe qui répond à CN eſt p ſin. a, donc celle qui répond à MN eſt p ſin. a. ſin. z : c'eſt la valeur générale de la parallaxe d'azimut, la lune étant à l'horizon, avec un azimut égal à z.

Fig. 95.

1686. On verra dans la ſuite que la parallaxe d'azimut employée dans le calcul des éclipſes, (1892) doit être meſurée ſur un arc de grand cercle, tiré par le centre de la lune, parallèlement à l'horizon ou perpendiculairement au vertical; ce petit arc ne change point, quelle que ſoit la hauteur de la lune, parce qu'il eſt formé dans tous les cas par la rencontre des lignes qui ſont toutes deux menées des points M & N à la lune, ou dans le plan de l'horizon, ou dans un même plan dont la partie NM eſt horizontale, & qui vont ſe réunir à la lune; ainſi la parallaxe d'azimut pour une hauteur quelconque de la lune ſera encore p ſin. a ſin. z: on en verra l'uſage dans le calcul des éclipſes, où je me ſervirai de la différence d'azimut pour trouver la diſtance apparente des centres (1892).

Son expreſſion dans le calcul des éclipſes.

Pour épargner aux aſtronomes le calcul de l'azimut, j'ai dreſſé pour la latitude de Paris deux tables, (*Con-*

noiſſ. des temps, 1760, 1761, *Mém. acad.* 1756), qui ſe rapportent à la déclinaiſon de la lune & à ſa diſtance au méridien, elles contiennent la parallaxe d'azimut, & la correction de la parallaxe de hauteur, dont je vais bientôt parler, & peuvent ſervir dans preſque toute l'Europe, ſans qu'il y ait d'erreur ſenſible. Au reſte, comme il ſuffit de prendre l'azimut ſur un globe à 2 ou 3 degrés près, le calcul de ces deux petites équations n'ajouteroit que peu de choſe à celui des parallaxes.

Correction de la parallaxe de hauteur.

1687. Cette parallaxe d'azimut entraîne un petit changement dans la parallaxe de hauteur. En effet, ſi l'obſervateur étoit ſitué en N (*fig.* 94), la parallaxe de hauteur ſeroit meſurée par ON, & ſeroit p cof. h, ſuivant la règle ordinaire; mais la hauteur vraie vue du centre C de la terre eſt un peu moindre, ſi la lune eſt au midi du premier vertical; & un peu plus grande ſi la lune eſt au nord ou du côté du pole élevé, puiſque le rayon tiré du point C, & celui qui eſt tiré du point N n'ont pas la même inclinaiſon; il faut donc faire une correction à la parallaxe de hauteur trouvée par la règle ordinaire. *Fig.* 94.

Soit L (*fig.* 95), la lune hors du méridien; CML le plan du vertical dans lequel ſe trouve la lune, enſorte que l'angle LCM ſoit la hauteur de la lune vue du centre de la terre, la ligne CM étant à la fois & dans le plan de l'horizon, & dans le plan du vertical de la lune; ſoit auſſi le petit arc NM perpendiculaire ſur CM. La hauteur de la lune vue du centre C de la terre eſt plus petite que la hauteur vue du point N ou du point M, de la quantité de l'angle CLM; en effet, puiſque le petit arc NM eſt perpendiculaire ſur CM, il l'eſt auſſi ſur LM, parce qu'il eſt néceſſairement perpendiculaire au plan du vertical LMC, & à toutes les lignes tirées au point M de ce plan: ainſi la ligne NM étant comme infiniment petite par rapport à la grande diſtance LM, les lignes LM & LN ſont ſenſiblement égales; le point M eſt donc pla- *Fig.* 95.

Fig. 95. cé de la même façon & à la même distance de la lune L, que le point N, donc la hauteur de la lune vue du point N ou vue du point M est sensiblement la même. Mais la hauteur de la lune vue du point M, qui est l'angle LMR, est plus grande que la hauteur vue du point C, c'est-à-dire, que l'angle LCM, de la quantité de l'angle CLM, parce que dans le triangle CLM, on a l'angle extérieur LMR égal aux deux intérieurs pris ensemble LCM, CLM; donc la hauteur de la lune vue du point C est plus petite que la hauteur vue du point N, de la quantité CLM.

1688. Lorsque la lune est hors du méridien, cet angle CLM est plus petit que lorsque la lune est dans le méridien, & cela dans le rapport du cosinus de l'azimut au rayon. En effet, lorsque la lune est dans le méridien, (supposant que sa hauteur & sa distance soient les mêmes que dans le cas précédent), le point M tombe en N, l'angle LCN est la hauteur de la lune; car il faut concevoir le sommet L du triangle CLM relevé en l'air perpendiculairement au-dessus du plan de la figure. Si l'on examine dans ces deux cas la valeur de l'angle CLM, on verra que l'angle CLM a pour base la ligne CM, quand la lune est hors du méridien, & que dans le méridien il a pour base la ligne CN; comme tout est égal d'ailleurs, soit la distance CL, soit l'inclinaison du rayon CL sur la base CN ou CM, & que les lignes CM & CN sont extrêmement petites, les petits angles seront entre eux comme leurs bases CN & CM; mais dans le triangle CMN rectangle en N, CN est à CM comme le rayon est au cosinus de l'angle NCM qui est l'azimut de la lune; donc la différence CLM entre les hauteurs de la lune vues du point N & du point C, quand la lune est hors du méridien, est à cette même différence quand la lune est dans le méridien, à hauteur égale, comme le cosinus de l'azimut est au rayon.

1689. L'angle MLC, dans le cas où il seroit le plus grand & où il auroit pour base la ligne entière

CN ſeroit égal à p ſin. a (1684) ; car il ſeroit alors la parallaxe d'azimut : ſi donc il avoit pour baſe & pour meſure le petit arc CM, nommant z l'azimut NCM, on auroit cette proportion; 1 : coſin. z : : p ſin. a : CLM ; donc l'angle CLM ſeroit égal à p. ſin. a. coſin. z, dans le cas ou CL ſeroit perpendiculaire à CM ; mais à cauſe de l'obliquité de la ligne CL & de l'angle LCR ſur la baſe CM, qui diminue l'angle CLM, il n'a plus pour meſure que MS qui eſt à CM, comme le ſinus de la hauteur MCS eſt au rayon, ou comme ſin. h : 1, donc l'angle CLM eſt égal à p. ſin. a coſ. z. ſin. h. équation de la parallaxe de hauteur dans le ſphéroïde applati.

Valeur de cette correction.

Cette correction eſt additive à la parallaxe calculée pour le point N, lorſque la lune eſt entre le premier vertical & le pole élevé ; dans tous les autres cas, on la retranche de la parallaxe calculée par la méthode ordinaire, & l'on a la véritable parallaxe de hauteur dans le ſphéroïde applati. Je donnerai dans le livre ſuivant (1881) une méthode pour calculer les éclipſes par les ſeules parallaxes de hauteur & d'azimut ; c'eſt ce qui m'a déterminé à expliquer ici tout ce qui concerne ces parallaxes.

1690. Quand on calcule la parallaxe de hauteur par la formule p coſin. h (1629), on ſuppoſe le centre de la terre en N (*fig.* 94) ſur la verticale ON, & l'on trouve la différence entre le lieu vu du point O & le lieu vu du point N, avec la même parallaxe horizontale, qui a pour baſe ON égale à OC, ſoit ſur la terre ſphérique, ſoit dans le ſphéroïde ; mais comme c'eſt au centre C qu'il eſt néceſſaire de réduire le lieu de la lune, on eſt obligé d'ôter de la parallaxe p coſ. h la correction p. ſin. a. ſin. h. coſ. z, qui devient additive quand l'azimut compté du point du midi ou du point oppoſé au pole élevé eſt plus grand que 90 degrés : on trouvera une table de cette équation dans les endroits cités (1686).

Fig. 94.

Ainſi nous ſommes parvenus ſur la terre applatie ;

comme ſur la terre ſphérique, à réduire au centre *C* de la terre le lieu vu du point *O*, par un petit changement de hauteur & d'azimut; voyons la manière de faire cette même réduction par un petit changement dans la déclinaiſon ſeule, ou bien dans la longitude & la latitude.

Application à la méthode du nonagéſime.

1691. La Méthode où l'on employe les parallaxes de longitude & de latitude (1663), par le moyen du nonagéſime, exigeoit une correction pour l'applatiſſement de la terre, & c'eſt ce que M. de la Caille a donné dans la dernière édition de ſes leçons d'aſtronomie (*pag.* 223), & M. Pingré, dans les mémoires de 1764 (*pag.* 362), en ſuivant les principes de la méthode précédente que j'avois donnée quelques années auparavant; mais M. de la Caille n'ayant point démontré ſes formules, & ayant emprunté de M. de Maupertuis des choſes qui n'y ſont pas ſuffiſamment démontrées, je vais reprendre cette matière.

Fig. 94. La normale *ZON* (*fig.* 94), perpendiculaire à la ſurface de la terre au point *O*, où ſe trouve l'obſervateur, étant prolongée au-deſſous de l'horizon, va couper en *K* l'axe de la terre *PCKM*; ainſi un obſervateur placé en *K* verroit la lune ſur le même cercle horaire, à la même diſtance du méridien, & à la même aſcenſion droite que s'il étoit en *C*, parce que les points *C* & *K* ſont placés ſur l'axe de la terre & ſur le plan de tous les cercles de déclinaiſon qui ſe coupent dans la commune ſection *PCM*; ainſi la lune ne paroîtra point changer le plan de ſon cercle horaire, ni ſon aſcenſion droite, quand on tranſportera l'obſervateur de *C* en *K*.

On commence donc par employer la parallaxe qui répond à la ligne *OK*, pour réduire au point *K* le lieu vu de la ſurface de la terre, & comme les points *O* & *K* ſont dans le même vertical & dans la ligne même du zénit, il ne faut pour cela que la règle employée pour la terre ſphérique ou la formule *p* coſin. *h* (1629), en prenant ſeulement une parallaxe qui réponde au

rayon

rayon OK, au lieu de celle qui répondoit à ON, on ſera sûr qu'il n'y a aucune erreur dans la parallaxe d'aſcenſion droite calculée par ce moyen ; toute la différence produite par l'applatiſſement conſiſtera dans la parallaxe de déclinaiſon, dont nous allons parler, en ſuppoſant tôujours que la parallaxe horizontale qu'on employera convienne à l'intervalle OK, & non pas au rayon OC ou ON, dont nous avons fait uſage dans la méthode précédente.

Fig. 94. Il faut augmenter la parallaxe horizontale.

1692. L'obſervateur ſuppoſé en K, & celui qui ſeroit au centre C de la terre, ne voyent pas la lune à une même diſtance de l'équateur & du pole : la diſtance au pole vue du centre C eſt l'angle LCP, mais vue du point hypothétique K, c'eſt l'angle LKP, moindre que LCP ; la différence de ces deux diſtances au pole eſt l'angle CLK ; cet angle, dont nous donnerons la valeur ci-après (1696), eſt donc le changement qu'exige l'applatiſſement de la terre, & puiſque l'angle extérieur PCL eſt égal aux deux intérieurs PKL & CLK, il faut ajouter cette petite équation CLK à la diſtance de la lune au pole P trouvée pour le point K, ſi l'on veut la réduire au centre C & avoir la vraie diſtance de la lune au pole, qui eſt l'angle LCP.

Equation de la déclinaiſon.

De là il ſuit que lorſque la lune ſera du côté du pole élevé, c'eſt-à-dire, que ſa déclinaiſon ſera ſeptentrionale, l'obſervateur étant dans les pays ſeptentrionaux, ou méridionale, & obſervée dans les pays méridionaux, l'équation de l'applatiſſement ſera ſouſtractive de la déclinaiſon vue du point K, pour avoir la déclinaiſon vue du centre C de la terre. Lorſque la lune ſera par rapport à l'équateur, du côté du pole abaiſſé, on ajoutera à la déclinaiſon réduite au point K l'équation de l'applatiſſement, pour avoir la vraie déclinaiſon vue du centre de la terre ; mais dans les deux cas, il faûdra toujours retrancher de la parallaxe de déclinaiſon la même équation CLK, pour avoir la parallaxe de déclinaiſon par rapport au centre de la terre, à

Fig. 94. moins que la lune ne ſoit entre le zénit & le pole élevé.

1693. Ainſi pour trouver dans le ſphéroïde la ſituation de la lune pour le centre C de la terre, on fait deux réductions, l'une de O en K, & l'autre de K en C. La première de O en K nous fournit l'avantage de ne ſuppoſer que les règles ordinaires; ſavoir, que la parallaxe de hauteur eſt comme le coſinus de la hauteur apparente. La ſeconde a l'avantage d'être aſſez petite, & de ſe réduire auſſi à une règle fort ſimple (1696), ce qui en rend l'uſage facile.

La première & la plus grande de ces parallaxes réduit le lieu vu du point O à celui qu'on obſerve du point K, ſitué perpendiculairement au-deſſous de O; cette réduction ne ſuppoſe rien de plus que la parallaxe dans la ſphère, car l'angle OLK eſt proportionnel au ſinus de la diſtance au zénit comptée de la ligne ZOK: ainſi prenant le point K pour centre, & employant la parallaxe horizontale qui répond à la longueur OK, on aura par la règle ordinaire (1629), la parallaxe de hauteur OLK, qui donnera la hauteur vue du point K, auſſi-tôt qu'on aura la hauteur vue du point O. On auroit de même la longitude & la latitude vûes du point K au moyen de celles qu'on auroit obſervées à la ſurface de la terre, & cela par les formules ordinaires (1666).

Il faut enſuite en conclure ces mêmes quantités vues du point C, parce que c'eſt le centre de la terre auquel nous devons rapporter tous les mouvemens céleſtes, ſi nous voulons les dégager de leurs inégalités; le point K étant un point différent, ſuivant les différentes latitudes, la quantité CK ſera différente, auſſi bien que la quantité OK. Nous allons les déterminer.

1694. La parallaxe qui convient à OK, ſera toujours plus grande que la parallaxe horizontale qui eſt meſurée par OC; à Paris la différence eſt d'environ $17''$, qu'il faut ajouter à la parallaxe horizontale de

Paris pour avoir celle qui convient au centre K, ou à la distance OK, & pour pouvoir opérer par les règles ordinaires des parallaxes sphériques. On trouvera parmi les tables de la lune celle des quantités répondantes à NK, nous donnerons aussi dans le XVe. livre une table du rayon CO de la terre pour chaque latitude, & de l'angle $COK = a$; d'où il est aisé de conclure les petits côtés CN & NK, & l'on en trouvera encore une table ci-après (1705).

1695. On peut calculer cet excès NK de la nouvelle parallaxe, pourvu qu'on connoisse l'angle COK du rayon avec la verticale (1708). Dans le triangle NCK, on a cette proportion : le rayon est à la tangente de l'angle NCK, comme CN est à NK; donc $NK = CN$ tangente NCK; mais $CN = p$ sin. a (1684), & NCK est égale à la latitude du lieu O, car il est opposé par la pointe à l'angle de la hauteur du pole P, & il est le complément de l'angle OKP formé par la ligne verticale & par l'axe de la terre, donc $NK = p$ sin. a tang. lat. A Paris où la valeur moyenne de p. est de $57' 40''$, on aura la quantité p. sin. $15'$ tang. $48° 50'$ $= 17'' 3$ qu'il faut ajouter à la parallaxe moyenne pour Paris, si l'on veut avoir la parallaxe sur OK (1691).

Augmentation de la parallaxe. *Fig.* 54.

Elle est de 17″ pour Paris.

1696. Pour connoître l'équation de la déclinaison ou l'angle CLK, il faut abaisser sur le rayon de la lune LK la perpendiculaire CV qui, à raison de sa petitesse sera la mesure de l'angle CLK; cet angle marque la différence entre les distances au pole LCP LKC, ou entre les déclinaisons vues des points C & K. La perpendiculaire CV sera égale à CK cosinus déclin.; car dans le triangle rectiligne CKV, rectangle en V, on a cette proportion : CV est à CK, comme le sinus de CKV est au rayon; mais CKV ou PKL est la vraie distance de la lune au pole, & son sinus est le cosinus de la vraie déclinaison, donc $CV = CK$ cosinus déclinaison. A l'égard de CK, on en trouvera la valeur au moyen de $CN = p$ sin. a (1684); car dans le triangle CKN on a cette proportion : CK est à CN, comme le rayon est au

ſinus de l'angle CKN, qui eſt le complément de la latitude du point O, donc $CK = \frac{CN}{\text{cof. latit.}}$; mais $CN = p$ ſin. a, donc $CK = \frac{p \text{ ſin. } a}{\text{cof. lat.}}$, ſubſtituant donc cette valeur de CK dans celle de $CV = CK$ cof. déclin., l'on aura la valeur de CV & de l'angle CLK, $\frac{p \text{ ſin. } a \text{ cof. déclin.}}{\text{cof. haut. du pole.}}$. C'eſt l'équation de la déclinaiſon.

Equation de la déclinaiſon.

1697. Suppoſons comme à Paris l'angle a de 15′; & la latitude géographique 48° 50′; ſuppoſons auſſi la parallaxe horizontale moyenne de 57′ 40″, on aura CV = 23″ cof. déclin. Si la déclinaiſon de la lune eſt de 28°, l'équation de la déclinaiſon, produite par l'applatiſſement de la terre, ſera de 20″ 2, ſouſtractive du côté du pole élevé, & additive à la déclinaiſon de la lune, ſi la lune eſt du côté du pole abaiſſé, pour avoir la vraie déclinaiſon vue du centre C de la terre, au lieu de celle qu'on avoit trouvée pour le point K par les opérations précédentes. Il eſt facile de voir que la correction CLK de la déclinaiſon doit toujours s'ajouter à la diſtance de la lune au pole élevé qui eſt l'angle PLK, pour avoir la vraie diſtance PCL, lors même que la lune eſt entre le pole & le zénit, parce que l'angle extérieur PCL eſt toujours plus grand que l'angle intérieur CKL.

Toujours additive.

La table ci-jointe fait voir qu'au lieu de 23″, on auroit 30″ 4, ſi l'on ſuppoſoit l'applatiſſement de $\frac{1}{178}$, comme M. de Maupertuis, dans ſon *Diſcours ſur la parallaxe*, je ſuppoſe auſſi dans cette table que la parallaxe horizontale ſoit de 60′, ce qui rend plus faciles les réductions pour d'autres cas.

Déclinaiſon de la Lune.	Equation de la parall. en déclin.
0°	30″, 4
5	30, 3
10	30, 0
15	29, 4
20	28, 6
25	27, 6
30	26, 4

Si l'on cherche la parallaxe de déclinaiſon ou de hauteur, pour le cas où la lune eſt dans le méridien, on n'a beſoin d'aucune équation : il ſuffit de corriger la diſ-

tance au zénit par l'angle de la verticale avec le rayon, (1654, 3942).

1698. En réduiſant le lieu apparent de la lune au point K, on n'a pour l'aſcenſion droite aucune correction (1691), & l'équation de la déclinaiſon eſt égale à $\frac{p \text{ ſin. } a \text{ coſ. décl.}}{\text{coſ. haut. du pole}}$ (1696) = 23″ pour la latitude de Paris; il reſte à ſavoir combien ce petit changement dans la déclinaiſon peut influer ſur la longitude & ſur la latitude de la lune, ou, ce qui revient au même, quel eſt le rapport qu'il y a entre le changement de la déclinaiſon & ceux de la latitude & de la longitude. Soit A (*fig.* 96), le pole de l'équateur ou le pole du monde, C le pole de l'écliptique, B le lieu vrai de la lune, AB ſa diſtance au pole du monde, BC ſa diſtance au pole de l'écliptique, & BL le petit changement fait à la déclinaiſon de la lune (1696) ſans changer l'angle A; il faut chercher quel ſera le changement arrivé dans la latitude de la lune. Pour cela ayant tiré le cercle de latitude CL, & le petit arc perpendiculaire LN, on aura BN pour le changement de latitude; or BL eſt à BN, ou d (AB) a d (BC) :: ſin. AB. ſin. BC: coſ. AC — coſ. AB. coſ. BC (3748), donc $BN = BL\left(\frac{\text{coſ. } AC - \text{coſ. } AB.\text{ coſ. } BC}{\text{ſin. } AB.\text{ ſin. } BC}\right)$; mais au lieu de BL, on doit mettre 23″ coſ. déclin. ou 23″ ſin. $AB = \frac{p \text{ ſin. } a \text{ coſ. déclin.}}{\text{coſ. haut. du pole.}}$ qui étoit la valeur de CV (1696), alors on aura l'applatiſſement en latitude $BN = 23''\left(\frac{\text{coſ. } AC}{\text{ſin. } BC} - \frac{\text{coſ. } AB.\text{ coſ. } BC}{\text{ſin. } BC}\right) = \frac{p \text{ ſin. } a}{\text{coſ. h. du pole.}}$ $\left(\frac{\text{coſ. } 23°}{\text{coſ. latit. } \mathbb{C}} - \text{ſin.décl.tan.lat.}\right)$, c'eſt-à-dire, $23'' \frac{\text{coſ. } 23° 28'}{\text{coſ. lat. } \mathbb{C}}$, — 23″ ſin. déclin. tang. lat. ℂ. Le ſigne — ſe changeroit en + ſi la déclinaiſon & la latitude de la lune étoient de ſignes différens. C'eſt la latitude vraie, ou vue du centre de la terre qu'il faut employer dans ces calculs.

Equation de la parallaxe en latitude.

Fig. 96.

1699. La ſeconde partie de cette formule 23″ ſin. décl. tang. latit. ne peut aller au-delà de 1″, 3 pour Paris; ainſi il y a bien des cas où l'on peut la négliger

Fig. 96. totalement, & s'en tenir pour la correction de la latitude de la lune, au terme $23'' \frac{\text{cos. } 23°.}{\text{cos. lat. } \mathbb{C}}$; ce terme lui-même varie très-peu, puiſque le coſinus de la latitude de la lune diffère à peine de l'unité ; ainſi ſans craindre l'erreur d'une ſeconde entiere, on peut s'en tenir à une correction conſtante de $26''$, 6 pour Paris lorſque la parallaxe horizontale eſt de $57' 40''$; ſous les autres latitudes elle ſera de $\frac{p \text{ ſin. } a \text{ cos. } 23° \frac{1}{2}}{\text{cos. haut. pole}}$, comme on le voit par la formule. A l'égard des ſignes ils ſont les mêmes que pour la déclinaiſon (1692), c'eſt-à-dire, que dans les pays ſeptentrionaux, ſi la latitude de la lune eſt ſeptrionale, on retranchera cette correction de la latitude de la lune rapportée au point K, pour avoir ſa vraie latitude vue du centre C de la terre. Dans nos régions ſeptentrionales, on la retranchera de la parallaxe en latitude (a) (1667), trouvée par les règles ordinaires ; ſi cependant la lune étoit entre le pole & le zénit, il faudroit l'ajouter. Je ſuppoſe qu'on ait employé dans le calcul de la parallaxe ordinaire, une parallaxe horizontale augmentée de p ſin. a, *tang. haut. du pole*, qui eſt la valeur de NK (1695).

Elle eſt preſque conſtante.

Equation de la parallaxe en longitude.

1700. La correction de la longitude qui dépend du changement de déclinaiſon, eſt égale au petit angle ſphérique LCN; or $NL = LCN$. ſin. CL (891), donc $LCN = \frac{NL}{\text{ſin. } CL}$; mais dans le triangle rectiligne rectangle BLN, on a $NL = BL$. ſin. B (3611); donc $LCN = \frac{BL. \text{ ſin. } B}{\text{ſin. } CL}$. Par la propriété ordinaire des triangles ſphériques on a ſin. B : ſin. AC : : ſin. C : ſin. AB (3690); donc ſin. $B = \frac{\text{ſin. } AC. \text{ ſin. } C}{\text{ſin. } AB}$ ſubſtituant cette va-

(a) M. de la Caille, (*pag.* 225 *lig.* 14), dit que cette correction doit être *ôtée* de la latitude auſtrale de la lune quand l'obſervateur eſt placé dans la partie boréale de la terre ; mais il faut lire *ajoutée*. Il y a auſſi erreur, en ce qu'il dit que la même correction eſt additive à la latitude boréale, tandis qu'elle eſt certainement ſouſtractive dans le cas dont il s'agit.

leur de ſin. *B* on a $LCN = \frac{BL.\,\text{ſin.}\,AC\,\text{ſin.}\,C}{\text{ſin.}\,CL.\,\text{ſin.}\,AB}$, c'eſt-à-dire, $\frac{BL.\,\text{ſin.}\,23°\,\text{coſ. longit.}}{\text{coſ. lat.}\,\mathbb{C}\,\text{coſ. déclin.}}$; mais BL eſt égale à $\frac{p.\,\text{ſin.}\,a.\,\text{coſ. déclin.}}{\text{coſ. haut. du pole}}$; (1696) donc LCN, ou la correction de la longitude eſt égale à $\frac{p.\,\text{ſin.}\,a.\,\text{ſin.}\,23°\,28'\,\text{coſ. long.}\,\mathbb{C}}{\text{coſ. haut. du pole coſ. latit.}\,\mathbb{C}}$, & comme le coſinus de la latitude de la lune eſt toujours à peu-près égal à l'unité, on aura ſans craindre l'erreur d'une ſeconde pour la longitude, $\frac{p.\,\text{ſin.}\,a.\,\text{ſin.}\,23°}{\text{coſ. haut. du pole}}$ coſin. longit. $\mathbb{C}$; ce ſera pour Paris environ $9''$ 1 coſ. longit. *Fig. 96.* Elle eſt de $9''$ coſ. long.

1701. Cette correction de la longitude s'ôte de la longitude vraie vue du centre *C* calculée par les tables, pour avoir la longitude vue du point *K*, tant que la lune s'éloigne du pole élevé : en effet, nous avons vu qu'il faut ajouter l'équation de la déclinaiſon pour avoir la vraie diſtance au pole, réduite au centre de la terre (1697), ou l'ôter de la vraie pour avoir celle qui eſt vue du point *K* toutes les fois que la lune eſt du côté du pole élevé ; or ſi vous rapprochez la lune du pole élevé dans le temps qu'elle s'en éloigne par ſon mouvement propre, vous diminuez ſa longitude ; donc cette correction eſt ſouſtractive de la longitude vraie de la lune vue du point *C*, pour la réduire au point *K*, toutes les fois que la lune s'éloigne du pole élevé ; ou ce qui revient au même, cette portion de la parallaxe doit s'oter de la longitude vraie vue du centre *C*, qui eſt donnée par les tables, pour avoir celle qui eſt vue du point *K*, à laquelle on applique enſuite les formules ordinaires qui dépendent du nonagéſime. *Fig. 94.*

1702. Ainſi pour tous les pays dont la hauteur du pole eſt ſeptentrionale, cette correction de la longitude eſt ſouſtractive, ou a le ſigne — quand la déclinaiſon boréale de la lune diminue, ou que la déclinaiſon méridionale augmente ; ce qui arrive, quand la lune eſt dans les ſignes deſcendans, c'eſt-à-dire, qu'elle a 3, 4, 5, 6, 7 & 8ˢ de longitude ; & elle a le ſigne + dans les ſignes aſcendans 9, 10, 11, 0, 1, 2, & Signes deſcendans.

Fig. 94. cela eſt vrai en conſidérant le point de l'écliptique où répond la lune, quand même le mouvement de la lune dans ſon orbite auroit une autre direction; ce qui pourroit arriver, ſi la lune étoit fort proche du ſolſtice & du nœud; ainſi la règle générale eſt d'ôter la correction de la longitude vraie, toutes les fois que la lune ſera dans les ſignes deſcendans 3, 4, &c. & de la ſouſtraire dans les ſix autres, pour les pays qui ſont au nord de l'équateur.

C'eſt le contraire pour les pays ſitués au midi de l'équateur; mais il n'y auroit rien à changer à cette règle, quand même la lune ſeroit entre le zénit & le pole.

1703. Si le lieu de la lune eſt plus avancé que celui du nonagéſime, la parallaxe de longitude eſt additive, c'eſt-à-dire, qu'elle a le ſigne +, ſinon elle a le ſigne —, donc en combinant ce ſigne avec celui de l'applatiſſement que nous venons d'indiquer, on aura exactement la longitude apparente dans la terre applatie, vue de la ſurface de la terre ou du point *O*.

1704. On pourroit auſſi déduire de l'équation de la déclinaiſon (1696) celle de la hauteur; mais la méthode que j'ai donnée (1687), eſt bien plus commode. Je dois ſeulement avertir que M. de la Caille, (*pag.* 225), a fait cette correction, *ſouſtractive dans tous les cas*; mais il eſt évident qu'elle devient quelquefois additive: en effet, quand le rayon dirigé vers la lune eſt entre *CO* & *CP*, ſi l'on tranſporte l'œil de *K* en *C*, l'on a une plus grande hauteur, & l'équation de la hauteur eſt additive, comme je l'avois démontré dans les mémoires de 1756, avant que M. de la Caille écrivît ſur cette matière (1689).

Explication de la Table. 1705. J'ai renfermé dans la table ſuivante toutes les quantités qui doivent ſervir aux calculs précédens pour différentes latitudes, en employant la valeur des rayons de la terre, tels que *CO*, dont on trouvera le calcul dans le livre XVe. d'après les hypothèſes de M. Bouguer (2690), & de M. Maupertuis (*Diſcours ſur la*

la parallaxe de la lune, 1742, *pages* 34 & 36), l'applatiſſement de la terre étant ſuppoſé de $\frac{1}{178}$; je ſuppoſe auſſi la parallaxe de la lune de 60′ ſous l'équateur; l'on augmentera ou l'on diminuera tous ces nombres de la table, lorſque l'on ſuppoſera une parallaxe horizontale plus ou moins grande que 60′, ou un applatiſſement plus ou moins conſidérable que $\frac{1}{178}$. Fig. 94.

La première colonne contient les degrés de latitudes géographiques, ou les hauteurs du pole. La ſeconde & la troiſième préſentent la différence entre le rayon de l'équateur & le rayon CO qui répond à chaque latitude, en ſuppoſant celui de l'équateur de 1°; c'eſt-à-dire, que l'on trouve dans ces deux colonnes ce qu'il faut ôter de la parallaxe horizontale ſous l'équateur, pour avoir la parallaxe ſous une latitude donnée dans les deux hypothèſes. Si l'on vouloit ſuppoſer l'applatiſſement de la terre moindre que $\frac{1}{178}$, on diminueroit ces nombres dans la même proportion.

La quatrième & la cinquième colonne contiennent la valeur de NK en ſecondes; c'eſt-à-dire, la quantité qu'il faut ajouter à la parallaxe horizontale déjà trouvée par une des colonnes précédentes pour chaque latitude, afin d'avoir la parallaxe qui répond à OK, & dont nous avons fait uſage ci-devant (1694 & ſuiv.). Cette valeur de NK auſſi bien que celle de CK eſt encore de 48″ ſous le pole, ou du moins infiniment près du pole, parce que le rayon du cercle oſculateur ſe termine en K à cette diſtance-là, quelque près qu'on ſoit du pole.

La ſixième & la ſeptième colonne contiennent le ſegment CK en ſecondes; c'eſt la quantité, qui multipliée par le coſinus de la déclinaiſon, donne l'équation de la déclinaiſon (1696), & par conſéquent celles de la longitude & de la latitude (1699, 1700).

La huitième & la neuvième colonne contiennent l'équation de la latitude, ou l'effet de l'applatiſſement en latitude pour chaque hauteur du pole, dans les mêmes

hypothèſes ; cette équation eſt conſtante pour chaque latitude géographique (1699).

La dixième colonne contient les 90 premiers degrés de la longitude de la lune, & la dernière la correction de la longitude pour la latitude de Paris ſeulement (1700). Cette équation eſt la même pour les trois autres quarts (1701), aux ſignes près ; en prenant le ſupplément, l'excès ſur 180 degrés, ou le complément à 360 degrés, ſuivant les cas, comme pour chercher le ſinus d'une longitude, ou pour calculer la déclinaiſon du ſoleil (855).

Equations de la Parallaxe pour des Sphéroïdes applatis, en ſuppoſant $\frac{1}{178}$ d'applatiſſement & 60′ de Parallaxe.

Haut. du Pole.	Otez de la par. ſous l'équateur.		N K (Fig. 94.)		C K (Fig. 94.)		Parallaxe en Latitude.		Long. de la Lune.	Parall. de longit. à Paris.
Deg.	*Bouguer.*	*Mauperruis.*	*Bouguer.*	*Mauperruis.*	*Bouguer.*	*Mauperruis.*	*Bouguer.*	*Mauperruis.*		
0	0″,0	0″,0	0″,0	0″,0	0″,0	0″,0	0″,0	0″,0	0°	12″,0
10	0 ,5	0 ,6	1 ,0	1 ,2	5 ,7	7 ,0	5 ,2	6 ,4	10	11 ,8
20	1 ,9	2 ,4	4 ,0	4 ,7	11 ,7	13 ,8	10 ,7	12 ,7	20	11 ,3
30	4 ,2	5 ,1	9 ,0	10 ,1	18 ,1	20 ,2	16 ,6	18 ,6	30	10 ,4
40	7 ,2	8 ,3	11 ,4	16 ,7	25 ,0	26 ,0	22 ,9	23 ,9	40	9 ,3
50	10 ,8	11 ,9	2, 45	23 ,8	32 ,0	31 ,0	29 ,2	28 ,5	50	7 ,7
60	14 ,4	15 ,2	3 ,33	30 ,3	38 ,5	35 ,0	35 ,3	32 ,3	60	6 ,0
70	17 ,4	17 ,9	4 ,11	35 ,7	43 ,8	38 ,0	40 ,1	35 ,0	70	4 ,1
80	19 ,5	19 ,6	4 ,65	39 ,3	47 ,3	39 ,9	43 ,3	36 ,8	80	2 ,1
90	20 ,2	20 ,2	48 ,2	40 ,5	48 ,2	40 ,5	44 ,2	37 ,1	90	0 ,0

1706. On trouvera parmi les tables de la lune celle de la parallaxe pour différentes latitudes, avec la correction tant en longitude qu'en latitude, & les angles de la verticale avec le rayon de la terre dans l'hypothèse que l'applatiſſement ſoit $\frac{1}{230}$ ſeulement, hypothèſe qui paroît favoriſée par diverſes meſures des degrés, dont les excès par rapport au degré de l'équateur ne ſont pas ſi conſidérables que ceux des degrés de France & de Laponie (2691).

1707. On ſera peut-être ſurpris de l'extrême différence qu'il y a entre les deux hypothèſes de M. Bouguer & de M. de Maupertuis employées dans la table précédente, quoique le degré d'applatiſſement ſoit le même; cette différence va à 7″ & $\frac{7}{10}$ pour la valeur de CK ſous le pole, parce que les rayons de courbure ſont fort différens dans ces deux hypothèſes, quoique le degré d'applatiſſement ſoit le même. Cependant, il n'en réſulte pas grande différence ſur la parallaxe, parce que l'équation CK de la déclinaiſon augmente avec l'équation NK de la parallaxe, & l'une compenſe l'autre, de ſorte que le réſultat eſt toujours le même à une ſeconde près, ou environ, dans les deux hypothèſes.

1708. L'angle de la verticale avec le rayon mené de Paris au centre de la terre, eſt de 19′ 30″, ſuivant la table que j'ai calculée dans l'hypothèſe de M. Bouguer; mais il ne ſeroit pas de 15′, ſi l'on ſuivoit l'hypothèſe dans laquelle je corrigeois les degrés de Laponie, de France & du Pérou dans les mémoires de l'académie, 1752, *pag.* 111, ou celle d'une ellipſe ordinaire avec un applatiſſement de $\frac{1}{230}$, dont je ferai uſage dans les tables de la lune. Ce même angle eſt de 18′ 28″, quand on employe pour déterminer la figure de la terre, les ſeuls degrés du nord & du Pérou, en ſuppoſant ſa figure elliptique, (*Mém. acad.* 1752, *pag.* 103). Enfin, il eſt de 19′ $\frac{1}{4}$ dans l'hypothèſe de M. de Maupertuis; je l'ai pris de 15′ en nombres ronds

Angle de la verticale.

dans les calculs précédens, & dans les tables de la lune on verra qu'il eſt de 14′ 49″.

1709. M. du Séjour en commençant ſon grand travail ſur le calcul analytique des éclipſes (*Mém. acad.* 1764, *pag.* 221), a donné des formules très-élégantes & très-ſimples pour calculer les rayons de la terre, & les angles des verticales avec les rayons, il y a joint des tables détaillées, conſtruites dans les deux hypothèſes d'applatiſſement, $\frac{1}{130}$ & $\frac{1}{178}$, auxquelles on peut avoir recours. J'ai employé une de ces tables pour calculer les équations de la longitude & de la latitude qu'on trouvera dans les tables de la lune.

Des inégalités de la Parallaxe, & de ſa quantité abſolue.

1710. La parallaxe horizontale & le diamètre de la lune ſont dans un rapport conſtant, (1633); quand la lune s'éloigne de nous, ſon diamètre diminue, (1384), & ſa parallaxe horizontale diminue auſſi dans le même rapport, (1632): ainſi les trois inégalités dont j'ai parlé à l'occaſion du diamètre de la lune, (1507), ont lieu de même dans la parallaxe; mais elles ſont plus grandes dans le rapport de 11 à 6, (1717).

Après qu'on eut obſervé les changemens du diamètre de la lune, il fut aiſé de reconnoître ceux de la parallaxe; mais Ptolomée & les anciens qui faiſoient tourner la lune dans un excentrique ou dans un épicycle, avoient déja penſé qu'elle devoit être plus ou moins éloignée de nous, & avoient établi une inégalité dans la parallaxe, quoiqu'ils ne connuſſent pas celle des diamètres. Tous les auteurs qui ont ſuivi, ont diſtingué la parallaxe de l'apogée de celle du périgée.

Ce ne fut que vers 1666, que M. Picard commença à reconnoître qu'il y avoit deux autres inégalités ſenſibles dans le diamètre apparent de la lune, & par

conſéquent dans ſa parallaxe. Ces inégalités répondent à l'évection (1435), & à la variation (1445); & l'on ſent aſſez que l'attraction du ſoleil, en changeant la vîteſſe de la lune autour de la terre, ne peut manquer de changer auſſi ſa diſtance, comme le calcul de l'attraction l'a fait voir : ainſi la valeur de ces inégalités a été déterminée & par l'obſervation & par la théorie.

1711. M. Clairaut employe dans ſes tables de la parallaxe 10 équations, (*Mém. acad.* 1752, *Connoiſſ. des mouv. céleſt.* 1765) : les principales ſont contenues dans la formule ſuivante, où y exprime l'anomalie moyenne de la lune, & t la diſtance moyenne de la lune au ſoleil, $57' 3'' - 3' 5'', 5 \text{ cof. } y + 10'', 3 \text{ cof. } 2y + 28'', 1 \text{ cof. } 2t - 34'', \text{cof. } (2t - y)$. La conſtante $57' 3''$ eſt celle que j'avois déjà déterminée pour la latitude de Paris, en appliquant aux parallaxes que j'avois obſervées à Berlin les équations précédentes; ce qui me donnoit à chaque fois la conſtante qu'il s'agiſſoit de trouver, (*Mém. acad.* 1756). J'ai reconnu en même-temps que le diamètre horizontal de la lune eſt à ſa parallaxe pour Paris, comme $30'$ ſont à $54' 56''$, en comparant avec ces parallaxes les diamètres de la lune que j'ai obſervés fréquemment, avec un héliomètre de 18 pieds.

Conſtante pour Paris.

Rapport du diamètre à la parallaxe.

1712. Cette parallaxe $57' 3''$, n'eſt pas la parallaxe moyenne qui tient un milieu entre la plus grande & la plus petite (car celle-ci eſt de $57' 39''$); mais c'eſt celle qui répond à la diſtance moyenne de la lune à la terre, & qui en diffère pour deux raiſons qu'il eſt utile de faire ſentir à nos Lecteurs. Premiérement, ſi l'on ne conſidère que l'orbite elliptique de la lune, dont l'excentricité eſt environ 0,05505; on trouvera que ſi la parallaxe eſt de $57' 3''$ dans les moyennes diſtances, elle ſera de $60' 22''$ dans le périgée, & de $54' 5''$ dans l'apogée; la première diffère de la conſtante $57' 3''$, de $3' 19''$, la ſeconde n'en diffère que de $2' 59''$, parce que le même changement ſur la diſtance

produit ſur l'angle de la parallaxe un plus grand effet; quand la lune s'approche de nous que quand elle s'en éloigne. La diſtance moyenne eſt un milieu arithmétique entre la diſtance apogée & la diſtance périgée, mais la parallaxe eſt en raiſon inverſe de la diſtance, ainſi la parallaxe 57′ 3″, qui répond à la diſtance moyenne, eſt une moyenne harmonique entre celles qui répondent aux diſtances apogée & périgée; or le milieu harmonique diffère beaucoup du milieu arithmétique. Par exemple, les premiers nombres qui expriment les nombres de vibrations des accords de la muſique, 2, 4, 6, ſont en proportion arithmétique, d'où l'on conclud que les nombres $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$ qui expriment les longueurs des cordes ſont en proportion harmonique, ces dernières quantités qui peuvent ſe repréſenter par les fractions décimales 0, 50; 0, 25; 0, 17 ſont bien loin de la progreſſion arithmétique, puiſqu'il faudroit que la moyenne fut 0, 33 & non pas 0, 25. Voila une première raiſon pour laquelle la conſtante 57′ 3″ diffère de 10″ de la moyenne priſe entre la parallaxe apogée & la parallaxe périgée.

La ſeconde raiſon, c'eſt que l'attraction du ſoleil peut augmenter la parallaxe périgée de 1′ 5″, & qu'elle ne peut diminuer la parallaxe apogée que de 12″, parce que ſon effet eſt plus conſidérable quand la lune eſt près de la terre, & que les attractions du ſoleil & de la terre conſpirent à rapprocher la lune de nous; que quand la lune eſt fort éloignée, & que le ſoleil tend à l'éloigner encore. Cette ſeconde raiſon fait que la parallaxe moyenne entre la plus grande & la plus petite eſt encore plus forte de 26″ $\frac{1}{2}$, que ſi les équations de la parallaxe faiſoient autant pour la diminution de la parallaxe conſtante 57′ 3″ que pour ſon augmentation; ainſi ſuivant nos tables la parallaxe moyenne doit être plus grande de 36″ $\frac{1}{2}$ que la conſtante, c'eſt-à-dire, 57′ 39″ $\frac{1}{2}$. Il faut dire à peu-près la même choſe du diamètre de la lune (1507).

1713. Suivant les nouvelles tables de Mayer, la

plus grande parallaxe de la lune, (lorſqu'elle eſt dans ſon périgée & en oppoſition), eſt de 61′ 25″, la plus petite parallaxe qui a lieu dans l'apogée en conjonction, eſt de 53′ 53″, ſous la latitude de Paris; il y avoit environ 3″ de moins dans la première édition de ſes tables, faite en 1753, peu après que j'eus donné le réſultat de nos obſervations de 1751 & 1752. Dans l'article précédent comme dans celui-ci, j'ai fait abſtraction des petites inégalités que M. Clairaut & M. Mayer ont ajoutées aux deux grandes inégalités qui dépendent de l'évection & de la variation, mais je vais en donner la formule, quoiqu'on ait rarement beſoin d'une ſi grande préciſion.

La plus grande & la plus petite parallaxe.

1714. Suivant la formule de Mayer, la parallaxe équatoriale eſt 57′ 11″, avec toutes les équations ſuivantes; elles ſont placées dans l'ordre de leurs quantités; mais nous avons marqué à côté l'ordre des tables, qui eſt le même que celui des équations de la lune, & qu'on a choiſi pour la facilité du calcul.

Table XI.	57′ 11″	— 3′ 7″, 5	cof. anomal. ☾.
		+ 10	cof. 2 anomal.
		— 0, 5	cof. 3 anomal.
V.		— 37	cof. Arg. évection.
		+ 0, 3	cof. 2 Arg. évection.
XII.		+ 25, 2	cof. 2 diſt. ☾ ☉
		— 1	cof. diſt. ☾ ☉
X.		+ 2, 0	cof. 2 (apog. ☾ — ☉)
		— 0, 2	cof. 3 (apog. ☾ — ☉)
VI.		+ 1, 0	cof. Arg. évect. + anom. ☉
XIII.		+ 0, 8	cof. 2 Arg. lat. — anom. ☾ corrig.
III.		— 0, 8	cof. 2 diſt. ☾ ☉ + anom. ☉
II.		— 0, 7	cof. diſt. ☾ ☉ + anom. ☉
VII.		+ 0, 6	cof. Arg. évect. — anom. moy. ☾
IX.		+ 0, 4	cof. 2 (☊ — ☉)
I.		+ 0, 3	cof. anom. moyen. ☉
VIII.		+ 0, 2	cof. anom. moy. ☾ - anom. moy. ☉
IV.		+ 0, 1	cof. 2 diſt. ☉ ☾ + anom. moy. ☾

Au lieu de 57′ 11″ qui eſt la parallaxe ſous l'équateur, on a, ſuivant M. Mayer, 57′ 2″ ½ pour la latitude de Paris, c'eſt la parallaxe que j'avois déterminée par mes obſervations de Berlin, comparées à celles du Cap (*Mém. acad.* 1752, 1753 & 1756, *pag.* 378), & que M. Clairaut avoit adoptée dans la dernière édition de ſes tables, *pag.* 117; elle étoit en nombres entiers 57′ 3″, (1711). C'eſt auſſi cette parallaxe pour Paris que j'ai employée dans les tables que je publie dans ce livre.

1715. M. de la Caille pluſieurs années après ſon retour du Cap, voulut auſſi examiner le réſultat de toutes les obſervations qui avoient été faites pendant ſon ſéjour au Cap; il conclud de 40 obſervations faites à Berlin, à Paris, à Greenwich, à Stockholm, à Bologne, que la plus grande parallaxe horizontale de la lune périgée & en ſyzygie, eſt de 61′ 23″ 1 à l'égard d'un obſervateur placé ſous le pole, & de 61′ 41″ 7 ſous l'équateur; en ſuppoſant l'applatiſſement de la terre $\frac{1}{100}$ du diamètre de l'équateur. (Voyez *les Ephémérides de* 1765 — 74, & *les Mémoires de* 1761, *pag.* 51).

Réſultat de M. de la Caille.

1716. Dans l'hypothèſe de M. Bouguer (2683), M. de la Caille trouve la plus grande parallaxe de 61′ 22″ 7 ſous le pole, de 61′ 45″ 6 ſous l'équateur; la conſtante dont nous avons parlé (1711) de 56′ 56″ ſous le pole, de 57′ 14″ 8 ſous l'équateur; le rapport du diamètre horizontal de la lune à la parallaxe horizontale ſous le pole, égal à celui de 30′ à 54′ 41″ ½ en ſuppoſant le diamètre de la lune tel qu'il paroît avec une lunette ordinaire de ſix à ſept pieds; ces réſultats ſont d'accord avec ceux que j'avois donnés; ce qui fait voir la préciſion & la certitude de nos recherches. Il n'y a que deux légères différences: la première conſiſte en ce que j'avois ſuppoſé l'applatiſſement de la terre plus conſidérable que M. de la Caille, ce qui peut produire dans certains cas 1 ou 2″ de différence ſur la parallaxe; la ſeconde, que j'ai employé les diamètres

mètres de la lune meſurés avec une lunette de 18 pieds, qui ſont plus petits de 2″ ou 3″ que ceux de M. de la Caille, meſurés avec des lunettes de ſix pieds; ſoit que la différence vienne réellement de l'effet des lunettes, ſoit qu'il y ait moins d'exactitude & plus de difficulté à obſerver avec une petite lunette telle qu'il l'a employée (1388, 1395).

Grandeur réelle de la Lune.

1717. Le rapport entre la parallaxe de la lune à 45 degrés de latitude & ſon diamètre horizontal eſt celui de 30′ à 54′ 57″, ou de 30′ à 54′ 59″, ſuivant l'hypothèſe qu'a embraſſée M. de la Caille; ce rapport eſt ſenſiblement & en nombres ronds celui de 6 à 11 : ainſi le rayon de la lune eſt $\frac{1}{11}$ du rayon moyen de la terre. Le cube de cette fraction eſt $\frac{1}{49}$; ainſi le volume ou la groſſeur de la lune eſt la 49e. partie du volume ou de la groſſeur de la terre. Cependant comme la denſité de la lune eſt moindre que celle de la terre (3414), il ſe trouve que la maſſe, la quantité de matière, le poids, ou la puiſſance attractive dans la lune eſt environ 70 fois moindre que dans la terre, comme on l'a reconnu par ſon action ſur les marées (3595).

Elle eſt $\frac{1}{70}$ de la terre.

Diſtance abſolue.

1718. La parallaxe de la lune pour Paris, par un milieu entre la plus grande & la plus petite eſt de 57′ 39″; ſi l'on diviſe le rayon moyen de la terre qui eſt de 3271850 toiſes par le ſinus de 57′ 39″, on aura la diſtance de la lune en toiſes; & diviſant par 2283, parce que nos lieues communes de 25 au degré ſont de 2283 toiſes, on trouvera la diſtance moyenne de la lune 85464 lieues. Si l'on ſuppoſoit la parallaxe moyenne de 57′ 43″, comme dans la première édition de ce livre, on trouveroit 85393 lieues.

Erreur poſſible ſur cette diſtance.

1719. Pour faire ſentir à tout le monde le degré de certitude que comporte ce réſultat, il ſuffira de remarquer que la parallaxe de la lune eſt connue à 2″ près, (1716); chaque ſeconde de parallaxe produit à peine 25 lieues ſur la diſtance; ainſi nous ſommes aſſurés de ne pas nous tromper de 50 lieues ſur 85 mille, que contient la diſtance de la lune à la terre.

De la parallaxe du Soleil, & de ſa diſtance à la terre.

Incertitude des Anciens.

1720. Après avoir vu combien les anciens s'étoient trompés ſur la diſtance de la lune à la terre, (1655) quoique facile à déterminer; on ne ſera pas étonné de voir qu'ils n'euſſent aucune idée de celle du ſoleil, du moins avant le temps d'Hipparque. C'eſt ſur-tout ici que les anciens devoient dire comme Pline. *Incomperta hæc & inextricabilia, ſed tam prodenda quam ſunt prodita.... Nec ut menſura, id enim velle pene dementis otii eſt, ſed ut tantùm æſtimatio conjectandi conſtet animo.* (*Lib. II, c.* 23).

Les opinions anciennes ſur la diſtance du ſoleil à la terre ſont rapportées dans Plutarque, (*De placitis Phil.* III, 31); & dans Pline (*Lib. II, c.* 21), on voit que Pythagore ſuppoſoit le ſoleil trois fois auſſi loin que la lune, c'eſt-à-dire, 16 ou 18 mille lieues, au lieu de 32 millions qu'on a trouvé de nos jours.

1721. Poſidonius, contemporain de Pompée, donnoit au demi-diamètre de la terre 38182 ſtades, ſuivant le calcul du P. Riccioli, & à la diſtance du ſoleil 502000040, c'eſt-à-dire, 13141 demi-diamètres de la terre, au lieu de 22918 que nous trouvons actuellement; cette opinion étoit aſſez approchante du vrai, mais on ne peut l'attribuer qu'au hazard d'une heureuſe conjecture. Il faut même ſuppoſer une interprétation favorable du texte de Pline, pour trouver cette diſtance ſi exacte, je vais rapporter le paſſage en entier. *Poſidonius non minus 40 ſtadiorum a terra altitudinem eſſe in quâ nubila ac venti nubeſque proveniant.... ſed a turbido ad lunam* VICIES CENTUM MILLIA *ſtadiorum, inde ad ſolem quinquies millies. Eo ſpatio fieri ut tam immenſa ejus magnitudo non exurat terras.* L'expreſſion *quinquies millies* qui exprime la diſtance de la lune au ſoleil ſignifie 5000 ſtades, ſuivant quelques commentateurs; mais

le P. Riccioli obſerve que, ſuivant la coutume des auteurs latins, il faut ſous-entendre *centena millia*, ce qui fait 500 millions de ſtades depuis la lune juſqu'au ſoleil, à quoi ajoutant la diſtance de la lune aux nuages 2 millions de ſtades, & celle des nuages à la terre 40 ſtades, on trouve 502 millions & 40 ſtades pour la diſtance du ſoleil ſelon l'hypothèſe de Poſidonius. Il y a des éditions où on lit 400 ſtades pour la hauteur des nuages, mais le texte eſt viſiblement altéré; car les anciens ne pouvoient pas ſuppoſer 20 lieues pour la diſtance des nuages, que l'on voit ſi ſouvent toucher le ſommet de nos montagnes. Cependant le P. Riccioli a fait cette eſpèce de faute, & l'Imprimeur en a ajouté une autre en mettant un chiffre de trop dans la ſomme (Pline II, 23. Riccioli I, 111).

Pline penſoit que la diſtance du ſoleil devoit être 12 fois auſſi grande que celle de la lune, parce que la durée de ſa révolution eſt 12 fois auſſi longue; mais cette conſéquence n'avoit aucun fondement; enfin il conclut ſon 23ᵉ chapitre par l'opinion de Pétoſiris & de Nécepſos, Rois d'Egypte, qui croyoient la diſtance du ſoleil de 2970 ſtades ſeulement; mais Pline la rejette avec raiſon comme une idée puérile.

1722. On ne connoiſſoit donc point la diſtance & la parallaxe du ſoleil, avant Ariſtarque de Samos, qui vers l'an 264 avant J. C., démontra que la parallaxe n'alloit pas au-delà de 3′, enſorte que la diſtance du ſoleil ſurpaſſoit 1146 demi-diamètres terreſtres, c'étoit avoir beaucoup fait, parce qu'il y avoit eu des Pythagoriciens qui d'après certaines proportions harmoniques avoient cru que le ſoleil étoit ſeulement 3 fois plus loin de nous que la lune; d'ailleurs on a été 1800 ans avant que de trouver rien de mieux. Ariſtarque de Samos voyant que le rayon de la terre étoit une baſe preſque inſenſible, par rapport à la diſtance qu'on vouloit meſurer, parce que la terre vue du ſoleil paroiſſoit ſous un trop petit angle, imagina d'employer la diſtance de la lune à la terre, qu'il étoit plus facile de

Méthode d'Ariſtarque.

connoître par la parallaxe, & de chercher l'angle ſous lequel cette diſtance devoit paroître vue du ſoleil; ſa méthode eſt ingénieuſe & ne ſuppoſe que l'obſervation exacte de la quadrature de la lune.

Lorſque la lune eſt à moitié éclairée, où lorſque la ligne qui ſépare la lumière de l'ombre ſur le diſque lunaire eſt parfaitement droite, enſorte qu'on voie ſur le diſque de la lune un demi-cercle parfait, alors le rayon qui va du ſoleil à la lune SV (*fig.* 82), eſt néceſſairement perpendiculaire au rayon TV, par lequel nous appercevons la lune; car toutes les fois que cet angle devient différent de l'angle droit, ſon ſinus verſe diffère du rayon, & la partie éclairée ne ſauroit être égale au rayon du diſque lunaire (1409); ſi dans le même inſtant on meſure l'angle STV entre la lune & le ſoleil, ou l'angle d'élongation (1142), on connoîtra deux angles du triangle STV, & par conſéquent le troiſième angle S qui doit être le complément de l'angle T, puiſque l'angle V eſt de 90 degrés. Or le côté TL diſtance de la lune à la terre étoit ſuppoſé connu (1655), ainſi il étoit facile de trouver la diſtance TS du ſoleil à la terre, qui étoit l'objet de cette méthode d'Ariſtarque.

fig. 82.

La méthode d'Ariſtarque parut à Képler, en 1618, très-digne d'être employée par Galilée & Marius qui ſe ſervoient alors des lunettes d'approche; & dans ſes éphémérides pour 1619, il exhorte les philoſophes à faire leurs efforts pour déterminer par cette méthode la parallaxe du ſoleil, qui juſqu'alors avoit été conclue de la grandeur des éclipſes de lune, & de celle de l'ombre de la terre dans ces éclipſes, avec des incertitudes & des variétés prodigieuſes.

1723. Ce qui rend cette méthode inſuffiſante, c'eſt la difficulté de déterminer exactement le temps ou l'angle V eſt droit, de même que la petiteſſe de l'angle S; la lune peut faire dans ſon orbite un arc de 15′ ſans que la grandeur apparente de ſa partie éclairée augmente de 4″, par rapport à nous; or l'angle TSV n'eſt pas

de 10′, par conſéquent on ne ſauroit l'appercevoir ni le meſurer en obſervant la partie éclairée de la lune.

Pour faire bien ſentir la vérité de cette objection, rappellons nous que la partie viſible de l'hémiſphère éclairé de la lune eſt égale au ſinus verſe de l'angle *V* (1409); & ſuppoſons que l'angle *V* ſoit plus grand de 10 minutes que l'angle droit, comme ſi l'angle à la terre *STV* étoit lui-même un angle droit; le ſinus verſe de 10 minutes eſt de 29 parties, le diamètre étant de 20 mille; ce qui ne fait que $2''\frac{1}{2}$; ainſi la partie lumineuſe que nous voyons, n'aura augmenté que de $2''\frac{1}{2}$; nous ne verrons ſur le diſque lunaire aucune différence ſenſible, la lune paroîtra auſſi bien dichotome que lorſqu'elle étoit exactement en quadrature, cependant alors l'élongation *T* ſera de 90°, & l'angle *V* étant ſuppoſé de 90°, puiſque la lune ſera dichotome, on trouvera zéro au lieu de 10 minutes pour la valeur de l'angle *S*. Il ſeroit également poſſible de trouver une quantité négative, c'eſt-à-dire, moins que rien, pour la parallaxe du ſoleil.

1724. Cependant Vendelinus ayant obſervé ſouvent à Majorque, en 1650, ces quadratures de la lune le matin & le ſoir, trouva que la dichotomie de la lune arrivoit lorſque l'angle étoit de 89° 45′ & même un peu plus grand, d'où il tira cette conſéquence très-vraie que l'angle *LST* n'étoit pas de 15′, ni la parallaxe du ſoleil de 15″ (*Ricc. Almag. I*, 109 & 731). D'un autre côté le P. Riccioli, après beaucoup de pareilles obſervations aſſuroit que l'angle au ſoleil étoit de 30′ ou différent de très-peu de minutes; il ſuppoſoit la parallaxe de 28″ à 30″, il ne pouvoit pas encore ſe réſoudre à la faire auſſi petite que l'avoient fait Poſidonius & Vendelinus (*Almag. I*, 734). De là il réſulte que la méthode d'Ariſtarque pouvoit bien nous apprendre que la parallaxe du ſoleil n'étoit pas au-deſſus d'une demi-minute; mais il étoit difficile de s'aſſurer d'une plus grande préciſion.

1725. Ptolomée employa pour déterminer la diſ-

tance du ſoleil, la méthode d'Hipparque, fondée ſur l'obſervation des éclipſes de lune, & cette méthode lui auroit fait découvrir la diſtance du ſoleil, ſi elle n'eût pas été prodigieuſement grande par rapport à celle de la lune qu'il employoit dans cette recherche; (*Alm. V*). Soit *AO* le diamètre du ſoleil, (*fig. 99*), *GB* celui de la terre, *APO* le cône d'ombre que produit la terre dans les éclipſes de lune. La durée des éclipſes avoit fait connoître à Ptolomée que *CE*, c'eſt-à-dire, la largeur du cône d'ombre traverſé par la lune étoit d'environ $1^{\circ}\frac{1}{3}$ ou deux fois le demi-diamètre du ſoleil, & trois cinquièmes de plus, c'eſt-à-dire, $\frac{13}{15}$ du diamètre du ſoleil. Il ſuppoſoit le diamètre *AO* du ſoleil de $31'\frac{1}{3}$, auſſi bien que celui de la lune pleine & apogée, la diſtance *TL* de la lune à la terre de $64\frac{1}{6}$ demi-diamètres terreſtres, il n'étoit pas difficile d'en conclure par la trigonométrie rectiligne que la diſtance *TS* du ſoleil devoit êtrede 1210 fois le demi-diamètre *TB* de la terre; & il s'en ſuivoit que la parallaxe du ſoleil devoit être de $2'\ 50''$, ainſi Ptolomée croyoit le ſoleil 17 ou 18 fois plus près de nous qu'il ne l'eſt réellement, & Copernic le rapprocha encore.

Fig. 99.

Pour trouver le rapport de *TB* à *TS*, Ptolomée fait $TM = TL$, & dans le triangle *TMQ* il trouve *MQ*; parce que $MQ : CL :: 5 : 13$ par obſervation, il trouve *CL*; mais puiſque $TM = TL$, $LC + MR = 2TB$, d'où ôtant *LC* & *MQ* il reſte *QR*. Ptolomée conſidère enſuite qu'à cauſe des triangles ſemblables on a $TS : SM :: TA : AQ :: BA : RA :: TB : QR$. Mais *TB* & *QR* ſont déja connus par les deux opérations précédentes; ainſi l'on a le rapport de *TS* à *SM*, & celui de la diſtance de la lune à celle du ſoleil; d'où Ptolomée conclut que *TB* eſt à *TS* comme 1210 eſt à 1, ou que la diſtance du ſoleil eſt de 1210 demi-diamètres de la terre. Le P. Riccioli (*Alm. I*, 107), réduit cette méthode aux règles ordinaires de la trigonométrie rectiligne; mais j'ai mieux aimé indiquer ici la manière dont les anciens procédoient pour dé-

duire le rapport des inconnues aux quantités données, par les rapports de celles-ci entre elles.

Cette méthode paſſe pour être de l'invention d'Hipparque, elle a été ſuivie & employée par Ptolomée, (*Alm. lib. V.* Albategnius, *cap.* 30. Régiomontanus, *Epit. Alm. lib. V.* Copernic, *Lib. IV*, *cap.* 19. Longomontanus, *Aſtr. dan. lib. I. Theoricor*, *cap.* 9. Boulliaud, *Aſtr. phil. lib. IV*). Mais Lanſbergius fait voir que Albategnius, Copernic & Tycho s'étoient trompés dans leurs données, & avoient admis des choſes incompatibles & incohérentes, (*Riccioli*, *Alm. I*, 107).

1726. Tycho employoit la diſtance du ſoleil de 1142 demi-diamètres de la terre, (*Progymn. pag.* 97). Il dit enſuite que les éclipſes de lune prouvent ſuffiſamment que la parallaxe horizontale du ſoleil eſt de trois minutes; mais en convenant que cette détermination n'étoit pas ſans incertitude (*pag.* 415 & 463). En effet, il dit ailleurs (*Progymn. pag.* 414) qu'il a meſuré quelquefois, avec ſoin, la parallaxe de Mars en oppoſition, pour ſavoir s'il étoit plus près de nous que le ſoleil, (comme cela devoit être, ſuivant l'hypothèſe de Copernic & la ſienne), & il ajoute qu'il parlera, dans un temps plus convenable, de ce qu'il a trouvé à ce ſujet; mais ce qui me perſuade que ſes efforts avoient été inutiles, c'eſt qu'il réfute enſuite (*pag.* 661), *Th. Digges* qui, en 1573, avoit donné en Angleterre une méthode pour trouver les parallaxes des aſtres, (*Digges Ala ſeu ſcala mathematica*), il lui oppoſe la difficulté qui naît des réfractions, & du mouvement propre de Mars; il ajoute ſeulement qu'il croit y être parvenu par un autre moyen, dont il parlera dans une occaſion plus favorable. Tout cela indique aſſez que Tycho n'avoit point, ſur la parallaxe du ſoleil ou de Mars, de réſultat dont il fût bien aſſuré, & qu'il avoit ſeulement adopté le réſultat de Copernic.

1727. Képler apperçut avec la ſagacité, qui lui étoit ordinaire, que la parallaxe de Mars étoit abſolument inſenſible, à plus forte raiſon celle du ſoleil,

(*Epit. aſtr. Cop. pag.* 479); il ſuppoſoit la diſtance du ſoleil 3469 demi-diamètres de la terre, c'eſt-à-dire, 1′ pour la parallaxe du ſoleil. Dans ſon ouvrage (*De Stella Martis, pag.* 71.), il dit qu'entre 700 & 2000 demi-diamètres de la terre, il eſt difficile de ſtatuer démonſtrativement ſur la diſtance du ſoleil à la terre; c'eſt-à-dire, qu'il ſuppoſoit la parallaxe du ſoleil entre 4′ 55″ & 1′ 44″. Dans ſes éphémérides de 1617 & 1618, il l'employoit de 2′, (*Ricc. Almag. I.* 108), la diſtance du ſoleil étoit donc, ſelon lui, de 1719 demi-diamètres; mais enſuite il réduiſit cette parallaxe à une minute.

1728. Nous avons dit que Vendelinus, pluſieurs années après la mort de Képler, établiſſoit la parallaxe du ſoleil de 15″, & le P. Riccioli, en 1665, de 28″ (1724). Cependant en 1677, on ne regardoit pas cette quantité comme bien ſûre; nous voyons que M. Halley en rendant compte de l'obſervation du paſſage de Mercure ſur le ſoleil, qu'il avoit faite à l'Iſle de Sainte Hélene, en 1677, la jugeoit plus grande. Il compara le mouvement de Mercure en longitude, obſervé dans l'eſpace de 5^h 14′ 20″, (il l'avoit trouvé de 31′ $14''\frac{1}{2}$), avec le mouvement calculé par les tables de Street, qu'il trouvoit de 30′ 50″ ſeulement; il jugea que cette différence de $24''\frac{1}{2}$, ne pouvoit être que l'effet de la parallaxe de Mercure, d'où il conclut que la parallaxe horizontale du ſoleil étoit de 45″; mais il convient que les élémens qu'on emploie dans cette recherche y jettent beaucoup d'incertitude.

« Je ſais bien, ajoute M. Halley, que la parallaxe de » Mars acronique, étant deux fois plus grande, ſervi- » roit à faire connoître celle du ſoleil, mais cette mé- » thode eſt fort ſujette à caution, parce qu'elle ſuppoſe » les obſervations de la diſtance de Mars aux étoiles » fixes, faites avec le plus grand ſoin, & les meilleurs » micromètres, encore n'eſt-on pas aſſuré d'y parvenir.

Il propoſe le paſſage de Vénus.

» Il ne reſte qu'une obſervation, par laquelle on puiſſe » réſoudre le problême de la diſtance du ſoleil à la terre, c'eſt

» c'eſt celle de Vénus qui paroîtra en 1761 dans le diſque » du ſoleil ; car ſi l'on obſerve alors la parallaxe de Vénus » au ſoleil par la méthode que je viens d'expliquer, elle » ſera preſque trois fois auſſi grande que celle du ſoleil, » & cette obſervation ſera la plus facile de toutes, en- » ſorte que par ce phénomène, on apprendra tout ce qu'il » eſt poſſible aux hommes de ſavoir là-deſſus. (Voyez » l'art. 2041)».

1729. M. Halley convient enſuite que les plus habiles aſtronomes de ſon temps ne croient pas que la parallaxe du ſoleil ſoit ſi grande qu'il la trouve ; mais il penſe qu'ils n'ont que des probabilités ſur cette matiere. La raiſon que M. Halley trouvoit la plus plauſible étoit celle de Street, qui ſuppoſoit la parallaxe du ſoleil entre 10″ & 20″, parce que, diſoit-il, ſi elle étoit ſeulement de 10″, pour lors Vénus ſeroit plus grande que la terre, ce qui n'eſt pas probable, la terre ayant la lune qui tourne autour d'elle, & ce ſatellite étant la marque d'une prééminence & d'une grandeur au-deſſus de Vénus. Si la parallaxe du ſoleil alloit à 20 ſecondes, alors mercure ſeroit plus petit que la lune, cependant il n'y a pas d'apparence qu'une planète principale ou du premier ordre, ſoit moindre qu'une planète du ſecond ordre ; toutes ces raiſons étoient bien peu concluantes.

La parallaxe de Mars en oppoſition n'avoit pas paru ſenſible avec les plus grands inſtrumens de Tycho-Brahé, cela perſuadoit à M. Halley qu'elle n'étoit pas d'une minute, d'où il s'enſuivoit que celle du ſoleil ne paſſoit pas 25″, & il conclut par dire qu'après avoir bien examiné toutes les circonſtances, il eſt très-perſuadé que la parallaxe du ſoleil eſt environ de 25″. Il ſuivoit à peu-près en cela le P. Riccioli, qui dans ſon aſtronomie réformée, l'avoit employée de $28'' \frac{1}{3}$ pour les moyennes diſtances du ſoleil. Telles étoient les incertitudes des aſtronomes ſur la parallaxe du ſoleil avant que les obſervations faites par les aſtronomes de l'académie des Sciences, euſſent prouvé que cette parallaxe n'alloit pas à plus de 10″.

M. Halley eſtime la parall. de 25″.

1730. M. Caſſini, dans une lettre écrite au marquis Malvaſia, en 1662, & dans un mémoire qui a pour titre : *Les élémens de l'aſtr. vérifiés*, (publié en 1684), dit qu'on avoit propoſé deux hypothèſes, qui ſur les hauteurs méridiennes du ſoleil faiſoient à peu-près le même effet dans les climats d'Europe, de ſorte qu'il n'y avoit pas de moyen aſſez certain de diſtinguer évidemment, par obſervation, quelle étoit la véritable hypothèſe. La premiere ſuppoſoit la parallaxe du ſoleil inſenſible ou au-deſſous de 12″, & dans cette hypothèſe les réfractions étoient invariables pendant toute l'année; dans l'autre on ſuppoſoit la parallaxe horizontale du ſoleil d'une minute, comme Képler, mais cette ſuppoſition obligeoit de varier la réfraction dans tout le cours de l'année, à proportion de la déclinaiſon du ſoleil. Les obſervations des phaſes de la lune & de la parallaxe de Mars dans ſes oppoſitions favoriſoient la premiere hypothèſe, que nous ſavons actuellement être la véritable; mais la diſtance du ſoleil à la terre qui en réſultoit étoit prodigieuſe. M. Caſſini s'étoit arrêté à la derniere hypothèſe dans les obſervations de l'équinoxe du printemps, qu'il publia à Bologne en 1656, après avoir tracé la méridienne de S. Pétrone, cependant il balançoit encore entre ces deux hypothèſes, en 1662, comme on le voit dans les éphémérides de Malvaſia, (*pag.* 155), & il ſouhaita, en 1671, que cette incertitude fût levée par le voyage de Cayenne : ce fut un des objets de l'inſtruction, dont on chargea M. Richer.

1731. Les premieres tentatives qui furent faites en France pour trouver la parallaxe de Mars, ſont dans un ouvrage de M. Caſſini, qui fait partie du *Recueil d'obſervations* publié à Paris en 1693. Il compare les obſervations que M. Richer avoit faites à Cayenne, le premier Octobre 1672, avec celles que M. Picard & M. Romer faiſoient en même temps à Paris; mais il trouve la même différence en déclinaiſon de Mars à l'étoile ψ du Verſeau, ſoit par l'obſervation de Paris, ſoit par celle de Cayenne, enſorte que la parallaxe de

Mars lui paroiſſoit nulle pour ce jour-là, ſans qu'il pût en ſavoir préciſément la raiſon. Nous ne voyons pas, dit M. Caſſini, qu'il puiſſe y avoir d'erreur ſenſible dans l'obſervation de Paris, & il ne peut y avoir erreur que de 15″ au plus ſur la hauteur de Mars obſervée en Cayenne ; or la parallaxe de Mars, dans ce cas-là, étoit tout au plus de 25″ ; celle du ſoleil ne pouvoit donc être de plus de 9″, ſuivant ces obſervations.

M. Caſſini juge la parall. de $9''\frac{1}{2}$.

Quelques années après, c'eſt-à-dire, en 1684, M. Caſſini donna un mémoire qui a pour titre : *Les élémens de l'aſtronomie vérifiés par le rapport des tables aux obſervations de M. Richer, faites en l'Iſle de Cayenne.* Il compara entr'elles les obſervations du 5 Septembre 1672, du 9 & du 24, faites en même temps à Cayenne & à Paris, & il trouva que Mars avoit été pour Paris plus abaiſſé par rapport à l'étoile de 15″ qu'en Cayenne, ce qui donnoit la parallaxe horizontale de Mars $25''\frac{1}{2}$, & celle du ſoleil de $9''\frac{1}{2}$, ou ſa diſtance à la terre de 21600 demi-diamètres de la terre.

1732. La même année M. Caſſini, aidé de MM. Romer & Sédileau, employa pour chercher la parallaxe de Mars, la méthode des aſcenſions droites (1648), qu'il publia enſuite à l'occaſion de la comète de 1680. Entre les obſervations faites quatre heures avant le paſſage au méridien, & quatre heures après, on trouvoit le plus ſouvent deux ſecondes de temps de différence entre la variation apparente & celle qui devoit avoir lieu réellement, d'où M. Caſſini tiroit la parallaxe de Mars de 24 ou 27″ ; la diſtance de Mars à la terre étoit à la moyenne diſtance du ſoleil à la terre, comme 1 eſt à $2\frac{2}{3}$, ou comme 1 eſt à $2\frac{1}{4}$.

Le 9 Septembre 1672, la nuit même de l'oppoſition de Mars, il étoit près de deux petites étoiles diſpoſées ſelon ſon parallèle, qui ſervirent pour les obſervations de pluſieurs jours ; ces obſervations donnerent la variation journaliere de l'aſcenſion droite de Mars, entre le 8 & le 9 Septembre de $67''\frac{1}{2}$ de temps, entre le 9 & le 10 de $66''\frac{3}{4}$. Le 9, entre 8^h 36′ du ſoir & 15^h

56′, la variation apparente de l'aſcenſion droite de Mars fut obſervée de $21''\frac{1}{2}$; le changement véritable déduit des mouvemens journaliers, ne devoit être que de $19''\frac{1}{4}$; la différence de $1''\frac{1}{4}$ étoit l'accélération apparente, cauſée par l'effet de la parallaxe de Mars; Mars paſſoit au méridien à $12^h\ 8'$, ſa déclinaiſon étant de $10°\ 34'$, il eſt aiſé de conclure de tout cela (1648), avec M. Caſſini, que la parallaxe horizontale de Mars étoit de $24''\frac{3}{4}$.

Les mêmes recherches furent continuées juſqu'à la fin de Septembre; car comme les différences cherchées étoient extrêmement petites, il falloit un très-grand nombre d'obſervations, qui donnaſſent le plus ſouvent à peu-près la même choſe, pour être perſuadé que ces différences venoient de la parallaxe, & non de quelque défaut des obſervations, qui ſont d'ailleurs ſujettes à de ſemblables différences, ou même à de plus grandes: M. Caſſini convient qu'il eſt arrivé quelquefois qu'on n'a pas trouvé de différence entre les mouvemens horaires apparens & les véritables, & quelquefois un peu de différence contraire à l'effet de la parallaxe: on s'arrêtoit, dit il, à ce qu'on trouvoit plus ſouvent, & & par des obſervations plus choiſies.

1733. On manqua en 1672 l'obſervation la plus avantageuſe & la plus déciſive pour cette détermination: le premier Octobre Mars paſſa par la moyenne des trois étoiles appellées ♆ dans l'eau d'Aquarius, & il la cacha par ſon diſque à 10 heures du ſoir, comme on le trouve par la comparaiſon des obſervations faites le même jour; mais les nuages dérobèrent cette importante obſervation. On meſura cependant la même nuit pluſieurs diſtances de Mars à cette étoile, qui ſervent à trouver à peu-près le temps de cette conjonction; mais en les comparant enſemble on y trouve de petites différences irrégulières dont quelques-unes ne donnent point de parallaxe; d'autres en donnent trop, & d'autres ſont en ſens contraire à l'effet de la parallaxe.

Cela donnoit lieu à M. Caſſini de douter ſi l'irré-

gularité de ces différences entre les obſervations faites ſi près de la conjonction, n'étoit pas cauſée par quelque réfraction extraordinaire, & ſi Mars n'avoit point une atmoſphère par laquelle les rayons de l'étoile étoient rompus diverſement à diverſes diſtances, juſqu'à un certain terme. C'étoit à la diffraction ou inflexion de la lumière que ces différences devoient ſe rapporter, (*Newton*, *Opt. part.* 3). Irrégularité obſervée.

1734. M. Picard, à Brion en Anjou, obſerva les mêmes différences d'aſcenſion droite le premier Octobre 1672; il trouva la parallaxe de Mars abſolument nulle en comparant ſon obſervation avec celle de Cayenne; mais en comparant ſes obſervations entr'elles par la méthode des angles horaires (1647), il la trouva double de celle de M. Caſſini; tout cela prouve combien ces obſervations ſont délicates, & provient peut-être auſſi de la cauſe indiquée dans l'article précédent.

1735. M. de la Hire obſerva auſſi Mars à Paris avec aſſiduité depuis le 22 Septembre 1672 juſqu'au 29 Octobre ſuivant; pendant ce temps-là il le vit paſſer vers un grand nombre de petites étoiles qui ſont dans l'eau d'*Aquarius*, & il trouva de ſi grandes variétés dans les réſultats, qu'il jugea la parallaxe inſenſible, comme on le voit dans ſes tables, *pag.* 6 : « A peine avons-nous trouvé, dit-il, une parallaxe » ſenſible dans le ſoleil; ainſi l'on peut en ſûreté la » négliger ſi on le juge à propos. Si cependant on veut » employer pour le ſoleil une parallaxe de 6″, on aura » la diſtance moyenne du ſoleil à la terre, de 34377 » demi-diamètres terreſtres ». On peut juger par-là que ſi M. de la Hire n'a jamais employé la parallaxe du ſoleil que de 6″, c'étoit parce qu'il la croyoit abſolument inſenſible. M. de la Hire la juge de 6″.

1736. Flamſteed qui avoit fait les mêmes obſervations à Derby, écrivoit le 16 Novembre 1672, qu'ayant meſuré la diſtance de Mars à deux étoiles, il avoit reconnu que ſa parallaxe n'étoit certainement pas de 30 ſecondes, & que la parallaxe du ſoleil n'étoit

pas de plus de 10 ſecondes, (*Philoſ. tranſ.* n°. 89, *pag.* 5118), & quelques mois après, il étoit perſuadé que la parallaxe de Mars ne paſſoit pas 25 ſecondes, & que celle du ſoleil étoit tout au plus de 10 ſecondes (*Ib. pag.* 6100).

Diverſes obſervations qui donnent 10″.

1737. En 1704 M. Maraldi profita de la ſituation de Mars périgée pour obſerver ſa parallaxe, il la trouva de 23″, d'où réſultoit la parallaxe du ſoleil de 10 ſecondes. (*Mém. acad.* 1706, *pag.* 74).

M. Pound & M. Bradley firent auſſi en 1719 de ſemblables obſervations avec une lunette de 15 pieds : M. Halley rapporte qu'il les vit obſerver ſouvent & que dans toutes leurs obſervations ils ne trouvèrent jamais la parallaxe du ſoleil plus grande que 12″, & jamais moindre que 9″.

1738. M. Maraldi qui obſerva auſſi Mars en oppoſition la même année, trouva la parallaxe horizontale du ſoleil de 10 ſecondes, (*Mém. acad.* 1722, *pag.* 216).

1739. M. Caſſini en 1736 obſerva pendant pluſieurs jours, à Thury, Mars qui étoit en oppoſition & fort près de l'étoile μ des Poiſſons; il trouva la parallaxe du ſoleil entre 11″ & 15″.

1740. M. l'Abbé de la Caille ayant obtenu la permiſſion de faire un voyage au Cap de Bonne-Eſpérance pour y travailler au catalogue des étoiles (728), en profita pour faire ſur la parallaxe de la lune & ſur celle du ſoleil un grand nombre d'obſervations. Il a comparé à ſes obſervations celles qui avoient été faites à Greenwich, par M. Bradley ; à Bologne, par M. Zanotti; à Paris, par M. Caſſini de Thury & M. le Gentil; à Stockolm & à Upſal, par M. Wargentin & M. Strommer; à Hernoſand, par M. Schemmark, avec des quarts de cercles de ſix pieds, ou des lunettes de 7 à 8 pieds garnies de micromètres; ces obſervations faites depuis la fin du mois d'Août juſqu'au 6 Octobre 1751, étant toutes réduites au 14 Septembre 1751, jour de l'oppoſition de Mars au ſoleil, donnent des

réſultats qui ſont tous compris entre 24 & 34 ſecondes, mais par un milieu pris entre 27 réſultats M. de la Caille trouve 26″ 8 pour la parallaxe horizontale de Mars ce jour-là. La diſtance de Mars à la terre étoit alors à celle du ſoleil, comme 3841 à 10047, d'où il réſulte que la parallaxe horizontale du ſoleil étoit alors de 10″ $\frac{1}{4}$, & que dans la moyenne diſtance du ſoleil elle ſeroit de 10″, 2 ou 10″ $\frac{1}{5}$.

1741. M. de la Caille a encore recherché la parallaxe de Mars par 41 obſervations faites à Thury par M. Caſſini & M. Maraldi; à l'Hôtel de Clugny, par M. Meſſier; à Lyon, par le Pere Béraud Jéſuite; à Toulouſe, par M. d'Arquier & M. Garipuy; à Naples, par M. Sabatelli & le P. Carcani; & à Wittemberg en Saxe, par M. Boſe, le milieu entre ces 41 réſultats eſt de 26″ $\frac{1}{3}$ pour la parallaxe de Mars; ce qui diffère à peine des autres obſervations.

Dans le temps où M. de la Caille étoit au Cap de Bonne-Eſpérance, Vénus ſe trouva auſſi dans ſa conjonction inférieure, le 31 Octobre 1751, & elle fut obſervée au Cap & en Europe; il eſt vrai que le temps fut très-peu favorable aux obſervations, mais M. de la Caille en a calculé quatre qui donnent la parallaxe du ſoleil de 9″ 8, 10″ 4 à 10″ 5 & 11″ 4; ainſi prenant un milieu on a 10″ 38 pour la parallaxe horizontale du ſoleil dans ſa moyenne diſtance par les obſervations de Vénus; & toutes compenſations faites, M. de la Caille termine ſes recherches là-deſſus (*Introd. aux éphémérides de* 1765—1774, *pag.* L), en diſant qu'on peut établir comme une quantité certaine à moins d'un quart de ſeconde près que la parallaxe horizontale du ſoleil dans ſa diſtance moyenne à la terre, eſt de dix ſecondes & un quart.

1742. Tel étoit l'état actuel de nos connoiſſances ſur la diſtance du ſoleil, quand les paſſages de Vénus ſur le ſoleil ſont arrivés en 1761 & 1769. Si l'on a toujours mis au nombre des époques mémorables, celles des progrès de l'eſprit, tout ce qui nous procure

des connoiſſances nouvelles eſt pour nous un événement célèbre : le paſſage de Vénus étoit un de ces phénomenes rares & ſinguliers, prédit & attendu depuis plus d'un ſiècle, il n'avoit jamais été obſervé, depuis qu'on en connoiſſoit l'importance. C'étoit cependant de tous les phénomènes céleſtes, celui dont on devoit eſpérer la plus exacte détermination de la parallaxe du ſoleil, & par conſéquent de toutes les diſtances des planètes à la terre, comme nous le dirons dans le XIe. livre. Ces paſſages nous ont fait connoître que la parallaxe du ſoleil eſt à peu-près de 9 ſecondes, car l'obſervation faite au Cap en 1761, a donné la parallaxe de 8″ 6 pour le jour de l'obſervation, ſuivant M. Short, (*Phil. tranſ.* 1763, *pag.* 340); & ſuivant M. Pingré, (*Mém. acad.* 1761, *pag.* 479). Ce qui fait preſque 8″ 8 pour les moyennes diſtances; & par l'obſervation faite à la Baye d'Hudſon en 1769, je trouve 9″ 2 (2149), le milieu eſt exactement 9″, parallaxe moyenne du ſoleil, & nous pourrons ſuppoſer en nombres ronds la parallaxe du ſoleil de 9 ſecondes, dans le reſte de cet ouvrage.

Par les paſſages de Vénus 9″.

1743. L'extrême petiteſſe de la parallaxe du ſoleil fait qu'on peut dans un grand nombre d'occaſions la négliger, & ſuppoſer que les rayons qui vont du ſoleil à tous les points de la terre ſont paralleles entr'eux, de la même manière que ſi le ſoleil étoit à une diſtance infinie de nous; puiſque des lignes qui font entre elles un angle ſi petit ne diffèrent pas de celles qui ſeroient exactement paralleles, ou qui ne feroient point d'angle, c'eſt la ſuppoſition que nous ferons dans les préliminaires du calcul des éclipſes.

1744. La diſtance du ſoleil à la terre eſt plus petite au mois de Décembre qu'au mois de Juin d'une trentième partie, parce que l'excentricité de l'orbite terreſtre eſt de 0, 0168 (1217, 1278). Ainſi la parallaxe horizontale du ſoleil doit être d'un tiers de ſeconde plus grande au mois de Janvier qu'au mois de Juillet.

La parallaxe du Soleil change d'un tiers de ſec.

1745.

1745. Lorſqu'on a une table des logarithmes des diſtances du ſoleil à la terre faite ſuivant les principes de l'art. 1245, il ſuffit de diviſer la parallaxe moyenne par la diſtance actuelle du ſoleil pour avoir la parallaxe du ſoleil dans un temps donné; ſi elle eſt de 9″ au commencement d'Avril & d'Octobre, elle n'eſt que de 8 ſecondes $\frac{83}{100}$ au commencement de Juillet, & elle eſt de 9 ſecondes $\frac{17}{100}$ au commencement de Décembre.

1746. La parallaxe du ſoleil étant connue, ſa diſtance abſolue eſt aiſée à trouver (1634) : car le ſinus de 9 ſecondes eſt au rayon, comme le demi-diamètre de la terre eſt à la diſtance du ſoleil; & comme le rayon d'un cercle eſt 22918 fois plus grand que le ſinus de 9 ſecondes ; il s'enſuit que la diſtance du ſoleil eſt de 22918 fois le rayon de la terre, ou environ 32830478 lieues communes de France, de 2283 toiſes chacune. Les diſtances des autres planètes ſont aiſées à conclure de celles-ci, puiſqu'on connoît leur rapport (1224), & nous avons déjà rapporté ces diſtances, (1222). Diſtances abſolues des Planètes.

1747. J'ai annoncé (1093) que même ſuivant Tycho, le ſoleil étoit plus gros que la terre, cela ſuit évidemment de la quantité qu'il ſuppoſoit pour la parallaxe du ſoleil, qui étoit de 3′ (1726); le demi-diamètre du ſoleil étant ſuppoſé de 15′ vu de la terre, & celui de la terre de 3′ vu du ſoleil, il s'enſuit que le ſoleil eſt cinq fois plus large que la terre, ou 125 fois plus gros & plus peſant, même dans les principes de Tycho; enſorte qu'il faiſoit tourner autour de la terre un corps bien plus gros qu'elle, (1093).

1748. On peut actuellement comparer entre elles les diſtances du ſoleil & de la lune, & reconnoître que la diſtance moyenne de la lune eſt 384 fois plus petite que celle du ſoleil, à peu-près comme nous l'avons ſuppoſé (1409); les parallaxes ſeules ſuffiſent pour reconnoître ce rapport; celle de la lune eſt de 57′ 39″:

(1712); ainſi elle contient 384 fois la parallaxe du ſoleil ſuppoſée de 9 ſecondes, & 380 fois ſi l'on employe la parallaxe de la lune dans les moyennes diſtances qui eſt 57′ 3″. Donc la diſtance du ſoleil eſt dans le même rapport, c'eſt-à-dire, 380 fois plus grande que la diſtance moyenne de la lune.

1749. Les principes que nous venons d'établir ſur les parallaxes, nous conduiront maintenant aux calculs des éclipſes de lune & de ſoleil, qui ſeront l'objet du livre ſuivant, & qui n'ont preſque aucune difficulté, quand on entend bien le calcul des parallaxes.

LIVRE DIXIEME.

DU CALCUL DES ÉCLIPSES.

1750. LES ÉCLIPSES (a) ont toujours formé pour les hommes un ſpectacle frappant ; la manière de les prédire leur paroît être l'objet le plus important des recherches de l'aſtronomie ; c'eſt du moins la preuve ſur laquelle on juge ſouvent des progrès de cette ſcience & de l'exactitude des aſtronomes.

Il eſt vrai que les éclipſes ne ſont importantes pour nous que parce qu'elles ſont un moyen de déterminer les inégalités de la lune, & les longitudes des différens lieux de la terre ; mais cet objet eſt aſſez conſidérable pour mériter des détails ; ajoutons à cela l'intérêt que le Public y prend, l'uſage où ſont les aſtronomes de les calculer toutes avec le plus de ſoin qu'il eſt poſſible, & l'emploi que les Hiſtoriens en ont fait ; tout cela exige qu'on apprenne dans un livre d'aſtronomie toutes les méthodes les plus exactes & les plus sûres de calculer les éclipſes, avec toutes les choſes remarquables qui peuvent y avoir rapport.

1751. Le premier calcul préliminaire dans une éclipſe eſt celui de la conjonction moyenne : lorſqu'on ignore le temps où il y aura des éclipſes & qu'on veut s'en inſtruire, on eſt obligé de calculer toutes les conjonctions & toutes les oppoſitions qui arriveront dans l'année, & de choiſir celles qui peuvent être écliptiques ; c'eſt-à-dire, où la lune ſera aſſez près de l'écliptique, & à une latitude aſſez petite pour qu'il puiſſe y avoir éclipſe. On a calculé diverſes tables propres à trouver aiſément chaque conjonction moyenne : nous

Conjonctions moyennes.

(a) Ἔκλειπω, *deficio*, parce que dans les éclipſes le ſoleil ou la lune paroiſſent nous manquer.

avons vu que le Saros de M. Halley, ou la période Caldéenne de Pline ramene ordinairement les éclipſes dans le même ordre au bout de 18 ans (1501); ainſi cette période fournit déjà un moyen pour prévoir à peu-près les jours où il peut y avoir une éclipſe de lune ou de ſoleil, quand on connoît celles qui ont eu lieu 18 ans auparavant; mais l'uſage de cette méthode eſt borné (1502).

Epactes aſtronomiq.

1752. On peut auſſi reconnoître les ſyzygies écliptiques par la méthode des épactes, & c'eſt la voie la plus naturelle & la plus générale. On en trouve la table dans le P. Riccioli, (*Aſtron. reform. pag.* 60); dans M. de la Hire, dans M. Caſſini, (*Tables aſtron. pag.* 58), dans les éphémérides du P. Hell, pour 1764, & dans nos tables de la lune. Les épactes aſtronomiques dont nous nous ſervons pour trouver les nouvelles lunes moyennes, ne ſont autre choſe que l'âge de la lune au commencement de l'année, ou le nombre de jours qui reſtoit depuis la dernière conjonction moyenne de l'année précédente juſqu'au commencement de l'année actuelle, ſi elle eſt biſſextile, ou à la veille ſi c'eſt une année commune (1326); par exemple, il y a eu conjonction moyenne le 26 Décembre 1761, à $1^h\ 14'\ 14''$, la longitude moyenne du ſoleil étant égale à la longitude moyenne de la lune; depuis ce moment-là juſqu'au 31 de Décembre à midi, pour lequel ſont calculées les époques des années communes, il y a quatre jours $22^h\ 45'\ 46''$; c'eſt-là ce qu'on appelle épacte aſtronomique de 1762. Cette épacte étant retranchée de 29 jours $12^h\ 44'\ 3''$, nous apprend que la première conjonction moyenne de 1762 arrivera le 24 Janvier à $13^h\ 58'\ 17''$ de temps moyen, puiſque 4 jours 22^h qui reſtent de l'année précédente avec 24 jours 13^h du mois de Janvier, font l'intervalle de 29 jours 12^h qu'il doit y avoir d'une conjonction à l'autre.

1753. Pour calculer l'épacte d'une année, il ſuffit de retrancher la longitude moyenne du ſoleil de celle de la lune, & de convertir le reſte en temps lunaire,

à raiſon de 12° 11′ 27″ par jour, qui eſt la différence des mouvemens diurnes du ſoleil & de la lune. Ainſi l'époque du ſoleil pour 1762 eſt 9 ſignes 10° 6′ 14″; & celle de la lune 11 ſignes 10° 25′ 45″, ſuivant les premières tables de Mayer; celle du ſoleil étant retranchée de cette dernière, il reſte 2 ſignes 0° 19′ 31″ qui répondent à quatre jours 22ʰ 45′ 46″ de temps, ces 4 jours ſont l'épacte de 1762, parce qu'il a fallu 4 jours à la lune pour s'éloigner du ſoleil de deux jours, & qu'au moment de l'époque de 1762, il y avoit quatre jours que la conjonction étoit paſſée; il eſt aiſé de trouver le temps qui répond à une différence quelconque de longitude, dès que l'on ſait que pour 360° il faut 29 jours 12ʰ 44′ 3″ (1422).

1754. On trouvera parmi nos tables de la lune celle des épactes, qui avoit été calculée par M. L'émery, ſur la première édition des tables de Mayer; après les épactes des années qui reſtent de ce ſiècle-ci, on y trouve celles d'un nombre quelconque d'années, juſqu'à 2000; vis-à-vis des années & des centaines d'années, il y a des nombres qu'on peut appeller le *changement des épactes*, & qui s'ajoutent à l'épacte d'une année pour avoir celle d'une autre année; ainſi vis-à-vis d'une année on trouve 10 jours 15 heures qui eſt l'âge de la lune à la fin de l'année, quand la conjonction eſt arrivée au commencement; de même vis-à-vis de 60 on trouve 3 jours 7ʰ 16′ 9″, c'eſt le temps qui répond à la différence entre le mouvement du ſoleil en 60 ans, c'eſt-à-dire, entre 27′ 33″, & celui de la lune 40° 43′ 24″; cette différence 40° 15′ 51″ répond à 3 jours 7 heures, c'eſt la quantité dont la lune eſt plus éloignée de ſa conjonction à la fin de 60 ans qu'elle ne l'étoit auparavant; enſorte que l'on ajoute ces 3 jours 7 heures à l'épacte de l'époque propoſée pour avoir l'épacte à la fin des 60 ans. Il en eſt de même des changemens de chaque mois.

L'épacte du mois de Janvier eſt zéro, car puiſque l'épacte de l'année marque l'âge de la lune le 31 Dé- Epactes des mois.

cembre, & que nous appellons zéro le 31 Décembre, il n'y a rien a y ajouter pour le mois de Janvier. L'épacte de Février ſera l'âge de la lune au commencement de Février, en ſuppoſant que la lune ait commencé le 31 Décembre, c'eſt donc l'excès de 31 jours ſur une lunaiſon entière, ou un jour $11^h\ 15'\ 58''$. Pour comprendre la raiſon de cette épacte du mois de Février, on conſidérera que ſi l'épacte de l'année étoit nulle ou $0^j\ 0^h\ 0'$ la conjonction ſeroit arrivée le 31 Décembre précédent à midi, (art. 1756); & celle du mois de Janvier qui arrive 29 jours 13 heures plus tard tomberoit au 29 Janvier à 13^h, il reſteroit du mois de Janvier un jour & 11^h, & c'eſt l'épacte du mois ſuivant. Cette épacte ôtée de $29^j\ 13^h$ fait voir que la conjonction ſuivante arrivera le 28 Février à deux heures; il s'en faut deux heures qu'il ne reſte quelque choſe de ce mois-là; ainſi l'épacte du mois de Mars ſeroit *moins* deux heures; ou ce qui revient au même 29 jours 11 heures.

L'épacte de Mars eſt l'âge de la lune, le premier de Mars, en ſuppoſant que la lune ait commencé le 9 de Décembre, c'eſt donc l'excès de 59 jours que contiennent les deux premiers mois ſur la durée d'une lunaiſon, ou $29^j\ 11^h\ 15'\ 58''$. On trouvera de même les changemens des autres mois, tels qu'ils ſont dans la table.

1755. Delà ſuit aiſément la règle générale pour trouver une nouvelle lune, par la table des épactes.

Règle pour trouver une conjonction.

Ajoutez enſemble l'épacte des années & celle du mois, retranchez la ſomme d'une révolution ou de pluſieurs, enſorte que le reſte ſoit moindre que 29^j, & ce reſte marquera le jour, l'heure & la minute de la conjonction moyenne pour ce mois-là. Si l'année eſt biſſextile, il faut, dans les deux premiers mois, retrancher un jour de la ſomme des épactes avant de faire la ſouſtraction; parce que les époques des années biſſextilles étant pour le premier Janvier à midi, ſont trop avancées d'un jour, juſqu'à ce que le jour intercalaire, placé vers la fin de

Février, ait rétabli les choſes dans leur ordre naturel.

On demande la conjonction moyenne du mois d'Avril 1764; en ſuppoſant qu'on n'ait pas une table auſſi détaillée que la nôtre, on ajoutera enſemble les nombres ſuivans, tirés de la table des épactes aſtronomiques.

Epacte de l'année 1700.	9j	21h	50′	53″
Changement pour 60 ans.	3	7	16	9
Pour 4 ans.	14	0	1	38
Pour le mois d'Avril.	1	9	47	51
Somme à ôter	28	14	56	31
Révolution entière	29	12	44	3
Conjonction moyenne	0	21	47	32

C'eſt-à-dire, le 31 Mars à 21 heures.

1756. Lorſque le jour de la conjonction moyenne ſe trouve zéro, comme dans l'exemple précédent, il faut prendre le dernier jour du mois précédent; ainſi la conjonction que nous venons de trouver, eſt celle du 31 Mars à $21^h\ 47'\ 32''$, quoique nous ayons employé l'épacte du mois d'Avril; on ſent aſſez qu'il faudroit avoir un jour dans la ſomme des épactes, pour pouvoir dire que c'eſt le premier d'Avril; tant qu'il n'y a que zéro de jours pour le mois d'Avril, on ne peut pas dire que nous ſoyons en Avril, car on compte 1 auſſi-tôt que le mois commence.

1757. Pour trouver les pleines lunes ou oppoſitions moyennes, il faut conſidérer qu'elles arrivent plus tard que les conjonctions moyennes, d'une demi-révolution ou de $14j\ 18^h\ 22'\ 1''\frac{1}{2}$, ainſi il ſuffira d'ajouter ces 14 jours au temps d'une conjonction moyenne, pour trouver l'oppoſition qui la ſuit, ou d'en ôter 14 jours pour avoir l'oppoſition qui précède: on peut auſſi trouver le temps d'une oppoſition, en retranchant de $14j\ 18^h\ 22'\ 1''$, la ſomme des épactes; car ſi l'épacte, où ce qui reſte du mois précédent, à compter de la nouvelle lune, eſt de 5 jours, il eſt évident que la pleine lune arrivera

Pour les pleines lunes.

le 9 du mois ſuivant, puiſqu'il doit y avoir 14 jours d'intervalle; il ſuffit donc d'ôter de 14 jours, les 5 jours d'épactes, & le reſte 9 annonce que la pleine lune arrivera le 9e jour du mois.

Si la ſomme des épactes eſt trop grande pour pouvoir être ôtée de 14^{j}, on ajoutera à 14^{j} une ou pluſieurs révolutions; ainſi pour trouver la pleine lune du mois d'Avril 1764, on ajoutera la

demi-révolution, ...	14^{j}	18^{h}	22$'$	1$''$
Avec une révolution entière. . . .	29	12	44	3
Somme.	44	7	6	4
Otez la ſomme des épactes Avr. 1764.	28	14	56	31
Pleine lune du mois d'Avril.	15	16	9	33

1758. M. Halley avoit donné une ſuite d'éclipſes, depuis 1701 juſqu'à 1718, pour ſervir à trouver les autres éclipſes par la période de 18 ans (1502); mais les éditeurs y ajoutèrent une table des conjonctions moyennes que M. Pound avoit conſtruite, & que l'on peut voir dans le premier volume des tables de Halley, (à Paris chez Bailly, *in*-8°. 1754), elle revient à peu-près au même que celle des épactes; mais on y a joint des tables d'équations pour trouver à peu-près les conjonctions vraies. Il y en a de ſemblables dans le *Calendarium*, imprimé à Berlin pour 1749.

Trouver s'il y aura éclipſe.

1759. Quoiqu'on ne connoiſſe encore que le temps moyen d'une conjonction moyenne, ou d'une oppoſition moyenne, par la méthode des épactes on peut ſavoir, à peu-près, s'il y aura éclipſe de ſoleil ou de lune; on prendra dans les tables la longitude moyenne du ſoleil & celle du nœud de la lune pour le temps moyen trouvé; on retranchera le lieu d'un des nœuds, de la longitude moyenne du ſoleil, & l'on aura la diſtance moyenne du ſoleil au nœud de la lune.

Lorſque le ſoleil eſt éloigné de plus de 21° d'un des nœuds de la lune, il ne ſauroit y avoir éclipſe de ſoleil, en aucun lieu de la terre; ſi cette diſtance eſt moindre

moindre que 15°, il eſt ſûr qu'il y aura éclipſe de ſoleil en quelque lieu de la terre ; l'incertitude roule entre 15 & 21°, c'eſt-à-dire, que ſi la diſtance moyenne du ſoleil au nœud le plus voiſin, dans le temps de la conjonction moyenne, eſt entre 15 & 21° ; il faudra faire un calcul plus exact que celui dont je viens de parler, pour être ſûr qu'il y aura éclipſe. (M. Caſſini, *Tables aſtr. pag.* 25).

Il ne peut y avoir éclipſe de lune, ſi dans le temps de la conjonction moyenne il y a plus de 14° ½ de diſtance moyenne entre le ſoleil & le nœud de la lune ; mais on eſt ſûr qu'il y en aura une, ſi cette diſtance eſt moindre que 7° ½ ; entre 14° ½ & 7° ½, l'on ſera obligé de recourir à un autre calcul, mais il eſt toujours très-commode d'avoir promptement l'excluſion de preſque toutes les ſyzygies qui ne ſauroient être écliptiques, & de n'avoir à en calculer rigoureuſement qu'un très-petit nombre, pour connoître toutes les éclipſes qui doivent arriver dans une année quelconque.

1760. Il y a des années dans leſquelles il n'arrive aucune éclipſe de lune, telle eſt l'année 1767 ; le nœud de la lune s'étant trouvé à 10ˢ 11° au commencement de Janvier ; mais communément il y en a pluſieurs à chaque année.

1761. Lorſqu'on a trouvé qu'il doit y avoir éclipſe dans une nouvelle ou pleine lune, & qu'on veut en calculer les circonſtances, il faut commencer par trouver l'heure & la minute en temps vrai de la conjonction ou de l'oppoſition vraie en longitude ; la latitude de la lune pour ce moment ; le mouvement horaire de la lune en longitude & en latitude, la parallaxe & le diamètre ; c'eſt un préliminaire eſſentiel dans le calcul de toutes les éclipſes. Calculs néceſſaires pour toutes les éclipſes.

Pour cela, on calcule d'abord le lieu du ſoleil & celui de la lune, comme nous le dirons en parlant de l'uſage des tables, pour deux inſtans différens ; & l'on a par ce moyen le mouvement horaire de la lune & celui du ſoleil, avec la différence de leur longitude

pour un inſtant connu ; on peut auſſi ſe ſervir des tables du mouvement horaire qui ſont à la ſuite des tables de la lune.

Temps de la conjonction.

Je ſuppoſe qu'on ait trouvé pour le premier Avril 1764 à 8 heures 32′ du matin que le lieu de la lune étoit moins avancé que celui du ſoleil de 54′, & que le mouvement horaire de la lune, moins celui du ſoleil, étoit de 27′ ; il eſt évident que puiſque la lune ſe rapproche du ſoleil de 27′ par heure, elle atteindra le ſoleil deux heures après ; car 27′ ſont à une heure comme 54′ ſont à deux heures. Ainſi la conjonction vraie, arrivera à 10^h 32′.

Lorſqu'on connoît le temps de la conjonction on trouve dans les tables pour le même inſtant, la latitude de la lune, ſa parallaxe, ſon diamètre & le diamètre du ſoleil ; il faut auſſi connoître le mouvement horaire de la lune en latitude, & pour cet effet on calcule la latitude de la lune pour deux inſtans différens.

1762. Quand on a l'heure de la conjonction & le mouvement horaire de la lune, il faut trouver l'inclinaiſon de ſon orbite par rapport à l'écliptique ; d'abord l'inclinaiſon de l'orbite vraie, enſuite celle de l'orbite relative ; cela eſt néceſſaire pour les éclipſes de lune, & même pour les éclipſes de ſoleil quand on veut en avoir les phaſes pour différens pays de la terre (1806) ; voilà pourquoi je place cet article au nombre des préliminaires généraux du calcul des éclipſes.

Orbite relative.

1763. Lorſqu'on calcule une conjonction de deux planètes, ou d'une planète à une étoile, c'eſt-à-dire, un appulſe, ou même une éclipſe, on n'a beſoin que de connoître la quantité dont un des aſtres ſe rapproche de l'autre, ou le mouvement relatif ; par exemple, dans une éclipſe de ſoleil on demande avec quelle vîteſſe & dans quelle direction la lune s'approche du ſoleil. Il ſuffit pour cet effet de chercher combien la longitude d'une planète ſurpaſſe celle de l'autre dans l'eſpace d'une heure, & combien une latitude excède l'autre dans le même eſpace de temps : ce n'eſt pas le

mouvement réel, total & abſolu, de chacune des deux planètes, mais l'excès d'un des mouvemens ſur l'autre qui produit une conjonction ou une éclipſe.

On peut donc ne faire aucune attention au mouvement d'une des deux planètes, pourvu qu'on donne à l'autre la différence des deux mouvemens, c'eſt-à-dire, qu'en faiſant mouvoir ſeulement l'une des deux on lui faſſe changer de longitude & de latitude par rapport à l'autre, autant qu'elle en change réellement par la combinaiſon des deux mouvemens pris enſemble ; on aura par ce moyen la conjonction apparente des deux aſtres, tout de même que ſi l'on conſidéroit les deux mouvemens à la fois.

Ainſi pour calculer une conjonction de deux planètes, on ne conſidère que le mouvement relatif, c'eſt-à-dire, le mouvement de l'une par rapport à l'autre, & on ſuppoſe fixe l'une des deux; cette ſuppoſition ne fait que ſimplifier le calcul & ne change rien à l'état réel des choſes ; car ſi une planète avance par heure de 36 minutes, & l'autre de 2 minutes, il eſt évident qu'elles ne changeront que de 34 minutes l'une par rapport à l'autre, & elles ſeront à la même diſtance que ſi l'une étant fixe, l'autre n'avoit eu que 34′ de mouvement.

Soit P & A (*fig.* 97) les deux planètes en conjonction, $PR = AB$ le mouvement horaire d'une des deux planètes en longitude, c'eſt-à-dire, parallèlement à l'écliptique, AC le mouvement horaire de l'autre planète; la différence BC des deux mouvemens eſt le mouvement horaire relatif, puiſque la première planète ayant avancé de la quantité PR égale AB, & la ſeconde planète de la quantité AC, elles ne diffèrent l'une de l'autre que de la quantité BC en longitude, c'eſt-à-dire, autant que ſi l'une étoit reſtée en P, & que l'autre eût parcouru ſeulement un arc AG égal à BC, en partant du point A. *Fig.* 97.

1764. Il en eſt de même du mouvement en latitude ; ſuppoſons que la planète qui a eu le mouvement

Fig. 97. PR en longitude ait eu le mouvement RD en latitude, en ſorte que ſon vrai mouvement ſoit PD; ſuppoſons que l'autre planète ait eu de même un mouvement en latitude CE, en même temps que le mouvement en longitude AC; c'eſt-à-dire, que ſon mouvement propre ait été réellement AE, la différence des deux mouvemens horaires en latitude RD & CE, ou la quantité FE ſera le mouvement horaire relatif en latitude, ou la quantité dont une planète s'éloignera de l'autre en latitude; on pourra donc ſuppoſer fixe la planète P, prendre AG & GH à la place de BC & FE, & ſuppoſer que la planète A a parcouru l'orbite relative AH.

Fig. 98. On pourra faire auſſi un triangle MNO (*fig.* 98), dont les côtés MN & NO ſoient égaux aux mouvemens horaires relatifs BC & FE ou AG & GH en longitude & en latitude, l'angle OMN ſera l'inclinaiſon de l'orbite relative, & MO le mouvement horaire ſur cette orbite relative; on pourra ſuppoſer qu'une planète étant reſtée fixe en M, l'autre a decrit MO: par le moyen de cette ſuppoſition on voit que les deux planètes différeront, ſoit en longitude, ſoit en latitude autant que lorſqu'on laiſſoit à chacune ſon mouvement particulier; tout ſe paſſera donc entr'elles, & toutes les apparences ſeront les mêmes qu'auparavant; la ſuppoſition de l'orbite relative MO ne fera que ſimplifier le calcul, en réduiſant deux mouvemens à un ſeul.

1765. L'orbite relative eſt donc celle que l'on peut ſuppoſer à la place de l'orbite réelle, & dans laquelle pourroit ſe mouvoir une des deux planètes ſans que ſes diſtances réelles par rapport à l'autre paruſſent être changées. Dans le triangle MNO on a ces proportions: MN eſt à NO, comme le rayon eſt à la tangente de l'angle OMN, & le coſinus de l'angle OMN eſt au rayon, comme MN eſt à MO; ainſi pour trouver l'inclinaiſon de l'orbite relative & le mouvement horaire relatif, on fera ces deux proportions: *La différence des deux mouvemens horaires en longitude, eſt à la*

Inclinaiſon de l'orbite relative.

différence des mouvemens en latitude, comme le rayon eſt à la tangente de l'inclinaiſon relative. Enſuite, *le coſinus de l'inclinaiſon relative eſt au rayon comme la différence des mouvemens horaires en longitude eſt au mouvement horaire* MO *ſur l'orbite relative.* C'eſt celui dont nous ferons uſage (1777, 1807), & nous en donnerons un exemple à l'art. 1778 (a). Mouvement relatif.

1766. On ſuppoſe dans ces deux proportions que les planètes vont du même ſens tant en longitude qu'en latitude; mais ſi l'une étoit directe & l'autre rétrograde, c'eſt-à-dire, ſi l'une des longitudes étoit croiſſante & l'autre décroiſſante, il faudroit prendre la *ſomme* des mouvemens horaires en longitude, au lieu de leur différence. De même ſi l'une des latitudes étoit croiſſante & l'autre décroiſſante, du même côté de l'écliptique, c'eſt-à-dire, ſi l'une alloit au nord & l'autre au midi par le mouvement horaire en latitude, il faudroit prendre la *ſomme* des mouvemens en latitude au lieu de leur différence; tout cela peut avoir lieu quand on calcule les éclipſes des planètes par la lune (1995).

Dans les éclipſes de lune ce n'eſt pas le ſoleil; mais le point oppoſé au ſoleil que l'on conſidère comme l'une des deux planètes; ce point oppoſé au ſoleil, qui eſt le centre de l'ombre de la terre, a le même mouvement horaire en longitude que le ſoleil lui-même, & par conſéquent doit ſe traiter comme le ſoleil. Le ſoleil n'ayant aucun mouvement horaire en latitude, c'eſt celui de la lune que l'on emploie dans les deux proportions de l'article 1765.

1767. Dans le calcul des éclipſes de lune on peut ſe contenter d'ajouter 8 ſecondes à la différence des mouvemens horaires en longitude, pour avoir le mouvement relatif ou compoſé, de la lune au ſoleil, & éviter la ſeconde analogie, parce que dans un triangle dont un angle eſt de $5^{\circ}\frac{1}{4}$, & l'hypothénuſe d'un demi-degré, le grand côté a environ $8''$ de moins que l'hypothénuſe.

(a) Il faut bien diſtinguer l'orbite relative de l'orbite apparente (1879).

Différence des inclinaisons.

1768. On trouve dans les tables de M. Caſſini, (*pag.* 57), une réduction qui eſt toujours entre 22 & 28 minutes ; que l'on ajoute avec 5° 15′ qui eſt à peu-près l'inclinaiſon vraie de l'orbite de la lune dans toutes les éclipſes, pour avoir l'inclinaiſon relative ou celle de l'orbite compoſée ; cet angle eſt la différence entre *EAC* & *HAG* (*fig.* 97).

1769. Dans les éclipſes de ſoleil ou d'étoiles que l'on ne veut calculer que par une opération graphique (1850), on n'a beſoin de ſavoir qu'à 5 minutes près, l'inclinaiſon de l'orbite lunaire, on peut alors ſuppoſer toujours que l'inclinaiſon eſt de 5° 40′ ; pour les éclipſes de ſoleil, & 5° 9′ pour les éclipſes d'étoiles ; mais ſi l'on veut calculer l'éclipſe rigoureuſement (1868), ou s'il s'agit d'une éclipſe d'étoile par la lune (1860), il faut chercher le mouvement horaire de la lune en longitude & en latitude, & faire la proportion de l'article 1765.

Des Éclipses de Lune.

1770. L'éclipse de Lune eſt l'obſcurité produite ſur le diſque de la lune, par l'ombre de la terre. L'éclipſe totale eſt celle où la lune entière eſt obſcurcie ; l'éclipſe partiale eſt celle où une partie du diſque de la lune conſerve ſa lumière. L'éclipſe *centrale* eſt celle qui a lieu quand l'oppoſition arrive dans le point même du nœud ; la lune traverſe alors par le centre même le cône d'ombre, c'eſt pourquoi l'on appelle centrale cette ſorte d'éclipſe.

Eclipſe centrale.

Si la lune au moment de ſon oppoſition vraie eſt aſſez loin de ſes nœuds pour que ſa latitude ſurpaſſe 30 minutes, l'éclipſe de lune ne ſauroit être totale, & ſi la latitude eſt plus grande que 64 minutes, il ne ſauroit y avoir éclipſe, parce que l'ombre de la terre n'occupe jamais dans l'orbite de la lune plus de 47 minutes, & le demi-diamètre 17′ : ainſi pour que le bord de la lune puiſſe toucher l'ombre de la terre, il faut

Limites écliptiques.

que la diſtance de leurs centres ou la latitude de la lune ne ſurpaſſe pas 64′.

1771. Nous meſurons les mouvemens de la lune par les arcs céleſtes qu'elle paroît décrire; il eſt donc néceſſaire de meſurer de la même manière l'ombre qu'elle traverſe dans les éclipſes, c'eſt-à-dire, la largeur de ce cône ténébreux que la terre répand derrière elle, en interceptant la lumière du ſoleil, comme font tous les corps opaques.

Soit *S* le centre du ſoleil (*fig.* 99), *T* le centre de la terre, *L* celui de la lune en oppoſition, *SA* le demi-diamètre du ſoleil, *TB* le demi-diamètre de la terre, *LC* le demi-diamètre de l'ombre de la terre dans l'endroit où la lune doit la traverſer; cette ligne *LC* eſt le rayon du cercle qui forme la ſection, perpendiculaire à l'axe, du cône de l'ombre dans la région de la lune. *Fig.* 99.

L'angle *CTL* formé au centre de la terre & qui a pour baſe le côté *CL*, eſt ce qu'on appellera le demi-diamètre de l'ombre; c'eſt l'angle ſous lequel nous paroît le mouvement de la lune, ou l'arc de ſon orbite qu'elle décrit pendant la demi-durée de l'éclipſe centrale, c'eſt-à-dire, en traverſant l'ombre de *C* en *I*. Demi-diamètre de l'ombre.

1772. Le triangle rectiligne *CAT* dont le côté *AT* eſt prolongé juſqu'en *D* a ſon angle externe *CTD*, égal aux deux angles internes oppoſés pris enſemble, c'eſt-à-dire, aux angles *BAT* & *BCT*, dont l'un eſt la parallaxe du ſoleil, l'autre celle de la lune (1625); ainſi l'angle *CTD* eſt égal à la ſomme des parallaxes; ſi l'on en ôte l'angle *LTD* il reſtera l'angle *CTL* ou le demi-diamètre de l'ombre; mais l'angle *LTD* eſt égal à l'angle oppoſé *ATS*, qui meſure le demi-diamètre apparent du ſoleil, donc ſi l'on ôte *de la ſomme des parallaxes le demi-diamètre apparent du ſoleil, le reſte ſera le demi-diamètre de l'ombre.* La figure 100 repréſente la ſection du cône ou le cercle d'ombre, dont le rayon eſt *LC* dans la figure 99. Règle pour le connoître.

Exemple. La parallaxe horizontale de la lune au moment de l'oppoſition du 17 Mars 1764, étoit de 60′ 56″, la parallaxe horizontale du ſoleil eſt conſtamment de 9 ſecondes (1742), la ſomme des parallaxes eſt donc 61′ 5″; ſi l'on en ôte le demi-diamètre du ſoleil 16′ 5″, on aura pour le demi-diamètre de l'ombre 45′ 0″. Il y faudra encore ajouter environ 45″ pour l'atmoſphère de la terre (1776).

1773. Le demi-diamètre de l'ombre trouvé par la règle précédente, peut varier depuis 37′ 46″ juſqu'à 46′ 19″; il eſt le plus grand quand la lune eſt périgée & le ſoleil apogée.

Augmentation à cauſe de l'atmoſphère.

1774. On connoît aſſez le diamètre de la terre & la parallaxe de la lune pour être sûr de la détermination du diamètre de l'ombre trouvé par la règle précédente. Cependant quand on obſerve les éclipſes on trouve conſtamment que l'ombre eſt un peu plus grande que ſuivant cette règle; & il eſt évident que l'atmoſphère de la terre en eſt la cauſe.

La denſité de l'air eſt aſſez grande & réfléchit aſſez de rayons pour former des crépuſcules (2260), pour cauſer la réfraction aſtronomique (2160), & pour affoiblir prodigieuſement la lumière du ſoleil à l'horizon (2259): ainſi il n'eſt pas étonnant qu'elle le ſoit aſſez pour intercepter une partie des rayons qui éclairent la lune, pour former une augmentation autour de l'ombre de la terre, & pour changer la longueur & l'intenſité du cône d'ombre. C'eſt une des cauſes qui font que l'ombre eſt mal terminée & qu'on trouve ſouvent 2′ de différence entre les temps du commencement d'une même éclipſe de lune obſervée par différens aſtronomes.

L'augmentation que l'atmoſphère produit dans le demi-diamètre de l'ombre eſt de 20″, ſuivant M. Caſſini, de 30″ ſuivant M. le Monnier, de 60″ ſuivant M. de la Hire.

1775. M. le Gentil penſe qu'elle eſt de 40″ dans les parties de l'ombre qui répondent à l'équateur, & de

de 1′ 40″ pour les parties qui ſont formées par la maſſe d'un air plus denſe répandu autour des poles de la terre. (*Mém. acad.* 1755, *Expoſition du calcul*, *pag.* 157, *Connoiſſance des mouvemens céleſtes* 1763).

1776. Enfin d'autres aſtronomes, entr'autres M. Mayer, penſent que la correction de l'atmoſphère eſt toujours $\frac{1}{60}$ du demi-diamètre de l'ombre, c'eſt-à-dire, qu'il faut y ajouter autant de ſecondes qu'il y a de minutes. Je m'en tiens ordinairement à cette règle, elle eſt ſuffiſante à cauſe du peu de préciſion dont ces obſervations ſont ſuſceptibles. Dans l'exemple précédent l'on a trouvé 45′ 0″, on y ajoutera 45″, & l'on aura le demi-diamètre apparent de l'ombre de la terre y compris ſon atmoſphère 45′ 45″. Règle générale.

Trouver les Phaſes d'une Eclipſe de Lune.

1777. Lorsqu'on connoît l'heure de la pleine lune ou de l'oppoſition vraie (1761), la latitude de la lune pour ce temps-là, l'inclinaiſon de ſon orbite qui dépend du mouvement horaire de la lune tant en longitude qu'en latitude (1765), & le mouvement horaire du ſoleil ; on doit chercher le temps du milieu de l'éclipſe.

Soit *O* (*fig.* 100), le point de l'écliptique oppoſé au ſoleil, ou le centre de l'ombre de la terre à la diſtance de la lune ; *OG* le demi-diamètre de l'ombre, *ELS* l'orbite relative de la lune (1765) ; *L* le lieu de la lune au moment de l'oppoſition, *OL* la latitude de la lune, ou ſa diſtance à l'écliptique *KG* ; *OM* la perpendiculaire abaiſſée ſur l'orbite relative *EMS* ; au moment où l'éclipſe commence, la lune étant en *E*, le bord de la lune touche en *P* le bord de l'ombre ; ainſi *E* eſt le lieu de la lune au commencement de l'éclipſe ; de même le point *S* eſt le lieu de la lune à la fin de l'éclipſe, ou à la ſortie de l'ombre : les triangles *MOE*, *MOS* ſont égaux, puiſqu'ils ont un côté commun *OM*, les côtés Le temps du milieu. *Fig.* 100.

Fig. 100. égaux *OE* & *OS*, & qu'ils ſont rectangles l'un & l'autre en *M*; ainſi le côté *EM* eſt égal au côté *MS*; donc le point *M* indique le milieu de l'éclipſe; au lieu que le temps de l'oppoſition arrive quand la lune eſt au point *L* de ſon orbite ſur un cercle de latitude *OL* perpendiculaire à l'écliptique *KG* dans le point *O* qui eſt directement oppoſé au ſoleil.

Dans le triangle *LOM*, formé par le cercle de latitude *OL* & par la perpendiculaire *OM*, l'angle *LOM* eſt égal à l'inclinaiſon de l'orbite relative de la lune (1765); puiſque la perpendiculaire à l'orbite & la perpendiculaire à l'écliptique, font néceſſairement le même angle que l'orbite fait avec l'écliptique; avec cet angle on a auſſi le côté *LO* latitude en oppoſition; on trouvera donc *LM* en faiſant cette proportion: *Le rayon eſt au ſinus de l'inclinaiſon, comme la latitude* OL *eſt à l'intervalle* LM. On le réduira en temps à raiſon du mouvement horaire de la lune, en diſant: *Le mouvement horaire relatif* (1765) *eſt à* 1^h *ou* 3600″, *comme l'eſpace* ML *eſt au temps qu'il y aura entre la conjonction & le milieu de l'éclipſe.* On retranchera cet intervalle de temps, du moment de l'oppoſition, ſi la latitude de la lune eſt croiſſante; on l'ajoutera au temps de l'oppoſition, ſi la latitude eſt décroiſſante, ou que la lune aille en ſe rapprochant du nœud, & l'on aura le milieu de l'éclipſe.

Règle pour trouver le milieu de l'éclipſe.

1778. Exemple. Dans l'éclipſe de lune du 17 Mars 1764, on trouve par les tables que la pleine lune ou l'oppoſition vraie devoit arriver à 12^h 6′ 28″; le mouvement horaire de la lune étoit de 37′ 23″ en longitude, & 3′ 26″ en latitude, le mouvement horaire du ſoleil 2′ 29″; la différence des mouvemens horaires, 34′ 54″, eſt au mouvement en latitude 3′ 26″, comme le rayon eſt à la tangente de l'inclinaiſon relative 5° 37′ (1765): le coſinus de cette inclinaiſon 5° 37′ eſt au rayon, comme la différence des mouvemens horaires en longitude, 34′ 54″, eſt au mouvement horaire de la lune ſur ſon orbite relative 35′ 4″.

La latitude de la lune en oppoſition étoit de 38′ 42″;

le rayon eſt au ſinus de l'inclinaiſon 5° 37′, comme la latitude 38′ 42″ eſt à l'intervalle *ML*, qu'on trouve de 3′ 47″ en parties de degrés. Le mouvement horaire relatif 35′ 4″ eſt à 60′ 0″, comme 3′ 47″ ſont à 6′ 28″ de temps; on ajoutera cet intervalle, parce que la latitude étoit décroiſſante, la lune n'étant pas encore arrivée à ſon nœud; & comme le temps de l'oppoſition eſt 12h 6′ 12″, on aura le milieu de l'éclipſe à 12h 12′ 40″, c'eſt-à-dire, le 18 Mars, 0h 12′ 40″ du matin. *Fig.* 100.

1779. Les mêmes quantités qui ont ſervi à trouver la différence *LM* entre la conjonction & le milieu de l'éclipſe, ſerviront à trouver la plus courte diſtance *OM* de l'orbite lunaire au centre de l'ombre; car dans le triangle *LOM* rectangle en *M*, on connoît *LO* qui eſt la latitude au temps de la conjonction, & l'angle *LOM* égal à l'inclinaiſon de l'orbite relative de la lune, on trouvera le côté *OM* par cette proportion: *Le rayon eſt à la latitude* LO, *comme le ſinus de l'angle* L, *ou le coſinus de l'inclinaiſon relative, eſt à la plus courte diſtance* OM. Trouver la plus courte diſtance. Règle.

Exemple. Dans l'éclipſe du 17 Mars 1764, la latitude de la lune *LO* étoit de 38′ 42″, & l'inclinaiſon de l'orbite relative 5° 37′: or le rayon eſt à 38′ 42″, comme le coſinus de *MOL* 5° 37′ eſt à 2311″, ou 38′ 31″; c'eſt la perpendiculaire cherchée: elle ſervira ci-après pour trouver le commencement, la fin, & la grandeur de l'éclipſe (1781).

1780. Lorſqu'on connoît le milieu de l'éclipſe (1778), la plus courte diſtance des centres de l'ombre & de la lune (1779), le demi-diamètre apparent de l'ombre (1776), & le demi-diamètre de la lune, pris dans les tables, il ne reſte plus qu'un triangle à réſoudre pour trouver le commencement & la fin de l'éclipſe. Trouver le commencement de l'éclipſe.

Soit *OM* (*fig.* 100), la plus courte diſtance, ou la perpendiculaire abaiſſée du centre *O* de l'ombre, ſur l'orbite relative *EMS* de la lune (1779); *GPAK* la

Fig. 100. circonférence de l'ombre, EP le rayon du diſque lunaire; E le centre de la lune au moment où ſon bord commence à toucher le bord de l'ombre en P, c'eſt-à-dire, au moment où l'éclipſe commence; S le centre de la lune à ſa ſortie de l'ombre, lorſque l'éclipſe finit ou que le dernier bord de la lune touche en R le bord de l'ombre. La diſtance OE des centres de la lune & de l'ombre, eſt compoſée des quantités OP & PE; dont l'une OP eſt le demi-diamètre de l'ombre (1776), & l'autre le demi-diamètre de la lune (1507); de même la diſtance OS, à la fin de l'éclipſe, eſt compoſée des quantités OR & RS, c'eſt-à-dire, qu'elle eſt auſſi à la ſomme du demi-diamètre de l'ombre & de celui de la lune; ainſi OS eſt égale à OE, à moins qu'on ne veuille avoir égard à la petite différence qu'il peut y avoir dans le mouvement horaire & dans la parallaxe de la lune pendant l'eſpace de quelques heures, & à la différence qu'on pourroit ſuppoſer dans l'atmoſphère (1775); mais on a coutume de les négliger.

Dans le triangle OEM, rectiligne rectangle en M; on connoît la perpendiculaire OM (1779), & la ſomme OE des demi-diamètres de la lune & de l'ombre; on cherchera le troiſième côté ME : l'on convertira ce côté ME en temps par la proportion ſuivante. Le mouvement horaire de la lune ſur ſon orbite relative eſt à 1 heure ou 3600″, comme le côté trouvé ME eſt à la demi-durée de l'éclipſe en ſecondes de temps. Cette demi-durée étant retranchée du temps du milieu de l'éclipſe (1777), on aura le commencement; & ſi l'on ajoute la demi-durée avec le milieu, on aura la fin de l'éclipſe.

1781. Exemple. Dans l'éclipſe de lune du 17 Mars 1764, la perpendiculaire MO étoit de 38′ 31″, le demi-diamètre OP de l'ombre 45′ 0″, celui de la lune 16′ 39″, la ſomme des demi-diamètres, en y ajoutant 1′ 40″ pour l'atmoſphère (1775) ſera 1° 3′ 19″; ainſi dans le triangle EMO, on connoît OE & OM : on

trouvera *ME* par l'opération ſuivante, où j'employerai la méthode la plus commode pour réſoudre ce triangle *OEM*. Méthode pour réſoudre le triangle. *Fig.* 100.

Somme des côtés *OE* & *OM*, 1° 41′ 50″ log. 3, 786041
Différence des côtés *OE* & *OM*, 24′ 48″ log. 3, 172603

Somme des deux logarithmes 6, 958644
Moitié de la ſomme, ou logarithme de *EM*, 3, 479322
Auquel répond 50′ 15″.

Le mouvement horaire de la lune ſur ſon orbite relative étoit de 35′ 4″; ainſi l'on dira 35′ 4″ eſt à 1 heure, comme *EM* 50′ 15″ eſt à la demi-durée de l'éclipſe 1 heure 25′ 59″.

Cette demi-durée de l'éclipſe eſt le temps que la lune employoit à aller de *E* en *M*; mais le milieu de l'éclipſe en *M* a été trouvé 12 heures 12′ 40″ (1778); ſi l'on en retranche 1 heure 25′ 59″, on aura pour le commencement de l'éclipſe 10 heures 46′ 41″; & ſi on l'ajoute, on aura la fin de l'éclipſe 13 heures 38 minutes 39 ſecondes.

1782. Si l'on veut avoir égard à l'inégalité de la correction de l'atmoſphère propoſée par M. le Gentil, (1775), on réſoudra deux triangles; un pour le commencement & un pour la fin de l'éclipſe, en employant deux hypothénuſes différentes *OE* & *OS*, dont l'une ſera quelquefois plus grande d'une minute que l'autre.

1783. L'inégalité du mouvement horaire de la lune ne mérite guère d'être ici conſidérée; elle ne va jamais qu'à trois ou quatre ſecondes, dont le mouvement horaire peut être plus ou moins grand dans la première demi-durée d'une éclipſe que dans la ſeconde. Les tables du mouvement horaire ſont dans la *Connoiſſ. des mouv. céleſt.* 1765; & l'on en trouve auſſi dans les tables qui ſont partie de cette aſtronomie. Inégalité dans le mouvement horaire.

1784. Dans les éclipſes de lune qui ſont totales, on a encore deux autres phaſes à chercher, qui ſont l'IMMERSION & l'EMERSION, c'eſt-à-dire, le moment où la lune entre totalement dans l'ombre, & celui où Immerſion & émerſion.

Fig. 101. elle commence à en ſortir. Soit *D* (*fig.* 101), le lieu de la lune à l'inſtant où elle eſt aſſez avancée dans l'ombre, pour que ſon dernier bord *N* touche le bord intérieur de l'ombre; on a un nouveau triangle *OMD*, dont l'hypothénuſe *OD* eſt égale à la différence entre le demi-diamètre de l'ombre *ON*, & le demi-diamètre *DN* de la lune; mais l'opération eſt la même que dans l'article 1781; la demi-durée de l'éclipſe totale ſe retranche du milieu de l'éclipſe, pour avoir l'immerſion qui arrive en *D*, & elle s'ajoute pour avoir l'émerſion qui arrive en *V*.

Trouver la grandeur de l'éclipſe. *Fig.* 100.

1785. Lorſqu'on a la plus courte diſtance des centres *OM* (*fig.* 100), le demi-diamètre de l'ombre *OA*, & le demi-diamètre de la lune *MB*, il eſt aiſé de trouver la partie éclipſée de la lune, c'eſt-à-dire, la quantité *AC*. Car *AM* eſt égale à *OA*—*OM*, ſi l'on y ajoute *MC*, l'on aura *AC*; donc *AC* eſt égale à *OA*+*MC*—*OM*, c'eſt-à-dire, que *la partie éclipſée eſt égale à la ſomme des demi-diamètres de la lune & de l'ombre, moins la plus courte diſtance.*

Règle générale.

Exemple. Dans l'éclipſe du 17 Mars 1764, (1781) la ſomme des demi-diamètres eſt 63′ 19″, la plus courte diſtance eſt 38′ 31″, la différence 24′ 48″ eſt la partie éclipſée. On a coutume de l'exprimer en doigts ou en douzièmes parties du diamètre de la lune; on fera donc cette proportion : le diamètre apparent de la lune 33′ 18″ eſt à 12 doigts 0 minutes, comme 24′ 48″ ſont à un quatrième terme qu'on trouvera $8^d\ 56'\frac{1}{2}$: ainſi la grandeur de l'éclipſe ſera de 8 doigts & $56'\frac{1}{2}$ de doigts.

Doigts éclipſés.

1786. La règle que je viens de donner pour trouver la grandeur des éclipſes de lune a lieu également, ſoit que le centre de la lune & ſon orbite apparente ſoient hors de l'ombre, comme dans la *fig.* 102; ſoit qu'au contraire la lune ſoit toute entière dans l'ombre, comme dans la *fig.* 101; car dans la *fig.* 102 l'on a *OA*+*CM*=*AC*+*OM*, ou *OA*+*CM*—*OM*=*AC*, & dans la *fig.* 101, qui a lieu pour les éclipſes totales, on a *AC*=*OA*—*OM*+*CM*. Dans ce dernier cas,

Fig. 101. & 102.

on dit que la grandeur de l'éclipſe eſt de plus de douze doigts, parce qu'on y comprend la partie *AB* de l'ombre, qui ſurpaſſe le bord de la lune; c'eſt-à-dire, que l'on comprend ſous le nom de partie éclipſée toute la quantité *AC*, qui ſeroit éclipſée en effet, ſi la lune avoit aſſez de diamètre pour s'étendre juſqu'en *A*. Si dans ce cas, la lune eſt au nord de l'écliptique, on dit que l'éclipſe eſt du côté du nord, quoique dans une éclipſe partiale ce ſoit la partie auſtrale de la lune qui ſoit éclipſée, quand la latitude eſt boréale. Cela fait une eſpèce de diſparate qu'on peut éviter en diſant la lune eſt au nord de l'écliptique. Cette règle qui eſt conforme à celle de M. de la Caille, (*Leçons d'aſtr. art.* 1119), me paroît n'être pas obſervée, dans pluſieurs endroits de ſes éphémèrides; mais peut-être que cela vient des fautes d'impreſſion ou de calcul. On voit par-là que les éclipſes de lune ſont de la même grandeur, quand elles arrivent à la même diſtance des nœuds, puiſque leur grandeur dépend ſur-tout de la latitude *OL* de la lune, & celle-ci de la diſtance de la lune à ſon nœud; voilà pourquoi on détermine le mouvement des nœuds par les éclipſes de même grandeur, obſervées dans des temps éloignés (1488). *Fig.* 101.

Toutes les quantités dont nous venons de donner le calcul dans les articles 1778, 1780, 1785, ſe trouvent calculées dans les tables du P. Riccioli, (*Aſtron. refor. pag.* 66), & de M. Caſſini, (*Tab. aſtr. pag.* 59); enſorte qu'avec ces tables auxiliaires, on peut calculer une éclipſe de lune ſans aucun calcul trigonométrique. Tables auxiliaires.

1787. On peut déterminer encore ſans calcul, avec la règle & le compas, toutes les circonſtances d'une éclipſe de lune, auſſi-tôt qu'on a calculé par les tables le temps de la conjonction, la latitude, la parallaxe, & le mouvement horaire. Cette méthode eſt même très-ſuffiſante, lorſqu'il ne s'agit que d'annoncer les éclipſes qui doivent arriver : car on ne ſauroit ſe tromper d'une minute dans l'opération graphique ſi la Trouver les mêmes phaſes avec le compas.

figure a ſeulement un pied de diamètre ; & l'on ne peut être aſſuré d'une plus grande exactitude dans la prédiction d'une éclipſe de lune ; à peine peut-on être sûr de l'obſervation même à une minute près. Ainſi je crois qu'on peut très-bien ſe contenter de l'opération graphique dans toutes les éclipſes de lune.

Exemple. Le demi-diamètre de l'ombre de la terre dans la région lunaire ayant été trouvé de $46'$ (1776) ; *Fig.* 100. je diviſe le rayon OG (*fig.* 100) en 46 parties ; je prends OL égale à la latitude de la lune $38' \frac{1}{2}$; & au point L, je tire l'orbite de la lune ELS, inclinée de $5^\circ\ 37'$, ou ſi l'on veut de $5^\circ\ 40'$ (1769), ſur la parallèle à l'écliptique. Le mouvement horaire relatif étant de $35'$, je prends $35'$ ſur les diviſions de OG, je les porte ſur l'orbite de L en X ; & ayant marqué en L le temps de la conjonction 12 heures $6'$, je marque 11 heures $6'$ au point X où tombe le mouvement horaire ; je diviſe XL en $60'$ de temps, & les mêmes ouvertures de compas ſervent à diviſer l'orbite $ELMS$. Je prends une ouverture de compas égale à la ſomme des demi-diamètres de l'ombre & de la lune, $1^\circ\ 3'$, & la portant de O en S ſur l'orbite relative, je trouve ſur ſes diviſions que le point S répond à 13 heures 39 minutes, comme on l'a trouvé par le calcul (1781).

Pénombre dans les éclipſes.

1788. La Penombre eſt une obſcurité moindre que celle du cone d'ombre ; c'eſt une lumière foible, cauſée par une portion du diſque du ſoleil, qui éclaire encore la lune lors même que le centre ne l'éclaire *Fig.* 99. plus. Le point E, (*fig.* 99), qui eſt ſur le côté OEP du cone d'ombre, eſt dans une entière obſcurité, parce qu'il n'eſt éclairé par aucun rayon du ſoleil. Le point F, qui eſt ſur la ligne AGF, menée par le bord ſupérieur A du ſoleil, & par le bord inférieur G de la terre, jouit d'une lumière parfaite, parce qu'il voit le diſque entier AO du ſoleil ; mais tous les points ſitués entre E & F ne voient qu'une partie du diſque ſolaire, ils ne reçoivent qu'une partie de la lumière du ſoleil,

&

& forment la pénombre ; c'eſt ce qui fait que le commencement d'une éclipſe de lune eſt ſi douteux, que l'on s'y trompe quelquefois de pluſieurs minutes.

1789. On obſerve dans la couleur des éclipſes de lune des différences conſidérables : lorſque la lune eſt apogée, elle traverſe le cône d'ombre plus près de ſon ſommet ; elle paroît alors plus rouge, plus lumineuſe que lorſque les éclipſes arrivent dans le périgée ; car dans le périgée, les rayons rompus par l'atmoſphère, qui ſe diſperſent dans le cône d'ombre, & qui en diminuent l'obſcurité, ne parviennent pas juſqu'au centre de l'ombre ou à l'axe du cône, qui eſt trop large dans ce point-là, & qui eſt plus près de la terre. Couleur des éclipſes.

Voilà pourquoi l'on a vu des éclipſes où la lune diſparoiſſoit entièrement ; telle fut l'éclipſe du 15 de Juin 1620, ou celle du 9 de Décembre 1601, dans laquelle on ne diſtinguoit pas le bord éclipſé, (*Képler*, *aſtron. pars opt. pag.* 297, *Epitome*, *pag.* 825), Hévélius en parlant de l'éclipſe du 25 Avril 1642, aſſure qu'on ne diſtinguoit pas, même avec des lunettes, la place de la lune, quoique le temps fût aſſez beau pour voir les étoiles de la cinquième grandeur, (*Hevel. Selenographia*, *pag.* 117) ; mais il eſt fort rare que la lune diſparoiſſe ainſi totalement dans les éclipſes. La lune diſparoît quelquefois.

DES ECLIPSES DE SOLEIL.

1790. Les ÉCLIPSES de ſoleil ſont produites par l'interpoſition de la lune, qui dans ſes conjonctions paſſe quelquefois directement entre nous & le ſoleil : elle nous le cache alors en tout ou en partie. Les éclipſes TOTALES ſont celles où le ſoleil paroît entièrement couvert par la lune, le diamètre apparent de la lune étant plus grand que celui du ſoleil. Les éclipſes ANNULAIRES ſont celles où la lune paroît toute entière ſur le ſoleil ; alors le diamètre du ſoleil paroiſſant le plus grand, excède de tout côté celui de la lune, & forme autour d'elle un anneau ou une couronne lumi- Eclipſes totales ou annulaires.

neuſe : telle fut l'éclipſe du premier Avril 1764, que l'on vit annulaire à Cadix, à Rennes, à Calais & à Pello en Laponie ; ainſi que je l'avois annoncé dans la connoiſſance des mouvemens céleſtes de 1764, *pag.* 205. Les éclipſes *centrales* ſont celles où la lune n'a aucune latitude au moment de la conjonction apparente, ſon centre paroît alors ſur le centre même du ſoleil & l'éclipſe eſt totale ou annulaire, en même temps qu'elle eſt centrale.

1791. Les plus anciens auteurs nous ont conſigné comme des événemens remarquables les grandes éclipſes de ſoleil, & c'eſt ce qui m'engage à en dire ici quelques mots. Il en eſt parlé dans Iſaïe, chap. 13, dans Homère & Pindare, dans Pline, liv. II, chap. 12 ; dans Denis d'Halicarnaſſe, liv. II. Ce dernier dit qu'à la naiſſance de Romulus, & à ſa mort, il y eut des éclipſes totales de ſoleil dans leſquelles la terre fut dans une obſcurité auſſi grande qu'au milieu de la nuit. Hérodote nous apprend que dans la ſixième année de la guerre entre les Lydiens & les Mèdes, il arriva pendant la bataille que le jour ſe changea en une nuit totale ; Thalès le Miléſien l'avoit annoncé pour cette année-là. Pline, (Liv. II, chap. 2) parle auſſi de la prédiction de Thalès, & M. Coſtard prouve que cette éclipſe fut celle du 17 Mai 603, avant J. C. (*Philoſ. tranſ.* 1753, *pag.* 23). On trouve de ſemblables éclipſes dans les années 431, 190, & 50 ans avant J. C., & dans les années après J. C. 59, 100, 237, 360, 787, 840, 878, 957, 1133, 1187, 1191, 1241, 1415, 1485, 1544, 1560, (*Képl. aſtron. pars opt. pag* 290, &c.). On trouvera un catalogue exact de toutes les éclipſes arrivées depuis l'ere vulgaire, dans *l'art de vérifier les dates*, ſeconde édition, in-folio chez Deſprez.

Spectacle ſingulier d'une éclipſe.

1792. C'eſt en effet, une choſe très-ſingulière que le ſpectacle d'une éclipſe totale de ſoleil. Clavius, qui fut témoin de celle du 21 Août 1560 à Conimbre, nous dit que l'obſcurité étoit, pour ainſi dire, plus

grande ou du moins plus ſenſible & plus frappante que celle de la nuit ; on ne voyoit pas où pouvoir mettre le pied, & les oiſeaux retomboient vers la terre par l'effroi que leur cauſoit une ſi triſte obſcurité, (*Képl. aſtr. pars opt.* 296).

Il n'y a eu depuis très-long-temps à Paris d'autre éclipſe totale, que celle du 22 Mai 1724; celle de 1706 fut de dix doigts & 58 minutes : il reſtoit environ $\frac{1}{12}$ du diamètre du ſoleil, ſa lumière étoit à la vérité d'une pâleur effrayante & lugubre ; cependant tous les objets ſe diſtinguoient, auſſi facilement que dans le plus beau jour, (*Hiſt. acad.* 1706, *pag.* 115). Cette éclipſe fut totale à Montpellier, & l'on y remarqua autour de la lune une couronne d'une lumière pâle, large de la douzième partie du diamètre de la lune, dans ſa partie la plus ſenſible ; mais qui diminuant peu à peu s'appercevoit encore à 4 degrés tout autour de la lune (*Ibid*, *pag.* 118). Eclipſe totale à Paris en 1724.

1793. Dans l'éclipſe de ſoleil du 23 Septembre 1699, il ne reſta que $\frac{1}{180}$ du diamètre du ſoleil à Gripſwald en Poméranie, l'obſcurité y fut ſi grande, qu'on ne pouvoit lire ni écrire ; il y eut des perſonnes qui virent quatre étoiles, ce devoit être Mercure, Vénus, Régulus & l'Epi de la Vierge, (*Hiſt. acad.* 1700, *pag.* 106).

Dans l'éclipſe du 22 Mai 1724, l'obſcurité totale dura $2' \frac{1}{4}$ à Paris; on vit le ſoleil, Mercure & Vénus ſur la même ligne droite : il parut peu d'étoiles à cauſe des nuages. La première petite partie du ſoleil qui ſe découvrit lança un éclair ſubit & très-vif, qui parut diſſiper l'obſcurité entière ; le baromètre ne varia point ; le thermomètre baiſſa un peu ; mais il ſeroit difficile de dire ſi l'éclipſe en étoit cauſe ; l'on vit autour du ſoleil la couronne lumineuſe dont on avoit beaucoup parlé dans l'hiſtoire de 1706. (*Mémoires de l'acad.* 1715. *Hiſtoire de l'académie* 1724. *Mémoires pour ſervir à l'hiſtoire de l'aſtronomie*, par M. de l'Iſle, 1738, *pag.* 205).

1794. Les éclipſes de ſoleil ſont beaucoup plus rares que les éclipſes de lune, pour un lieu déterminé: la raiſon en eſt évidente; la lune étant beaucoup plus petite que la terre, ne peut couvrir qu'une très-petite partie de notre globe; ſouvent même la pointe du cone d'ombre n'arrive pas juſqu'à nous, comme dans les éclipſes *annulaires*. Il arrive toutes les années pluſieurs éclipſes, quelquefois juſqu'à ſix, en comptant celles de lune & de ſoleil; mais on ne les voit pas toutes dans un même lieu; car depuis 1755 juſqu'en 1764 inclusivement, on ne trouve que quatre éclipſes de ſoleil viſibles à Paris, tandis qu'on y a dû voir onze éclipſes de lune.

Nombre des éclipſes.

Le Roi ayant deſiré de ſavoir s'il y auroit à Paris des éclipſes totales, dans l'eſpace de quelques années, j'engageai M. du Vaucel à ſe livrer à cette recherche, il trouva que ~~d'ici~~ à l'année 1900, il y auroit 59 éclipſes viſibles à Paris, ſans qu'aucune y ſoit totale, & une ſeule annulaire qui ſera celle du 9 Octobre 1847, (*Mém. préſentés, &c. tom. V, pag.* 575).

+ depuis 1769 juſqu'à

1795. Le calcul des éclipſes de ſoleil eſt beaucoup plus difficile & plus long que celui des éclipſes de lune, à cauſe des parallaxes qui y entrent néceſſairement; les parallaxes diffèrent pour chaque point de la terre, enſorte qu'une éclipſe de ſoleil paroît d'une manière différente à différens pays: au contraire les éclipſes de lune paroiſſent de la même manière, & ſont parfaitement les mêmes pour tous ceux qui les voyent; car la lune perdant alors véritablement ſa lumière, devient obſcure pour tout le monde.

Si nous étions placés en un point de la ſurface de la lune lorſqu'elle eſt éclipſée, & que nous vouluſſions calculer la manière dont elle devroit paroître dans ce point déterminé de la lune, nous tomberions également dans la difficulté des parallaxes; car l'éclipſe de lune ayant lieu ſucceſſivement & différemment pour les différens points de la ſurface de la lune, il faudroit calcu-

ler la parallaxe pour le point de la lune où nous ſerions placés.

Au contraire ſi dans le temps que nous avons ſur la terre une éclipſe de ſoleil, un obſervateur placé dans la lune, vouloit nous regarder, & calculer cette éclipſe qu'il appelleroit *éclipſe de terre*, il n'y trouveroit pas plus de difficulté que nous en trouvons dans le calcul d'une éclipſe de lune ; il verroit les mêmes phaſes en quelque point de la lune qu'il fût placé ; il appercevroit une petite tache noire & ronde s'avancer ſur le diſque de la terre, & le parcourir ſucceſſivement : c'eſt ainſi qu'il faudra conſidérer les éclipſes de ſoleil pour rendre la théorie plus ſimple, & aller pas à pas dans des détails plus compliqués.

La théorie & le calcul des éclipſes de ſoleil étant difficiles à concevoir, j'ai cru qu'il falloit commencer par employer une méthode, pour ainſi dire, mécanique, & telle que les yeux puſſent ſoulager l'imagination ; je vais donc expliquer une opération graphique, avec laquelle on pourra calculer une éclipſe de ſoleil, pour la terre en général avec la même facilité que l'on a calculé une éclipſe de lune (1787), & même trouver à quelques minutes près, pour chaque pays de la terre, les circonſtances de l'éclipſe par le moyen d'un globe terreſtre, pourvu qu'on ait fait ſeulement les calculs préliminaires (1761).

1796. Pour faire ſentir les raiſons & les principes de cette opération graphique, nous allons montrer la manière dont les éclipſes de ſoleil arrivent ſur la ſurface de la terre, dans le cas le plus ſimple : en ſuppoſant un principe qu'il ne faut pas perdre de vue, ſavoir que le ſoleil eſt aſſez éloigné de nous, pour que les rayons qui partent du centre du ſoleil, & qui vont aux différens points de la terre, ſoient ſenſiblement paralleles (1743). Le point T, (*fig.* 104), que je ſuppoſe le centre de la terre, voit le centre du ſoleil par un rayon TS ; le point E qui eſt à la ſurface de la terre, voit le centre du ſoleil par un autre rayon EO,

Paralléliſme des rayons ſolaires.

Fig. 104.

Planche X.

Fig. 104. qui ne fait avec le précédent qu'un angle de 9″ (1742), & qui va par conſéquent le rencontrer à une diſtance prodigieuſe, ainſi ce rayon eſt ſenſiblement parallèle au précédent : on peut donc ſuppoſer que la ligne *EAO* parallèle à *TLS*, eſt celle par laquelle le point *E* de la terre voit le centre du ſoleil.

1797. Si cependant l'on veut avoir égard à la parallaxe du ſoleil, & ſuppoſer que le rayon *EO* ſe rapproche de *ES* pour aller former au centre du ſoleil un angle de 9″, toute la différence conſiſtera à diminuer l'angle *TEA* de 9″, en tirant une ligne *ER* qui faſſe avec *EO* un angle *REO* de 9″, & ce ſera ſur la ligne *ER* que le point *E* de la terre verra le centre du ſoleil, puiſque *ER* & *TS* vont ſe réunir au ſoleil ſous un angle de 9″, qui eſt en effet la parallaxe du ſoleil. Si l'on ſuppoſe que *LA* ſoit une portion de l'orbite lunaire interceptée par les rayons *TS*, *ER*, cette ligne *LA* paroîtra plus petite de 9″ lorſqu'on voudra tenir compte de la parallaxe du ſoleil : pour le comprendre il ſuffit de concevoir un autre rayon *GS* qui du point *G* de la terre aboutit au centre du ſoleil *S*; l'intervalle que les rayons *GS* & *TS* interceptent dans l'orbite de la lune, & que nous appellerons ci-après la projection de la terre, (1804, 1836), eſt vu de la terre ſous un angle *LGS* qui eſt la différence des angles *GLT* & *LSG*; c'eſt-à-dire, la différence des parallaxes de la lune & du ſoleil; mais il faut imaginer le point de concours *S* à une diſtance prodigieuſe, pour que l'angle *S* ne ſoit que de 9 ſecondes; alors l'angle *G* eſt plus petit de 9 ſecondes que l'angle *L*, & l'angle *REL* plus petit de 9 ſecondes que l'angle *ELT* ou ſon égal *OEL*; ainſi la projection de la terre eſt ſenſiblement égale à la parallaxe de la lune.

1798. Si la lune eſt en *L* au moment de la conjonction, l'obſervateur placé en *K* ſur la ſurface de la terre, verra une éclipſe centrale de ſoleil (1790), puiſque le centre de la lune lui paroîtra ſur le rayon même *TKLS*, par lequel il voit le centre du ſoleil.

Soit *AL* une portion de l'orbite lunaire décrite avant la conjonction, en allant de *A* en *L*, ou d'occident vers l'orient : puiſque le point *E* de la terre voit le centre du ſoleil ſur la ligne *EAO* (1796), il s'enſuit évidemment que quand la lune ſera au point *A* de ſon orbite, elle couvrira le ſoleil, & formera une éclipſe centrale pour l'obſervateur placé en *E*, puiſqu'alors le centre de la lune, auſſi bien que celui du ſoleil paroîtront ſur une même ligne *EAO*. Fig. 104

Si la lune employe une heure à parcourir la portion *AL* de ſon orbite, l'éclipſe aura lieu pour le point *E* de la terre, une heure avant qu'elle ait lieu pour le point *K*, ou pour le centre *T* de la terre, c'eſt-à-dire, une heure avant la conjonction, que je ſuppoſe arriver au point *L*. L'eſpace *AL* eſt ce que nous appellerons bientôt le *rayon de projection* (1804, 1836), parce que c'eſt l'eſpace auquel on rapporte les points *E* & *K* de la terre, comme ſur un plan de projection : nous parlerons plus en détail de la nature & des circonſtances de la projection (1825, 3871). Rayon de projection.

1799. Je ſais que l'on a d'abord quelque peine à ſe figurer ainſi le ſoleil, répondant au même inſtant à divers points de la projection pour différens lieux de la terre ; mais qu'on réfléchiſſe à ce qui ſe paſſe dans une allée de jardin, où l'on ſe promene en voyant le ſoleil ſur ſa droite ; toutes les ombres des arbres ſont paralleles entr'elles ; quand on eſt ſur la première ombre, on voit le ſoleil répondre au premier arbre ; quand on a fait quelques pas on voit le ſoleil répondre à l'arbre ſuivant ; & s'il y a quatre perſonnes en même temps qui ſoient entre elles à la même diſtance que les quatre arbres ſont entr'eux, elles verront répondre le ſoleil aux quatre arbres différens ; c'eſt ainſi que l'obſervateur qui eſt en *D* voit le ſoleil répondre au point *C* de l'orbite de la lune ou de la projection ; tandis que l'obſervateur qui eſt en *K* voit le ſoleil au point *L* (a), comme

(a) Au reſte il n'eſt pas beſoin d'avertir que les points *E*, *F*, *K*, de la terre ne ſont point fixes ; ils tournent par le mouvement de

celui qui eſt en *F* voit le ſoleil au point *H*.

1800. Le point *E* de la terre eſt le premier point d'où l'on verra la lune ſur le ſoleil ; il aura l'éclipſe centrale quand la lune ſera en *A* (1798), le centre de la lune répondant au centre du ſoleil ; mais avant que d'être en *A*, le centre de la lune a été en un point *M*, tel qu'alors le bord *B* de la lune touchoit le bord du ſoleil, parce que le centre du ſoleil paroiſſant en *A*, le bord de ſon diſque paroiſſoit en *B* éloigné du centre *A* d'environ 16 minutes (1388) ; le centre *M* de la lune étoit alors éloigné du centre *A* du ſoleil d'une quantité égale à la ſomme des demi-diamètres *AB* & *BM*, du ſoleil & de la lune, & c'étoit le commencement de l'éclipſe pour l'obſervateur ſitué en *E*, ou le premier inſtant où il a vu le bord de la lune toucher le bord du ſoleil. La diſtance de la lune au point *L* de la conjonction, ou à la ligne des centres, étant égale à la ſomme des demi-diamètres du ſoleil & de la lune plus la quantité *AL* égale à *ET*, l'obſervateur qui au lever du ſoleil étant en *E* aura vu l'attouchement des bords de la lune & du ſoleil, verra l'éclipſe centrale d'un autre point de l'eſpace abſolu, différent du point *E* ; & ce ſera l'habitant de la terre qui ſera arrivé au bord *E* du cercle d'illumination qui verra l'éclipſe centrale lorſque la lune ſera parvenue en *A*.

Quand commence l'éclipſe,

1801. La partie *AL* de l'orbite lunaire égale au rayon *ET* de la terre paroît ſous un angle *AEL*, égal à l'angle *ELT* qui eſt la parallaxe horizontale de la lune (1624) ; la partie *ML* paroît donc égale à la ſomme du demi-diamètre *BM* de la lune, du demi-diamètre *BA* du ſoleil, & de la parallaxe horizontale de la lune qui eſt égale à *AL*. Ainſi le point *E* de la terre verra commencer l'éclipſe auſſi-tôt que la diſtance *ML* de la lune au point *L* de la conjonction ſera égale à la ſomme des demi-diamètres du ſoleil & de la lune, &

rotation de la terre ; mais dans ces préliminaires généraux, nous n'examinons pas quels pays de la terre occupent les divers points du globe, il ſuffit de conſidérer ces points en général.

de

de la parallaxe horizontale de la lune, dont on aura ôté 9 ſecondes pour plus d'exactitude (1797). De même le point *G*, le dernier & le plus oriental de la terre, verra finir entiérement l'éclipſe, lorſque la lune, après avoir paſſé la conjonction, ſera éloignée du point *L* de la même quantité, c'eſt-à-dire, de la ſomme des demi-diamètres du ſoleil & de la lune, & de la parallaxe horizontale de la lune.

Si la lune eſt en *C*, de maniere que *AC* ſoit auſſi égal à la ſomme des demi-diamètres du ſoleil & de la lune, le point *E* de la terre verra auſſi le centre *C* de la lune éloigné du centre *A* du ſoleil, de la ſomme des demi-diamètres, c'eſt-à-dire, qu'il verra les bords du ſoleil & de la lune ſe toucher, & l'éclipſe finir; puiſqu'alors le centre du ſoleil paroît en *A* & celui de la lune en *C*, à une diſtance *CA* égale à la ſomme des demi-diamètres. Quand finit l'éclipſe.

Mais dans le temps que la lune eſt en *C*, & que le point *E* de la terre voit finir l'éclipſe, un autre point *D* de la terre, qui voit le centre du ſoleil ſur le rayon *DC* parallele à *TS*, voit le centre de la lune ſur celui du ſoleil, c'eſt-à-dire, qu'il a une éclipſe centrale; il en eſt de même de tous les autres points de la terre qui répondent perpendiculairement ſous différens points de la ligne *ACL*.

1802. En même temps que le point *E* de la terre voit finir l'éclipſe par le contact des deux bords, lorſque le centre de la lune eſt en *C*, & que le point *D* voit l'éclipſe centrale, les points de la terre ſituées entre *E* & *D*, voient l'éclipſe de différentes grandeurs; ainſi le point *F* de la terre, qui voit le centre du ſoleil ſur la parallele *FH*, voit la diſtance apparente de la lune *C* au ſoleil *H* de la quantité *CH*; ſi nous ſuppoſons que la ligne *CH*, priſe ſur l'orbite lunaire *LCHAM*, ſoit plus petite que la ſomme des demi-diamètres, la lune anticipera d'autant ſur le ſoleil; ſi elle eſt plus petite d'un doigt, le bord de la lune ſera d'un doigt ſur le ſoleil, on dira que l'éclipſe eſt d'un doigt. Si *CH* eſt

ſuppoſée moindre de ſix doigts ſolaires, que la ſomme des demi-diamètres, il faut néceſſairement que cette ſomme, qui forme la diſtance des centres de la lune & du ſoleil au commencement de l'éclipſe ait été retrécie d'autant; elle n'a pu l'être, que parce que le diſque lunaire a anticipé d'autant ſur celui du ſoleil; donc dans la ſuppoſition de CH moindre que CA de ſix doigts pour le point F, il doit y avoir ſix doigts du diamètre du ſoleil, couverts par la lune pour l'obſervateur F, & par conſéquent l'on verra du point F le bord de la lune ſur le centre même du ſoleil. De même ſi CH eſt plus petite que cette ſomme, & cela de 3 doigts ſeulement, ou d'un quart du diamètre ſolaire, la lune anticipera ou mordra ſur le ſoleil de 3 doigts ſeulement, & l'éclipſe ne ſera que de la même quantité.

1803. Ainſi pour trouver le point F de la terre où l'éclipſe doit paroître de 3 doigts, à un inſtant donné où l'on ſuppoſe la lune en C, il faut, en partant du point C où eſt la lune, 1°, prendre CA égale à la ſomme des demi-diamètres du ſoleil & de la lune; 2°, en partant du point A, prendre AH de 3 doigts, &c. 3°, abaiſſer une perpendiculaire HFN ſur la terre, (c'eſt-à-dire, ſur le plan GE du cercle de la terre, qui eſt perpendiculaire à la ligne des centres), & l'on aura le point F de la terre où l'éclipſe doit paroître de 3 doigts, la lune étant en C, puiſque le ſoleil paroiſſant alors en H & la lune en C, leur diſtance eſt plus petite de 3 doigts, que la ſomme des demi-diamètres du ſoleil & de la lune.

Cercle de projection.

1804. J'ai ſuppoſé juſqu'ici que l'orbite LBM de la lune paſſoit par la ligne SLT, qui joint les centres du ſoleil & de la terre, & que la lune en conjonction n'avoit aucune latitude; voyons ce qui arrivera dans les cas où la lune en conjonction aura une latitude. Il faut conſidérer d'abord que tout ce que j'ai dit du point M (1800), doit s'entendre également de tout autre point qui ſeroit à la même diſtance du point T & du point L; ſuppoſons que la ligne LM (égale à la parallaxe

de la lune, plus la ſomme des demi-diamètres du ſoleil & de la lune), tourne autour du point *L*, & décrive un cercle dont le plan ſoit perpendiculaire à *LT*, & au plan de notre figure, enſorte que tous les points de ce cercle ſoient à égales diſtances du point *T*; c'eſt ce cercle décrit ſur *LM* que nous appellerons le *Cercle de projection* (1835), & nous allons le conſidérer ſeul dans la ſuite du diſcours, en y rapportant tout ce que nous venons de dire ſur la *Figure* 104. Il eſt évident que les différens points du cercle placé dans la région de la lune & décrit ſur *LA*, répondent aux différens points de la circonférence de la terre, de la même maniere que le point *A* répond au point *E* de la terre, & le point *L* au point *K*; chaque point de la terre a ſa projection ou ſon image à l'extrémité de la ligne qui va tomber perpendiculairement au plan de projection, dans la région de la lune.

1805. Suppoſons une ligne *LB*, (*fig.* 103), de même longueur que la ſomme *LM* du rayon de projection & des demi-diamètres du ſoleil & de la lune dans la *fig.* 104, décrivons un cercle *BCGD* ſur le plan de projection; décrivons auſſi un autre cercle *AEFR*, dont le rayon *LA* ſoit égal à la parallaxe de la lune, (dont on retranchera 9″ pour plus d'exactitude (art. 1797), comme *LA* dans la figure 104, formoit le rayon de projection égal au rayon de la terre & vu ſous un angle égal à la parallaxe de la lune; lorſque la lune approchera aſſez de la conjonction pour que ſon centre vienne à ſe trouver ſur quelque point *K* de la circonférence *BCD*, l'éclipſe commencera pour quelque point de la ſurface de la terre (1801). Cercle de projection. *Fig.* 103.

De même, lorſque le centre de la lune ſera ſur quelque point *V* de la circonférence *AVE* du cercle de projection, le centre de la lune paroîtra répondre ſur le centre du ſoleil, & l'éclipſe commencera d'être centrale pour quelque point de la ſurface de la terre, c'eſt-à-dire, pour celui qui ſe trouvera directement ſous le point *V*, ou qui aura ſa projection au point *V*.

Fig. 103. 1806. L'Éclipse générale de ſoleil eſt celle que l'on calcule pour la terre en général, ſans examiner à quel pays elle ſe rapporte ; c'eſt par où nous commençons, à l'exemple de Képler, (*Epit. pag.* 873), avant de chercher les circonſtances d'une éclipſe de ſoleil pour chaque lieu déterminé de la terre. Au moment où la diſtance *LK* du centre de la projection au centre de la lune eſt égale à la ſomme des trois demi-diamètres du ſoleil, de la lune, & de la projection, l'éclipſe de ſoleil commence pour un point de la terre qui répond perpendiculairement au point *I* (1800), ou dont la projection eſt en *I*; c'eſt le commencement de l'éclipſe générale ; de même, lorſque la lune eſt parvenue au point *G* de ſon orbite, aſſez éloigné pour que la diſtance *LG* ſoit encore égale aux trois demi-diamètres, le bord de la lune quitte le bord du ſoleil pour le dernier de tous les pays de la terre où il peut y avoir éclipſe, c'eſt la fin de l'éclipſe générale. De même, la perpendiculaire *LM* abaiſſée ſur l'orbite, marque le milieu de l'éclipſe générale, comme dans le cas des éclipſes de lune (1777).

Milieu de l'éclipſe générale.

1807. Pour connoître le temps du milieu de l'éclipſe générale, on ſuppoſe les mêmes calculs préliminaires, & l'on ſuit la même méthode que pour une éclipſe de lune (1777) ; *LAB* repréſente une portion de l'écliptique ; *L* le point où eſt le ſoleil au moment de la conjonction, ~~*LM*~~ *HL* la latitude de la lune, *KMG* l'orbite relative (1765). Dans le triangle *LMH* rectangle en *M*, on connoît l'angle *HLM* égal à l'inclinaiſon de l'orbite relative, & l'hypothénuſe *HL* égale à la latitude de la lune ; on multipliera le côté *LH* par le ſinus de l'angle *MLH*, & l'on aura le côté *HM*; on le convertira en temps à raiſon du mouvement horaire de la lune ſur l'orbite relative, & l'on aura l'intervalle entre la conjonction & le milieu de l'éclipſe ; cet intervalle ſe retranchera du moment de la conjonction, arrivé en *H*, ſi la latitude de la lune eſt croiſſante, c'eſt-à-dire, ſi la lune a paſſé ſon nœud ; mais

il s'ajoutera au temps de la conjonction, ſi la lune va en ſe rapprochant de ſon nœud; & l'on aura le temps du milieu de l'éclipſe générale en *M*; comme dans l'exemple de l'article 1778.

Le cercle de projection *AER* repréſente le diſque de la terre, ou l'image de l'hémiſphère éclairé de la terre tranſporté dans l'orbite ou dans la région de la lune; la ligne *VX* eſt la portion de l'orbite lunaire qui ſera décrite pendant la durée de l'éclipſe totale, comme la ligne *KG* eſt la portion d'orbite qui ſera décrite depuis le premier moment où la pénombre (1788) touchera le diſque de la terre en quelque point *I*, c'eſt-à-dire, où quelque point de la terre verra un commencement d'éclipſe, juſqu'au dernier inſtant où la pénombre abandonnera la terre au point *F*, le centre de la lune étant alors en *G*, & l'éclipſe finiſſant pour le dernier de tous les pays où elle ſera viſible; ainſi la longueur *KG* de l'orbite lunaire compriſe entre les points *K* & *G*, nous fera connoître la durée de l'éclipſe; comme le milieu *M* de la ligne *KG* nous fera trouver le temps du milieu de l'éclipſe générale: la ligne *KG* eſt coupée en deux parties égales par la perpendiculaire *LM*, parce que les côtés *LK* & *LG* ſont égaux; il en eſt de même de la corde *VX*; ainſi le point *M* indique le milieu de l'éclipſe générale, dont la durée eſt exprimée par *KG*; & la durée de l'éclipſe centrale eſt repréſentée par *VX*.

Durée de l'éclipſe générale.

1808. Exemple. Dans l'éclipſe du premier Avril 1764, le temps vrai de la conjonction indiqué par les tables étoit $10^h\ 32'\ 7''$, mais nous nous ſervirons du temps obſervé $10^h\ 31'\ 23''$ du matin, à Paris; la latitude pour ce temps-là $39'\ 36''$ boréale; le mouvement horaire de la lune en longitude $29'\ 39''$, celui du ſoleil $2'\ 27''\frac{1}{3}$, l'inclinaiſon relative $5°\ 44'\ 26''$, le mouvement horaire relatif ou compoſé $27'\ 19''\frac{1}{2}$; on fera ces deux proportions: $R : 39'\ 36'' :: \text{ſin. } 5°\ 44'\ 26'' : 3'\ 58''$, valeur de *HM*, & $27'\ 19''\frac{1}{2} : 60'\ 0'' :: 3'\ 58'' : 8'\ 42''$; on retranchera ces $8'\ 42''$ de l'heure de la con-

Fig. 103. jonction, parce que la latitude de la lune alloit en augmentant, & l'on aura $10^h\ 22'\ 41''$ pour le temps du milieu de l'éclipse générale, compté au méridien de Paris.

Le même triangle HLM fera trouver la perpendiculaire LM par le moyen de cette analogie : R : cos. $5°\ 44'\ 26'' :: 39'\ 36'' : 39'\ 24''$; c'est la plus courte distance de la lune au centre de la projection dans le temps du milieu de l'éclipse ; cette perpendiculaire LM, de $39'\ 24''$, nous servira pour trouver le commencement & la fin.

Commencement & fin de l'éclipse générale.

1809. Le commencement de l'éclipse générale compté au méridien de Paris, se trouve de la même manière que le commencement d'une éclipse de lune (1780, 1787); dans le triangle LKM rectangle en M, on connoît la perpendiculaire LM (1808) & l'hypothénuse LK égale à la somme des trois demi-diamètres du soleil, de la lune, & de la projection ; (1800), on cherchera le côté MK, on le convertira en temps à raison du mouvement horaire, & ce temps ôté de celui du milieu de l'éclipse en M, donnera le temps du commencement de l'éclipse générale en K; étant ajouté il donnera la fin de l'éclipse en G.

Exemple. Dans l'éclipse de 1764, le côté LM est de $39'\ 24''$; la parallaxe de la lune de $54'\ 9''$ pour Paris, le demi-diamètre horizontal de la lune $14'\ 47''$, celui du soleil $16'\ 1''$, la somme des demi-diamètres de la projection & la pénombre, c'est-à-dire, de la différence des parallaxes & des demi-diamètres du soleil & de la lune, est de $1°\ 24'\ 48''$, on résoudra le triangle LKM (1781); pour cela on fera la somme & la différence ; on ajoutera leurs logarithmes, on prendra la moitié de la somme, & l'on y ajoutera le

Logarithme constant. logarithme constant 0,3424158, différence entre le logarithme du mouvement horaire (1765), & celui de 1^h ou $3600''$; on trouvera le logarithme de $9893''$ ou $2^h\ 44'\ 53''$; ainsi le commencement de l'éclipse générale étoit à $7^h\ 37'\ 48''$ du matin, & la fin à $1^h\ 7'\ 34''$.

après-midi, ſa durée ſur toute la terre étoit de 5 heures 29′ 46″. *Fig.* 103.

1810. Le commencement de l'éclipſe centrale arrive lorſque la lune eſt au point *V*, où ſon orbite coupe le cercle de projection ; car alors le centre de la lune, le centre du ſoleil & le bord de la terre ſont ſur une même ligne, & le point de la terre dont la projection eſt en *V*, voit le centre de la lune ſur le centre du ſoleil. Commencement & fin de l'éclipſe centrale.

Dans le triangle *LMV*, rectangle en *M*, on connoît la perpendiculaire *LM* (1808) & la ligne *LV* qui eſt la différence des parallaxes ou le rayon de la projection, on cherchera le côté *MV*, on le convertira en temps, c'eſt-à-dire, on cherchera le temps que la lune emploie à parcourir *VM*, & ce temps étant ôté de celui du milieu de l'éclipſe générale, on aura le temps qu'il étoit à Paris quand l'éclipſe commençoit à être centrale pour quelque point *V* de la terre.

Exemple. Dans l'éclipſe de 1764, ſuppoſant *LV* = 54′ 0″ = 3240″; *LM* = 39′ 24″, on trouvera *MV* = 36′ 56″, qui réduit en temps donne 1ʰ 21′ 5″ ; cette demi-durée étant ôtée du milieu de l'éclipſe 10ʰ 22′ 41″, donnera le commencement de l'éclipſe centrale 9ʰ 1′ 36″, & ajoutée au milieu de l'éclipſe donnera la fin 11ʰ 43′ 46″. Le temps que l'ombre employoit à traverſer la terre étoit de 2ʰ 42′ 10″.

1811. Les calculs que nous venons de faire pour l'éclipſe générale, peuvent s'exécuter graphiquement comme ceux des éclipſes de lune (1787) ; on fera une grande figure dont le rayon *LA* ſoit égal à la différence des parallaxes horizontales, c'eſt-à-dire, diviſé en autant de minutes qu'en contient cette différence des parallaxes ; on prendra la ligne *LH* égale à la latitude de la lune, & l'angle *MLH* égal à l'inclinaiſon relative de l'orbite lunaire ; on prendra ſur la même échelle une quantité égale au mouvement horaire de la lune ſur ſon orbite relative, que l'on portera de *H* en *N* ; on marquera en *H* l'heure & la minute de Opération graphique.

la conjonction, & en *N* une heure de moins, on diviſera par ce moyen l'orbite *GK* en heures & minutes, & l'on verra à quelle heure la lune s'eſt trouvée en *K*, en *V*, en *M*, en *X* & en *G*; comme on l'a trouvé par les calculs des articles précédens.

1812. Il s'agit actuellement de connoître quels ſont les différens pays de la terre qui ſont en *V*, en *X*, au moment où la lune y arrive, c'eſt-à-dire, leurs longitudes géographiques, & leurs latitudes; Boulliaud les trouvoit par le moyen des tables du nonagéſime; je donnerai une méthode pour en faire le calcul par la trigonométrie (1930); mais il faut indiquer dès à préſent une manière ſimple & naturelle pour trouver ces pays avec un globe. M. de la Caille a donné dans ſes leçons d'aſtronomie (art. 1166) une méthode pour y parvenir avec la règle & le compas en décrivant des ellipſes; nous en parlerons également (1942 & ſuiv.); mais je ne conſeillerois pas aux aſtronomes de faire ces calculs par la trigonométrie, ſi ce n'eſt dans des cas extraordinaires, & pour des obſervations importantes; le temps qu'exigent ces calculs rigoureux, eſt bien mieux employé à calculer des obſervations déja faites, pour en tirer des conſéquences, qu'à annoncer avec une préciſion ſi ſcrupuleuſe celles qui doivent arriver; les opérations graphiques ſont ſuffiſantes pour tracer des cartes ſemblables à celles de la planche XIV, que l'on met ordinairement en abrégé dans les éphémérides. Ce fut M. Caſſini qui en donna l'idée & le modèle, à l'occaſion de l'éclipſe de ſoleil qu'il avoit obſervée à Ferrare en 1664. (*Obſervatione dell' ecliſſe ſolare fatta in Ferrara* 1664).

Machines pour les éclipſes.

1813. Il y a dans les manuſcrits de M. de l'Iſle une deſcription avec les plans d'une machine de ſon invention, propre à faire trouver facilement & ſans calcul les circonſtances d'une éclipſe de ſoleil. M. de Fouchy avoit auſſi exécuté, il y a pluſieurs années, une machine compoſée d'un globe & de différentes pièces pour le même uſage. M. Segner, de Gottingen, en a décrit



Fig. 95.



Fig. 96.



Fig. 98.



Fig. 99.

Fig. 101.





Fig. 103.

Digitized by Google

décrit une dans les tranſactions philoſophiques, (*année* 1741, *n°.* 461). Enfin, dans le livre de M. Ferguſon, intitulé, *Aſtronomy explained*, 1757, *pag.* 280, ou 1764 *pag.* 298, *planche XIII*, on trouve auſſi la deſcription d'une machine pour les éclipſes, qu'il appelle *Eclipſareon*, avec laquelle il trouve le temps, la quantité, le progrès, les circonſtances & la durée d'une éclipſe de ſoleil pour tous les pays de la terre. L'Auteur qui étoit Berger du Roi, en Ecoſſe, eſt venu au ſein de la ville de Londres exercer un talent naturel qu'il avoit pour la mécanique & pour l'aſtronomie, il s'y eſt diſtingué, & a obtenu des bienfaits du Roi d'Angleterre.

1814. Pour mettre tout au plus ſimple, je ne ſuppoſe qu'un globe terreſtre qui ait cependant au moins 6 pouces de diamètre, & une règle avec deux pieds, repréſentée par *GVAE* (*fig.* 105), dont la longueur *VA* ſoit égale au diamètre du globe dont on ſe ſert, & la hauteur égale au rayon du globe, ou un peu plus, afin d'être placée ſur ſon horizon *GE*; le rayon de ce globe doit repréſenter le rayon de la terre, ou la parallaxe de la lune, comme *LA* dans la *figure* 104, c'eſt-à-dire, qu'il faut le ſuppoſer, par exemple, de 54′ parce que la parallaxe de la lune dans l'éclipſe de ſoleil de 1764 étoit de 54′. *Fig.* 105.

Comme l'on n'eſt pas maître de changer le diamètre de ſon globe dans les différentes éclipſes de ſoleil, il faudra calculer les différentes parties de la figure, c'eſt-à-dire, le mouvement horaire de la lune & les diamètres du ſoleil & de la lune, en les réduiſant à cette échelle; ſi le globe a 8 pouces de diamètre, & que la parallaxe actuelle, ſoit, par exemple de 54′, on dira 54′ ſont à 48 lignes, comme 31′, ſomme des demi-diamètres, eſt à 27 lignes $\frac{1}{2}$, qu'on portera ſur la règle *LA*, qui doit repréſenter l'orbite de la lune.

1815. On évitera même ces règles de trois en ſe ſervant d'une échelle compoſée de pluſieurs lignes parallèles, & diviſées en 60 parties par des tranſverſales, telle qu'on la trouvera décrite ci-après (1858), &

Fig. 115. qu'on la voit dans la *figure* 115, la ligne marquée 60 eſt ſuppoſée égale au rayon du globe dont on ſe ſert; mais le rayon de ce globe devant toujours être égal à la parallaxe, ſi elle eſt de 54′, on aura beſoin d'une échelle plus longue que le rayon du globe dans le rapport de 60 à 54; car le rayon devant être alors diviſé en 54′, les minutes doivent être plus longues dans le même rapport, par conſéquent les diviſions ſur leſquelles on les prendra, doivent être plus étendues, ou être des portions d'une parallèle plus longue dans le rapport de 60 à 54. La parallèle *AB* qui répond à 54′ eſt dans ce rapport avec la parallèle qui répond à 60′, elle doit donc ſervir à prendre les minutes du mouvement horaire, des demi-diamètres & des autres parties de la figure, lorſque la parallaxe ſera de 54′; ainſi le nombre des minutes ſera plus petit, parce que le rayon n'en contiendra que 54 au lieu de 60.

Uſage du globe pour le calcul des éclipſes.

1816. Pour placer ſur le globe l'orbite de la lune, il faut avoir fait une figure, telle que la *fig.* 103, où la ligne *BLD* repréſente une portion de l'écliptique, & XV l'orbite relative (1765); on y ajoutera une ligne *OLQ* pour repréſenter une portion de l'équateur; en faiſant l'angle *ALO* égal à l'angle de poſition (1044), ou au complément de l'angle de l'écliptique avec le méridien (1846); l'équateur ſera au midi ou au-deſſous de l'écliptique à l'orient du globe, dans les ſignes aſcendans, c'eſt-à-dire, quand la conjonction arrivera depuis le 21 Décembre juſqu'au 21 Juin. La ſomme de l'angle *ALO* & de l'inclinaiſon de l'orbite relative, ou leur différence, ſuivant les cas, donnera l'angle de la perpendiculaire *LM* avec le méridien univerſel *LH*, ou le méridien du globe, que l'on ſuppoſe immobile; cet angle eſt le même que l'angle de l'orbite avec l'équateur; on prendra ſur la figure avec un compas les arcs *OV*, *QX*, & l'on marquera un pareil nombre de degrés ſur l'horizon du globe, à compter depuis les vrais points d'orient & d'occident, c'eſt-à-dire, depuis les interſections de l'équateur & de l'horizon du globe,

Fig. 103.

en allant du côté du nord, ſi la latitude de la lune eſt boréale, du côté du midi, ſi elle eſt auſtrale.

On élevera le pole du globe ſur ſon horizon du nombre de degrés que la déclinaiſon du ſoleil indiquera; ſi la déclinaiſon eſt boréale, c'eſt le pole boréal qu'il faut élever; ce ſera le pole antarctique, ſi la déclinaiſon eſt méridionale: on placera le ſupport *G V A E*, (*fig.* 105), de maniere qu'un bord de la règle ſupérieure *V A* réponde perpendiculairement au-deſſus des deux points marqués ſur l'horizon du globe; dans cet état, cette traverſe *V A* repréſentera l'orbite de la lune, placée ſur l'horizon du globe, comme elle l'étoit ſur le cercle de projection dans la *figure* 103. Maniere de placer le globe. *Fig.* 105.

Il faut prendre encore ſur la *figure* 103 les temps de l'orbite lunaire qui répondent en *V* & en *X*, c'eſt-à-dire, au commencement & à la fin; on les écrira ſur le ſupport *V A*, que je ſuppoſe couvert d'une petite bande de papier collé, & l'on aura un intervalle *A V*, qu'on diviſera en minutes de temps, comme l'on a diviſé l'orbite *V X* de la lune (1811), ou bien l'on ſe ſervira du mouvement horaire, & l'on marquera ſeulement le temps du milieu de l'éclipſe ſur le milieu *L* de la règle.

Il ne s'agira plus que de placer le globe ſur l'heure qui lui convient; par exemple, dans l'éclipſe de 1764, la lune devant être en *A* à 9h 2′, qui eſt le commencement de l'éclipſe centrale, on tournera le globe de maniere que Paris ſoit en *C*, 2h 58′ à l'occident du *Méridien univerſel MP*; c'eſt ce méridien dans lequel le ſoleil eſt ſuppoſé fixe, tandis que tous les pays de la terre paſſent ſucceſſivement devant lui par la rotation du globe d'occident en orient (1829). Méridien univerſel.

1817. Le globe terreſtre étant ainſi diſpoſé pour l'heure de Paris, il eſt auſſi placé pour tous les autres pays, & la lune étant ſuppoſée en *A*, le point de la terre qui répond perpendiculairement ſous la lune, eſt celui où l'éclipſe paroît centrale dans ce même moment (1800); on n'a donc qu'à abaiſſer un à-plomb du point *A*, ſi l'horizon du globe eſt bien de niveau, ou placer l'œil

Fig. 105. perpendiculairement au-deſſus du point *A*, ou enfin, ſe ſervir d'une petite équerre, & l'on verra ſur le globe le point de la terre que l'on cherchoit, perpendiculairement au-deſſous de *A*; l'on marquera la longitude & la latitude de ce point-là; ce ſera le premier point de l'éclipſe centrale, marquée ſur la carte de la *planche XIV*.

Au point *A* l'on placera le centre d'un cercle dont le rayon *AD* ſoit égal à la ſomme des demi-diamètres du ſoleil & de la lune; on pourra faire un cercle de carton, qu'on placera parallèlement à l'horizon du globe, ſon centre étant en *A*; ou bien l'on fera circuler un compas dont l'ouverture ſoit égale à la ſomme des demi-diamètres, & dont une pointe ſoit en *A*; on remarquera tous les points du globe qui ſe trouveront répondre perpendiculairement ſous la circonférence de ce cercle, ce ſont ceux qui verront les bords du ſoleil & de la lune ſe toucher au même inſtant.

1818. On fera un autre cercle dont le rayon ſoit plus petit que le précédent, d'un quart du diamètre du ſoleil, c'eſt-à-dire, de 3 doigts, (ce ſera 8′ en 1764), ou bien on échancrera de la même quantité une portion du même cercle qui a ſervi pour la première phaſe, comme dans le limaçon de la *figure* 106; ou bien l'on diminuera ſeulement l'ouverture du compas dont on s'eſt ſervi dans l'opération précédente; alors la circonférence du cercle, ainſi diminuée de trois doigts, ou l'ouverture du compas, promenée tout autour du point *A* (*fig.* 105), indiquera ſur le globe, par le moyen de l'à-plomb, tous les points de la terre où le ſoleil eſt éclipſé dans ce moment-là de 3 doigts ſeulement; on en comprendra la raiſon en réfléchiſſant ſur les articles 1802 & 1803.

Cercle de la pénombre. 1819. On pourra faire de même d'autres cercle pour l'éclipſe de 2, 3, 4, 5 doigts, &c. en diminuant de 2, 3 doigts, &c. le rayon du cercle de la *pénombre* c'eſt-à-dire, du cercle dont le rayon étoit égal à la ſomme des demi-diamètres du ſoleil & de la lune; on pourra échancrer un ſeul cercle dont la circonférence ſoit di-

viſée en 12 parties, & le rayon de même en 12 parties, & dont les 12 ſecteurs aillent en diminuant comme le limaçon d'une montre à répétition (*fig.* 106), chacun étant plus petit que le précédent, d'un doigt ou d'une douzième partie du diamètre ſolaire, pris ſur la même échelle que la parallaxe horizontale & le mouvement horaire (1815); en promenant un à-plomb ſur les circonférences de ces cercles, il marquera ſur le globe les pays qui pour cet inſtant-là auront l'éclipſe d'un doigt, ou de 2, &c. *Fig.* 106.

Si l'on place en *L*, ſur le milieu de la traverſe *AV*, le centre de ces cercles, & qu'on faſſe la même opération, après avoir fait tourner le globe pour amener la roſette *P* du globe ſur $10^h\ 23'$, qui eſt l'heure du milieu de l'éclipſe générale au méridien de Paris, on trouvera tous les pays qui à $10^h\ 23'$ ont l'éclipſe d'un doigt, de deux, &c. C'eſt ainſi qu'on peut tracer ſur un globe, ou ſur une carte géographique, la figure de tous les points qui auront une éclipſe centrale, ou qui auront l'éclipſe d'un doigt, de deux, &c. On en trouvera le calcul trigonométrique avec un exemple à l'article 1930 & ſuiv. Il eſt bon d'obſerver dès-à-préſent que tous ces pays qui dans un inſtant donné voient l'éclipſe d'un doigt, n'ont pas cependant la grandeur de l'éclipſe d'un doigt; car ce n'eſt pas la plus grande phaſe qu'on trouve par cette opération, c'eſt ſeulement la phaſe qui a lieu pour moment donné.

Méthode pour déterminer les phaſes d'une éclipſe de ſoleil par le moyen des projections.

1820. La méthode que je viens d'expliquer pour trouver, par le moyen d'un globe, les pays de la terre qui doivent voir une éclipſe de ſoleil, ne ſeroit pas aſſez exacte pour trouver, à une ou deux minutes près, le commencement & la fin de l'éclipſe en un lieu quelconque, à moins qu'on n'eût un globe très-grand &

très-parfait ; mais nous y parviendrons aiſément au moyen d'une figure de projection & d'une ellipſe tracée avec ſoin ; cette opération graphique avec la règle & le compas ſera plus exacte, & auſſi ſimple que celle du globe. Avant d'en donner les règles, je vais tacher d'en faire comprendre la théorie en expliquant avec ſoin les principes de la projection ortographique ; j'en ai déja fait quelque uſage, (art. 1798 & ſuiv.), mais je vais en expliquer ici tous les fondemens & toutes les circonſtances.

Opération graphique.

1821. M. Caſſini s'étoit occupé, à ce qu'il paroît, de cette matière, même avant que d'avoir quitté l'Italie. M. Weidler, (*pag.* 522), cite à ce ſujet un ouvrage de M. Caſſini, intitulé : *Nova Eclipſium methodus. Bonon. Italice*, 1663, *in*-4°. J'aurois été fort curieux de voir un ouvrage auſſi ancien de M. Caſſini, ſur cette matière ; mais je l'ai cherché inutilement en Italie, en France, en Angleterre & en Allemagne, & je ſuis perſuadé qu'il n'a jamais été imprimé ; le P. Audiffredi, ſavant bibliothécaire & aſtronome, du Couvent de la Minerve à Rome, m'a écrit qu'il en jugeoit de même, & qu'il l'avoit dit dans ſon ouvrage *De' Scrittori Nizzardi*, où des Ecrivains du comté de Nice, dans lequel il a parlé de M. Caſſini, & où il s'eſt ſervi de ce qu'en ont dit Apoſtolo Zeno, Michele Giuſtiniani, le P. Nicéron, &c. Le premier dit, en parlant de l'éclipſe de 1664, que M. Caſſini publia ſes obſervations à Ferrare, & qu'elles furent d'autant plus intéreſſantes qu'il y fit uſage d'une nouvelle méthode pour déterminer les apparences d'une éclipſe de ſoleil dans toute la terre ; mais qu'il ſe reſerva de publier dans un autre temps cette méthode en ſon entier, & d'en faire la matière d'un ouvrage qui devoit être intitulé : *Nova eclipſium methodus*, (*Giornale d'Italia, tom.* 27, *pag.* 121), il continue le détail de tous les ouvrages que M. Caſſini donna juſqu'à ſon départ pour la France, mais il ne dit plus rien de la nouvelle méthode des éclipſes, ce

qui me fait croire que du moins en Italie il n'en fut plus queſtion. Le P. Nicéron n'en dit rien, quoiqu'il parle auſſi des obſervations de l'éclipſe de 1664, publiées à Ferrare, (1812). M. Euſtache Zanotti, m'a dit qu'il ne croyoit pas qu'il y eût rien autre de publié ſur cette matière; il ſe ſouvient qu'étant jeune il reçut de M. Manfredi, des manuſcrits que Domin. Caſſini avoit autrefois prêtés à ce dernier, où étoit expliquée la méthode de calculer graphiquement les éclipſes, ces manuſcrits étoient en françois, ce qui prouve qu'il les avoit compoſés en France, il n'y faiſoit mention d'aucun ouvrage précédemment publié, & Manfredi n'en avoit pu indiquer aucun à M. Zanotti, lorſqu'il lui prêta ces papiers. On ne voit rien de M. Caſſini juſqu'à l'année 1700, qu'il fit part de ſa méthode à l'académie, (*Hiſt. de l'acad.* 1700, *pag.* 103); elle ſe trouve fort au long à la tête des tables de M. ſon Fils publiées en 1740.

1822. Flamſteed donna une diſſertation à la ſuite du cours de mathématiques de Jonas Moore, (*A new ſyſteme of the mathematick*, 1681), cette pièce a pour titre, *The doctrine of the ſphere grounded on the motion of the earth*; il dit dans la préface qu'on n'avoit jamais publié de méthode pour trouver les phaſes d'une éclipſe de ſoleil ſans calculer les parallaxes; il y avoit penſé en 1676, & avoit envoyé ſa méthode à Jonas Moore, celui-ci la communiqua à la ſociété royale; mais Chriſt. Wren, dit alors qu'il avoit trouvé la même méthode 16 ans auparavant; & pour le prouver, il lui envoya peu après une ſemblable projection tracée proprement ſur un carton, avec pluſieurs inventions ingénieuſes de nombres & d'échelles pour la conſtruction des éclipſes de ſoleil ſous la latitude de Londres.

Wren eſt regardé comme le premier inventeur.

Je crois donc, dit Flamſteed, que Wren eſt le premier de tous qui ait connu la manière de trouver les phaſes d'une éclipſe ſans calculer les parallaxes; il ajoute que M. Halley, avant ſon depart pour Sainte

Helene en 1666, lui parla de la conſtruction des éclipſes, mais en lui cachant la méthode, à laquelle Flamſteed n'avoit pas alors beaucoup de confiance.

Projection ortographique.

1823. Projetter une figure, c'eſt la rapporter à un autre plan, par des lignes tirées de chaque point de la figure à chaque point du plan. On diſtingue pluſieurs ſortes de projections, mais la plus ſimple de toutes eſt la projection *ortographique* (a), formée par des lignes perpendiculaires au plan de projection; c'eſt celle dont on ſe ſert avec un très-grand avantage pour les éclipſes ſujettes aux parallaxes. Soit une ligne AB, (*fig.* 107), & un plan quelconque PL, différent de cette ligne; ſi des extrémités A & B de la ligne donnée on abaiſſe ſur le plan PL des perpendiculaires Aa, Bb, l'eſpace ab qu'elles occuperont ſur le plan PL, ſera la projection ortographique de la ligne AB, & le plan PL ſur lequel on a abaiſſé ces perpendiculaires, s'appellera le *plan de projection.*

Fig. 107.

1824. Si les lignes Aa, Bb, au lieu d'être parallèles, & perpendiculaires au plan de projection, avoient pour origne un point commun, il en réſulteroit ſur le plan PL une autre figure, une autre ſorte de projection; nous ferons uſage, par exemple, de la projection *ſtéréographique* (b) (2111), à l'occaſion de la Mappemonde qui ſervira pour le paſſage de Vénus; & nous parlerons dans le XXIVe. livre de pluſieurs ſortes de projections (3871); mais nous n'avons beſoin ici que de la projection ortographique.

Projection d'une ligne.

1825. La projection ortographique ab d'une ligne AB faite ſur un plan de projection PL par les perpendiculaires Aa, Bb eſt le coſinus de ſon inclinaiſon. Car ayant tiré AC parallèle à PL, l'angle BAC eſt égal à l'inclinaiſon de la ligne AB ſur le plan de projection PL, & $AC = ab$ eſt la projection de la

(a) Ὀρθὸς, *rectus*, parce que cette projection ſe fait par des angles droits.

(b) Στερὸς, *ſolidus*, parce que c'eſt la projection employée pour repréſenter le globe qui eſt un corps ſolide.

ligne

ligne AB; or $AB : AC :: R : \text{cof. } BAC$; ainſi le rayon eſt au coſinus de l'inclinaiſon, comme la ligne AB eſt à ſa projection AC. Donc ſi l'on prend le rayon pour l'unité, on trouvera que *la projection d'une ligne eſt égale à cette ligne multipliée par le coſinus de ſon inclinaiſon ſur le plan de projection.*

1826. LA PROJECTION d'un arc tel que FI eſt égale à ſon ſinus. Soit la circonférence DFH (*fig.* 108), du demi-cercle dont on demande la projection, ſituée dans un plan perpendiculaire au plan de projection, toutes les lignes perpendiculaires FC abaiſſées de chaque point de la circonférence ſur le rayon CH, ſeront perpendiculaires au plan & marqueront les projections des mêmes points; le point K ſera la projection du point I; ainſi la ligne CK ſera la projection de l'arc FI; mais ſi C eſt le centre du cercle, CK égal à IL eſt le ſinus de l'arc FI: ainſi les ſinus des arcs FI ſeront les projections de ces arcs, ſi l'on prend leur origine au point F qui répond perpendiculairement au centre C. Cette propoſition ſera d'un grand uſage dans le calcul des éclipſes (1838 & ſuiv.). Projection d'un arc. *Fig.* 108.

1827. LA PROJECTION ortographique d'un cercle incliné eſt toujours une ellipſe. Soit DFH (*fig.* 108), le cercle dont on cherche la projection, DH celui de ſes diamètres qui eſt dans le plan de projection, ou parallele à ce plan; ſi l'on incline ce demi-cercle en le faiſant tourner autour du diamètre DH, de manière que toutes les lignes IK faſſent avec le plan de projection un angle quelconque, toutes ces lignes auront pour projections des lignes KG qui ſeront égales chacune à leur correſpondante IK multipliée par le coſinus de l'angle d'inclinaiſon (1825), enſorte que KG ſera par-tout à IK comme le coſinus de l'angle d'inclinaiſon eſt au rayon; or, telle eſt la propriété d'une ellipſe, que toutes ſes ordonnées KG ſoient aux ordonnées IK d'un cercle de même diamètre dans un rapport conſtant (3256); donc les lignes KG formeront une ellipſe; donc enfin la projection d'un demi- Projection d'un cercle. *Fig.* 198.

Fig. 108. cercle *DFH* ſera la circonférence d'une ellipſe *DGH*, dont le grand axe *DH* eſt le même que celui du demi-cercle; & le petit axe plus petit en raiſon du coſinus de l'inclinaiſon. Il en ſeroit abſolument de même quand le diamètre *DH* du cercle projetté ſeroit à une certaine diſtance au-deſſous du plan de projection.

Le cercle paroît en forme d'ellipſe.

1828. Un cercle vu obliquement paroît donc ſous la forme d'une ellipſe; car on ſait qu'une ligne *AB* (*fig.* 109), vue obliquement du point *O* paroît de la même grandeur que la ligne perpendiculaire *AC* = *AB* ſin. *ABC*; ainſi dans un cercle *CAD* (*fig.* 110), vu obliquement toutes les ordonnées *AB*, *EF*, paroiſſent plus petites dans le même rapport, le cercle paroît donc une ellipſe *CGD*, dont le petit axe eſt au grand comme le ſinus de l'inclinaiſon eſt au rayon. Cette propoſition revient au même que la précédente; mais il eſt néceſſaire de s'accoutumer à comprendre que le cercle vu obliquement, paroît en forme d'ellipſe; car nous ferons un uſage continuel de cette propoſition.

Fig. 109 & 110.

Fig. 111.

1829. Les principales lignes de la projection d'une éclipſe ſont repréſentées dans la *fig.* 111; *ST* eſt la ligne menée du centre du ſoleil au centre de la terre, que nous appellons ſimplement la ligne des centres; *IL* un plan qui paſſe par le centre de la terre perpendiculairement à la ligne des centres. Ce plan forme le *cercle d'illumination*, & ſépare la partie éclairée *IDL* de la partie obſcure *LOVI*; nous allons rapporter à ce plan les différentes parties de la projection; & tout ce que nous dirons à ce ſujet pourra s'appliquer au plan de projection, lors même que nous le placerons dans la région de la lune (1835), parce qu'il ſera toujours parallèle au cercle d'illumination, & ſenſiblement égal. La ligne *PO* eſt l'axe de la terre; *EQ* le diamètre de l'équateur; *PELOQIP* le *méridien univerſel* (1816), c'eſt-à-dire, celui qui paſſe continuellement par le ſoleil, & que les différens pays de la terre atteignent ſucceſſivement par la rotation diurne de notre globe; *ED* eſt la déclinaiſon du ſoleil ou ſa diſtance à l'équateur; l'arc

Cercle d'illumination.

PI eſt l'élévation du pole au-deſſus du plan de projection; cette hauteur eſt égale à la déclinaiſon du ſoleil, car ſi des angles droits ou quarts de cercle *PE* & *DI* on ôte la partie commune *PD*, on aura l'arc *PI=DE* qui eſt la diſtance du ſoleil à l'équateur *E*, ou ſa déclinaiſon. Cette élévation eſt auſſi égale à l'inclinaiſon de tous les parallèles terreſtres par rapport à la ligne des centres, & le complément de leur inclinaiſon par rapport au plan de projection. *Fig.* 111.

Elévation de l'axe & du pole.

Ayant pris, depuis l'équateur, les arcs *EG* & *QF* égaux à la latitude d'un lieu de la terre, tel que Paris, la ligne *GH* perpendiculaire à l'axe *PO*, & qui eſt le coſinus de la latitude *EG*, ſera le rayon du parallèle de Paris, ou du cercle que Paris décrit chaque jour par la rotation diurne de la terre; *GF* ſera le diamètre du parallèle. Des points *G*, *F* & *H*, qui ſont les extrémités & le centre du parallèle de Paris, nous abaiſſerons des perpendiculaires *GM*, *FR*, *HN*; les points *M*, *R*, *N* où ces perpendiculaires rencontreront le cercle de projection *IL*, ſeront les projections des extrémités & du centre du parallèle.

1830. La diſtance *TM* du centre *T* de la projection au bord intérieur *M* de la projection du parallèle de Paris, eſt égale au ſinus de l'arc *GD* ou de la différence entre *EG* qui eſt la latitude de Paris, & *DE* qui eſt la déclinaiſon du ſoleil; la diſtance *TR* du centre *T* de la projection à l'extrémité la plus éloignée *R* du parallèle de Paris, eſt égale au ſinus de l'arc *DF*, ou *VF*; cet arc *VF* eſt égal à la ſomme des arcs *VQ* & *QF* dont l'un eſt égal à la déclinaiſon du ſoleil, & l'autre à la latitude de Paris; ainſi *la diſtance du centre à la projection du ſommet du parallèle, eſt égale au ſinus de la ſomme de la latitude du lieu & de la déclinaiſon du ſoleil.*

1831. La projection du pole *P* ſe trouvera en abaiſſant une perpendiculaire du point *P* ſur la ligne *TI*; elle marque un point éloigné du centre *T* d'une quantité égale à *TP* coſ. *PTI* ou *TP* coſ. déclin. ⊙ (1825).

Fig. 111.

1832. La distance *TN* ou l'espace de la projection compris entre le centre *T* de la projection, & le centre *N* du parallèle est égal à *TH*. cos. *HTN* (1825); mais *TH* est le sinus de la latitude de Paris, *HTN* est égal à *PI* ou à *DE*, c'est-à-dire, à la déclinaison du soleil; donc *TN* est égale au produit du sinus de la latitude du lieu, par le cosinus de la déclinaison du soleil pour le moment donné, en prenant pour rayon le rayon même de la projection: nous en ferons usage (1862).

Distance du centre de l'ellipse.

1833. Le point *D* de la terre est celui qui a le soleil au zénit; un autre point quelconque *E* qui en est éloigné de la quantité *DE*, a donc le soleil éloigné de son zénit de la même quantité *DE*; delà il suit qu'une ligne *TA* étant prise sur la projection & étant convertie en arc pour avoir *DE*, elle donnera le sinus de la distance du soleil au zénit ou le cosinus de sa hauteur pour le lieu de la terre qui est projetté au point *A*; c'est-à-dire, que la ligne *TA*, sinus de l'arc *DE*, en est la projection. Nous ferons usage plusieurs fois de cette proposition, & en particulier à l'article 1936.

1834. Il suit aussi delà que *TA* exprime la parallaxe de hauteur pour le lieu de la terre qui est projetté en *A*; car *TL* qui est la parallaxe horizontale (1797), est encore le sinus total; donc *TA* qui est le cosinus de la hauteur sera aussi la parallaxe de hauteur, qui est toujours $= p$. cos. h (1629); donc en général *la distance d'un pays de la terre au centre de la projection, est égale à la parallaxe de hauteur*; le rayon de la projection étant pris pour la parallaxe horizontale. On peut dire cependant que c'est la parallaxe qui convient à la hauteur du soleil, & non pas celle qui conviendroit à la hauteur de la lune, parce que les différens points de la projection sont ceux auxquels on rapporte le soleil vu des différens points de la terre; ce n'est pas ceux où l'on rapporte la lune, qui se meut sur une orbite différente, tantôt au-dessus & tantôt au-dessous; cependant on néglige dans la méthode des projections la différence qu'il y a entre la hauteur du soleil & celle de la lune (1874),

Expression de la parall. de hauteur.

parce qu'elle ne peut aller qu'à un demi-degré environ, lorſque l'éclipſe commence ou finit. *Fig.* 113

1835. Le parallèle de Paris ou le cercle dont *H* eſt le centre, & *GF* le diamètre, étant rapporté ou projetté ſur le plan *ITL* y devient une ellipſe (1827), & c'eſt cette ellipſe qu'il eſt néceſſaire de décrire ſur le plan, pour y rapporter les phaſes de l'éclipſe; mais auparavant je dois faire obſerver que l'on peut tranſporter dans la région de la lune le plan de projection *ITL*, & que l'ellipſe y ſera parfaitement la même que ſur le plan *ITL* qui paſſe par le centre de la terre, puiſqu'elle ſera compriſe entre des lignes parallèles à la ligne des centres *TDS*, & qui s'étendent juſqu'à la lune, où elles forment une projection de la terre, égale à la terre elle-même (1796).

Plan de projection dans la Lune.

Soit *NO* (*fig.* 113), le diamètre de la terre perpendiculaire au rayon du ſoleil, ou le diamètre du cercle d'illumination, c'eſt-à-dire, du cercle terminateur de la lumière & de l'ombre; *OAN* l'hémiſphère éclairé, *OVN* l'hémiſphère obſcur de la terre; *OK* & *NM* deux lignes dirigées vers le ſoleil, & que je ſuppoſe d'abord parallèles entr'elles puiſqu'elles en diffèrent très-peu (1796); *XY* un plan perpendiculaire à la ligne des centres & aux rayons du ſoleil, que j'appellerai *plan de projection*; *MGK* un cercle décrit ſur ce plan, & qui ſoit parallèle & égal au cercle d'illumination; c'eſt ce cercle *MK* que j'appelle *cercle de projection* (1804), parce qu'il eſt véritablement la projection ortographique (1823) du diſque de la terre dans la région de l'orbite lunaire. *Fig.* 113.

Raiſons de préférence.

1836. Nous choiſiſſons pour plan de projection celui qui eſt dans la région de l'orbite lunaire & qui paſſe à la diſtance de la lune, quoiqu'on pût choiſir d'autres plans qui paſſeroient ou par le ſoleil ou par la terre, (*Mém. acad.* 1744, *pag.* 191); mais celui qui paſſe par la lune me paroît le plus commode, parce que le mouvement de la lune & ſon diamètre y ſont tels que nous les obſervons réellement de la terre;

Fig. 113. le rayon même de la terre y paroît d'une grandeur connue, & donnée par les tables, qui eſt la parallaxe horizontale de la lune. En employant un plan de projection, tel que le propoſe M. le Monnier, d'après Képler, & Boulliaud, (*Inſt. aſtron. pag.* 213) qui paſſe par le centre de la terre, on eſt obligé de ſuppoſer l'œil de l'obſervateur placé dans la lune, ce qui peut donner quelque difficulté de plus à ceux qui commencent à s'occuper de ces matières. Ayant choiſi la région lunaire pour y placer notre projection, voyons comment on doit y rapporter les parallaxes terreſtres.

Soit *PCR* l'axe de la terre, élevé au-deſſus du cercle d'illumination (1829), ou du cercle terminateur, de la quantité *PCN* égale à la déclinaiſon du ſoleil (1829). Soit *ABDE* le cercle ou parallèle diurne que décrit par le mouvement de rotation un point de la terre, tel que Paris; *AF*, *DG*, des lignes parallèles aux rayons du ſoleil, & que nous ſuppoſerons auſſi parallèles entr'elles, puiſque la différence eſt inſenſible (1796). Ces lignes forment un cylindre oblique dont la baſe eſt un cercle; mais dont toutes les ſections perpendiculaires à l'axe ſont des ellipſes; puiſqu'elles ſont la projection d'un cercle vu obliquement (1828).

1837. La projection de la terre entière ſera un cercle *MFK* parallèle & égal au cercle d'illumination, comme nous l'avons déja dit; mais le parallèle de Paris ou le cercle *ABDE* n'étant point parallèle au plan de projection *XY*; il ne peut s'y projetter que ſous une forme elliptique (1827). C'eſt cette ellipſe que nous allons décrire; elle eſt la même ſur le plan de projection *XY* que ſur le plan qui paſſeroit par *NO*, c'eſt-à-dire, ſur le plan du cercle d'illumination, puiſque ces deux ellipſes ſont renfermées entre des lignes parallèles *FA*, *GD*; ainſi tout ce que j'ai dit à l'occaſion de la *figure* 111, (art. 1829), aura lieu pour l'ellipſe que nous allons décrire ſur le cercle de projection qui paſſe dans l'orbite lunaire.

1838. Dans les opérations ſuivantes, il ne faut

pas oublier que la diſtance de la lune au point de la projection qui repréſente un lieu de la terre, marque la diſtance apparente des centres du ſoleil & de la lune pour ce lieu-là. Je ſuppoſe un point *A* de la terre (*fig.* 113), projetté en *F* par un rayon *AF*; le même lieu *A* de la terre voit le ſoleil ſur la ligne *AF* (1796); ſi le centre de la lune répond alors au point *L* de la projection, l'obſervateur ſitué en *A* verra la lune éloignée du ſoleil de la quantité *FL*; ainſi la diſtance apparente ſur le plan de projection entre la lune *L* & le point *F* qui répond au point *A* de la terre, ſera *FL*. Il faut bien concevoir que le point *F* étant la projection du lieu *A* de la terre, c'eſt au point *F* de la projection que l'on rapporte le ſoleil quand on l'obſerve du point *A*; ainſi l'on peut indifféremment dire qu'un point *F* de la projection marque le lieu *A* de la terre, par exemple, la ſituation de Paris, ou qu'il marque le lieu du ſoleil vu de Paris (1799). *Fig.* 113.

1839. Au moyen des propoſitions démontrées dans les articles 1829 & ſuiv. il eſt aiſé de tracer l'ellipſe de projection pour un lieu & pour un jour donné. Soit *AOB* (*fig.* 112), le cercle d'illumination, ou le cercle de la terre qui eſt perpendiculaire au rayon du ſoleil ou à la ligne des centres; il faut ſuppoſer le ſoleil au-deſſus de la figure, répondant perpendiculairement au-deſſus du centre *C* de la terre. La ligne *OPDC* eſt un diamètre du méridien univerſel dans lequel on ſuppoſe le ſoleil immobile; *ACB* eſt un diamètre de l'équateur, perpendiculaire au méridien univerſel; *P* eſt la projection du pole, c'eſt-à-dire, le point du plan de projection ſur lequel le pole répond perpendiculairement (1831); on prendra les arcs *BL* & *AK* égaux à la latitude du lieu; enſuite *KM*, *KN*, *LR*, *LV*, égaux à la déclinaiſon du ſoleil; on tirera les lignes *MER*, *NFV*, l'on aura *CE* égale au ſinus de *BR* ou de la ſomme de la latitude du lieu & de la déclinaiſon de l'aſtre, & la ligne *CF* égale au ſinus de *BV* ou de la différence des mêmes arcs. Ainſi les points *E* & *F* *Fig.* 112.

Pour avoir le petit axe.

Fig. 112. ſeront les extrémités de la projection du parallèle (1830); donc l'ellipſe qui repréſente le parallèle aura *EF* pour petit axe, & diviſant *EF* en deux parties égales au point *G*, l'on aura le centre de l'ellipſe, car le centre doit être néceſſairement à égale diſtance des deux extrémités *E*, *F*, du petit axe.

1840. Il eſt vrai que le point *G* eſt différent du point *D*, par lequel paſſe le diamètre *KL* du parallèle de Paris; mais cela vient de ce que le cercle *AOB* ſur lequel nous avons pris les arcs *BL* & *AK* égaux à la latitude de Paris, n'eſt pas un méridien ni un cercle ſur lequel ſe comptent les latitudes; l'axe eſt incliné au cercle de projection, le méridien eſt incliné au cercle *AOB*, le point de l'axe par lequel paſſe le parallèle de Paris, eſt bien à une diſtance du centre égale à *CD*; mais ce point rapporté ſur le cercle de projection répond perpendiculairement en *G*, enſorte que *CG* eſt égale à *CD* multipliée par le coſinus de la déclinaiſon (1825). Ainſi l'opération que nous venons de faire pour trouver le point *G*, eſt ſeulement une conſtruction par laquelle on a les grandeurs *CE* & *CF* telles que nous avons fait voir qu'elles devoient ſe trouver, mais où la ligne *KDL* ne ſervira point comme diamètre du parallèle.

Pour le grand axe,

1841. Le grand axe de l'ellipſe eſt le diamètre même du parallèle; ayant pris déja les arcs *AK* & *BL* égaux à la latitude du lieu pour lequel on veut dreſſer la projection, la ligne droite *KL* ſera égale au diamètre du parallèle; or l'on a vu (1829) que le demi-diamètre du parallèle ou le demi-grand-axe de l'ellipſe, n'eſt autre choſe que le coſinus de la latitude du lieu. Ayant la grandeur de l'axe on tirera par le centre *G* que nous avons déterminé, une ligne *SGX* parallèle & égale à *KL*, qui eſt égale au diamètre du parallèle de Paris; *SGX* ſera le grand axe de l'ellipſe qu'il s'agit de décrire.

Règles pour décrire l'ellipſe.

1842. Connoiſſant le grand axe *SX* & le petit axe *EGF* (1839) de l'ellipſe que nous cherchons, il

ſera

ſera aiſé de la décrire, c'eſt-à-dire, d'en trouver tous les points d'heure en heure. On décrira ſur le grand axe *SX* un cercle *SHXQ*, qui repréſentera le parallèle de Paris, quoique ſitué dans un plan différent; ce cercle étant diviſé en 24 heures aux points marqués 1, 2, 3, &c. on ſera sûr que chaque point *g* du parallèle paroîtra ſur la ligne *gf* perpendiculaire au grand axe *SX*, tirée par chaque point de diviſion; car quelle que ſoit l'inclinaiſon du cercle *SHX*, & l'obliquité ſous laquelle il ſera vu, pourvu qu'il paſſe par les points *S* & *X*, le point *g* de ſa circonférence répondra toujours perpendiculairement au point *h* du grand axe, & l'abſciſſe *Gh* de l'ellipſe ſera toujours le ſinus même de l'arc *Hg* du parallèle, ou de la diſtance au méridien. *Fig.* 115.

Pour trouver auſſi l'ordonnée *bh* de l'ellipſe, au même point, on remarquera que la ligne *gh* du parallèle étant vue obliquement, doit paroître d'une longueur *bh*, telle que *bh* ſoit à *gh*, comme le coſinus de l'inclinaiſon du parallèle eſt au rayon (1825), ou comme le ſinus de la déclinaiſon du ſoleil eſt au rayon (1829), ou enfin comme le petit axe *EG* eſt au grand axe *HG*, donc *HG* : *gh* :: *EG* : *bh*; ainſi *gh* étant le coſinus de 30° pour le rayon *HG*, *bh* ſera le coſinus de 30° pour le rayon *GE*.

1843. Les abſciſſes de l'ellipſe *PbX* étant les ſinus de 15°, 30°, 45°, &c. les ordonnées *bh* doivent être les coſinus des mêmes arcs, en prenant pour rayon la moitié du petit axe (3264); on marquera donc en partant du centre *G* les points 1, 2, 3, tels que *G* 1, ſoit le ſinus de 15° ou de *Hg*; *G* 2, le ſinus de 30°, &c. pour le rayon *GH*; aux points 1, 2, 3, &c. on élevera ſur *GX* des perpendiculaires qui ſoient les coſinus de 15°, 30°, 45°, pour le rayon *FG*, ou *GE*, & ces perpendiculaires détermineront les points cherchés & le contour de l'ellipſe du parallèle. Décrire l'ellipſe.

1844. Pour trouver aiſément ces ſinus & ces coſinus, au défaut d'un compas de proportion, on décrira du centre *G* un autre cercle *EYF* ſur le petit axe,

on le diviſera comme le cercle *HXQ* en 24 parties, ſi l'on ſe contente de 24 heures, ou en 48, ſi l'on veut avoir une ellipſe diviſée en demi-heures. Par les points de diviſion du grand cercle, on tirera des lignes *g b f* parallèles au petit axe, & par les points de diviſions du petit cercle, qui correſpondent aux mêmes heures, on tirera des lignes comme *a b* parallèles au grand axe; celles-ci étant prolongées iront rencontrer les premières dans des points tels que *b*, qui formeront l'ellipſe que l'on cherche. Par exemple, la ſeconde ligne parallèle au petit axe, & qui va du point 30 au point *F*, coupe la ſeconde ligne *a b*, tirée également à 30° du point *E* parallèlement au grand axe *G X*, dans le point *b*, ce point eſt celui de l'ellipſe qui eſt à deux heures du méridien. Le point correſpondant *c* à gauche marque deux heures après midi. C'eſt ainſi qu'on a pour chaque heure la projection du parallèle de Paris, & la ſituation de Paris ſur le cercle de projection, à toutes les heures du jour.

Déclinaiſon ſeptentrionale ou méridionale. *Planche XI. Fig.* 114.

1845. On voit dans la *fig.* 114 une ellipſe tracée par la méthode précédente pour 26 degrés de déclinaiſon, mais dans laquelle on a ſupprimé toutes les lignes qui ont ſervi à la décrire. La partie inférieure de l'ellipſe a lieu quand la déclinaiſon eſt ſeptentrionale; car alors la partie éclairée du parallèle, telle que *B A E*, dans la *fig.* 113, paroît la plus baſſe ou la plus méridionale par rapport au rayon ſolaire *T S*. Mais ſoit qu'on ſe ſerve de la partie ſupérieure ou de la partie inférieure de l'ellipſe, il faut toujours conſidérer Paris, comme allant vers la gauche, c'eſt-à-dire à l'orient, dans la partie viſible du parallèle ou dans la partie qui eſt tournée vers l'étoile.

Heures du matin ou du ſoir. *Fig.* 114.

La partie droite ou occidentale de l'ellipſe, (*fig.* 114), ſert pour les heures du matin, dans les éclipſes de ſoleil; ou ſi c'eſt une éclipſe d'étoile fixe, cette partie ſert avant le paſſage de l'étoile au méridien, puiſque le mouvement de la terre ſe fait vers l'orient, ſoit ſur la terre, ſoit ſur la projection qui en eſt l'image; on marque

0^h ou 12^h aux ſommets du petit axe, lorſqu'il s'agit du ſoleil, ou bien l'on y marque l'heure du paſſage de l'étoile au méridien, lorſqu'il s'agit d'une éclipſe d'étoile par la lune.

On voit au bas de la *fig.* 114 les diamètres des ellipſes qu'on trouveroit pour différentes déclinaiſons en employant le même rayon de projection. On y voit auſſi à quelle diſtance paſſeroient toutes ces ellipſes du ſommet *S* de la projection, c'eſt-à-dire, la valeur de *SV*. J'ai marqué au milieu de l'ellipſe les lieux des centres de ces différentes ellipſes; chacun pourra les tracer toutes ſur autant de cartons différens, pour calculer les éclipſes de toutes les étoiles par la lune. *Fig.* 114.

Pour rendre l'uſage de cette méthode plus facile, j'ai donné dans les mémoires de l'académie pour 1763, une figure qui peut ſervir à tracer des ellipſes pour tous les degrés de déclinaiſon, dont l'échelle eſt double de celle de la *fig.* 114; & ſur la même planche, j'en ai tracé pluſieurs qui ſont diviſées exactement de minutes en minutes; on pourra auſſi, pour décrire de ſemblables ellipſes, ſe ſervir des tables que le P. Pilgram a calculées dans les éphémérides de Vienne pour 1769, de toutes leurs dimenſions.

1846. La ſituation du cercle de latitude ou de l'axe de l'écliptique ſur le cercle de projection, par rapport au cercle de déclinaiſon *CA*, (*fig.* 116), peut ſe trouver par le moyen du calcul de l'angle de poſition (1044); mais pour abréger, autant qu'il eſt poſſible, l'opération graphique dont nous parlerons bientôt (1848), on peut ſe ſervir de la méthode ſuivante. Je ſuppoſe que *FGH*, ſoit un arc du cercle de projection égal au double de l'obliquité de l'écliptique, c'eſt-à-dire, que du point *G* où ſe termine le méridien *CG* de la projection, on ait pris les arcs *GF* & *GH*, chacun de 23° 28′; ſur la tangente *GV* de l'arc *GF* & du centre *G*, l'on décrira un demi-cercle *VMX* qu'on diviſera en 12 ſignes, comme l'écliptique, en commençant au point *X* du côté de l'occident, où l'on marquera le Bélier, c'eſt-à- Tracer le cercle de latitude. *Planche XII. Fig.* 116.

Fig. 116. dire, 0ˢ de longitude ; on prendra ſur ce cercle un arc égal à la longitude du ſoleil ou de l'étoile, par exemple, XM ; on abaiſſera ſur le diamètre VX la perpendiculaire MN ; & le point N de la tangente GNV où paſſera cette perpendiculaire MN, ſera le point où l'on devra tirer le cercle de latitude CSN.

En effet, GN eſt le coſinus de l'arc XM ou de la longitude du ſoleil, pour le rayon GV ; donc GV : R : : GN : coſ. long. ⊙ ; c'eſt-à-dire, $GN = GV$ coſ. longit. mais par la conſtruction $GV =$ tang. $23^\circ \frac{1}{2}$ pour le rayon que nous ſuppoſons égal à l'unité, c'eſt-à-dire, CG, donc $GN =$ tang. $23^\circ \frac{1}{2}$ coſ. long., cela revient à la proportion ſuivante, par laquelle on trouve l'angle de poſition (908, 3680), le rayon eſt au coſinus de la longitude du ſoleil, comme la tangente de l'obliquité de l'écliptique eſt à la tangente de l'angle de poſition. Donc l'angle NCA eſt celui que forme le cercle de latitude CN avec le méridien CG.

1847. On pourroit auſſi faire une conſtruction ſemblable pour les étoiles fixes que la lune rencontre, en ſuppoſant le coſinus de la latitude égal au rayon (1044) ; l'erreur eſt inſenſible, puiſque la latitude de la lune ne va pas à 6 degrés ; enſorte qu'il n'y a pas $\frac{1}{110}$ d'erreur à craindre, ce qui ne fait pas 8 minutes de degré ſur l'arc AF : or 8′ ſont inſenſibles même ſur une figure d'un pied de rayon, telle que j'ai coutume de l'employer. Au reſte j'ai donné à l'art. 1046 ces angles calculés pour toutes les étoiles conſidérables, & j'ai marqué ſur la circonférence de la *fig.* 114. les points où il faut tirer le cercle de latitude pour différentes étoiles, telles que γ ♍, c'eſt-à-dire, l'étoile γ de la conſtellation de la Vierge, &c. On voit que toutes celles dont la longitude eſt dans le premier ou le dernier quart de l'écliptique, c'eſt-à-dire, dans les ſignes aſcendans, ſont à la droite du méridien CS, les autres ſont à la gauche ; parce que dans la *fig.* 116, les trois premiers & les trois derniers ſignes de longitude ſont dans le quart de cercle $3X$, qui eſt à l'occident ou

à la droite du point *G*; cela eſt aiſé à appercevoir ſur un globe; la direction de l'écliptique tend à l'orient dans tous les cas; ſi en même temps elle ſe rapproche du nord, la perpendiculaire doit décliner du côté oppoſé à la direction de l'écliptique, c'eſt-à-dire, à l'occident, quand on la conſidère du côté du nord.

Trouver les phaſes d'une Eclipſe de ſoleil ou d'étoile, avec la règle & le compas.

1848. On peut par une opération très-commode; & avec l'exactitude d'une minute de temps trouver le commencement & la fin d'une éclipſe, ſans calculer les parallaxes; j'ai parlé de l'auteur de cette invention, art. 1821.

On voit dans la *fig.* 114 un demi-cercle d'environ 6 pouces de rayon, qui repréſente la projection de la terre dans l'orbe de la lune (1798); le rayon *CR* eſt diviſé en autant de minutes qu'en contient la différence des parallaxes horizontales de la lune & du ſoleil, (1797); le diamètre *TR* eſt parallèle à l'équateur, *CS* eſt une portion du méridien univerſel ou du cercle de déclinaiſon qui paſſe par le ſoleil ou par l'étoile; *CK* eſt la diſtance du centre de projection au centre de l'ellipſe, trouvée ci-deſſus (1832); *KF* eſt le demi-axe de l'ellipſe (1841), égal au coſinus de la latitude du lieu pour lequel on calcule une éclipſe, par exemple, de Paris. La ligne *KV* ou *KQ* eſt la moitié du petit axe de l'ellipſe, qui eſt au grand axe comme le ſinus de la déclinaiſon de l'aſtre eſt au rayon (1828). Cette ellipſe de la *fig.* 114 repréſente le parallèle de Paris, ou la trace décrite ſur le plan de projection par le rayon mené de Paris à une étoile dont la déclinaiſon eſt de 26 degrés. *Fig.* 114

1849. La partie ſupérieure de l'ellipſe eſt l'arc diurne, ou celui dont on doit faire uſage quand la déclinaiſon du ſoleil eſt méridionale; la partie inférieure

Fig. 114. *FQH*, eſt celle qui ſert pour les déclinaiſons ſeptentrionales (1845).

1850. On tirera le cercle de latitude *CL* ou l'axe de l'écliptique, qui eſt à la gauche ou à l'orient du méridien dans le ſecond & troiſième quart de longitude, ou dans les ſignes deſcendans; il eſt à la droite ou à l'occident dans les autres ſignes qui ſont 9, 10, 11, 0, 1, 2, de longitude (1847).

1851. La latitude de la lune au moment de la conjonction étant priſe ſur les diviſions de la ligne *CR*, qui ſert d'échelle, & portée de *C* en *L* ſur le cercle de latitude, le point *L* eſt celui où doit paſſer l'orbite de la lune, en lui donnant l'inclinaiſon convenable. On marquera au point *L* l'heure de la conjonction.

1852. Pour tracer l'orbite de la lune, on tirera au point *L* de la conjonction une ligne *LM* perpendiculaire au cercle de latitude; on prendra la quantité du mouvement horaire de la lune en longitude, moins celui du ſoleil, ſur les diviſions de *CR*, & l'on portera ce mouvement de *L* en *M*; on prendra auſſi le mouvement horaire en latitude, on le portera de *M* en *N* parallèlement au cercle de latitude; au midi du point *M*, ſi la lune ſe rapproche du nord; au nord, ſi la lune s'approche du midi, c'eſt-à-dire, ſi la latitude eſt auſtrale croiſſante ou boréale décroiſſante. Par les points *N* & *L*, on tirera l'orbite de la lune *INL*; on marquera au point *L* l'heure & la minute de la conjonction; on marquera en *N* une heure de moins; l'on diviſera *NL* en 60 minutes de temps, & l'on portera les mêmes diviſions à gauche du point *L*, pour avoir la ſituation de la lune de minutes en minutes une heure avant la conjonction, & une heure après. On prolongera même ces diviſions plus loin, ſi cela paroît néceſſaire.

1853. On marquera ſur l'ellipſe les heures du ſoleil ou de l'étoile qui répondent aux diviſions qu'on a trouvées (1844); ſavoir, les 6 heures du matin à la droite, ou à la partie occidentale de la figure, & les

6 heures du ſoir à la partie orientale. Ces 12 heures ſe mettroient dans la partie ſupérieure de l'ellipſe ſi le ſoleil ou l'étoile étoit dans les ſix derniers ſignes, ou dans les ſignes méridionaux (1845). Quand il s'agit d'une éclipſe d'étoile, c'eſt l'heure du paſſage au méridien que l'on écrit ſur le méridien, en *V* ou en *Q*. Ces règles ſeroient les mêmes, ſi l'obſervateur étoit dans l'hémiſphère auſtral de la terre, avec cette ſeule différence que l'ellipſe ſeroit au-deſſous ou au midi du centre *C* de la projection.

1854. On prendra ſur les diviſions de *CR* la ſomme des demi-diamètres du ſoleil & de la lune, ou le demi-diamètre ſeul de la lune, s'il s'agit d'une éclipſe d'étoile. Le compas étant ouvert de cette quantité, on verra ſi le moment de la conjonction marqué en *L*, & la même minute de temps priſe ſur les diviſions de l'ellipſe, ſont éloignés entre eux de cette quantité des demi-diamètres, dans ce cas le temps de la conjonction ſera auſſi le temps du commencement ou de la fin de l'éclipſe; ce ſera le commencement ſi le point trouvé ſur le parallèle eſt à l'orient du point *L*; ce ſera la fin de l'éclipſe ſi le point de l'ellipſe marqué de la même heure que le point *L*, eſt à l'occident ou à la droite du point *L*.

1855. Si cette diſtance des points correſpondans ſur l'ellipſe & ſur l'orbite de la lune n'eſt pas égale à la ſomme des demi-diamètres, on placera le compas à la droite ou à la gauche du point *L* ſur l'orbite de la lune comme en *I*; on verra ſi le point *A* de l'ellipſe marqué du même nombre d'heures & de minutes que le point *I* de l'orbite, eſt à la gauche de celui-ci de la quantité des demi-diamètres; s'il eſt trop éloigné, on rapprochera peu à peu la branche droite du compas, ſans changer l'ouverture, juſqu'à ce que la branche gauche trouve un point *A* de l'ellipſe marqué du même nombre de minutes que le point de l'orbite où eſt la branche droite.

Commencement de l'éclipſe.

1856. Quand on aura ainſi trouvé deux temps cor-

reſpondans, l'un ſur l'orbite, l'autre ſur le parallèle, tels que *I* & *A*, marqués de la même heure & de la même minute, & éloignés de la quantité *IA*, de manière que le point *I* de l'orbite ſoit à la droite ou à l'occident du point *A* du parallèle, on ſera sûr que ce moment eſt celui du commencement de l'éclipſe; car on a vu que l'éclipſe commence pour Paris, quand la diſtance entre le point de la projection ou Paris voit le ſoleil, c'eſt-à-dire, auquel Paris répond, & celui où ſe trouve la lune au même inſtant, eſt égale à la ſomme des demi-diamètres du ſoleil & de la lune (1801).

La lune avance vers l'orient dans ſon orbite de *I* en *E*, & Paris avance ſur ſon parallèle de *A* en *B*; mais beaucoup plus lentement, puiſqu'il faut 12 heures pour décrire la demi-ellipſe du parallèle de Paris, tandis que la lune en 2 heures de temps ou environ fait dans ſon orbite un chemin auſſi conſidérable: ainſi la lune arrivera de l'autre côté ou à l'orient de Paris, & ſe trouvera en *E* lorſque Paris ne ſera arrivé qu'en *B*; ils ſeront encore une fois à la même diſtance l'un de l'autre, c'eſt-à-dire, à une diſtance *BE*, égale à la ſomme des demi-diamètres de la lune & du ſoleil, la lune abandonnant le ſoleil; & quand on aura trouvé deux points *B* & *E* marqués de la même minute, on ſera sûr d'avoir la fin de l'éclipſe.

La plus courte diſtance.

1857. Le milieu de l'éclipſe eſt à peu près le milieu de l'intervalle de temps écoulé entre le commencement & la fin: ainſi l'on cherchera la minute ou le point *D* qui tient le milieu entre ces momens marqués en *I* & en *E*, & la minute ou le point *G* qui tient auſſi le milieu entre *A* & *B*. La diſtance de ces deux points *D* & *G*, dont l'un eſt ſur l'orbite, l'autre ſur le parallèle de Paris, donnera la plus courte diſtance des centres de la lune & du ſoleil, ou leur diſtance, dans le temps du milieu de l'éclipſe. Cette diſtance étant portée avec le compas ſur les diviſions du rayon *CR*, ſe trouvera exprimée en minutes & en ſecondes de degré; car ſur une échelle d'un pied de rayon, chaque

que minute occupe plus de deux lignes, & l'on y diſtingue facilement un intervalle de 5 à 6″ : ainſi l'on aura en minutes & en ſecondes la plus courte diſtance du centre de la lune au centre du ſoleil ou de l'étoile, au temps du milieu de l'éclipſe. Si le point *D* de l'orbite eſt au-deſſous ou au midi du point *G* du parallèle, ce ſera une preuve que la lune paſſe au midi de l'étoile. *Fig.* 114.

On peut auſſi trouver la plus courte diſtance des centres ſans ſuppoſer que le milieu de l'éclipſe ſoit à égale diſtance du commencement & de la fin ; il n'y a qu'à meſurer pluſieurs fois la diſtance de la lune à l'étoile, ou la diſtance des points correſpondans marqués de la même minute ſur l'orbite & ſur l'ellipſe, on verra cette diſtance diminuer peu à peu juſqu'à un certain terme, ou cette diſtance étant parvenue à ſon *minimum*, ceſſe de diminuer pour augmenter un moment après ; l'on aura par ce moyen, ſoit la plus courte diſtance, ſoit le temps où elle arrive, qui eſt le milieu de l'éclipſe.

1858. Pour éviter de diviſer chaque fois le rayon *CR* de la projection, en autant de parties qu'en contient la parallaxe ; c'eſt-à-dire, tantôt en 54′, tantôt en 61′, ſans compter les fractions de minutes, on forme une échelle *EF*, (*fig.* 115), dont les lignes ſont plus longues que le rayon du cercle qu'on veut faire ſervir de projection, lorſque la parallaxe eſt plus petite ; & plus petites quand la parallaxe eſt plus grande : par exemple, ſi la parallaxe eſt de 54′, c'eſt-à-dire, plus petite d'un ſixième que le rayon de la projection qu'on ſuppoſe toujours de 60′, il faut avoir une échelle où le compas puiſſe indiquer 54′ au lieu de 60′ ; car la même ouverture de compas qui valoit 10′ quand la parallaxe étoit de 60′, ne doit valoir que 9′ quand cette parallaxe n'eſt que de 54′ ; il faut donc avoir une échelle plus grande d'un ſixième ; cette échelle, quoique diviſée en 60 parties, n'en fera trouver que 54 quand on y portera le rayon de projection, parce qu'elle eſt plus grande que ce rayon, & que ſes parties ont Echelle des parallaxes. *Fig.* 115.

Fig. 114. plus d'étendue. Auſſi la ligne *AB* qui répond à 54′ eſt plus longue que la ligne ſupérieure de l'échelle marquée 60, autant que 60 eſt plus grand que 54; ainſi une portion quelconque de l'orbite ou une ouverture quelconque de compas qui vaudroit 10′ ſur la ligne de 60′ ne vaudra que 9′ ſur la ligne de 54′, dont les ſubdiviſions ſont plus allongées.

Pour faire ſentir encore mieux la raiſon de ce procédé, ſuppoſons que la parallaxe étant de 54′, la latitude ſoit de 27 minutes; il faut prendre la moitié du rayon de la figure, ou du cercle de projection pour avoir la latitude, mais ce rayon eſt diviſé en 60′ ſur l'échelle, il en faudroit donc prendre 30 ſur cette ligne; mais il revient au même d'en prendre 27 ſur une ligne plus grande dans la même proportion, ou de $\frac{1}{9}$; les 27′ de de cette échelle plus longue, en feront 30 ſur le rayon de la figure; car 54 : 60 :: 27 : 30, ainſi l'on aura une latitude qui ſe trouvera la moitié du rayon, comme elle doit l'être; il en eſt de même du mouvement horaire & des diamètres, qu'on prendra ſur une échelle plus longue quand la parallaxe ſera plus petite.

1859. Le demi-diamètre de la lune étant toujours les $\frac{3}{11}$ de la parallaxe (1717), on pourra tirer une ligne droite *CD* ſur l'échelle, de maniere qu'elle intercepte les $\frac{3}{11}$ de toutes les échelles de parallaxe, en comptant de la ligne marquée 10, 10; on prendra facilement ſur cette échelle le demi-diamètre de la lune qui eſt, par exemple, de 16′ $\frac{1}{3}$ ſi la parallaxe eſt de 61′; de 14 $\frac{1}{3}$ ſi elle eſt de 54′, & ainſi des autres; on le prendra avec le compas ſans avoir beſoin d'en ſavoir la valeur; on néglige ici l'augmentation du diamètre de la lune qui a lieu à différens degrés de hauteur (1509).

Fig 114 Quand on a la plus courte diſtance *GD* des centres du ſoleil & de la lune, & qu'on en veut conclure la grandeur de l'éclipſe en doigts (1785), il faut porter cette diſtance ſur le diamètre du ſoleil, diviſé en 12 parties ou 12 doigts, & l'on y voit aiſément la partie éclipſée du ſoleil.

1860. Lorſqu'il s'agit d'une éclipſe d'étoile, on ſuit le même procédé que pour les éclipſes de ſoleil, en obſervant, 1°, que CL eſt la différence entre la latitude de la lune & celle de l'étoile ; 2°, que LN eſt le mouvement horaire de la lune ſeule, puiſque l'étoile n'a aucun mouvement propre ; 3°, que ſur les points V ou Q de l'ellipſe on marque l'heure du paſſage au méridien, ou plus exactement, la différence entre ſon aſcenſion droite & celle du ſoleil, convertie en temps, pour le temps de l'éclipſe ; 4°, que l'on prend la diſtance IA égale au ſeul diamètre de la lune. Eclipſe d'étoile par la lune.

1861. Exemple. Le 7 Avril 1749, Antarès fut en conjonction avec la lune à $2^h\ 22'$ du matin ; la parallaxe de la lune étoit alors de $57'\frac{1}{4}$, ſon mouvement horaire $33'\ 12''$ en longitude, & $1'\ 56''$ en latitude décroiſſante ; la latitude au moment de la conjonction étoit de $3°\ 45'\ 22''$, celle de l'étoile étoit de $4°\ 32'\ 12''$; ainſi la lune étoit au nord de l'étoile de $46'\ 50''$.

Je commence par tirer l'axe de l'écliptique ou le cercle de latitude CL au point qui convient à la longitude d'Antarès $8^s\ 6°\ 16'$ (1046, 1846), je prends ſur la ligne qui répond à $57'$ dans l'échelle des parallaxes, une quantité de $46'\ 50''$, & je la porte de C en L ſur le cercle de latitude ; au point L je tire la perpendiculaire LM.

Je prends ſur la même ligne de l'échelle des parallaxes le mouvement horaire de la lune $33'\frac{1}{7}$, & je le porte de L en M ſur la perpendiculaire au cercle de latitude, je porte auſſi $2'$ au-deſſous du point M, parce que la lune s'avançoit de $2'$ par heure vers le nord, & le point N marque le lieu de la lune une heure avant la conjonction, ou à $1^h\ 22'$ du matin : ayant donc marqué en L le moment de la conjonction $2^h\ 22'$, je marque en N $1^h\ 22'$, & diviſant l'intervalle LN en 60 parties ; je marque la ſituation de la lune de 10 en $10'$, comme on le voit dans la *figure* depuis $0^h\ 50'$ juſqu'à $2^h\ 30'$.

L'heure du paſſage d'Antarès au méridien de Paris eſt $3^h\ 11'$ (984), je la marque au ſommet V de l'ellipſe,

Fig. 114. & je marque 2^h 11′, 1^h 11′, &c. ſur les autres diviſions de l'ellipſe ; je ſubdiviſe les intervalles de 10 en 10′, du moins dans les heures où il paroît que l'éclipſe peut arriver, c'eſt-à-dire, qui approchent de l'heure de la conjonction.

Je prends ſur l'échelle le demi-diamètre de la lune, depuis la ligne 10, 10, juſqu'à la ligne *CD*, & cela ſur la ligne de 57′ ; cette ouverture de compas étant promenée ſur l'orbite de la lune & ſur l'ellipſe, je vois qu'une des pointes étant en *I* ſur 1^h 1′, l'autre pointe tombe en *A* ſur l'ellipſe, & y rencontre auſſi 1^h 1′ : ainſi la lune étant en *I* à 1^h 1′, & la projection de Paris, ou le lieu apparent de l'étoile en *A*, il doit ſe faire une éclipſe, la diſtance de la lune à l'étoile étant préciſément égale au demi-diamètre de la lune, ce qui ſuppoſe un contact de l'étoile au bord de la lune.

Immerſion.

Je promène la même ouverture de compas de l'autre côté en avançant vers l'orient, & je trouve qu'une des pointes étant en *E* ſur 2^h 11′, l'autre pointe tombe auſſi à 2^h 11′ ſur l'ellipſe en *B*, c'eſt le moment de l'émerſion ; la lune a donc parcouru la portion *IE* de ſon orbite, depuis le moment de l'immerſion juſqu'à celui de l'émerſion, & le lieu apparent de l'étoile a changé de la quantité *AB*. C'eſt vers le milieu de cet intervalle, la lune étant en *D* & l'étoile en *G*, qu'eſt arrivée la plus courte diſtance ; on s'en aſſurera en meſurant la diſtance de minute en minute ; car l'on verra qu'aux environs de 1^h 36′ elle ceſſe de diminuer, après quoi elle augmente ; cette plus courte diſtance *DG* étant portée ſur la ligne 57 de l'échelle des parallaxes, ſe trouvera de 6′, ce qui m'apprend que le centre de la lune a paſſé 6′ au midi de l'étoile, vers le temps de la conjonction apparente.

Emerſion.

La plus courte diſtance.

1862. Les opérations que je viens de décrire, ſuppoſent que la *figure* 114 eſt dreſſée pour Paris ; s'il étoit queſtion de toute autre latitude la diſtance *CK* du centre de la projection au centre de l'ellipſe, ſeroit différente. Car cette diſtance augmente quand la latitude ou la hauteur

Changement pour différentes latitudes.

du pole devient plus grande (1832); cependant une ſeule ellipſe étant donnée, & ſon ouverture conforme à la déclinaiſon du ſoleil ou de l'étoile dont il s'agit, on peut la faire ſervir pour toutes les latitudes géographiques, en plaçant le centre *C* de la projection à différentes diſtances du centre *K* de l'ellipſe. En effet, dès que l'ellipſe eſt tracée de l'ouverture convenable, c'eſt-à-dire, que ſon grand axe eſt au petit comme le rayon eſt au ſinus de la déclinaiſon de l'aſtre, elle peut ſervir pour exprimer toutes ſortes de parallèles, ou de cercles qui ſont vus ſous une même obliquité & qui forment tous des ellipſes ſemblables; il ne s'agit plus que de proportionner le reſte de la figure, c'eſt-à-dire, la diſtance du centre de projection & le rayon du globe ou de ſa projection, de façon que l'ellipſe y occupe la place du parallèle terreſtre qu'il s'agit de repréſenter: or, voici la manière de le faire. La diſtance *CK* eſt égale à cof. déclin. ſin. latit. (1832), en ſuppoſant que *CR* eſt le rayon: ſi l'on veut prendre pour rayon, ou pour échelle le demi-diamètre du parallèle, ou le coſinus de la latitude, il faudra encore faire cette proportion: le coſinus de la latitude eſt à l'unité, comme la valeur de *CK* eſt à ſa valeur en parties du parallèle, qui ſera par conſéquent $\frac{\text{ſin. lat.}}{\text{cof. lat.}}$ cof. déclin.; mais $\frac{\text{ſin.}}{\text{cof.}}$ = tang.; donc *CK* = tang. lat. cof. déclin. Ainſi *la diſtance du centre de la projection au centre du parallèle ou de l'ellipſe, eſt égale à la tangente de la latitude, multipliée par le coſinus de la déclinaiſon de l'aſtre*, en prenant pour unité le demi-diamètre du parallèle, ou le demi-axe *KF* de l'ellipſe. *Fig.* 114.

Diſtance des deux centres.

1863. Exemple. Dans le paſſage de Vénus de 1761, la déclinaiſon du ſoleil étoit de 22° 42′; je ſuppoſe qu'on ait décrit l'ellipſe qui convient à cette déclinaiſon, c'eſt-à-dire, une ellipſe dont le grand axe eſt au petit, comme l'unité eſt au ſinus de 22° 42′, & qu'on veuille faire ſervir cette ellipſe pour la latitude de 10°, on ajoutera le logarithme de la tangente de 10° avec celui du coſinus de 22° 42′, la ſomme étant cherchée

dans les nombres naturels, on trouve 0, 163 pour la distance qu'il y a entre le centre de l'ellipse & le centre du cercle qui doit servir de projection, en supposant que le demi-axe de l'ellipse est l'unité, ou 163, en supposant ce demi-axe divisé en 1000 parties. On trouvera de même la distance qui convient aux autres latitudes de 10 en 10°. pour la même déclinaison de 22° 42′.

Rayon de projection.

1864. On doit chercher aussi la longueur du rayon de projection pour la latitude donnée; mais il est évident que ce n'est autre chose que la sécante de la latitude du lieu, en prenant pour rayon le demi-diamètre du parallèle : car si DL, (*fig.* 112), étoit pris pour rayon d'un cercle décrit du centre L, la ligne menée de C en L seroit la sécante de l'angle CLD égal à l'arc LB, qui est la latitude du lieu; ainsi l'on cherchera dans les tables ordinaires les sécantes de chaque latitude, & divisant le rayon DL de l'ellipse en 1000 parties, on prendra sur ces divisions la grandeur du rayon de chaque projection, par exemple, 2000 pour 60° de latitude; & l'on aura la longueur du rayon avec lequel il faut décrire le cercle de projection, en partant du centre qu'on a trouvé (1863) : c'est ce rayon de projection qu'il faut diviser en autant de parties qu'en contient la différence des parallaxes; ainsi l'échelle des parallaxes (*fig.* 115), doit être augmentée dans la proportion des sécantes des latitudes, par ce moyen la même ellipse servira pour différens pays, en employant différentes échelles, (2075).

Fig. 112.

Fig. 115.

1865. La table suivante contient la valeur de la distance des centres CK (*fig.* 114) pour différentes latitudes & différentes déclinaisons; c'est par le moyen de cette table que j'ai marqué dans la *fig.* 114, aux environs du centre K, les points où doit être le centre de l'ellipse pour Paris, à différentes déclinaisons; on voit que le centre de l'ellipse qui sert pour 28° de déclinaison, est plus près du centre C de la projection d'environ six lignes, que le centre de l'ellipse qui répond à zéro, ou plutôt de la ligne droite qui en tient

Fig. 114.

lieu quand la déclinaiſon eſt nulle. Cette même table ſervira pour marquer dans la Planche XV, à l'occaſion du paſſage de Vénus, le rayon de la projection pour différentes latitudes (2077).

Distance du centre de la Projection au centre de l'Ellipſe, pour differentes latitudes & differentes declinaiſons, en ſuppoſant le demi-axe de 1000; avec le rayon de Projection, pour chaque latitude.

Degrés de Latit.	Degrés de déclinaison.												Rayon de projec.
	0	3	6	9	12	15	18	21	22 42	24	27	30	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000
5	87	87	87	86	86	84	83	82	81	80	78	76	1004
10	176	176	175	174	172	170	168	165	163	161	157	15:	1015
15	268	268	260	265	262	259	255	250	247	245	239	232	1035
20	364	363	362	359	356	352	346	340	336	332	324	315	1064
25	466	466	460	461	456	450	443	435	430	426	415	404	1103
30	577	577	574	570	565	558	549	539	533	527	514	500	1155
35	700	699	696	692	685	676	666	654	646	640	624	606	1221
40	839	838	834	828	821	810	798	783	774	767	748	727	1305
45	1000	999	994	988	978	966	951	934	923	913	891	866	1414
48 $\frac{1}{2}$	1143	1142	1137	1130	1119	1105	1088	1068	1055	1045	1019	990	1519
50	1192	1190	1185	1177	1166	1151	1133	1113	1099	1089	1062	1032	1556
55	1428	1426	1420	1411	1397	1379	1358	1333	1318	1305	127:	1237	1743
60	1732	1730	1723	1711	1694	1673	1647	1617	1598	1582	1543	1500	2000
65	2144	2142	2133	2118	2098	2071	2040	2002	1978	1959	1911	1857	2366
70	2747	2744	2732	2714	2687	2654	2613	2565	2535	2510	2448	2379	2924

1866. Par le moyen de cette table on peut faire ſervir une ſeule ellipſe pour tous les pays du monde, au lieu que ſuivant le procédé de l'article 1839, on décriroit ſur le même cercle de projection une ellipſe pour chaque latitude. Les poſitions & les grandeurs de ces ellipſes ſeroient différentes, comme on le voit dans la Planche XIII; mais leur ellipticité, leur figure, le rapport de leurs axes ſeroit le même, parce qu'il ne dépend que de la déclinaiſon du ſoleil, (1827);

& comme les ellipſes ſont difficiles à décrire, il eſt ſouvent plus commode en calculant pour pluſieurs lieux, de conſerver l'ellipſe, & de changer le centre du cercle de projection auſſi bien que la grandeur du rayon : on en verra une application importante à l'occaſion du paſſage de Vénus, où cette méthode s'emploie avec ſuccès (2076). On trouvera auſſi des tables détaillées, & propres à tracer ces ſortes de figures pour tous les pays, calculées par le P. Pilgram, d'après ma méthode, dans le livre intitulé : *Ephemerides aſtronomicæ, anni* 1769, *ad meridianum Vindobonenſem, Viennæ* 1769.

1867. L'augmentation du diamètre de la lune à diverſes hauteurs (1509), doit entrer dans cette opération d'une façon particulière : c'eſt au diamètre du ſoleil qu'il convient de l'appliquer, ſi l'on vouloit porter la préciſion juſques-là. Suppoſons Paris au point F (*fig.* 104), enſorte qu'il voie le centre du ſoleil au point H de la projection, la lune étant en L; ſi la diſtance HL ou l'angle HFL compris entre les centres du ſoleil & de la lune égale la ſomme des demi-diamètres, ce ſera la fin de l'éclipſe; mais ce ſont les demi-diamètres vus du point F, & non pas vus du point N, ou vus du centre de la terre qu'il faut prendre; la différence eſt nulle pour le ſoleil, mais elle eſt ſenſible pour la lune, & va juſqu'à 18″ ou une demi-minute de temps. Mais ſi le demi-diamètre de la lune paroît plus grand, l'arc total de la projection HL paroît plus grand auſſi, dans la même proportion, & ſi le diamètre du ſoleil étoit augmenté de même, il ne ſeroit plus néceſſaire d'avoir égard à l'augmentation de HL, tout reſteroit proportionnel, la projection, les diamètres & le mouvement horaire. Alors les phaſes de l'éclipſe ſeroient les mêmes vues du point F, ou vues du point N; il vaut donc mieux appliquer l'augmentation au diamètre du ſoleil, qu'au diamètre de la lune, afin de n'avoir rien à changer dans les autres parties de la figure & du calcul.

Fig. 104.

En

Fig. 105.





Fig. 107.

Fig. 108.



Fig. 109.



Fig. 111.



Fig. 110.







Fig. 113.

Digitized by Google

En effet, ſuppoſons pour rendre les choſes très-ſenſibles, & les calculs très-ſimples que le point *K* où eſt l'obſervateur, ſoit à la moitié de *TL* ou de la diſtance de la lune, que le rayon de projection *LA* au lieu d'être d'un degré paroiſſe de deux degrés; que le mouvement horaire vu du point *K* ait également doublé & ſoit d'un degré, & le diamètre de la lune d'un degré; ſi le diamètre du ſoleil étoit auſſi doublé & qu'il parût d'un degré, la diſtance des centres *CL* commencement de l'éclipſe ſeroit de 1°, & ce commencement paroîtroit arriver une heure avant que la lune fût au point *L*, ou ſe fait la conjonction; & il en ſeroit tout de même pour le centre *T* de la terre, où les quantités précédentes paroîtroient moindres de moitié; mais ſi le demi-diamètre du ſoleil ne participe pas à cette augmentation vue du point *K*, il faudra pour réduire tout à ce qu'on auroit vu du centre de la terre augmenter le demi-diamètre du ſoleil. Si c'eſt une étoile dont on calcule l'éclipſe, il n'y aura point de correction à faire pour la hauteur de la lune au-deſſus de l'horizon. *Fig.* 104.

Méthodes pour calculer rigoureuſement les éclipſes ſujettes aux parallaxes.

1868. Nous avons expliqué aſſez au long la manière de trouver par une opération graphique le commencement & la fin d'une éclipſe de ſoleil ou d'étoile. Nous allons paſſer à l'explication des méthodes rigoureuſes où l'on employe le calcul, pour trouver juſqu'à la préciſion des ſecondes les réſultats qu'on ne pouvoit trouver qu'à une minute près par le moyen de l'opération graphique; & nous expliquerons quatre méthodes différentes.

Lorſqu'on ne veut calculer une éclipſe de ſoleil que pour la prédire dans les éphémérides, la méthode graphique (1848) eſt ſuffiſante; on auroit tort, ce me

ſemble, de mettre beaucoup de temps à les calculer en ſecondes, avec une préciſion à laquelle les tables ne répondent pas, puiſque l'erreur des tables de la lune, qui va quelquefois à une minute, entraîne deux minutes d'incertitude ſur le temps du commencement & de la fin d'une éclipſe.

Mais lorſqu'on a quelque raiſon particulière de ſe préparer à une obſervation, lorſqu'on a obſervé une éclipſe de ſoleil ou d'étoile, & qu'on veut l'employer à trouver le lieu de la lune, le temps de la conjonction & l'erreur des tables; c'eſt alors qu'on doit faire avec la dernière préciſion le calcul de l'éclipſe, & qu'on peut en chercher le commencement & la fin par les méthodes exactes que nous allons expliquer.

Quatre méthodes différentes.

Il y a quatre méthodes employées pour cet effet par les aſtronomes; celle des projections, employée par M. de la Hire, & par M. Caſſini; celle du nonagéſime & des parallaxes de longitude, employée par M. de la Caille, dans ſes Leçons d'aſtronomie; celle des angles parallactiques & des parallaxes de hauteur, que je préfère, comme étant la plus courte & la plus exacte, au moyen de la forme que je lui ai donnée, (1881); enfin la méthode analytique donnée dans les mémoires de l'académie par M. du Séjour.

Néceſſités des Figures.

1869. Je commencerai par avertir le Lecteur, qu'en entreprenant le calcul exact d'une éclipſe, il eſt utile & même néceſſaire de former une figure, où l'on marque à peu-près avec la règle & le compas les angles que l'on aura trouvés par le calcul, & les lignes que l'on aura déterminées, ſuivant leur poſition & leur grandeur. Sans ce ſecours, il eſt aiſé de ſe tromper, en ajoutant quelquefois ce qui doit être ſouſtrait; d'ailleurs cette précaution dont je ſuppoſerai qu'on faſſe uſage, épargnera beaucoup de détails ſur les règles & ſur les exceptions qui ont lieu dans différens cas pour la poſition de la lune, par rapport au vertical, au cercle de déclinaiſon, au cercle de latitude, & à la perpendiculaire ſur l'orbite.

Méthode des projections.

1870. Parmi les différentes manières de calculer la projection, je choiſirai celle de M. Caſſini, comme étant la plus ſimple, & je prendrai pour exemple l'éclipſe de ſoleil du 28 Février 1710, employée dans les tables aſtronomiques de M. Caſſini, *pag.* 53; mais dont cet auteur n'a donné que l'opération graphique, & j'y appliquerai le calcul trigonométrique. Je ſuppoſe le temps de la conjonction au 28 Février 1710, 0^h 18′ après midi, la déclinaiſon du ſoleil 7° 59′ 42″, la latitude de la lune en conjonction 46′ 31″, l'inclinaiſon de l'orbite relative 5° 42′ 26″ (1765), le mouvement horaire relatif 27′ 10″, le milieu de l'éclipſe générale en T (*fig.* 116) à 12^h 7′ 47″, la diſtance perpendiculaire CT (1808) de 46′ 17″, l'angle de poſition 22° 9′ 27″, qui ajouté avec l'inclinaiſon donne l'angle ACT de 27° 51′ 53″; la différence des parallaxes horizontales, ou le rayon de la projection 54′ 28″; le demi-grand axe DK ou le coſinus de la latitude de Paris, 35′ 51″, le demi-petit axe 4′ 59″ 5, & la diſtance CD du centre de la projection à celui de l'ellipſe = 40′ 36″ 5. Soit O le lieu de Paris ſur ſon parallèle KOA à 11^h 43′ 30″, L le lieu de la lune ſur ſon orbite LT, on demande la diſtance apparente des centres de la lune & du ſoleil, ou la valeur de la ligne OL, pour ce moment-là, c'eſt-à-dire, 34′ 30″ avant la conjonction, ou 24′ 17″ avant le milieu de l'éclipſe générale; c'eſt le temps du commencement de l'éclipſe trouvé par l'opération graphique, (*M. Caſſini, tab. aſtron. pag.* 55).

Méthode pour calculer la projection.

Fig. 116.

1871. Puiſque le mouvement de la lune eſt de 27′ 10″ en une heure, il ſera de 10′ 59″ 7 en 24′ 17″ de temps, & l'on aura la portion de l'orbite lunaire TL = 10′ 59″ 7; on dira CT eſt à TL, comme le rayon eſt à la tangente de l'angle TCL qu'on trouvera de 13° 21′ 45″, enſuite $\sin.TCL :: TL : R : CL$, qui ſera de 2854″ 5 ou 47′ 34″ 5.

Fig. 116. Pour trouver l'angle OCA, l'on conſidérera que la diſtance depuis l'heure donnée $11^h\ 43'\ 30''$ juſqu'à midi eſt de $16'\ \frac{1}{2}$, ce qui répond à $4°\ 7'\ 30''$; le demi-grand axe de l'ellipſe multiplié par le ſinus de $4°\ 7'\ \frac{1}{2}$, donnera $OB = 154''\ 7$, & le demi-petit axe multiplié par le coſinus de $4°\ 7'\ \frac{1}{2}$, donnera $DB = 298''\ 7$, (1843); DB étant ajouté avec $CD =$ ſin. latit. coſ. déclin. $(1832) = 2436'', 5$, donnera $CB = 2735'', 2$.

Dans le triangle BCO rectangle en B, dont on connoît les deux côtés CB & BO, l'on trouvera l'angle $OCB = 3°\ 14'\ 16''\ 6$, & l'hypothénuſe $CO = 45'\ 39''\ 6$. On prendra la différence de l'angle OCB & de l'angle ACT, qui eſt lui-même la ſomme, quelquefois la différence de l'angle de poſition $22°\ 9'\ 27''$, & de l'angle d'inclinaiſon $5°\ 42'\ 26''$, (1934); cette différence donnera l'angle $OCT = 24°\ 37'\ 36''\ 4$, la ſomme de l'angle OCT & de l'angle LCT, trouvé ci-deſſus de $13°\ 21'\ 45''$ (1871), ſera l'angle $OCL = 37°\ 59'\ 21''\ 4$. On connoîtra aiſément les cas où il faut prendre la ſomme ou la différence, en examinant la ſituation reſpective des points L, O & T.

1872. Dans le triangle OCL, on connoît les deux côtés OC, CL & l'angle compris OCL; il ne reſtera plus qu'à chercher le côté OL, qui eſt la diſtance apparente des centres, en diſant la ſomme des côtés OC, CL qui eſt $93'\ 14''\ 1$ eſt à leur différence $1'\ 54''\ 9$, comme la tangente de la demi-ſomme des angles inconnus, $71°\ 0'\ 19''\ 3$, eſt à la tangente de leur demi-différence $3°\ 24'\ 53''$; ainſi l'angle O ſera de $74°\ 25'\ 12''\ 3$, d'où l'on conclura enfin le côté OL de $30'\ 24''$: c'eſt la diſtance apparente des centres du ſoleil & de la lune à $11^h\ 43'\ 30''$.

Diſtance apparente des centres.

1873. Le moment pour lequel on a calculé ſeroit le moment même du vrai commencement de l'éclipſe, ſi l'on eût trouvé la diſtance apparente égale à la ſomme des demi-diamètres du ſoleil & de la lune; mais le demi-diamètre du ſoleil étoit de $16'\ 12''$, celui de la lune à l'horizon $14'\ 46''$; & comme la lune avoit $33°$

de hauteur, il y a 9″ pour l'augmentation du demi-diamètre, ainſi la ſomme étoit 31′ 7″, & la diſtance apparente des centres eſt plus petite de 43″ que la ſomme des demi-diamètres du ſoleil & de la ☾; cela prouve que l'éclipſe étoit déja commencée; on fera un ſemblable calcul de la diſtance apparente pour 11ʰ 40′, & l'on trouvera 63″ de plus pour la diſtance des centres: ainſi en 3′ ½ de temps la diſtance apparente changeoit de 63″, donc elle change de 43″ en 2′ 23″; on ôtera cette quantités de l'heure du premier calcul 11ʰ 43′ 30″, & l'on aura 11ʰ 41′ 7″ pour le commencement de l'éclipſe. On pourroit tracer, par le moyen de deux calculs ſemblables, l'orbite apparente de la lune, pour trouver les autres phaſes de l'éclipſe; c'eſt ce que j'expliquerai dans la méthode ſuivante (1879).

Si l'on veut avoir égard à l'inflexion des rayons (1992), il faudra oter 4″ ½ de la ſomme des demi-diamètres apparens, ou de 31′ 7″, avant que de la comparer avec la diſtance apparente calculée, parce que l'inflexion fait paroître le commencement de l'éclipſe plus tard, & la fin plutôt qu'on ne les obſerveroit ſi ces phaſes ne dépendoient que de la ſomme des demi-diamètres apparens. Inflexion.

1874. Cette méthode des projections ſuppoſe implicitement que la hauteur de la lune ſoit égale à celle du ſoleil, ou que la parallaxe de la lune ſoit proportionnelle au coſinus de la hauteur du ſoleil; en effet, ſi le point *Y* eſt le vrai lieu de la lune ſur ſon orbite, *O* la projection de Paris ou le lieu du ſoleil vu de Paris, *C* le vrai lieu du ſoleil vu du centre de la terre, *CY* eſt la vraie diſtance des centres du ſoleil & de la lune, *YO* la diſtance apparente (1800), & *CO* la parallaxe de hauteur (1834), cependant le point *O* ne dépend que du lieu du ſoleil, & nullement de la ſituation de la lune en *Y* ou en *L*, ainſi cette parallaxe ne dépend que de la hauteur du ſoleil.

Si un point *K* de la terre (*fig.* 104) qui voit le ſoleil *S* à ſon zénit voyoit le bord de la lune au point *Fig.* 104.

L, c'eſt-à-dire, également au zénit, la parallaxe ſeroit nulle en ſuivant les règles de la projection, mais dans le vrai, le centre de la lune en ſuppoſant ſon demi-diamètre de 15′ ſeroit à 15′ du zénit, & la parallaxe de ſon centre ſeroit véritablement de $14''\frac{1}{2}$, quoiqu'elle paroiſſe nulle dans la figure, & que le lieu de la terre pour lequel on calcule ſoit au centre même de la projection.

On y remédieroit dans ce cas-là, en augmentant la diſtance apparente des centres donnée par la projection, à raiſon de la hauteur de la lune ſur l'horizon, par le moyen de la table qui ſert pour les diamètres de la lune; en effet, l'augmentation du demi-diamètre de la lune, quand il paroît au zénit eſt de 15″; c'eſt la différence entre la parallaxe du bord & la parallaxe du centre (1510), où la quantité dont la diſtance du centre de la lune au centre du ſoleil vue de la ſurface *K* eſt plus grande que celle qu'on voit du centre *T* de la terre; cette augmentation eſt proportionnelle à la diſtance apparente, elle eſt de 29″ pour 30′; ainſi elle ſerviroit à corriger la diſtance trouvée par la méthode des projections dans le cas où les deux centres ſeroient dans le même vertical.

1875. M. de la Caille, dans les Mémoires de la l'académie pour 1744, *pag.* 202 & ſuiv. fait voir de quelle manière on pourroit calculer rigoureuſement une éclipſe par le moyen des projections; c'eſt-à-dire, corriger la méthode précédente; mais celle de M. de la Caille m'a paru plus longue, ſans être auſſi exacte que celle qui ſera détaillée ci-après (1881). D'ailleurs M. du Séjour a traité la projection de la manière la plus exacte dans la méthode analytique, dont on verra bientôt la formule (1923).

Calcul d'une Eclipſe par le Nonagéſime.

1876. Le nonagésime (1660), fournit une ſeconde méthode pour le calcul d'une éclipſe; mais dans cette méthode, il faut, pour avoir la diſtance apparente des

centres, chercher la différence apparente de longitude & de latitude, entre la lune & le ſoleil. Je ſuppoſe donc que pour un inſtant donné, l'on veuille trouver la diſtance apparente des centres; il faut avoir pour cet inſtant la parallaxe de longitude & celle de latitude 1665 & ſuiv.

Si la lune eſt à l'orient du nonagéſime (1676), il faut ajouter la parallaxe de longitude avec la longitude vraie, pour avoir la longitude apparente de la lune. Mais ſi la longitude de la lune eſt occidentale, c'eſt-à-dire, plus petite que celle du nonagéſime, pourvu que la différence ne ſoit pas de 180°, il faut retrancher la parallaxe.

La ſomme ou la différence de 90°, & de la latitude vraie de la lune, ſuivant qu'elle eſt auſtrale ou boréale eſt la diſtance au pole boréal de l'écliptique; on ajoute la parallaxe en latitude à la diſtance vraie de la lune au pole de l'écliptique pour avoir ſa diſtance apparente au pole; ayant fait le même calcul pour deux inſtans, on verra ſi la lune ſe rapproche ou s'éloigne de l'écliptique..

1877. On prendra la différence entre la longitude du ſoleil & la longitude apparente de la lune pour avoir la différence apparente en longitude. Soit DE (*fig.* 121) une portion de l'écliptique, S le lieu du ſoleil au moment pour lequel on calcule, L le lieu apparent de la lune, EL ſa latitude apparente, SE ſa différence apparente de longitude avec le ſoleil : dans le triangle SEL, rectangle en E, l'on connoîtra deux côtés SE & EL; on cherchera l'hypothénuſe SL, qui eſt la diſtance apparente des centres du ſoleil & de la lune. Pour cela, on ajoutera les carrés des deux côtés, & l'on cherchera la racine de la ſomme; ou bien on fera les deux proportions ſuivantes $SE : EL :: R :$ tang. ESL, & ſin. $ESL : R :: EL : SL$, diſtance apparente des centres. Trouver la diſtance apparente. Fig. 121.

Exemple. Le 1 Avril 1764 à 9^h 10′ du matin à Paris, où la latitude eſt de 48° 50′, on demande la

distance apparente de la lune au soleil. Supposons la différence de longitude vraie entre la lune & le soleil, suivant les tables, de 37′ 11″ & la latitude de la lune 36′ 21″ boréale, sa déclinaison 4° 48′, le lieu du soleil 0ˢ 11° 29′ 25″, l'ascension droite du milieu du ciel 21° 54′ 32″; la longitude du nonagésime 11ˢ 28° 31′ 55″; la hauteur du nonagésime 34° 12′ 30″, la différence des parallaxes horizontales à Paris 54′ 0″; on trouve pour
Fig. 94. la parallaxe réduite au point *K* (*fig.* 94) 54′ 20″ 8, la parallaxe de longitude (1665) 6′ 55″ 8; la correction de l'applatissement, en supposant l'angle de la verticale & du rayon de la terre 19′, est $\frac{54'\,0''.\,\text{sin. } 19'\,\text{sin. } 23°\,\text{cos. } 11°\,29'}{\text{cos. } 48°\,50'.\,\text{cos. } 0°\,36'} = 10''$ 6 (1700), la parallaxe exacte 7′ 6″ 4 & la distance à la conjonction apparente 30′ 4″ 6.

La 1re partie de la parall. en latitude (1668) = 44′ 57″: la seconde partie (1670) + 4″, la correction de l'applatissement (1698) $\frac{54'\,0''.\,\text{sin. } 19'}{\text{cos. } 48°\,50'}\left(\frac{\text{cos. } 23°}{\text{cos. } 0°\,36'} - \text{sin. } 4°\,48'\right.$ $\left.\text{tang. } 0°\,36'\right) = 25''$, ensorte que la parallaxe entiere de latitude est 44′ 36″; la latitude vraie étant 36′ 21″ la latitude apparente est 8′ 15″. Connoissant les deux
Fig. 121. côtés *EL*, *SE* (*fig.* 121), dont l'un est de 8′ 15″, & l'autre de 30′ 5″; on trouvera l'hypothénuse ou la distance apparente *SL* des centres du soleil & de la lune 31′ 12″, la même que par la nouvelle méthode (1918).

Si l'on veut comparer cette distance avec la somme des demi-diamètres du soleil & de la lune, il faudra y ajouter $4''\frac{1}{2}$ à cause de l'inflexion des rayons (1992), qui fait paroître trop grandes toutes les distances de la lune au soleil ou aux étoiles, & l'on aura 31′ 16″$\frac{1}{2}$ distance apparente qui, pour le temps du commencement de l'éclipse, doit être égale à la somme des demi-diamètres.

Exception pour les étoiles,

1878. S'il s'agit d'une éclipse d'étoile par la lune, ou d'une autre éclipse dans laquelle la lune ait une latitude sensible, il faudra avoir soin de multiplier la différence de longitude *HI* par le cosinus de la latitude apparente

apparente *IL*, pour avoir cette différence *SE* en arc de grand cercle dans l'endroit où ſe trouve la lune, qui eſt la quantité dont nous avons fait uſage.

1879. On fera le même calcul une heure après, & l'on aura une autre diſtance apparente *SI* (*fig.* 121) de la lune au ſoleil, & l'angle *DSF*, par le moyen de la différence de longitude apparente *SD*, & de la latitude apparente *FD* (1877). On connoîtra auſſi par ce moyen le mouvement apparent en longitude relativement au ſoleil, *ED* ou *AF*, & le mouvement apparent en latitude *AL*. Connoiſſant *FA* & *LA* on calculera l'angle *AFL*, qui eſt l'inclinaiſon du mouvement apparent, & la ligne *LF*, qui eſt le mouvement de la lune relativement au ſoleil, ſur l'orbite apparente ou affectée par la parallaxe. Cet angle *AFL* peut être de plus de 20 degrés dans certains cas, comme quand la lune eſt dans ſon nœud deſcendant, & que le nonagéſime à 0ˢ de longitude; car alors le changement de la parallaxe porte la lune du même côté que l'inclinaiſon de ſon orbite, ce qui augmente l'inclinaiſon apparente. On aura donc l'angle *SLF*, égal à la ſomme des angles *ESL*, *AFL*; quelquefois c'eſt leur différence; on en conclura la perpendiculaire *SB*, qui eſt la plus courte diſtance apparente de la lune au ſoleil; & le temps où la lune a été en *B*, c'eſt le milieu de l'éclipſe; en ſuppoſant que l'orbite apparente eſt rectiligne pendant une heure de temps, ce qui eſt ſenſiblement vrai, cette perpendiculaire donnera la grandeur de l'éclipſe de ſoleil. *Fig.* 121.

Orbite apparente de la lune.

On ſuppoſera *SL* égal à la ſomme des demi-diamètres apparens du ſoleil & de la lune; connoiſſant *SL* & *SB*, on cherchera la ligne *BL*, on la convertira en temps, à raiſon du mouvement ſur l'orbite apparente trouvé ci-deſſus, & l'on ſaura combien la lune a employé de temps à aller de *B* en *L*. Or l'on connoît le temps du milieu de l'éclipſe en *B*, donc on connoîtra le moment de la fin en *F*, & celui du commencement en *L*. (*Kepler Epit. aſtr. p.* 888).

Il faut bien diſtinguer cette *orbite apparente* affectée par la parallaxe, & que nous venons de déterminer, de

l'orbite relative (1765), qui peut être repréſentée ici par une autre ligne *MN*; nous n'en parlerons point dans le cas actuel. On ſe rappelle que dans l'orbite relative il s'agit du mouvement vrai de la lune, vu du centre de la terre par rapport au ſoleil ſuppoſé fixe en *S*; on le détermine par le moyen des latitudes vraies *EM*, *DN*, qui peuvent aller d'un autre ſens & être d'une autre dénomination que les latitudes apparentes *EL*, *DF*.

1880. Quand on voudra connoître avec une grande préciſion la grandeur de l'éclipſe, il faudra calculer deux autres diſtances apparentes, comme nous avons calculé *SF* & *SL*, mais plus voiſines du milieu *B* de l'éclipſe, & ſe ſervir de ces nouvelles diſtances pour trouver la perpendiculaire *SB*. Mais ſi l'orbite apparente *FL* n'eſt pas parfaitement rectiligne, comme nous l'avons ſuppoſé pendant la durée d'une éclipſe, la différence ne va jamais qu'à peu de choſe : dans l'éclipſe de 1748, je n'ai trouvé que 3″ de courbure en 40′ de temps, par un calcul rigoureux. La plus courte diſtance *SB*, fait connoître la grandeur de l'éclipſe, à peu près comme dans les éclipſes de lune (1785); *car la ſomme des diamètres apparens de la lune & du ſoleil, moins la plus courte diſtance apparente des centres, donne la grandeur de l'éclipſe.* Cette maniere de déterminer les phaſes par le moyen de l'orbite apparente, eſt beaucoup plus facile que celle des interpolations indiquée par M. de la Caille dans ſes leçons d'aſtronomie, art. 1140.

Règle pour la grandeur de l'éclipſe.

Le diamètre apparent de la lune exige que l'on connoiſſe ſa hauteur, du moins à peu près, pour trouver l'augmentation (1509). On peut trouver cette hauteur groſſiérement avec un globe; mais ſi l'on veut mettre de la préciſion dans ce calcul, on eſt obligé, pour ce ſeul objet, quoique extrêmement petit, de faire tout le calcul de la hauteur (1034). Cela ſeul donne à la méthode du nonagéſime un déſavantage marqué; la méthode ſuivante, non-ſeulement par cette raiſon, mais en général, par ſa ſimplicité & ſon exactitude, me paroît être ſans contredit préférable.

Nouvelle méthode pour calculer les Eclipſes.

1881. Je paſſe enfin à ma méthode, que je crois être la plus courte, la plus générale, la plus exacte; j'y fais uſage des angles parallactiques, ainſi que les plus anciens aſtronomes, à compter depuis Ptolomée; mais d'une maniere beaucoup plus ſimple, & ſans négliger l'applatiſſement de la terre, ni aucune des conſidérations néceſſaires pour l'exactitude des réſultats. Ma méthode conſiſte à trouver la différence de hauteur & d'azimut entre les deux aſtres qui ſont en conjonction, pour en conclure leur diſtance apparente, qui eſt le terme auquel on ſe propoſe de parvenir, pour trouver le commencement & la fin d'une éclipſe (1873), ou pour tracer l'orbite apparente (1879).

Calcul par les angles parallactiques.

Calculs préliminaires.

La premiere opération qui eſt néceſſaire dans ce calcul, eſt de trouver la hauteur du ſoleil ou de l'étoile que la lune doit éclipſer. Je ſuppoſe qu'on ait calculé par les tables, pour un moment donné, la longitude du ſoleil ou de l'étoile & la latitude de celle-ci; la longitude & la latitude vraie de la lune, ſa parallaxe horizontale, la déclinaiſon du ſoleil ou de l'étoile, & leurs aſcenſions droites; enfin l'angle de poſition du ſoleil (908) ou de l'étoile (1044), & ſon angle horaire (1008): par le moyen de la déclinaiſon & de l'angle horaire, on calculera ſa hauteur (1034), & l'angle du vertical avec le cercle de déclinaiſon (1036).

Elémens pour le premier Avril 1764.

1882. Exemple. Le premier Avril 1764, la conjonction vraie eſt indiquée par les tables à $10^h\ 32'\ 7''$ du matin, la latitude de la lune étant de $40'\ 4''$ boréale à l'heure de la conjonction; la différence des mouvemens horaires en longitude $27'\ 10''$; le mouvement horaire de la lune en latitude $2'\ 43''\frac{1}{2}$ du midi au nord, ſa parallaxe $54'\ 9''$, celle du ſoleil $9''$. Si l'on demande à $9^h\ 10'$ du matin la diſtance apparente des

centres du ſoleil & de la lune, on aura la déclinaiſon du ſoleil pour cet inſtant 4° 47′ 36″, ſa hauteur 33° 7′ 30″; l'angle ZSO du vertical ZS avec le cercle de déclinaiſon SO (*fig.* 119), 32° 4′ 17″; l'angle de poſition OSP 23° 0′ 0″; la différence de longitude AB entre la lune & le ſoleil 37′ 11″, & la latitude de la lune SB 36′ 21″ boréale.

Fig. 119.

L'angle parallactique.

1883. L'ANGLE PARALLACTIQUE proprement dit, celui que nous déſignerons généralement par ce nom, lorſqu'il ne ſera pas qualifié plus ſpécialement, eſt formé par le vertical ZSD & le cercle de latitude PSE, qui eſt toujours perpendiculaire à l'écliptique. On ne peut calculer l'angle parallactique PSZ ſans le diviſer en deux parties qui ſe calculent ſéparément; ſavoir l'angle de poſition PSO (1044), & l'angle OSZ du cercle de déclinaiſon OS qui paſſe par l'étoile, avec le vertical ZS (1036).

1884. Nous prendrons toujours ces angles du côté du pole élevé, c'eſt-à-dire, du côté du nord pour nos climats ſeptentrionaux, ſoit que l'angle du vertical & du cercle de déclinaiſon ſoit aigu ou obtus (a), & nous conſidérerons la partie du cercle de latitude ou du cercle de déclinaiſon, qui eſt compriſe entre l'aſtre & le pole élevé, qui chez nous eſt le pole boréal de l'écliptique ou de l'équateur. Les angles étant ainſi conſidérés, on obſervera les règles ſuivantes, qui n'ont beſoin d'aucune autre démonſtration que l'inſpection d'un globe, ou d'une figure.

Dans quel cas on les ajoute.

Il faut ajouter enſemble ces deux angles, c'eſt-à-dire, l'angle de poſition & l'angle du vertical avec le cercle de déclinaiſon après le paſſage au méridien, ſi c'eſt dans les ſignes aſcendans 9, 10, 11, 0, 1, 2, ou avant le paſſage au méridien, ſi c'eſt dans les ſignes deſcendans; mais on prend leur différence en ôtant le plus

(a) Il eſt obtus (1036) lorſque ZS *fig.* 42. eſt plus près du pole que la perpendiculaire ZX; cela ne peut avoir lieu pour le ſoleil que dans la zone torride, & pour la lune à 5 ou 6 degrés plus loin de l'équateur.

petit du plus grand, quand l'aſtre n'a pas paſſé le méridien, & qu'il eſt dans les ſignes aſcendans, ou lorſqu'il a paſſé le méridien & ſe trouve dans les ſignes deſcendans.

1885. Pour pouvoir ſe former aiſément une figure exacte, dans les différens cas, ſuppoſons qu'on ait tiré une ligne verticale *Z S D* (*fig.* 119), & que le ſoleil ſoit en *S*; ſi c'eſt le matin, on ſait qu'en regardant l'orient on a le pole ſeptentrional à ſa gauche, ainſi l'on tirera vers la gauche une ligne *SO* pour repréſenter le cercle de déclinaiſon. On ſait auſſi que vers l'orient l'écliptique & le mouvement propre du ſoleil qui ſe fait d'occident en orient doivent aller de haut en bas; mais, ſi c'eſt dans les ſignes aſcendans, ce mouvement du haut en bas n'eſt pas tout-à-fait perpendiculaire au cercle de déclinaiſon *SO*, il va un peu en ſe rapprochant du pole *O*, où de l'origine du cercle *SO*, on tirera donc l'écliptique dans la direction *L E* qui ſe rapproche du pole *O*, & l'on verra par ce moyen que la ligne perpendiculaire à l'écliptique ou le cercle de latitude *S P* doit paſſer à droite du cercle de déclinaiſon *S O*; il en eſt ainſi à proportion des autres cas. On peut dire auſſi en général que le point *P* eſt à l'occident du point *O*, dans les ſignes aſcendans, 9, 10, 11, 0, 1, 2, & qu'il eſt à l'orient dans les 6 autres ſignes, ou que l'angle de poſition eſt occidental dans les ſignes deſcendans, oriental dans les autres. *Fig.* 119.

1886. Lorſque l'angle du cercle horaire eſt oriental (1036), auſſi bien que l'angle de poſition, il faut les ajouter enſemble pour former l'angle parallactique, & celui-ci ſera également oriental, c'eſt-à-dire, que le cercle de latitude ſera à l'orient du vertical. Si l'un des angles eſt oriental, & l'autre occidental, il faudra prendre leur différence, & l'angle parallactique aura la dénomination du plus grand.

Il faut donc examiner ſi par le réſultat de l'addition ou de la ſouſtraction, l'angle parallactique eſt oriental (1036), c'eſt-à-dire, ſi le cercle de latitude eſt à l'o- Le cercle de latitude eſt à l'orient ou à l'occident.

rient du vertical du côté du nord, ou s'il eſt à l'occident. En général le cercle de latitude eſt à l'orient du vertical avant le paſſage au méridien, & à l'occident après le paſſage au méridien; ſi ce n'eſt dans le cas où l'angle du vertical avec le cercle de déclinaiſon, non-ſeulement eſt plus petit que l'angle de poſition; mais qu'il en a été retranché (a). Car alors le cercle de latitude eſt à l'occident du vertical, ſi c'eſt avant le paſſage au méridien; & à l'orient du vertical, ſi c'eſt après le paſſage au méridien; nous ſerons obligés pluſieurs fois de rappeller cette diſtinction (1895 & ſuiv.).

Si nous étions dans la partie ſeptentrionale de la Zone torride, & que nous euſſions le ſoleil du côté du nord, c'eſt-à-dire, que ſa déclinaiſon fut plus grande que la latitude du lieu, l'angle du cercle horaire ſeroit occidental le matin, du côté du zénit, & il ſeroit obtus dans certains cas. L'angle de poſition ſeroit oriental dans les ſignes aſcendans, tout comme il l'eſt dans l'Europe.

Dans les pays ſitués au midi de l'équateur, l'angle du cercle horaire eſt oriental le matin, comme en Europe. L'angle de poſition eſt oriental dans les ſignes 3, 4, 5, 6, 7, 8, au contraire de ce qui a lieu en Europe.

Exemple. Le premier Avril 1764, à $9^h\ 10'$ du matin, on prendra la différence des deux angles $32°\ 4'\ 17''$ & $23°\ 0'\ 0''$; & l'on aura $9°\ 4'\ 17''$ pour l'angle parallactique ZSP. Cet angle eſt oriental, c'eſt-à-dire, que le cercle de latitude PS eſt à la gauche ou à l'orient du vertical, dans ce cas-là, puiſque c'eſt avant le paſſage au méridien, & que l'angle du cercle horaire étant oriental, l'angle de poſition quoique occidental ne s'eſt pas trouvé le plus grand.

(a) Cela arrive pendant quelque temps avant midi, dans les ſignes aſcendans; & après midi pendant quelque temps dans les ſignes deſcendans; car dans le premier cas, le cercle de latitude peut être à l'occident du vertical un certain nombre de minutes avant le paſſage au méridien, & dans le ſecond cas, il peut être à l'orient pluſieurs minutes après le méridien.

1887. L'ANGLE DE CONJONCTION eſt l'angle formé par le cercle de latitude, & par le cercle mené du ſoleil à la lune. Cet angle eſt nul dans la conjonction, & il augmente d'autant plus, que la lune s'éloigne de la conjonction, toutes choſes égales. Soit *S* (*fig.* 119) le ſoleil ou l'étoile dont on calcule une éclipſe, *A* la lune, *SB* la latitude de la lune avant ſa conjonction, *BA* la différence de longitude entre la lune & l'étoile, meſurée dans la région de l'étoile, c'eſt-à-dire, multipliée s'il eſt néceſſaire par le coſinus de la latitude (892); *SA* la ligne qui joint le vrai lieu du ſoleil à celui de la lune, l'angle *ASB* eſt celui que j'appelle ANGLE DE CONJONCTION; parce qu'il eſt formé au centre du ſoleil ou de l'étoile *S* par le cercle de latitude *SB*, & par la ligne *SA* menée du ſoleil *S* au lieu vrai *A* de la lune. Pour trouver cet angle de conjonction l'on dira : *La différence des latitudes eſt à la différence des longitudes des deux aſtres, comme le rayon eſt à la tangente de l'angle de conjonction*, ou *SB* : *BA* : : *R* : tang. *BSA*.

Angle de conjonction.

Fig. 119.

Règle pour le trouver.

La ligne *BA*, s'il s'agit d'une éclipſe d'étoile, eſt un peu plus petite que la différence de longitude priſe dans les tables, & meſurée le long de l'écliptique. Pour être réduite à l'écliptique, il faudroit qu'elle fût diviſée par le coſinus de la latitude apparente de la lune (892); j'ai donné une table de la quantité qu'il faut ôter de la différence de longitude pour avoir l'arc *AB*, (*Connoiſſance des mouv. céleſt.* 1764, *pag.* 118). Cette quantité ne peut aller qu'à 15 ſecondes dans les plus grandes latitudes de la lune, & en ſuppoſant même *AB* d'un degré.

Attention pour les étoiles.

1888. L'ANGLE D'AZIMUT, ou l'angle de diſtance eſt l'angle *ZSA* formé au centre du ſoleil ou de l'étoile, par le vertical de l'étoile, & par la ligne *SA*, qui va du centre de l'étoile au centre de la lune. Cet angle d'azimut *ASC* ne peut ſe former que par la ſomme ou la différence des angles *BSC* & *ASB*, c'eſt-à-dire, de l'angle parallactique & de l'angle de conjonction.

Angle d'azimut.

Fig. 119. Règle pour le former.

L'angle de conjonction eſt toujours occidental, ou à l'occident du cercle de latitude avant la conjonction, il eſt oriental après la conjonction; ainſi lorſque l'angle parallactique ſera oriental, c'eſt-à-dire, lorſque le cercle de latitude pris du côté du nord, ou la portion du cercle de latitude qui eſt au nord de l'étoile, ſera à l'orient du vertical, avant la conjonction, on prendra la *différence* de l'angle de conjonction & de l'angle parallactique, & après la conjonction l'on prendra la *ſomme*. Lorſque l'angle parallactique ſera occidental, c'eſt-à-dire, que le cercle de latitude ſera à l'occident du vertical, on prendra la *ſomme* avant la conjonction & la *différence* après la conjonction. Tout cela dans le cas où la lune ſera au nord du ſoleil ou de l'étoile qui eſt en conjonction; mais ſi la latitude de la lune eſt au midi du ſoleil ou de l'étoile, c'eſt-à-dire, ſi la lune a une latitude plus méridionale ou moins boréale que l'étoile, on changera les mots de *ſomme* & de *différence* dans les préceptes que nous venons d'établir, parce que ce ſera la partie inférieure de la figure 119, dont on fera uſage. On aura ſoin de remarquer ſi la ſomme eſt plus grande que 90 degrés (1903). Ces préceptes ſont généraux, ſoit dans les pays ſeptentrionaux, ſoit dans les pays méridionaux, & dans le cas même où l'angle parallactique eſt obtus; pourvu qu'on n'employe que ſon ſupplément à 180° dans les règles précédentes & qu'on entende par le mot *d'angle parallactique oriental*, un angle aigu du côté de l'orient vers le nord. C'eſt ainſi que l'on formera l'angle d'azimut ASC, compris entre le vertical ZCS, & l'arc de la diſtance vraie SA qui eſt entre le ſoleil & la lune.

Diſtance vraie de la lune au ſoleil.

1889. Il faut chercher auſſi l'arc AS, qui eſt la diſtance vraie de la lune au ſoleil ou à l'étoile, ſoit en ajoutant les carrés de AB & BS en ſecondes, pris dans les tables ordinaires des carrés, ſoit en faiſant cette proportion. Le ſinus de l'angle de conjonction ASB eſt à la différence de longitude AB, comme le rayon eſt à la diſtance AS. Cette diſtance AS multipliée

pliée par le ſinus de l'angle d'azimut *ASC* (1888), ou de ſon ſupplément, donnera la différence d'azimut vraie *AC*; & cette même diſtance *AS*, multipliée par le coſinus de l'angle d'azimut *ASC*, ou de ſon ſupplément s'il eſt obtus, donnera la différence de hauteur vraie *SC* entre le ſoleil & la lune : nous en ferons uſage art. 1903. *Fig.* 119.

Différence de hauteur & d'azimut.

EXEMPLE. La différence de latitude 36′ 21″ (1882), eſt à la différence de longitude 37′ 11″, comme le rayon eſt à la tangente de 45° 38′ 57″, angle de conjonction *ASB*. Diviſant 37′ 11″ par le ſinus de 45° 39′, on a la diſtance vraie *SA*, 52′ 0″; la différence entre l'angle de conjonction 45° 38′ 57″, & l'angle parallactique eſt de 9° 4′ 17″ (1886), ce qui donne l'angle d'azimut *ASC*, 36° 34′ 40″. La diſtance vraie 52′ 0″, multipliée par le ſinus de l'angle d'azimut 36° 34′ 40″, donne la différence vraie d'azimut *AC*, 30′ 59″ 2; & la diſtance vraie multipliée par le coſinus du même angle d'azimut, donne la différence de hauteur *SC*, 41′ 45″,5 (a).

1890. La différence vraie d'azimut peut être priſe pour la différence apparente, dans tous les calculs où l'on ne veut pas mettre une préciſion extraordinaire, & dans ce cas le calcul d'une éclipſe devient beaucoup plus ſimple, mais ſi l'on veut calculer tout à la rigueur, la différence vraie d'azimut *AC* exige deux petites corrections que je vais expliquer. Suppoſons les deux verticaux de l'étoile & de la lune très-proches l'un de l'autre, comme *ZCD* & *ZAM* (*fig.* 117). Soit un arc *AC* perpendiculaire au vertical *ZC*, j'ai appellé cet arc la différence vraie d'azimut; ſi l'on prend *AM* *Fig.* 117.

(a) Les petites Tables de Logarithmes imprimées *in*-12, 1760 (chez *Guérin* & *Delatour*, & qui ſe vendent chez *Deſaint*), ſont fort commodes pour ces calculs, quand on néglige les décimales, parce qu'elles diſpenſent de réduire ces arcs en ſecondes pour en trouver les logarithmes; ce ſont d'ailleurs les plus exactes que je connoiſſe : nous employâmes, M. de la Caille & moi, la plus grande attention à en revoir les épreuves, elles furent même encore lues ſéparément par d'autres Académiciens.

Fig. 117. égal à la parallaxe de la lune en hauteur (1629); en ſorte que M ſoit ſon lieu apparent dans le vertical ZAM, & qu'on tire MD perpendiculaire au vertical du ſoleil CD, la différence apparente d'azimut qui eſt MD, ſera plus grande que la différence vraie AC, parce que AM n'eſt pas exactement parallèle à CD. Pour ſavoir combien la différence apparente MD ſurpaſſe la différence vraie AC, on tirera AN parallèle à CD, & l'on aura NM pour l'excès de MD ſur AC; c'eſt cet excès dont il s'agit de trouver la valeur. Dans le triangle ANM l'on a $MN = AM$ cof. M, (3611); mais dans le triangle ſphérique ZMD, R : cof. M : : tang. MZ : tang. MD (3668), ou cof. $M = \frac{\text{tang. } MD}{\text{tang. } ZM}$; donc $MN = \frac{AM \text{ tang. } MD}{\text{tang. } ZM}$; mais puiſque AM eſt la parallaxe de hauteur, on a $AM = p$ ſin. ZM (1629); donc en ſubſtituant cette valeur & mettant cof. ZM à la place du ſinus diviſé par la tangente, on aura p coſin. ZM tang. MD.

Valeur de cette premiere équation.

1891. Ainſi *la parallaxe horizontale multipliée par le ſinus de la hauteur apparente, & par la tangente de la différence apparente d'azimut à peu-près connue*, donne la quantité de ſecondes qu'il faut ajouter à la différence vraie pour avoir la différence apparente d'azimut MD, entre la lune & l'étoile, priſe dans la région de la lune. Je ne prends pas ici les différences d'azimut dans l'horizon comme on le fait dans d'autres occaſions (1038), mais ſur un almicantarat, à la hauteur de la lune, ou ſur l'arc de grand cercle qui ſe confond ſenſiblement avec le parallèle à l'horizon.

On ajoute dans tous les cas cette quantité à la différence vraie d'azimut pour avoir la différence apparente; mais cette quantité ne va jamais qu'à 30″ dans les éclipſes, & j'en ai fait une table, (*Connoiſſance des mouv. céleſt.* 1764, *pag.* 120), dans laquelle on prendra facilement à la vue & ſans parties proportionnelles cette quantité, dont il faudra augmenter la différence vraie d'azimut. Dans des calculs qui ne ſeroient pas bien im-

portans, ou dans les premiers calculs préparatoires d'une éclipſe on peut négliger cette correction de l'azimut, comme celle qui dépend de l'applatiſſement de la terre (1892).

EXEMPLE. La différence des parallaxes horizontales étant de 54′ 0″, la hauteur de la lune 33°; la différence d'azimut AC 30′ 59″ 2 (1889), on a p ſin. h tang. $AC = 16''$, qui étant ajoutées à AC donnent la différence apparente $DM = 31'\ 15''$. *Fig.* 119.

C'eſt cette différence apparente 31′ 15″ qu'il auroit fallu employer dans l'opération précédente; mais l'erreur qui réſulte d'avoir pris la différence vraie au lieu de l'apparente, eſt comme inſenſible: ſi cependant on vouloit y avoir égard on recommenceroit le calcul en mettant la tangente de 31′ 15″, au lieu de celle de 30′ 59″, & l'on trouveroit 16″ 4 pour la correction cherchée, qu'il faut ajouter à 30′ 59″, 2 pour avoir 31′ 15″ 6, différence apparente d'azimut.

1892. LA PARALLAXE D'AZIMUT qui a lieu dans le ſphéroïde applati (1686), eſt la ſeconde correction qu'il faut faire à la différence vraie d'azimut pour avoir la différence apparente. Lorſqu'on a calculé par les tables la vraie différence d'azimut entre le ſoleil & la lune (1889, 1891), & qu'on a trouvé DM (*fig.* 119); cela nous apprend que la lune vue du centre de la terre paroîtroit au point M, ſi la terre étoit ſphérique; mais à cauſe de l'applatiſſement de la terre elle ne paroît pas dans le même vertical, étant vue de la ſurface. Si l'on prend un petit arc de grand cercle ML égal à la parallaxe d'azimut, le point L ſera celui où la lune devra paroître vue de la ſurface de la terre. Seconde équation, ou parallaxe d'azimut. *Fig.* 119.

Cette parallaxe d'azimut = p ſinus a. ſinus z, (1686) fait toujours paroître la lune du côté du pole élevé; en effet, l'obſervateur ſitué en O (*fig.* 94) voit la lune dans le même vertical & au même point d'azimut que s'il étoit ſitué au point N de la verticale: or le point N eſt toujours oppoſé au pole P qui eſt élevé ſur l'ho- *Fig.* 94.

Fig. 94. rizon, comme cela eſt évident par la ſituation de l'ellipſe terreſtre; donc l'obſervateur placé en *O* ou en *N* voit la lune plus près du pole *P*, que s'il étoit au centre *C* de la terre. Ainſi cette parallaxe dans les pays ſeptentrionaux eſt additive à la différence vraie d'azimut, ſi la lune eſt au nord du vertical du ſoleil ou de l'étoile; elle ſe retranche ſi la lune eſt au midi, c'eſt-à-dire, ſi la différence vraie d'azimut eſt vers le midi.

1893. Pour pouvoir faire diſtinguer d'une manière sûre & commode les cas où la lune eſt au nord du vertical, nous allons donner des règles générales auxquelles on pourra avoir recours dans le calcul des éclipſes; mais dont on pourra ſe paſſer ſi l'on a devant les yeux une figure du vertical & du méridien, ou du cercle de déclinaiſon qui paſſe par l'étoile, dans laquelle la lune ſoit placée comme elle doit l'être au temps pour lequel on calcule, telle qu'eſt la *figure* 119 pour l'exemple que nous avons choiſi. On peut encore ſe ſervir d'un globe pour guider le calcul. Au reſte, j'ai renfermé dans les règles ſuivantes toutes les variétés poſſibles, afin de lever pour jamais toute incertitude dans ma méthode.

Dans les hauteurs du pole qui ont lieu en Europe & qui ſont plus grandes que 28°, l'angle parallactique eſt toujours aigu; ainſi dans les premières règles nous le ſuppoſerons moindre que 90° du côté du nord; nous diſtinguerons ſi la lune a paſſé le méridien ou non, c'eſt-à-dire, ſi elle eſt dans l'hémiſphère oriental ou occidental, & ſi elle eſt au nord du ſoleil ou de l'étoile. En diſant que la lune eſt au nord, j'entends que ſon lieu vrai eſt plus près du pole boréal de l'écliptique, que celui de l'étoile; c'eſt-à-dire, ſa vraie latitude boréale plus grande ou ſa vraie latitude auſtrale plus petite que la latitude de l'étoile. Tout cela poſé, l'on aura la parallaxe d'azimut additive à la différence d'azimut dans tous les cas ſuivans.

1894. DANS LES PAYS SEPTENTRIONAUX. AVANT LE MÉRIDIEN, ſi la lune eſt au NORD & APRÈS ſa conjonction. Cas où cette équation eſt additive.

Dans les pays ſeptentrionaux.

Si la lune eſt au NORD, AVANT ſa conjonction, & que l'angle de conjonction ſoit plus PETIT que l'angle parallactique.

Si la lune eſt au MIDI, APRÈS la conjonction, & que l'angle de conjonction ſoit plus GRAND que l'angle parallactique.

1895. Dans le cas où l'angle de poſition ſe ſera trouvé le plus grand & où l'on en aura retranché l'angle du vertical avec le méridien (1886); il faudra dans les trois règles précédentes mettre MIDI au lieu de NORD.

1896. APRÈS LE MÉRIDIEN. Si la lune eſt au NORD & AVANT ſa conjonction.

Si la lune eſt au NORD, APRÈS ſa conjonction, & que l'angle de conjonction ſoit plus PETIT que l'angle parallactique.

Si la lune eſt au MIDI, AVANT la conjonction, & que l'angle de conjonction ſoit plus GRAND que l'angle parallactique.

1897. Dans le cas où l'angle du vertical avec le cercle de déclinaiſon aura été retranché de l'angle de poſition (1886), il faudra dans ces trois règles mettre *midi* au lieu de *nord*, & *nord* au lieu de *midi*; ou, ce qui revient au même, changer dans les trois premières règles (1894) ces mots, *avant*, *après*, *nord* & *midi*.

1898. Il peut arriver dans des pays ſitués près de la zone torride ſous des latitudes moindres que 28°, que l'angle parallactique ſoit obtus du côté du nord (1036), alors on conſidérera ſon ſupplément à 180° & dans les ſix règles des articles 1894 *& ſuiv.* on changera les mots AVANT & APRÈS; d'où réſultent les règles ſuivantes pour trouver les cas où la lune eſt au nord du vertical de l'étoile dans les pays ſeptentrionaux, & où la parallaxe d'azimut eſt additive à la différence d'azimut. Si l'angle parallactique eſt obtus.

1899. Avant le méridien. Si la lune eſt au NORD, AVANT la conjonction.

Si la lune eſt au NORD, APRÈS la conjonction; mais l'angle de conjonction plus PETIT que le ſupplément de l'angle parallactique.

Si la lune eſt au MIDI, AVANT la conjonction, & l'angle de conjonction plus GRAND que le ſupplément de l'angle parallactique.

1900. Après le mérieien. Si la lune eſt au NORD, APRÈS la conjonction.

Si la lune eſt au NORD, AVANT la conjonction, & que l'angle de conjonction ſoit plus PETIT que le ſupplément de l'angle parallactique.

Si la lune eſt au MIDI, APRÈS la conjonction, & que l'angle de conjonction ſoit plus grand que le ſupplément de l'angle parallactique.

Dans les pays ſitués au-delà de l'équateur.

1901. DANS LES PAYS MÉRIDIONAUX, c'eſt-à-dire, ſitués dans l'hémiſphère auſtral de la terre, ou au midi de l'équateur; la parallaxe d'azimut s'ajoute à la différence d'azimut lorſque la lune eſt au midi du vertical de l'étoile; d'où il réſulte que pour trouver les cas où elle ſera additive, il ſuffit de changer les mots de *nord* & *midi* dans toutes les règles précédentes, où il s'agit de la latitude de la lune.

Cas où l'équation eſt ſouſtractive.

Je me diſpenſe, pour abréger, de rapporter les cas où l'équation eſt ſouſtractive; mais l'on pourra en faire une table en écrivant toutes les règles ci-deſſus, & changeant tout à la fois les mots *avant* & *après*, *nord* & *midi*.

1902. Exemple. La parallaxe étant de $54' 0''$ dans l'éclipſe de 1764, l'angle a ſuppoſé de $19'$, comme je l'employois autrefois (1708), l'azimut de la lune $53^{\circ}\frac{1}{2}$, on a la parallaxe d'azimut p ſin. a. ſin. z (1686) $= 14''4$, qui retranchée de $31' 15''6$ (1891), différence d'azimut vue du centre de la terre, donne la différence apparente d'azimut DL $31' 1''2$, telle qu'on la voit ſur la ſurface du ſphéroïde.

1903. Quand on a trouvé la différence d'azimut entre la lune & l'étoile, il faut connoître auſſi la hauteur vraie de la lune, & pour cela on prend la différence de hauteur entre la lune & l'étoile (1889), qu'on ajoute à celle de l'étoile ſi la lune eſt plus élevée. Mais pour diſtinguer cette circonſtance, voici des règles générales qui ſuppoſent ſeulement qu'on ait examiné ſi la ſomme de l'angle de conjonction & de l'angle parallactique (en prenant ſon ſupplément, s'il eſt obtus), forme plus ou moins de 90°, dans les cas où on les ajoute enſemble (1888). On pourra ſe diſpenſer de conſulter ces règles ſi l'on voit aſſez diſtinctement la ſituation des lignes & des angles dont il s'agit dans ce calcul, ou ſi l'on a un globe ou une figure exacte devant les yeux. Les règles ſuivantes renferment tous les cas où il faut ajouter la différence de hauteur vraie, à celle du ſoleil, ou de l'étoile, pour avoir la hauteur vraie de la lune.

1904. DANS LES PAYS SEPTENTRIONAUX. Cas où la différence de hauteur eſt additive.

AVANT LE MÉRIDIEN. Si la latitude de la lune eſt au NORD, de l'étoile, AVANT la conjonction.

Si la lune eſt au NORD, APRÈS la conjonction, & que la ſomme de l'angle de conjonction & de l'angle parallactique (1888), ſoit moindre que 90°.

Si la lune eſt au MIDI, AVANT la conjonction & que la ſomme de l'angle de conjonction & de l'angle parallactique ſoit plus grande que 90°.

1905. Mais ſi l'on a retranché de l'angle de poſition celui du vertical avec le méridien (1886), l'on aura une différence de hauteur additive dans les cas ſuivans.

Si la lune eſt au NORD du ſoleil ou de l'étoile, APRÈS la conjonction.

Si la lune eſt au NORD, AVANT la conjonction, & que la ſomme ſoit plus petite que 90°.

Si la lune eſt au MIDI APRÈS la conjonction, & que la ſomme des angles ſoit plus grande que 90°.

1906. APRÈS LE MÉRIDIEN. Ce ſont les trois règles de l'article 1905.

Mais ſi l'on a retranché de l'angle de poſition celui du vertical avec le méridien (1886), ce ſont les trois règles de l'article 1904.

Les préceptes de ces trois articles, ſont les ſeuls dont on ait beſoin en Europe.

1907. Dans les pays ſeptentrionaux de la zone torride, l'angle parallactique peut ſe trouver obtus ſi la lune eſt entre le zénit & le pole élevé : alors on changera les mots de NORD & de MIDI dans les articles 1904 & 1905 ; mais on prendra le ſupplément de l'angle parallactique avant de l'ajouter à l'angle de conjonction (1888).

Si l'angle parallactique eſt obtus.

Dans les pays méridionaux.

1908. DANS LES PAYS MÉRIDIONAUX, c'eſt-à-dire, ſi le lieu pour lequel on calcul une éclipſe eſt de l'autre côté de l'équateur, ayant une latitude géographique auſtrale, AVANT LE MÉRIDIEN ; l'on changera les mots de NORD & MIDI dans l'art. 1904.

1909. Mais ſi l'on a retranché de l'angle de poſition celui du vertical avec le cercle de déclinaiſon, l'on changera dans l'article 1905 les mots de NORD & de MIDI.

1910. APRÈS LE MÉRIDIEN. On changera auſſi dans l'art. 1905 les mots de NORD & MIDI.

1911. Mais ſi l'angle du vertical avec le méridien a été ſouſtrait de l'angle de poſition (1886), on changera NORD & MIDI dans l'art. 1904.

1912. Si l'angle parallactique eſt obtus dans les pays méridionaux, AVANT LE MÉRIDIEN ; on prendra l'art 1904. APRÈS LE MÉRIDIEN ce ſera l'article 1905 ; je ſuppoſe toujours qu'on prend le ſupplément de l'angle parallactique pour l'ajouter à l'angle de conjonction (1888).

1913. Les cas où la différence de hauteur eſt ſouſtractive ſe peuvent conclure de ceux où elle eſt additive, en changeant dans les neuf articles précédens tous les mots MIDI & NORD, AVANT & APRÈS ; d'ailleurs on ſaura qu'elle eſt ſouſtractive, lorſqu'après avoir parcouru les cas précédens où elle eſt additive on n'y verra pas celui dont on aura beſoin.

1914.

1914. Après avoir ajouté la différence de hauteur *SC* avec celle du ſoleil ou de l'étoile, ou l'avoir retranché par le moyen des règles précédentes, on aura la hauteur vraie de la lune. Pour avoir ſa hauteur apparente, on multipliera la différence des parallaxes par le coſinus de la hauteur vraie de la lune que l'on vient de trouver, on aura la paralſaxe de hauteur à quelques ſecondes près; cette parallaxe ſe retranchera de la hauteur vraie de la lune pour avoir ſa hauteur apparente, & la différence des parallaxes horizontales, multipliée de nouveau par le coſinus de cette hauteur apparente, donnera plus exactement la parallaxe de hauteur (1629). Trouver la hauteur apparente.

1915. On retranchera de cette parallaxe la correction dûe à l'applatiſſement de la terre, p ſin. a. ſin. h. coſ. z (1689); & l'on aura exactement la parallaxe de hauteur AM ou CD (*fig.* 117 & 119) dans le ſphéroïde applati. Correction de la parallaxe.

1916. La parallaxe de hauteur CD (*fig.* 119) abaiſſe la lune au-deſſous du ſoleil ou de l'étoile; ainſi l'on en retranchera la quantité CS dont la hauteur vraie de la lune étoit plus grande que celle du ſoleil, & l'on aura la différence de hauteur apparente SD. Si la hauteur vraie de la lune a été trouvée moindre que celle de l'étoile, on ajoutera cette différence avec la parallaxe de hauteur, pour avoir la quantité SD dont le lieu apparent de la lune ſera plus bas que celui de l'étoile. *Fig.* 119.

1917. Connoiſſant ainſi la différence apparente de hauteur SD, & la différence apparente d'azimut LD (1902), on réſoudra le triangle SLD, & l'on trouvera la diſtance apparente SL. Cette diſtance fera connoître ſi l'éclipſe eſt commencée, & fera trouver le véritable commencement de l'éclipſe, en faiſant le même calcul pour un temps plus ou moins avancé de quelques minutes, comme on le verra dans l'exemple ſuivant.

1918. Exemple. La différence de hauteur vraie entre la lune & le ſoleil $41' 45'', 5$ (1889), étant

Fig. 119. ajoutée à la hauteur du ſoleil 33° 7′ 35″ donne la hauteur vraie de la lune 33° 49′ 20″. La différence des parallaxes horizontales du ſoleil & de la lune 54′ 0″, multipliée par le coſinus de la hauteur de la lune, donne la parallaxe de hauteur à peu-près, 44′ 51″. Cette parallaxe retranchée de la hauteur vraie de la lune 33° 49′ 20″ donne ſa hauteur apparente 33° 4′ 29″. Le coſinus de cette hauteur apparente multiplié par la parallaxe horizontale, donne plus exactement la parallaxe de hauteur 45′ 15″ 2 ; il en faut ôter la correction p ſin. a ſin. h coſ. z dûe à l'applatiſſement (1689), qui ſe trouvera de 5″ 9, & l'on aura la véritable différence des parallaxes dans le ſphéroïde applati 45′ 9″ 3 = AM ou CD ; il en faut retrancher la différence de hauteur vraie CS = 41′ 45″ 5, il reſte la différence de hauteur apparente SD, 3′ 23″ 8 ; cette valeur de SD avec celle de DL (1902) qui eſt de 31′ 1″ 2, nous donnera l'angle de 83° 45′ 4″, & la diſtance apparente des centres du ſoleil & de la lune 31′ 12″ 3, comme par la première méthode (1877). La ſomme du demi-diamètre du ſoleil 16′ 0″ $\frac{1}{2}$ & du demi-diamètre horizontal de la lune 14′ 47″ augmenté de 7″ $\frac{1}{2}$, à cauſe de ſa hauteur (1510), eſt de 30′ 55″, quantité moindre de 17″ que la diſtance apparente des centres ; ainſi le centre de la lune doit ſe rapprocher encore du centre du ſoleil de 17″ pour que l'éclipſe puiſſe commencer. Si l'on refait un ſemblable calcul (1882 & ſuiv.), pour un temps plus avancé de 5′, ou pour 9^h 15′ l'on trouvera que la diſtance apparente des centres eſt de 29′ 22″ 5, plus petite que la précédente de 1′ 49″ 8 ou en nombres ronds de 1′ 50″ ; or 1′ 50″ : 5′ 0″ : : 17″ : 46″ ; donc la diſtance des centres perdra, dans l'eſpace de 46″ de temps, les 17″ dont nous l'avons trouvée trop grande ; ainſi l'éclipſe commencera à 9^h 10′ 46″. Il faudroit ôter 4″ $\frac{1}{2}$ de la ſomme des demi-diamètres, & la réduire à 30′ 50″ $\frac{1}{2}$, ſi l'on vouloit avoir égard à l'inflexion des rayons qui raſent le limbe de la lune (1992).

Diſtance apparente.

Commencement de l'éclipſe.

1919. Si l'on veut former l'orbite apparente de la lune, affectée de la parallaxe, pour trouver le milieu de l'éclipſe, & le mouvement apparent, on cherchera dans le même triangle (dont on connoît les côtés *SD* & *DL*), l'angle *LSD*, 83° 45′ 4″; la ſomme ou la différence de cet angle, & de l'angle parallactique (1883), donnera l'angle *LSE* 74° 40′ 47″ (a). L'on fera le même calcul deux heures plus tard la lune étant en *F*, & l'on aura de même l'angle *FSE*, qu'on ajoutera avec l'angle *LSE*; ainſi l'on formera un triangle *LSF*, dans lequel on connoîtra *LS*, *SF*, & l'angle *LSF*, on cherchera le ſegment *LX* qui donnera le temps où la lune doit paroître en *X*, c'eſt le temps du milieu de l'éclipſe (1879); on cherchera enſuite la perpendiculaire *SX* avec laquelle on trouvera facilement la grandeur de l'éclipſe (1880). *Fig. 119.* Former l'orbite apparente.

1920. Pour plus d'exactitude, il faudroit que les calculs d'où l'on déduit le milieu de l'éclipſe ne fuſſent éloignés entre eux que d'une demi-heure, ou bien que l'un des calculs ne fût pas éloigné d'un quart d'heure de la plus grande phaſe. Ainſi l'on peut regarder le premier réſultat comme une approximation, & calculer la diſtance des centres pour le temps de la plus grande phaſe que l'on aura trouvé par le premier calcul; on combinera cette nouvelle diſtance des centres avec celle qu'on aura calculée pour le commencement ou pour la fin, & l'on en déduira plus exactement la grandeur & le temps de la plus grande phaſe.

1921. La nouvelle méthode que je viens de donner pour calculer une éclipſe, eſt plus ſimple que celle du nonagéſime. 1°. On n'a beſoin que de la hauteur de la lune, qu'il eſt néceſſaire d'avoir à peu-près, même dans la méthode du nonagéſime, pour connoître l'augmentation du diamètre de la lune (1510). 2°. On a la parallaxe exacte qui convient à la hauteur apparente, par deux Avantages de cette méthode.

(a) Ce ſera la ſomme, ſi la lune & le vertical ſont de différens côtés par rapport au cercle de latitude.

Fig. 119. ſimples additions (1918), au lieu que dans la formule du nonagéſime (1665), il faut faire deux fois une évaluation qui eſt bien plus compliquée. 3°. Lorſque les corrections de l'applatiſſement de la terre ſont réduites en tables, comme je l'ai fait pour Paris, & qu'on a une table des hauteurs, & des angles parallactiques, ma méthode eſt beaucoup plus courte que celle du nonagéſime, en ſuppoſant de pareilles tables pour cette méthode.

1922. Si l'on vouloit avoir non-ſeulement la diſtance apparente des centres; mais encore les parallaxes de longitude & de latitude. On les trouveroit par le moyen du triangle SLE, dans lequel on calculeroit la différence des longitudes apparentes EL 30′ 5″ 8, & la latitude apparente $SE = 8'\,14''7$, comparant ces valeurs avec les différences vraies AB 37′ 11″, & BS 36′ 21″, l'on aura la parallaxe de longitude 7′ 5″ 2, & celle de latitude 44′ 35″ 7, ainſi que par la méthode du nonagéſime (1877); mais on aura rarement beſoin de ces parallaxes, ſi l'on calcule les éclipſes par la méthode précédente, que je crois plus exacte, & plus ſimple que celle du nonagéſime. Cependant nous employerons la méthode du nonagéſime, pour trouver la différence des méridiens, par le temps de la conjonction vraie (1971).

Méthode analytique pour calculer les Eclipſes.

1923. Après avoir expliqué trois méthodes aſtronomiques pour calculer exactement une éclipſe, j'aurois ſouhaité de développer ici une méthode purement analytique, donnée par M. *du Séjour*, Conſeiller au Parlement de Paris, d'abord en 1761 (a), & plus rigoureuſement dans les Mémoires de l'académie pour

(a) Recherches ſur la Gnomonique, les rétrogradations des planètes, & les éclipſes de ſoleil, (par M. du Séjour & M. Goudin); à Paris chez *Deſaint* & *Saillant* 1761, *in*-8° 86 pages.

1765, 1766, 1767, &c.; mais M. du Séjour ayant conſidéré ce problême dans une généralité, où il ſuppoſe beaucoup de principes qui ne peuvent être démontrés dans cet ouvrage, je vais me contenter de rapporter ici ſa principale formule, avec un exemple, pour que le lecteur puiſſe du moins en comparer l'uſage avec celui des trois méthodes précédentes. Cette méthode analytique a toute la généralité qu'un géomètre habile pouvoit lui donner; elle eſt ſimple dans l'application, & très-élégante dans ſes principes & ſes démonſtrations. Je ſouhaite que l'exemple que je vais en donner, détermine les aſtronomes à conſulter les mémoires de l'académie pour en voir les fondemens, & ſuivre les applications ſans nombre que M. du Séjour en a faites à toutes les ſortes de problêmes que l'on peut propoſer ſur les éclipſes.

1924. Problême. Trouver la diſtance apparente des centres du ſoleil & de la lune, à un inſtant donné.

Je ſuivrai dans ces calculs les mêmes lettres que M. du Séjour, & les mêmes élémens pour l'éclipſe de 1764, qui me ſervira d'exemple; j'avertirai ſeulement que dans les formules ſuivantes, on peut négliger r qui exprime le rayon ou le ſinus total, puiſqu'il eſt toujours égal à l'unité dans nos tables.

Soit π = ſinus de la parallaxe horizontale de la lune ſous le pole, à l'inſtant donné.

π' = ſin. de la parallaxe du ſoleil, qui eſt de $9''$ (1742).

ρ = demi-grand axe de la terre, ſuppoſant le demi-petit axe = 1, c'eſt-à-dire, que $\rho = \frac{178}{177}$.

θ = ſinus de l'inclinaiſon de l'orbite corrigée ou de l'orbite relative (1765).

$\downarrow$ = coſinus de l'inclinaiſon de l'orbite corrigée.

ξ = coſinus de la latitude de la lune à l'heure de la conjonction.

$\zeta = 1 - \frac{\pi'}{\pi}\xi$

b = nombre de ſecondes de temps depuis la conjonction juſqu'à l'inſtant pour lequel on calcule.

s = ſinus de la latitude du lieu diminuée de la moitié de l'angle de la verticale (1708).

c = coſinus de la latitude du lieu ainſi corrigée.

g = ſinus de l'angle horaire ☉, ou du temps vrai réduit en degrés.

h = coſinus de l'angle horaire.

p = ſinus de la déclinaiſon du ſoleil à l'inſtant donné.

q = coſinus de la déclinaiſon du ſoleil.

Ω = coſinus obliquité de l'écliptique. $\chi = \sqrt{q^2 - \Omega^2}$.

t = tangente
ω = ſinus
φ = coſinus

} de l'angle de l'orbite relative avec la perpendiculaire au méridien univerſel, à l'inſtant pour lequel on calcule.

On trouve la valeur de ω par cette formule $\omega = \frac{t\Omega}{q} + \frac{\psi\chi}{q}$ (mém. de l'acad. 1766, *pag.* 257).

$$l = r\,\frac{\text{ſin. lat. ☾ au temps de la conjonction.}}{\text{ſin. parall. polaire au temps de la conjonct.}}$$

$$\gamma = \xi\,\frac{\text{ſin. verſe (mouv. hor. ☾ en longit. ſur l'éclip. mouv. hor. ☉)}}{\text{ſin. parall. horiz. polaire au temps de la conjonction.}}$$

$$\varpi = \frac{r\xi\ \text{ſin. (mouv. hor. ☾ — mouv. ☉)}}{\psi\qquad\text{ſin. parall. polaire.}}$$

$$A = \frac{\psi l}{\zeta} - \frac{qs\varphi}{r^2} + \frac{cg\rho\omega}{r^3} + \frac{chp\rho\varphi}{r^4}$$

$$B = \frac{tl}{\zeta} - \frac{qs\omega}{r^2} - \frac{cg\rho\varphi}{r^3} + \frac{chp\rho\omega}{r^4} + \frac{b\varpi r}{3600\,\zeta}$$

$$\frac{Ar}{B} = \text{tang. H}$$

$$E = \xi - \frac{p\varpi r}{r^2} - \frac{c\rho qh\varpi}{r^4} - \frac{\gamma b^2\varpi}{(3600)^2 r}$$

La tangente de la diſtance apparente des centres du ſoleil & de la lune ſera enfin égale à $\frac{A\zeta\varpi}{E\ \text{ſin. H}}$ (*mém. de l'ac.* 1765, *pag.* 299).

1925. L'uſage de cette méthode n'exige d'autre attention que celle de changer les ſignes d'une manière convenable, ſuivant la règle qu'on verra dans la trigonométrie que depuis 180° juſqu'à 360, les ſinus

changent de ſigne, & les coſinus depuis 90° juſqu'à 270. On ſait auſſi que + multiplié par — donne —, & que — multiplié par — donne +, enfin que les quantités qui après avoir diminué juſqu'à zéro continuent de diminuer encore deviennent négatives.

Ainſi l'on ſuppoſe pour b, que le temps eſt après la conjonction, ſinon b eſt négatif.

Pour l, que la latitude à l'heure de la conjonction eſt boréale, autrement l eſt négative.

Pour p, que la déclinaiſon du ſoleil eſt boréale à l'heure du calcul.

Pour χ, que le ſoleil eſt dans les ſignes aſcendans, ou depuis 9^s juſqu'à 3^s de longitude.

Pour g, que l'heure donnée eſt après midi.

Pour h, que l'heure eſt entre ſix heures du matin & ſix heures du ſoir, ſans cela le coſinus h eſt négatif.

Pour le changement de la parallaxe que la lune s'approche de la terre, ou que la parallaxe augmente.

Pour s, que la latitude du lieu eſt boréale; le coſinus de la latitude $= c$ eſt toujours poſitif.

Pour n, que le mouvement horaire relatif eſt direct ou vers l'orient, ainſi n eſt négatif, dans les paſſages de Vénus & de Mercure.

Pour γ, que l'orbite eſt concave vers la terre; dans les paſſages de Vénus γ eſt négatif, mais on peut négliger totalement cette petite quantité.

Pour θ, que le mouvement de la lune en latitude va vers le nord, & le mouvement relatif en longitude vers l'orient, ſi l'une des deux conditions change ſans l'autre, θ devient négatif.

t a le même ſigne que ω.

Dans les éclipſes de ſoleil les quantités r, ρ, ψ, ξ, c, q, Ω, φ, π, π', ζ, γ, n, ſont toujours poſitifs.

1926. Exemple. Je ſuppoſe qu'on demande la diſtance apparente des centres du ſoleil & de la lune, le 1 Avril 1764, à $9^h\ 10'$ à Paris, $1^h\ 21'\ 23''$ avant la conjonction; nous ſuppoſerons avec M. du Séjour, la conjonction à $10^h\ 31'\ 23''$, & la latitude $39'\ 36''$, la

parallaxe horizontale pour Paris $54' 9''$, & ſous le pole $54' 1'' \frac{1}{2}$; ſa formule pour trouver les parallaxes ſous d'autres latitudes, eſt dans les mémoires de l'académie pour 1764. Le nombre 206265 qui ſe trouve dans les formules ſuivantes eſt l'arc égal au rayon (1242); j'ai ſupprimé la lettre r qui exprime toujours l'unité.

Tangente de l'inclinaiſon de l'orbite relative ou corrigée $= \frac{\text{mouv. en latit.}}{206265 \text{ ſin.diff.mou.en lon.}} = \frac{2' 44''}{206265 \text{ ſin. } 27' 11'', 3}$, ainſi cette inclinaiſon $= 5° 44' 26''$.

$\rho = 1,00565$ Logarithme.	0,0024467
$\pi = 54' 1'' 5$	8,1963030
$\pi = 10''$	
$57° = 206264'' 8$	5,3144281
$\theta =$ ſin. $5° 44' 26''$	9,0001044
$\downarrow =$ cof. $5° 44' 26''$	9,9978165
$\xi =$ cof. latit. $\mathbb{C}$ $39' 36''$	9,9999711
$b = -4883$	3,6886867
$s =$ ſin. 48.41.25	9,8757280
$c =$ cof. 48 41 25	9,8196289
$g = -$ ſin. $42° 30'$	9,8296833
$h =$ cof. 42 30	9,8676309
$p = +$ ſin. $4° 48' 50''$	8,9238624
$q =$ cof. 4.48.50	9,9984653
$\Omega =$ cof. 23 28 21	9,9624884
$\chi = +38936$	9,5903565
$\omega =$ ſin. 28 44 30	9,6820198
$t =$ tang. 28 44 30	9,7391209
$\varphi =$ cof. 28 44 30	9,9428989
$\zeta =$ ſin. 85 30 6	9,9986603
$l = +0,73301$	9,8651087
$\gamma = 0,00200$	7,3008965
$n = +0,50581$	9,7039847

1927. Pour parvenir à l'évaluation des termes de A, de B, & de E, on calcule d'abord ſéparement les termes généraux qui ne changent pas de valeur pendant la durée d'une éclipſe.

Le

Le premier terme de A eſt $\frac{\psi 1}{\zeta} = +0,73159.$

Le premier terme de B eſt $\frac{\theta 1}{\zeta} = +0,07354.$

Le premier terme de E eſt $\xi = +0,99993.$

Il entre encore dans la valeur de A des quantités qui ſont ſenſiblement les mêmes pour toute la durée de l'éclipſe, tels ſont dans le ſecond terme $q\varphi$, dans le troiſième $\rho\omega$, dans le quatrième $p\rho\varphi$. De même dans la valeur de B, on a $q\omega$, $\rho\varphi$, $p\rho\omega$, & $\frac{n}{3600\zeta}$; dans celle de E les produits $p\pi$, $\rho q\pi$, $\frac{\gamma\pi}{(3600)^2}$; il eſt bon de les former ſéparément avant que de calculer les termes qui dépendent du lieu, & de l'heure pour leſquels on calcule, voici leurs Logarithmes, (*Mém. acad.* 1765, *pag.* 298).

Logar. de	$q\varphi$	$= -0,0586358.$
	$\rho\omega$	$-0,3155335.$
	$p\rho\varphi$	$-1,1307920.$
	$q\omega$	$-0,3195149.$
	$\rho\varphi$	$-0,0546544.$
	$p\rho\omega$	$+1,3916711.$
	$\frac{n}{3600\zeta}$	$+6,1490219.$
	$p\pi$	$-2,8798346.$
	$\rho q\pi$	$-1,8027850.$
	$\frac{\gamma\pi}{(3600)^2}$	$-1,6154055.$
	$\zeta\pi$	$+8,1949633.$

On écrit enſuite les quatre termes de A, dans quatre colonnes, chacun avec le ſigne qui convient au produit qui a lieu dans le cas actuel; il n'y a que le troiſième terme qui change dans notre exemple, parce que g eſt négatif, l'heure donnée étant avant midi; on les évalue chacun ſéparément, & l'on trouve les quantités ſuivantes.

$$\left.\begin{array}{l} +\frac{\psi 1}{\zeta} = +\ 0,73159 \\ -q\,s\,\varphi = -\ 0,65629 \\ -c\,g\,\rho\omega = -\ 0,21566 \\ +c\,h\,p\,\rho\omega = +0,03601 \end{array}\right\} \text{donc } A = -\ 0,10435$$

On écrit auſſi les quatre termes de *B* chacun avec le ſigne qui leur convient ; dans notre exemple, le troiſième terme change de ſigne, parce que *g* eſt négatif ; le cinquième terme change auſſi, parce que le temps donné étant avant la conjonction *b* eſt négatif. Voici tous les termes de *B*.

$$\left.\begin{array}{l} +\ \frac{\psi 1}{\zeta} = +\ 0,07354 \\ -q\,s\,\omega = -\ 0,35992 \\ +c\,g\,\rho\varphi = +0,39324 \\ +c\,h\,p\,\rho\omega = +0,01975 \\ -\ \frac{b\pi}{3600\,\zeta} = -\ 0,68819 \end{array}\right\} \text{donc } B = -\ 0,56158,$$

donc $\frac{A}{B}$ = tang. H, & H = 10° 31′ 35″.

$$\left.\begin{array}{l} \xi = +0,99993 \\ -p\,s\,\pi = -0,00101 \\ -c\rho q\,h\pi = -\ 0,00766 \\ -\ \frac{\gamma b^2 \pi}{(3600)^2} = -0,00006 \end{array}\right\} \text{donc } E = +0,99120.$$

1928. Ainſi la tangente de la diſtance apparente $= \frac{A\zeta\pi}{E \text{ ſin. } H}$ = tang. 31′ 2″. Elle s'accorderoit parfaitement avec celle que j'ai trouvée par les autres méthodes (1877, 1918), ſi l'on avoit employé les mêmes élémens, comme je m'en ſuis aſſuré. La manière d'en conclure le commencement & la fin de l'éclipſe eſt la même que par les autres méthodes (1918).

1929. Cette méthode de M. du Séjour a toute la généralité poſſible ; elle auroit l'avantage de ſervir avec

la même facilité dans les cas mêmes où les quantités qu'on néglige actuellement, ne ſeroient pas négligeables. On peut, avec ces formules, trouver les limites des erreurs que l'incertitude de chaque élément peut produire ; c'eſt cette facilité qui a fait trouver l'inflexion (1992). Enfin la même forme de calcul ſert à trouver le *maximum* & le *minimum* de toutes les circonſtances d'une éclipſe, à en tirer toutes les conſéquences poſſibles, & à chercher tous les élémens que l'obſervation de l'éclipſe peut déterminer ; de même que les courbes d'illumination qui ſeront l'objet des articles ſuivans.

Méthode pour calculer la route de l'ombre & les lignes des phaſes ſur la ſurface de la terre.

1930. Aprés avoir déterminé les circonſtances de l'éclipſe générale pour le méridien de Paris, (1806), par le calcul, ou par l'opération graphique, dont on peut très-bien ſe contenter (1811), il eſt queſtion de connoître par longitudes & latitudes les pays de la terre où commenceront ces phaſes ; il faut ſavoir, par exemple, quel eſt le point *I* de la terre *fig.* 103, qui le premier de tous verra commencer l'éclipſe en voyant lever le ſoleil, quel eſt le point *V* qui le premier verra l'éclipſe centrale au lever du ſoleil. On a vu la manière de le trouver ſans calcul, par le moyen d'un globe (1814), nous allons indiquer une méthode trigonométrique, & une opération graphique pour y parvenir. *Fig.* 103.

M. de la Caille avoit donné, il eſt vrai, une méthode graphique pour tracer les lignes des phaſes, mais perſonne encore n'avoit donné avant moi, la manière de les calculer par la trigonométrie ; M. du Séjour, étoit le ſeul qui eût donné des formules analytiques pour tracer la ligne de l'ombre, ou de l'éclipſe centrale, dans le recueil que j'ai cité (1923) ; depuis ce temps-là, il a donné dans les Mémoires de l'académie, une théorie plus générale & une analyſe plus complette

de tous les cas de ce problême; mais cela ne m'empêchera pas de ſuivre dans cette partie l'application des méthodes que j'ai expliquées ci-deſſus, & qui ſont plus familières aux aſtronomes, quant à préſent.

Fig. 118. 1931. Soit le centre de la projection en *C* (*fig.* 118), l'orbite de la lune *KMG*; le milieu de l'éclipſe en *M*, le commencement de l'éclipſe générale au moment où la lune eſt en *K*; le triangle *MCK* que nous avons employé à trouver la portion *MK* de l'orbite (1809), ſervira auſſi à trouver l'angle *MCK*, en diſant *CK* : *R* :: *CM* : cof. *MCK*; la ſomme ou la différence de cet angle *MCK*, & de l'angle *PCM* que forme le méridien univerſel *CP* avec la perpendiculaire à l'orbite, donnera l'angle *PCK* ou *PCI*, dont la meſure eſt l'arc *DI* du cercle de projection. Rien n'empêche actuellement de concevoir ſur le cercle *ADE* le globe même, dont il eſt la projection, & d'imaginer ſur le globe un triangle ſphérique *PDI*; le côté *PD* eſt égal à la déclinaiſon du ſoleil, c'eſt-à-dire, à l'élévation de l'axe de la terre au-deſſus du cercle terminateur ou du cercle de projection (1829), le côté *DI* eſt l'arc déterminé il n'y a qu'un inſtant ſur le cercle de projection; l'angle *D* eſt droit, puiſque le méridien univerſel *CPD* eſt perpendiculaire au cercle terminateur; on pourra donc réſoudre le triangle *IPD*, en diſant 1°. Le rayon eſt au coſinus de la déclinaiſon du ſoleil, ou de *PD*, comme le coſinus du côté *DI*, eſt au coſinus de l'hypothénuſe *PI*, 2°. Le ſinus de *PD* eſt au rayon, comme la tangente du côté *DI* eſt à la tangente de l'angle *DPI*. L'hypothénuſe *PI* eſt la diſtance du lieu *I* au pole *P* du monde, ou le complément de ſa latitude, ſi *PI* eſt moindre que 90 degrés; mais ſi le côté *DI* étoit plus grand que 90°, l'hypothénuſe *PI* ſeroit auſſi plus grande, on ſeroit obligé de prendre le ſupplément à 180° de l'arc trouvé dans les tables par le calcul trigonométrique, & d'ôter 90° de ce ſupplément pour avoir la latitude du point *I*, qui dans ce cas-là ſeroit une latitude méridionale. Je

Trouver le premier lieu qui verra l'éclipſe.

Latitude du point *I*.

ſuppoſe que le pole *P*, élevé au-deſſus du cercle de projection eſt le pole boréal du monde, c'eſt-à-dire, que la déclinaiſon du ſoleil eſt boréale; mais ſi c'étoit le pole auſtral qui fût élevé au-deſſus du plan de projection, il faudroit tirer le méridien ou cercle horaire *PI* du pole auſtral & non du pole boréal. *Fig.* 118.

1932. L'angle *DPI*, formé au pole du monde par le méridien *PI* du lieu cherché, & par la partie ſupérieure *PD* du méridien univerſel, ſervira à trouver l'angle horaire du lieu *I*, c'eſt-à-dire, ſa diſtance au méridien univerſel, ou le chemin qu'il a fait & l'arc qu'il a décrit depuis ſon paſſage par le méridien univerſel, en y ajoutant 180 degrés; car comme le point *I* s'avance d'occident en orient, ou de droite à gauche vers le méridien univerſel *PC* où il arrivera à midi, l'angle *DPI* eſt ſa diſtance au point de minuit, & l'angle horaire compté d'un midi à l'autre, eſt plus grand que 180° de la quantité *DPI*. Si le lieu dont il s'agit étoit à gauche ou à l'orient du méridien univerſel, comme le point *F*, l'angle horaire *CPF* ſeroit le ſupplément de l'angle *DPF*, trouvé par le calcul précédent.

1933. L'angle horaire pour Paris, qui eſt déterminé par l'heure donnée (211), étant diminué de 20 degrés, on le retranchera de l'angle horaire trouvé pour le point *I*, & l'on aura la longitude géographique du lieu de la terre qui y répond, comptée du premier méridien (1012).

1934. Exemple. Dans l'éclipſe de 1764, $CK = 1°24'48''$, (1809) $CM = 39'24''$, & $PD = 4°48'50''$; on fera cette proportion: $1°24'48'' : R :: 39'24'' :$ cof. $62°18'47''$ valeur de l'angle *MCK*; on y ajoutera l'angle d'inclinaiſon *LCM* $5°44'26''$, puiſque le milieu *M* de l'éclipſe eſt à l'occident de la conjonction, & le point *K* à l'occident du point *M*; on y ajoutera l'angle de poſition $LCP = 23°0'0''$, parce que le cercle de latitude eſt à l'orient du méridien vers le nord dans les ſignes aſcendans (1847), & l'on aura $91°3'13''$

Fig. 118. (dont le ſupplément eſt 88° 56′ 47″) pour l'angle *PCI* qui eſt égal à l'arc *DI*; cet arc *DI* étant obtus; nous apprend que l'hypothénuſe *PI*, & l'angle *DPI* le ſeront également, ſuivant les règles de la trigonométrie ſphérique (3658, 3659). On fera cette proportion : ſin. 4° 48″ 50″ : *R* : : tang. 88° 56′ 47″ : tang. 89° 54′ 42″; ce qui montre que l'angle *P* eſt de 90° 5′ 18″, & l'angle horaire du lieu *I*, 270° 5′ 18″.

Le commencement de l'éclipſe générale en *I* a été trouvé 7ʰ 38′ 8″ à peu-près (1809), ou 19ʰ 38′ 8″, en comptant d'un midi à l'autre, ce qui fait 294° 32′ 0″ pour l'angle horaire à Paris, dont ôtant 20°, on aura 274° 32′ 0″ pour l'angle horaire ſous le premier méridien; on le retranchera de l'angle horaire du lieu *I*, 270° 5′ 18″, en ajoutant 360° pour la ſouſtraction : il reſtera 355° 33′ 18″ pour la longitude géographique du lieu cherché *I*, (1012).

Sa ſituation dans l'éclipſe de 1764.

1935. On fera auſſi cette proportion *R* : cof. 4° 48′ 50″ : : coſinus 88° 56′ 47″ : cof. 88° 57′ 0″, dont le ſupplément 91° 3′ 0″ marque la diſtance du lieu *I* au pole boréal du monde : ainſi ce lieu eſt à 1° 3′ de latitude auſtrale & à 355° 33′ de longitude, c'eſt-à-dire, qu'il eſt ſitué dans le milieu de la Mer du Nord, entre la côte de Guinée & la côte du Bréſil. On trouveroit par une opération ſemblable le point *V*, qui le premier verra l'éclipſe centrale au lever du ſoleil; ſa longitude eſt à peu-près de 332° 28′, & ſa latitude 18° 49′ boréale. On trouvera ci-après le réſultat du calcul de M. du Séjour, (1957); le calcul eſt encore le même pour trouver la poſition du point *F* & du point *X*, les derniers de la terre qui verront l'éclipſe.

Tracer la route de l'ombre.

1936. La trace de l'ombre de la lune ſur la ſurface de la terre peut ſe marquer ſur un globe ou ſur une carte de géographie, en déterminant de quart-d'heure en quart-d'heure la longitude & la latitude du lieu qui doit voir l'éclipſe centrale, pendant l'eſpace de temps compris entre ceux où la lune a été en *V* & en *X*. Commençons par le point *M* de la projection, & cher-

chons quel eſt le pays de la terre, qui projetté au point *M*, aura l'éclipſe centrale à l'heure même du milieu de l'éclipſe générale (1807). *Fig.* 118.

La ligne *CM*, conſidérée comme une ligne droite de la projection, repréſente un arc du cercle de la terre dont elle eſt la projection, & qui eſt compris entre le point *C*, qui répond perpendiculairement au ſoleil, & le point de la terre qui eſt projetté en *M*. Or on a vu que les arcs comptés du centre de la projection ont leur ſinus même pour projection (1833) : ainſi pour trouver l'arc de la terre qui répond à *CM*, il ſuffit de ſavoir quels ſont les degrés dont *CM* eſt le ſinus; l'on fera donc cette proportion : le rayon de la projection exprimé en ſecondes, eſt au ſinus total, comme la perpendiculaire *CM* eſt au ſinus de l'arc de la terre qui lui répond.

On conſidérera enſuite le triangle ſphérique *PCM*, dont on connoît deux côtés & l'angle compris, ſavoir, l'arc *CM* que nous venons de trouver, l'arc *CP*, complément de la déclinaiſon du ſoleil, ou ſa diſtance au pole, & l'angle *PCM*, égal à celui que forme le méridien avec la perpendiculaire *CM*, ou l'équateur avec l'orbite apparente de la lune (1816), on cherchera le côté *PM* & l'angle *CPM* par les analogies ſuivantes, en abaiſſant une perpendiculaire du point *M* ſur le méridien *PC*. (3696, 3697).

R : cof. *PCM* : : tang. *CM* : tang. *CZ*; on a *CP* − *CZ* = *PZ*;
Cof. *CZ* : cof. *PZ* : : cof. *CM* : cof. *PM*.
Sin. *PZ* : ſin. *CZ* : : tang. *PCM* : tang. *CPM*.

Au moyen de *PM* & de l'angle *P*, on trouvera la longitude & la latitude du point *M* par les conſidérations que nous avons employées ci-deſſus pour trouver celles du point *I* (1934).

1937. Tous les autres pays de la terre qui doivent avoir l'éclipſe centrale ſe trouveront par une ſemblable opération, ou pour un moment donné, ou pour une latitude donnée, ou enfin pour une longitude priſe à

Trouver le pays où l'éclipſe eſt centrale à 1 heure donnée.

volonté : mais il eſt plus commode de choiſir un temps donné. Suppoſons, par exemple, qu'à une heure fixe la lune étant en *O*, on demande quel eſt le point *O* de la terre où l'éclipſe paroîtra centrale, c'eſt-à-dire, le pays qui eſt projetté au point *O* de la projection en même-temps que la lune s'y trouve ; ce pays de la terre voyant tout à la fois le ſoleil & la lune au point *O* de la projection, aura une éclipſe centrale.

1938. Pour connoître le côté *MO*, on ſe ſervira du mouvement horaire de la lune, en diſant, une heure ou 60′ ſont au mouvement horaire de la lune ſur ſon orbite relative, comme la différence entre le temps donné & celui du milieu *M* de l'éclipſe générale eſt au mouvement *MO*. On cherchera l'angle *MCO* par cette proportion : la perpendiculaire *CM* eſt au côté *MO*, comme le rayon eſt à la tangente de l'angle *MCO* ; cet angle combiné avec l'angle *PCM* que le méridien fait avec la perpendiculaire, donnera l'angle *PCO* ; on cherchera le côté *CO*, en diſant : Le ſinus de l'angle *MCO* eſt à *MO*, comme le ſinus total eſt à *CO* ; enſuite, le rayon de la projection eſt au ſinus total, comme la ligne *CO* eſt au ſinus de l'arc de la terre dont elle eſt la projection ; par ce moyen l'on a dans le triangle ſphérique *PCO*, deux côtés *PC*, *CO* & l'angle compris *PCO* ; on trouvera par les analogies rapportées ci-deſſus (1936), le côté *PO*, & l'angle au pole *CPO*, d'où l'on tirera la latitude & la longitude du point *O* (1934).

1939. Exemple. Le 1 Avril 1764, le milieu de l'éclipſe générale étant ſuppoſé à 10h 22′ 41″ au méridien de Paris, (1808), on demande quel pays de la terre aura l'éclipſe centrale, à 10h 42′ 30″, c'eſt-à-dire, 19′ 49″ après le milieu de l'éclipſe, on dira 1°, 60′ : 27′ 19″½ :: 19′ 49″ : *MO* qui ſera de 9′ 2″ : 2°, 39′ 24″ : 9′ 2″ :: *R* : tang. *MCO* = 12° 54′ 5″ ; on ôtera cet angle *OCM* de l'angle *PCM* = 28° 44′ 26″, il reſtera l'angle *PCO* 15° 50′ 21″ ; 3°, coſin. *MCO* = 12° 54′ 5″ : *CM*, 39′ 24″ :: *R* : *CO* = 40′ 25″. 4°, 54′ 0″ : *R* :: 40′ 25″ :

25″ : ſin. 48° 27′ 54″; c'eſt l'arc de la terre qui répond à la projection *CO*. 5°, *R* : coſ. *PCO* = 15° 50′ 21″ :: *T*. *CO* = 48° 27′ 54″ : *T*. ſegment = 47° 21′ 43″; on ôtera ce ſegment 47° 21′ du côté *PC* = 85° 11′ 10″, il reſtera le ſecond ſegment 37° 49′ 27″. 6°, ſin. 37° 49′ 27″ : ſin. 47° 21′ 43″ :: tang. *PCO* = 15° 50′ 21″ : tang. *CPO* = 18° 47′ 44″, d'où il ſuit que l'angle horaire du lieu *O* eſt de 341° 12′ 16″. 7°, Enfin, coſ. 47° 21′ 43″ : coſ. 37° 49′ 27″ :: coſ. 48° 27′ 54″ : coſ. *PO* = 38° 54′ 26″, ce qui prouve que la latitude du lieu *O* eſt de 51° 5′ 34″. A 10ʰ 42′ 30″ l'angle horaire pour Paris, eſt de 340° 37′ 30″, & pour le premier méridien 320° 37′ 30″, on retranchera cet angle horaire de celui du lieu *O* = 341° 12′ 16″, & il reſtera 20° 34′ 46″ pour la longitude du pays cherché; ce point tombe à l'orient de Calais, qui eſt à 19° 31′ de longitude, & à 50° 58′ de latitude ſeptentrionale. *Fig.* 118.

1940. On peut aiſément trouver par les mêmes principes une ſuite de pays qui auront l'éclipſe d'un doigt, où de telle autre grandeur qu'on voudra : voici en quoi conſiſtoit le procédé de l'opération graphique de M. de la Caille, (*Leçons d'aſtronomie*, *art.* 1169). Du point *M* (*fig.* 120), où eſt le milieu de l'éclipſe, on prend *MA* égale à la ſomme des demi-diamètres du ſoleil & de la lune; on tire par ce point *A* la ligne *BAE* parallèle à l'orbite de la lune; elle marque ſur la projection une ſuite de points qui auront ſucceſſivement un ſimple contact de la lune & du ſoleil, au nord du ſoleil ſans aucune éclipſe (1801). Du point *A* l'on prendra *AQ* d'un quart du diamètre du ſoleil ou de 3 doigts, & la ligne *OQR* marquera des pays où l'on doit voir le ſoleil éclipſé de trois doigts; on prendra *AS* égale au diamètre du ſoleil, & la ligne *SY* marquera une ſuite de points où l'on verra la lune entière ſur le ſoleil, touchant le bord ſeptentrional du ſoleil; la diſtance *MS* eſt la demi-largeur de l'eſpace, où l'on voit une éclipſe annulaire, quand le diamètre de la lune eſt plus petit que celui du ſoleil, & une éclipſe tota- *Fig.* 120.

Fig. 120. le, ſi le diamètre de la lune eſt plus grand, c'eſt-à-dire, ſi le point *S* tombe au-deſſous du point *M*.

1941. En ſuivant l'eſprit de cette méthode, M. de la Caille cherche encore pour un inſtant donné la longitude & la latitude d'un point *R* de la terre qui voit l'éclipſe de trois doigts, & d'un point *Z* qui voit les deux bords ſe toucher, de la même manière que l'on a déterminé ſur l'orbite celui qui voyoit l'éclipſe centrale (1937): la ſeule différence conſiſte à employer *CQ* au lieu de *CM*, & du reſte la ligne *QR* eſt égale à la portion *MH* de l'orbite lunaire qui ſerviroit à trouver un lieu de la terre, comme *H*, qui voit l'éclipſe centrale au même inſtant. Mais dans cette méthode, on néglige la différence entre l'inclinaiſon de l'orbite relative, & celle de l'orbite apparente; & l'on ſuppoſe que *HR* ſoit la plus courte diſtance de la lune *H*, à un point *R* de la projection, quoique en décrivant ſon parallèle ou ſon ellipſe le point *R* puiſſe s'en approcher davantage. M. du Séjour a corrigé cette erreur dans ſes méthodes, en réſolvant le problême d'une manière plus rigoureuſe (*Mém. de l'acad.* 1765, *pag.* 306; 1767, *pag.* 156).

1942. Au reſte, M. de la Caille ne s'eſt ſervi de ces principes que pour exécuter ſur une carte géographique, ainſi que dans notre Planche XIV, le type général d'une éclipſe, qu'il faiſoit graver dans ſes éphémérides, toutes les fois qu'il y avoit à Paris éclipſe de ſoleil; ces principes ſuffiſent même pour former une carte ſemblable à celle que *Madame le Paute*, donna pour la grande éclipſe du 1 Avril 1764 (a); où il n'eſt queſtion que de donner aux aſtronomes un avertiſſement général, pour qu'on faſſe des calculs plus rigoureux, dans les endroits où l'on ſe propoſe d'obſerver. On voit ſur cette carte de Mad. le Paute, la trace de l'ombre, qui formoit ſur la terre une petite el-

Viteſſe de l'ombre.

(a) A Paris chez Latré, Graveur, rue S. Jacques, à la ville de Bordeaux.

lipſe, & qui parcouroit environ 12 lieues par minute : cette vîteſſe eſt double de celle d'un boulet de canon, qui eſt d'environ 200 toiſes par ſeconde, ou 5 lieues par minute, (*Journal des Savans*, Avril 1769). Mais quoique les principes que je viens d'expoſer ſuffiſent pour ces cas-là, cette branche du calcul des éclipſes étant par elle-même curieuſe & intéreſſante, je vais donner quelques détails de plus à ce ſujet, & y appliquer la méthode des projections, ſoit par une opération graphique, ſoit par le calcul trigonométrique ; je finirai par des tables détaillées qui ont ſervi à conſtruire la carte des phaſes de l'éclipſe tracée avec ſoin dans la Planche XIV.

1943. Pour trouver graphiquement les phaſes de l'éclipſe, en divers pays de la terre avec plus de préciſion que par le globe, il faut tracer une projection ortographique de la terre, ſur un plan perpendiculaire à la ligne des centres du ſoleil & de la lune, telle qu'on la voit dans la Planche XIII, (*fig.* 122) ; *C* eſt le centre, & *CK* le rayon de la projection égal à 54′ 0″ dans notre exemple ; *P* eſt la projection du pole, dont la diſtance $CP = 54'$ cof. déclin. $= 53'\ 49''$ (1831) ; les ellipſes qui repréſentent les parallèles de 10° 20°, &c. de latitude y ſont tracées, ſuivant la méthode de l'article 1842 ; chacune a ſon demi-grand axe égal au coſinus de ſa latitude (1829), & le demi-petit axe égal au cof. de la latitude, multiplié par le rayon de projection, & par le ſinus de la déclinaiſon du ſoleil (1828), c'eſt-à-dire, en commençant par l'équateur, 4′ 32″, 4′ 28″, 4′ 16″, 3′ 55″, 3′ 28″, 2′ 55″, 2′ 16″, 1′ 33″, 0′ 47″, de 10 en 10 degrés. *Planche XIII. Fig.* 122.

La diſtance du centre *C* de la projection au centre de chaque ellipſe, eſt égale au produit de 54′, par le ſinus de la latitude & le coſinus de la déclinaiſon (1832), ces diſtances priſes de 10 en 10 degrés, ſont de 9′ 21″, 18′ 24″, 26′ 54″, 34′ 35″, 41′ 13″, 46′ 36″, 50′ 34″, 53′ 00″. Chacune des abſciſſes, priſe ſur le grand axe, eſt égale au demi-axe multiplié par le ſinus de l'an-

Fig. 122. gle horaire, & chaque ordonnée (1843) égale au demi-petit axe multiplié par le cosinus de l'angle horaire, comme dans la table suivante; par ce moyen, il est aisé de tracer exactement chacune de ces ellipses, en supposant qu'on ne veuille pas se servir de l'opération graphique (1844) ou du compas elliptique, dont l'usage est peu commode.

Table des abscisses & des ordonnées des ellipses qui représentent les parallèles terrestres dans l'éclipse de 1764, en supposant le rayon de projection de 54′ 0″ & la déclinaison 4° 48′ 50″.

Latitudes	Midi.		I. heure.		II. heures.		III. heures.		IV. heures.		V. heures.	
	Ab.	Ordon.	Absc.	Ordon.	Absc.	Ordon.	Absc.	Ordon.	Absc.	Ordon.	Absc.	Ordon.
0°	0	4′ 32″	13″ 59″	4′ 21″	27′ 0″	3′ 54″	38′ 11″	3′ 11″	46′ 46″	2′ 15″	52′ 10″	1′ 10″
10	0	4 28	13 46	4 19	26 35	3 52	37 36	3 9	46 3	2 14	51 22	1 9
20	0	4 16	13 8	4 7	25 22	3 41	35 53	3 1	43 57	2 8	49 1	1 6
30	0	3 55	12 6	3 47	23 23	3 24	33 4	2 46	40 30	1 58	45 10	1 1
40	0	3 28	10 42	3 21	20 41	3 0	29 15	2 27	35 50	1 44	39 57	0 54
50	0	2 55	8 59	2 49	17 21	2 31	24 33	2 4	30 4	1 27	33 32	0 45
60	0	2 16	6 59	2 11	13 30	1 58	19 6	1 36	23 23	1 8	26 5	0 35
70	0	1 33	4 47	1 30	9 14	1 21	13 4	1 6	16 0	0 46	17 50	0 24
80	0	0 47	2 26	0 46	4 41	0 41	6 38	0 33	8 7	0 24	9 3	0 12

1944. Toutes les ellipses des parallèles terrestres, étant ainsi tracées se trouvent divisées en heures, & il est aisé d'en tracer le contour; elles touchent la circonférence *ABTR* du cercle de projection en deux points, l'un à l'orient, l'autre à l'occident: ces points séparent l'ellipse en deux parties, dont l'une est l'arc diurne, & l'autre l'arc nocturne; si l'on veut savoir par le calcul à quel endroit de chaque ellipse est le point de contact du cercle de projection, il ne faut que trouver les arcs semi-diurnes pour chaque latitude, qui sont les complémens des différences ascensionnelles; le cosinus de l'arc semi-diurne est égal à la tangente de la

latitude, multipliée par la tangente de la déclinaiſon, quand on néglige la réfraction (1026). Ces arcs ſemi-diurnes en degrés, depuis l'équateur juſqu'à 80 degrés de latitude ſont de 90°, 90° 51′, 91° 45′, 92° 47′, 94° 3′, 95° 46′, 98° 23′, 103° 23′, 118° 32′; ſi on les convertit en temps, on aura l'heure & la minute qui doit ſe trouver dans le point de contact.

On peut chercher auſſi par le calcul, à quels points du cercle de projection doivent paſſer les différens parallèles; on conſidérera un parallèle *BCK* (*fig.* 111), dont *C* eſt le centre, *BE* la latitude du lieu, *CT* le ſinus de la latitude, *KT* le ſinus de la diſtance du centre *T*, ou du point par où paſſe l'équateur, au point *K* par où l'aſtre doit paſſer pour paroître ſur le cercle terminateur; or ſin. *TKC* : *TC* :: *R* : *TK*, c'eſt-à-dire, que le coſinus de la déclinaiſon, eſt au ſinus de la latitude, comme le rayon eſt au ſinus de la diſtance entre l'équateur & le point de ſection du parallèle terreſtre, dont le rayon eſt *BC*. *Fig.* 111.

1945. Dans l'éclipſe du 1 Avril 1764, la déclinaiſon du ſoleil étant de 4° 49′; on trouve par l'analogie précédente que le parallèle de 10° touchoit le cercle de projection à 10° 2′ de l'équateur, celui de 20° à 20° 4′; celui de 30° à 30° 7′; celui de 40° à 40° 10′; celui de 48° 50′ à 49° 4′; celui de 60° à 60° 21′; celui de 70° à 70° 34′; celui de 80° à 81° 13′; & celui de 85° 11′ à 90°; c'eſt-à-dire, au ſommet du méridien univerſel de la figure, puiſque la déclinaiſon eſt ſuppoſée de 4° 49′. Les parallèles qui ſont plus éloignés de l'équateur que le complément de la déclinaiſon ne touchent point le cercle de projection; mais leurs ellipſes en ſont éloignées au ſommet où dans leur plus proche diſtance; d'une quantité *RI* égale au ſinus verſe de l'arc *DF* qui eſt la ſomme du complément *DP* de la déclinaiſon, & du complément *PF* de la latitude du parallèle.

On auroit pu décrire encore ſur la figure 122, les parallèles de 10° & de 20° au midi de l'équateur; mais

cela auroit rendu la figure trop grande pour ce volume

1946. Par les points de diviſion de chaque ellipſe, on a tiré d'autres ellipſes qui ſe coupent toutes au pole P (*fig.* 122); car les cercles horaires dans cette projection ortographique ſont auſſi des ellipſes (1827); mais comme ce ſont de grands cercles, ces ellipſes ont toutes pour centre, le centre même de la projection, & pour grands axes des lignes égales au diamètre de la projection. Le petit axe de chacune eſt le produit du grand axe par le ſinus de l'angle d'inclinaiſon, c'eſt-à-dire, de l'angle que fait le cercle lui-même avec la ligne des centres (1828). *Fig.* 122.

Si pour décrire ces ellipſes avec préciſion, l'on veut ſavoir quel angle forment les axes avec le méridien univerſel CP, & quelles ſont les valeurs des petits axes, on imaginera un triangle ſphérique, rectangle, formé par le cercle d'une heure & le méridien, avec un arc abaiſſé perpendiculairement du ſoleil ſur le cercle horaire; l'angle au ſoleil formé par le méridien univerſel & par la perpendiculaire ſe trouvera en diſant: le rayon eſt au coſinus de la diſtance du ſoleil au pole comme la tangente de 15° eſt à la cotangente de l'angle cherché (3680); ainſi en multipliant la tangente de l'angle horaire par le ſinus de la déclinaiſon, l'on aura la tangente de l'angle que forme le grand axe de chaque ellipſe avec le méridien CP, ces angles ſont dans la figure 122, de 1° 17′, 2° 47′, 4° 49′, 8° 16′, & 17° 24′. En prenant ces quantités-là ſur la circonférence, à droite & à gauche du ſommet R de la projection, on pourra tirer le grand axe de chaque ellipſe, pour la décrire avec plus de facilité.

1947. Quand à l'inclinaiſon du rayon ſolaire ou de la ligne des centres du ſoleil & de la terre ſur le plan du cercle horaire, elle eſt égale à l'arc perpendiculaire abaiſſé du ſoleil ſur ce cercle; on la trouve par le même triangle ſphérique, en diſant (3681): le rayon eſt au coſinus de la diſtance du ſoleil au pole, comme

le ſinus de l'angle horaire eſt au ſinus du côté, qui eſt égal à l'inclinaiſon; & ce ſinus multiplié par le rayon de projection donne le demi-petit axe de l'ellipſe du cercle horaire. Ces demi-axes dans notre exemple, ſont de $13'\ 56''$, $26'\ 54''$, $38'\ 3''$, $46'\ 36''$, $51'\ 59''$, pour 1^h, 2^h, 3^h, 4^h & 5^h. Fig. 122.

1948. Ayant décrit les parallèles & les méridiens ſur la projection, on tirera le cercle de latitude CT formant l'angle de poſition RCT (1846); il eſt dans cette éclipſe de $23°\ 0'$; on prendra CL égale à la latitude de la lune $39'\ 36''$; on tirera l'orbite LF faiſant un angle de $84°\ 15'\ 34''$ avec le cercle de latitude (1765). Au point L de la conjonction, on marquera $10^h\ 31'\ 23''$ qui eſt le temps de la conjonction; on prendra ſur l'orbite le mouvement horaire relatif $27'\ 19''\frac{1}{2}$ par le moyen duquel on diviſera l'orbite en heures & en minutes avant & après la conjonction, depuis $7^h\ 35'$ juſqu'à 12 heures 30', c'eſt-à-dire, pendant toute la durée de l'éclipſe.

Nous avons ſuffiſamment expliqué la manière de trouver ſur cette figure les points de la terre qui auront l'éclipſe centrale (1931); la table qu'en a calculé M. du Séjour, ſe trouvera ci-après (1969), avec celles des autres circonſtances de l'éclipſe, dont nous avons à parler. Nous commencerons ici par chercher les points qui voient pour plus grande & unique phaſe, le contact des deux bords du ſoleil ou de la lune; la méthode eſt la même que pour trouver la grandeur de l'éclipſe d'un doigt, de deux doigts, &c. Si l'on tire une ligne DEG (*fig.* 122) parallèle à l'orbite, qui en ſoit éloignée de la ſomme des demi-diamètres du ſoleil & de la lune, cette ligne DEG marquera bien ſur la terre une ſuite de points qui verront les deux bords ſe toucher, comme l'orbite elle-même y marque une ſuite de points qui voient les centres coïncider; mais il n'eſt pas exactement vrai que le point E de la terre qui voit le contact des bords, lorſque la lune eſtſur la ligne BE perpendiculaire à l'orbite, ne les a pas vu plus près, ou Fig. 122.

Fig. 122. qu'il ne verra pas enſuite la lune entamer le bord du ſoleil ; enfin il n'eſt pas vrai que la diſtance *B E* doive être la plus courte diſtance ou la plus grande phaſe, puiſque cette plus courte diſtance arrive ordinairement ſur une ligne inclinée à la perpendiculaire, & c'eſt ce que M. de la Caille avoit négligé d'obſerver dans ſes leçons d'aſtron. (art. 1172), où il n'avoit pour objet que de dreſſer en général une figure approchée des phaſes de l'éclipſe.

1949. Le problême des plus grandes phaſes données, conſidéré généralement, ſeroit impraticable, même par les méthodes directes ; mais M. du Séjour voulant réſoudre ce problême dans ſon grand travail des éclipſes a imaginé pour ſimplifier l'équation de prendre pour ſon *medium* ou pour ſa donnée, l'angle que forme la ligne de la plus grande phaſe avec la perpendiculaire *B E* ſur l'orbite ; cet angle étant ſuppoſé d'une certaine quantité détermine la latitude, l'heure & la quantité de la plus grande phaſe, par le moyen d'une équation qui a ſervi à conſtruire la table de la limite de l'éclipſe qui ſe trouvera ci-après (art. 1969). M. de Séjour trouve qu'il y auroit une erreur de $3^{\circ}\ 33'\frac{1}{2}$ ſur la longitude & de $0^{h}\ 35'\ 49''$ ſur l'heure du contact, pour la latitude de $16^{\circ}\ 57'$, ſi l'on ſuppoſoit que la plus grande phaſe arrive ſur la perpendiculaire à l'orbite relative.

1950. Pour trouver, par la méthode graphique, cette ligne de la plus grande phaſe ſous une latitude donnée, on peut faire varier l'orbite avec ſes diviſions, juſqu'à ce qu'on ait rencontré deux heures pareilles, l'une ſur le parallèle & l'autre ſur l'orbite, qui ſoient éloignées de la ſomme des demi-diamètres, & en même temps plus près que les autres points ſemblables qui précèdent & qui ſuivent. Pour cela on trace l'orbite *R B M* ſur un carton ſéparé de la figure ; en faiſant mouvoir cette orbite *BL* de la lune vers la droite, de la valeur, par exemple, de $50'$, enſorte que ce ſoit le point de $11^{h}\ 21'$, au lieu de $10^{h}\ 31'$, qui tombe en *L* ſur le cercle de latitude, je trouve après quelques eſſais qu'en mettant une pointe du compas ſous l'équateur à $9^{h}\ 48'$ du

du matin, avec une ouverture égale à la ſomme des demi-diamètres, elle tombe auſſi à 9^h 48′ de l'orbite ainſi déplacée, & qu'en la portant ſur 9^h 45′, & ſur 9^h 50′, la diſtance eſt ſenſiblement la même, enſorte que 9^h 48′ eſt véritablement le temps de la plus courte diſtance & de la plus grande phaſe, réduite à un ſimple contact, ſous l'équateur; pour un pays qui compte 50′ de plus, ou qui eſt plus oriental que Paris de 0^h 50′, c'eſt-à-dire, de $12° \frac{1}{2}$ & qui a par conſéquent $32° \frac{1}{2}$ de longitude. *Fig.* 122.

1951. Au lieu de faire promener l'orbite, on peut auſſi ſe contenter de chercher un point ſur l'orbite, & un ſur le parallèle, où la diſtance donnée ſoit ſenſiblement la même, en faiſant varier chacun de ces points de cinq minutes; on trouve que l'heure de l'orbite eſt alors plus petite que l'heure du parallèle, de 50′ de temps, on en conclut que le lieu cherché eſt plus oriental que Paris de 50′ de temps.

1952. Si je fais la même opération ſous le parallèle de 30°, & en faiſant avancer l'orbite mobile de 2^h 39′ ſur la droite, enſorte qu'elle ſoit coupée par le cercle de latitude à 1^h 10′ $\frac{1}{2}$, je vois en eſſayant différentes heures ſur le parallèle, que ſi je mets les pointes de compas ſur 1^h 49′ du ſoir, tant au parallèle qu'à l'orbite, la diſtance ſera égale à la ſomme des demi-diamètres, & que ce ſera la plus courte qui ait lieu avant & après, enſorte que le contact y arrivera, comme plus grande phaſe à 1^h 49′; or ce pays ayant la conjonction 2^h 39′ plutôt que Paris, eſt de $39° \frac{3}{4}$ plus oriental, ainſi il a $59° \frac{1}{4}$ de longitude. On trouveroit de même la ſuite de tous les points qui ſont dans la table de la limite de l'éclipſe (1969).

1953. Si l'on tire une ligne parallèle à l'orbite, qui ſoit au-deſſus de la ligne du contact *GED*, de la douzième partie du diamètre du ſoleil, elle marquera de même une ſuite de points qui doivent avoir l'éclipſe d'un doigt. Mais pour avoir des points où ce ſoit la plus grande phaſe, & afin de trouver le milieu de l'éclipſe pour chaque point, il faut faire le même tâtonnement que

pour le contact, en portant ſur divers parallèles & ſur l'orbite mobile une ouverture de compas égale à la ſomme des demi-diamètres, moins la douzième partie du diamètre du ſoleil, & ainſi des autres phaſes.

1954. Pour appliquer le calcul à ces opérations graphiques, il faudroit chercher la diſtance apparente des centres pour chaque lieu trouvé, par les méthodes ordinaires (1870, 1876 ou 1881), & recommencer ce calcul pour deux ou trois inſtans à chaque latitude, afin de reconnoître ſi l'on a trouvé exactement l'heure de la plus grande phaſe donnée, par exemple, l'heure où l'on y a obſervé le milieu de l'éclipſe, & ſa grandeur d'un doigt.

Faiſant le même calcul pour différentes latitudes, on aura une ſuite de points où doit paroître le contact des deux bords, & l'on en tracera la courbe ſur une carte, comme celle de la Planche XIV. Ce calcul ſeroit long, mais on ne le fait que pour un petit nombre de points. D'ailleurs on ne cherche communément ces lignes que par pure curioſité, pour avertir, dans les éphémérides, les habitans des pays où l'on peut eſpérer de voir une éclipſe; cela ne vaut guère la peine de chercher une exactitude plus grande que celle des lignes droites parallèles à l'orbite, ou des opérations graphiques dont je viens d'indiquer la méthode. Mais dans le cas où l'on voudroit même calculer ces diſtances exactement, je crois que la méthode indirecte que je propoſe, ſeroit encore la plus courte.

1955. Il en eſt à peu-près de même quand on cherche le point de la terre qui doit voir le contact des deux bords au lever du ſoleil, ou qui voit tout à la fois le commencement, le milieu & la fin de l'éclipſe au lever du ſoleil, en un ſeul inſtant & comme plus grande phaſe; le point B (*fig.* 120) ou le cercle de projection eſt coupé par la ligne AB du contact eſt bien un point où l'on voit le commencement de l'éclipſe au lever du ſoleil, mais il n'eſt pas exactement vrai que ce contact y ſoit la plus grande phaſe, & que ce ſoit le plus mé-

Fig. 120.

ridional de tous les lieux de la terre où l'on voit l'éclipſe ; il eſt néceſſaire d'y appliquer les mêmes opérations que pour les autres points des lignes de limites, & l'on trouvera, comme M. du Séjour, qu'à 19° 36′ 33″ de latitude auſtrale, le contact arrivera au lever du ſoleil a 6^h 6′ 48″ ſous une longitude de 346° 3′ 49″. Quant au point le plus méridional de tous ceux qui ont vu l'éclipſe, on trouve qu'à 20° 5′ 47″ de latitude, le contact eſt arrivé à 5^h 25′ du matin, dans un lieu plus occidental que Paris de 3^h 2′ ou 45° ½, c'eſt-à-dire qui eſt à 334° ½ de longitude. C'eſt le point marqué *B* dans la figure 123. On verra la différence qu'il y a entre ce point de la ligne de limite, & le point dont la projection eſt en *B* (*fig.* 120), ſi l'on calcule la longitude & la latitude de celui-ci. Si *CM* eſt de 39′ 24″ (1934), *AM* = 30′ 47″, *CA* = 8′ 37″, *CB* = 54′ 0″, on aura l'angle *ACB* = 80° 49′, ôtant l'angle *ACF* = 62° 19′ (1934) on a l'arc *FB* = 18° 30′; connoiſſant l'arc *FB*, on a la latitude du parallèle qui paſſe au point *B* du cercle de projection ; car ſin. latit. = ſin. *BF* coſ. déclin. (1943) ; cette latitude eſt de 18° 26′. Pour trouver la longitude de ce point-là, on cherchera l'angle au pole, ou l'arc ſemi-diurne, dont le coſinus = tang. déc. tang. lat. = 88° 23′ ; on cherchera auſſi *AB* qui réduit en temps de l'orbite donnera 1^h 57′ 3″, ainſi la lune étoit en *B* a 8^h 25′ 38″ ; l'angle horaire pour Paris étoit donc 53° 35′ ½ ; il ſurpaſſe celui du lieu *B* de 34° 47′ ½, & puiſque ce ſont des angles du matin, le point *B* eſt plus occidental que Paris, & ſa longitude eſt 345° 12′ ½. Cette longitude eſt moindre de 52′ que celle qu'on a trouvé en calculant rigoureuſement le point qui doit voir le contact pour plus grande phaſe, & au lever du ſoleil.

Fig. 120.

1956. Le point de la plus petite phaſe eſt un autre cas aſſez ſimple, du problême des phaſes : nous avons vu qu'au midi il y a une ſuite de points où ſe voit le contact du bord auſtral de la lune avec le bord boréal du ſoleil ; mais l'attouchement du bord boréal

Fig. 118. de la lune, n'avoit point lieu en 1764; la plus proche diſtance des centres n'a pû être plus grande pour les pays ſeptentrionaux que la ligne MH (*fig.* 118), différence entre le rayon de la projection & la plus courte diſtance. Le pays dont le parallèle touche le cercle de projection en H, & qui voit le milieu de l'éclipſe au coucher du ſoleil, voit auſſi exactement la plus petite diſtance poſſible pour ce point-là, puiſque ſon mouvement eſt parallèle à l'orbite de la lune, & la plus petite phaſe qui ſoit poſſible du côté du nord, ſur la ſurface de la terre. Pour trouver la poſition géographique du point M, je ſuppoſe l'angle $PCM = 28° 44'$, eſt $HE = 62° 19'$, le ſinus de cet arc multiplié par le coſinus de la déclinaiſon donne le ſinus de la latitude du point de la terre, dont le parallèle touche en H le cercle de projection, & il ſe trouve de $61° 56'$. L'arc ſemi-diurne ſous cette latitude eſt $99° 5'$; la lune étant en M à $10^h 22' 41''$, l'angle horaire pour Paris, n'eſt que de $24° 20'$, ainſi le lieu cherché eſt de $74° 45'$ à l'occident de Paris; c'eſt-à-dire, à $305° 15'$ de longitude; c'eſt le point boréal de la terre qui voit la plus petite phaſe poſſible; la plus grande diſtance des centres y eſt de $14' 36''$, ou de 5 doigts & demi, c'eſt-à-dire, égale à MH, au coucher du ſoleil. C'eſt donc ſous le parallèle de $61° 56'$ à l'endroit marqué *A* dans la carte de l'éclipſe, Planche XIV, que doivent ſe terminer toutes les lignes des phaſes qui ne diminuent pas au-delà de 6 doigts & un quart. Ce pays eſt dans la terre de Labrador, à l'orient de la Baie d'Hudſon, pour l'éclipſe de 1764.

1957. Après avoir indiqué la manière de tracer la ligne des phaſes ſur la terre par longitudes & latitudes, nous allons parler des *courbes d'illumination* qui marquent les limites de tous les pays où peut s'obſerver une éclipſe.

Milieu de l'éclipſe au lever du ſoleil. TROUVER *les lieux où le milieu de l'éclipſe arrive au lever du ſoleil.* Le point $9^h 1' 9''$ de l'orbite lunaire coupe le cercle de projection ſur la droite vers l'endroit où

ce cercle eſt touché par l'ellipſe ou le parallèle de 18° 5′ de latitude, or le ſoleil ayant 4° 48′ 50″ de déclinaiſon ſe leve à 5^h 53′ 45″ ſous cette latitude, ſon arc ſemi-diurne étant de 6^h 6′ 15″; ainſi le point qui ſe trouvera ſur le bord du cercle à 9^h 1′ 9″ de Paris, comptera 5^h 53′ 45″; la différence eſt 3^h 7′ 24″ dont il comptera moins que Paris, ou dont il ſera plus occidental que Paris; 3^h 7′ font 46° 51′, donc ſa longitude ſera 333° 9′ comptée du premier méridien; c'eſt le réſultat du calcul de M. du Séjour, (*Mém. acad.* 1766, *pag.* 258). Ce point eſt entre les Iſles du Cap-Verd, & celles de l'Amérique, & c'eſt-là le premier endroit de la terre où l'on a commencé de voir l'éclipſe centrale au lever du ſoleil; il eſt marqué *C* dans la carte, Planche XIV.

1958. On obſervera que le point d'interſection *B* (*fig.* 122) de l'orbite avec le cercle de projection, n'eſt pas à 18° de l'équateur ou du point *A*; mais qu'il eſt le point où le parallèle de 18° coupe le plan de projection; il repréſente le point de la terre dont nous avons donné le calcul (1944); ce point *B* eſt celui où l'arc diurne eſt ſéparé de l'arc nocturne par le plan d'illumination perpendiculaire au rayon du ſoleil. Les diviſions marquées 10°, 20°, &c. ſur le cercle *A P* ne ſont pas des arcs de 10° & de 20° pris ſur ce cercle; mais les points où il rencontre les parallèles qui ſont à 10° & à 20° de l'équateur; auſſi le ſommet *R* de ce cercle au lieu d'être marqué de 90°, répond à 85° 11′ complément de la déclinaiſon du ſoleil, parce qu'il eſt touché par le parallèle de 85° 11′ qui eſt tout entier au-deſſus du cercle d'illumination & du cercle de projection; mais on n'a pu le repréſenter dans la figure, à cauſe de ſon extrême petiteſſe. *Fig.* 122.

1959. Du côté de l'orient l'orbite doit couper le cercle de projection, à 11^h 43′ 23″, à l'endroit où il eſt touché par le parallèle de 75° 7′ 22″ de latitude; il eſt aiſé d'en conclure la longitude de ce point ou du pays qui le dernier de tous a vu l'éclipſe centrale, ou

Fig. 122. qui l'a vue au coucher du ſoleil. Cette longitude eſt de 132° 25′; ce point eſt ſitué au nord de la Chine, & il eſt marqué *D* dans la carte de l'éclipſe, Planche XIV. On a vu ci-devant la manière de trouver rigoureuſement par la trigonométrie la ſuite des points de l'éclipſe centrale (1936). M. du Séjour, a réſolu ce problême & un grand nombre d'autres par ſes méthodes analytiques, de la manière la plus exacte & la plus générale (*Mém. acad.* 1766, *pag.* 187 & ſuiv.).

1960. La courbe du milieu de l'éclipſe au lever
Fig. 123. ou au coucher du ſoleil, où *BCADM* (*fig.* 123), ne peut ſe trouver par un procédé auſſi ſimple; celle qui eſt marquée de *B* en *H* ſur la Planche XIV, n'eſt pas la ſuite des points qui ſe levent ou qui voient le ſoleil quand la lune eſt au milieu *M* de ſon orbite (*fig.* 122), dans le moment du milieu de l'éclipſe générale, c'eſt la ſuite des points qui voient au lever du ſoleil la plus grande phaſe qu'ils aient à voir; c'eſt pourquoi toutes les courbes des phaſes de trois doigts, de ſix doigts, &c. ſe terminent ſur cette ligne *BCADM* (*fig.* 123), où elles marquent les points de la terre qui voient la plus grande phaſe de trois doigts au lever du ſoleil, de ſix doigts au lever, &c.

Pour trouver ſur un parallèle quelconque le point où paſſe cette courbe du milieu de l'éclipſe au lever du ſoleil; il faut pour chaque ligne des phaſes trouver comme dans les articles 1950, 1954, un point de l'orbite & un point de l'ellipſe éloignés de la quantité d'une phaſe quelconque, & tels que pendant quelques minutes, la lune ſoit à la même diſtance du parallèle terreſtre conſidéré vers l'endroit où il touche le cercle de projection, & où par conſéquent arrive le lever ou le coucher du ſoleil. On trouvera de même ci-après la table des pays qui doivent avoir le milieu de l'éclipſe au lever ou au coucher du ſoleil; M. du Séjour, a traité cette matière analytiquement dans les *Mémoires de* 1765, *pag.* 322.

1961. On a coutume de tracer auſſi ſur la carte

géographique d'une éclipſe la courbe de tous le pays où l'éclipſe commence & finit, ſoit au lever, ſoit au coucher du ſoleil, on la voit dans la Planche XIV, ſous la forme d'un huit de chiffre, dont le nœud eſt près du pole, & qui s'étend depuis la Tartarie juſqu'au Bréſil. Commencement au lever du ſoleil.

Pour tracer cette courbe, on cherche ſucceſſivement les points où elle coupe les divers parallèles de la terre : on choiſit un parallèle quelconque, par exemple, l'équateur qui paſſe au point *A* du cercle de projection (*fig.* 122); on prend une ouverture de compas égale à la ſomme des demi-diamètres du ſoleil & de la lune, & mettant l'une des pointes en *A*, on fait avec l'autre une interſection ſur l'orbite de la lune, qui tombe en *R* à $7^h\ 37'\frac{1}{2}$, l'arc ſemi-diurne eſt de $6^h\ 0'$; car on néglige ici l'effet des réfractions, ainſi le point *A* de la terre compte $6^h\ 0'$ du matin, tandis qu'il eſt $7^h\ 37'\frac{1}{2}$ à Paris; donc ce lieu eſt $1^h\ 37'\frac{1}{2}$ à l'orient de Paris, c'eſt-à-dire, que ſa longitude eſt de $355°\ 37'\frac{1}{2}$. Cette opération eſt exacte & n'exige point de tâtonnement : il eſt sûr que ce point *A* verra les deux bords du ſoleil & de la lune ſe toucher au lever du ſoleil; il pourra voir enſuite une plus grande éclipſe, mais cela n'intéreſſe pas la queſtion préſente. Si l'on fait l'interſection à gauche avec la même ouverture de compas, elle doit tomber ſur $9^h\ 39'\frac{1}{3}$, c'eſt l'heure qu'il étoit à Paris, lorſque la lune étoit dans ce point de ſon orbite; mais il étoit $6^h\ 0'$ du matin pour le point de l'équateur qui ſe levoit en *A*, donc ce point eſt à $3^h\ 39'\frac{1}{3}$ à l'occident de Paris, ou à $325°\ 10'$ de longitude, peu éloigné de Cayenne; M. du Séjour trouve $325°\ 14'\ 0''$ de longitude. *Fig.* 122.

1962. On trouvera de même ſous les autres parallèles, à l'occident de la projection la longitude des lieux qui verront le commencement & la fin de l'éclipſe au lever du ſoleil, on en trouvera ci-après une table exacte, calculée par M. du Séjour. En faiſant la même choſe ſur le bord oriental du cercle de projection ſous

chaque parallèle, on trouvera les longitudes des lieux qui doivent avoir le commencement ou la fin de l'éclipſe au coucher du ſoleil; le commencement en prenant les interſections à droite ſur l'orbite lunaire, la fin en les faiſant ſur la partie gauche ou ſur l'extrémité orientale de l'orbite.

1963. Quand tous ces points du commencement & de la fin de l'éclipſe au lever & au coucher du ſoleil ſont rapportés ſur un globe, ou ſur une carte géographique, il en réſulte une courbe ſingulière qui reſſemble quelquefois à un huit de chiffre, quelquefois auſſi elle ne contient qu'un ſeul ovale, ou deux ovales ſéparés; M. du Séjour donnera toutes les propriétés géométriques & aſtronomiques de ces courbes, les points de croix, d'infléxion, de rebrouſſement, les points iſolés, &c. dans les *Mémoires* de 1769, comme il l'a annoncé dans ceux de 1768, *pag.* 187 & 188. Celle que l'on voit dans la carte, Planche XIV, (*fig.* 123) a vers le point *K* au-deſſus du pole arctique, un nœud ou interſection formée par un point triple, à l'endroit de la terre, où le ſoleil ne fait que ſe coucher un inſtant à minuit, ou raſe l'horizon, ce qui arrive ſous le parallèle de 85° 11′ complément de la déclinaiſon du ſoleil ce jour-là. Pour avoir la longitude de ce méridien, M. de la Caille (art. 1177), ſuppoſe qu'il faut prendre le point *M* (*fig.* 122), où la perpendiculaire coupe l'orbite de la lune, il eſt marqué 10^h 22′ 41″, c'eſt-à-dire, ſelon cet Auteur, le lieu qui avoit midi quand la lune étoit en *M*; or il comptoit 1^h 37′ 19″ de moins que Paris, il étoit donc de 24° $\frac{1}{3}$ plus oriental, c'eſt-à-dire, qu'il avoit 44° $\frac{1}{3}$ de longitude. Mais obſervons que le point, qui en ſe couchant & ſe levant, à minuit au-delà du pole *P* voit le commencement de l'éclipſe, ne verra point la fin à ce même moment, à moins que toute l'éclipſe ne fût réduite à un ſimple contact pour ce point-là, ce qui forme un cas unique, & n'avoit pas lieu en 1764; de même la ligne *BCADM*, qui marque ſur le globe

Courbe ſingulière.

Planche XIV. Fig. 123.

le

le milieu au lever & au coucher du ſoleil, ne peut pas être coupée en un même point par les 2 lignes courbes, dont l'une marque le commencement au lever & au coucher du ſoleil, & l'autre la fin au lever & au coucher du ſoleil; celle du commencement au lever du ſoleil ſe termine & ſe joint à celle du commencement au coucher du ſoleil, lorſque la lune eſt vers le point $10^h\ 14'$ (*fig.* 122), éloignée du ſommet *R* de la projection de $30'\ 48''$, ou de la ſomme des demi-diamètres du ſoleil & de la lune; la ligne de la fin au lever ſe termine, & celle de la fin au coucher commence, lorſque la lune eſt vers $12^h\ 27'$, éloignée du point *R* vers l'orient de la ſomme des demi-diamètres; les deux premières ſe joignent au point *G* de la terre (*fig.* 124), & les deux dernières en un point *I*, beaucoup plus occidental. *Fig.* 122. *Fig.* 124.

1964. Pour déterminer ſur la terre ces deux points *G* & *I*, l'on remarquera d'abord qu'ils ſont ſur le parallèle de $85°\ 11'$ où le ſoleil ne fait que raſer l'horizon; mais ils ſont à des longitudes fort différentes. La lune étant au point de l'orbite marqué $10^h\ 14'\frac{1}{3}$ (*fig.* 122), on a $10^h\ 14'\frac{1}{3}$ à Paris, en comptant depuis minuit, & le point qui eſt en *R* comptant 0^h, il compte moins, il a moins de longitude, il eſt plus occidental de $10^h\ 14'\frac{1}{3}$ ou $153°\ 35'$, ſa longitude eſt donc de $226°\ 25'$. C'eſt le point *G* (*fig.* 124), qui eſt commun aux lignes du commencement au lever, & du commencement au coucher. On trouvera de même le point *I* où ſe réuniſſent les courbes de la fin au lever, & de la fin au coucher; car la lune étant au point de ſon orbite marque $12^h\ 25'$, eſt éloignée du point *R* de la ſomme des demi-diamètres, & le lieu de la terre qui pour lors eſt arrivé en *R*, comptant $12^h\ 25'$ de moins, a auſſi une longitude moindre de $186°\ \frac{1}{4}$; ſa longitude eſt donc de $193°\ 45'$; M. du Séjour trouve $193°\ 49'\frac{1}{2}$, comme on le verra dans la table. Sous le parallèle de $85°\ 11'$, il faut diſtinguer 3 points au lieu d'un ſeul qui eſt indiqué dans la figure de M. de la Caille.

Fig. 124. Le premier eſt à 226° 24′ de longitude, il voit le commencement au lever & au coucher du ſoleil ; le dernier eſt à 193° 49′, il voit la fin au lever & au coucher du ſoleil ; entre ces deux points eſt un lieu intermédiaire qui voit le milieu où la plus grande phaſe au lever & au coucher du ſoleil, il eſt marqué *H* dans la figure 124 ; c'eſt l'endroit où le parallèle de 85° 11′, eſt touché par la ligne du milieu, & ce point de contact ſépare le milieu au lever d'avec le milieu au coucher.

1965. Ce lieu de la terre qui doit voir le milieu de l'éclipſe au lever & au coucher du ſoleil, eſt auſſi ſur le parallèle dont la latitude eſt égale au complément de la déclinaiſon du ſoleil 85° 11′ ; ou ſuivant M. du Séjour, 85° 14′ ; c'eſt le lieu qui ſe trouve en *L* (*fig.* Fig. 120. 120), lorſque la lune eſt aux environs du point *N*, où aboutit la perpendiculaire *LN* ; cette ligne exprime à peu-près la plus grande phaſe ou la plus courte diſtance poſſible pour le point *L*, & c'eſt au moment du minuit qui joint le lever avec le coucher du ſoleil. Pour ſavoir à quelle heure la lune étoit en *N*, on employe les triangles ſemblables *CMT*, *LTN* dans leſquels on connoît $CT = 44' 56''$, $TM = 21' 36''$, $CL = 54' 0''$, & l'on fait cette proportion $CT : TM :: CL : NM$, que l'on trouve répondre à 57′ 0″ de temps ; ce temps ajouté avec celui du milieu de l'éclipſe générale en *M*, $10^h 22' 41''$, donne $11^h 19' 41''$ pour l'heure qu'il étoit à Paris, lorſque la lune étoit en *N* ; & comme l'on comptoit 0^h dans le lieu *L*, il s'enſuit qu'il étoit plus occidental que Paris, de $11^h 19' 41''$ ou de 169° 55′ $\frac{1}{2}$; ainſi ſa longitude étoit de 210° 4′ 30″.

1966. A parler exactement, ce n'eſt pas au point *N* que la diſtance *LN* eſt réellement la plus courte poſſible pour le point *L* ; mais comme le mouvement en *L* eſt toujours très-petit, & que l'inclinaiſon de l'orbite *TN*, par rapport à la tangente en *L* ne va jamais qu'à 29°, il n'y a pas d'erreur ſenſible ; je trouve, par exemple, que dans le cas où la déclinaiſon ſeroit de 10°, & l'inclinaiſon de 27°, la perpendiculaire *LM*

ne différeroit de la ligne de la plus grande phaſe que de 2°, parce que le mouvement ſur l'ellipſe étant 12 fois moindre que celui de la lune, il faut que le coſinus de l'angle que forme la ligne *L N* avec l'orbite, ſoit 12 fois moindre que le coſinus de l'angle formé par cette même ligne *L N* avec la tangente en *L*; or les deux angles étant aſſujettis à faire entr'eux 153°, qui eſt le ſupplément de 27°, il n'y a que des angles de 88° & de 65°, qui ayant leur ſomme égale à 153°, ayent auſſi leurs coſinus dans le rapport de 1 à 12.

On voit, par ce qui précède, combien le point du milieu de l'éclipſe au lever du ſoleil, eſt éloigné du point *M* qui, ſuivant M. de la Caille, marquoit ſur l'orbite la longitude du lieu où devoient ſe couper les lignes du commencement & de la fin de l'éclipſe au lever & au coucher du ſoleil.

1967. Ces courbes d'illumination que l'on voit dans la carte, (*fig.* 123) paroiſſent d'abord aſſez biſarres; mais quelques conſidérations ſur la nature du phénomene qu'elles repréſentent, feront ſentir les raiſons générales de leur ſituation & de leur contour. Les courbes du coucher ſont plus vers la droite, ou plus orientales que celles du lever, parce que les pays qui quittent déjà l'horizon, quand l'éclipſe commence ont plus de longitude & ſont plus orientaux que ceux qui y arrivent, ou qui ont le ſoleil levant. Les courbes du coucher ſont auſſi plus au nord que celle du lever, cela arrive en général dans les ſignes aſcendans, ſurtout quand la lune eſt en même-temps dans ſon nœud aſcendant; car alors elle va en ſe rapprochant du nord depuis le commencement juſqu'à la fin de l'éclipſe; le mouvement de l'ombre tend vers le nord, & les pays qui en ſe couchant ſont éclipſés ſur la gauche ou ſur la partie orientale *RU* de la figure 122, ſont plus au nord que ceux qui ont vu l'éclipſe en ſe levant dans la partie droite *G A B T*. *Fig.* 123.

Le pays ſitué en *B*, qui eſt à peu-près le plus méridional de tous ceux qui peuvent voir l'éclipſe au ſoleil

Fig. 123. levant ne voit qu'un contact, ou un inſtant d'éclipſe, & ce pays voit tout à la fois le commencement, le milieu & la fin ; ainſi les trois courbes commencent en un point *B*, qui eſt à l'occident de la figure, parce que la lune arrivant par l'occident, les pays les plus occidentaux ſont ceux qui voient l'éclipſe les premiers.

Dans des pays un peu plus ſeptentrionaux, la lune étant un peu plus baſſe, il y a un peu plus de parallaxe, la lune mord davantage ſur le ſoleil, l'éclipſe y dure plus long-temps, il ſe paſſe plus de temps entre le commencement & la fin ; il y a donc plus d'eſpace entre le lieu *E* qui ſe leve quand l'éclipſe commence, & le lieu *F* qui ſe leve quand l'éclipſe finit ; voila pourquoi la courbe s'élargit & ſe renfle en *E* & en *F* ; mais le point *E* qui ſe leve ou qui arrive ſur le cercle terminateur, parallèle au plan de projection, quand l'éclipſe commence, eſt plus occidental que celui qui ſe leve quand l'éclipſe finit, & la diſtance de ces deux points, où la largeur de la courbe répond à la plus grande durée de l'éclipſe, & à la petiteſſe des degrés de longitude qui fait que la courbe occupe moins d'eſpace ; la plus grande largeur en longitude eſt à 18° 5′ 24″ de latit. comme on le verra dans la table, *pag.* 554. En arrivant au parallèle de 85° 11′, le ſoleil ne ſe couche qu'un inſtant, donc les trois points qui ſéparent la partie droite & la partie gauche de chaque courbe ; c'eſt-à-dire, où l'on voit le commencement, le milieu, ou la fin de l'éclipſe, au lever & tout à la fois au coucher du ſoleil doivent être ſur ce cercle-là ; & les courbes qui marquent la ſuite de ces points doivent toucher ſa circonférence, voila pourquoi les 3 courbes ſe rapprochent & ſe terminent ſur ce parallèle, vers le nord, en 3 points, dont l'un *G* eſt commun aux courbes du lever & du coucher au commencement, le ſecond *H* appartient aux courbes du milieu de l'éclipſe au lever & au coucher, le troiſième *I* eſt celui du lever & du coucher à la fin de l'éclipſe, à 193° 49′ de longitude.

Trois points de contact.

1968. Les deux courbes du milieu de l'éclipſe ne doivent pas ſe rencontrer au même point que celles du commencement & de la fin; car les pays qui ont 85° 11′ de latitude arrivant l'un après l'autre au nord de la projection, dans le point *R* du ſommet (*fig.* 122); *Fig.* 122. celui qui y arrive quand l'éclipſe commence à moins de longitude que celui qui y arrive quand elle eſt à ſon milieu, & la différence eſt proportionnelle au nombre de degrés qui répondent à la demi-durée de l'éclipſe, pour les pays les plus ſeptentrionaux de tous, où la lune ne paroîtra qu'à $14\frac{1}{2}$ minutes du ſoleil (1956).

La courbe de la fin au lever, coupe celle du commencement au coucher, en un point *K* très-voiſin du parallèle de 85° 11′, parce que le pays qui après avoir vu l'éclipſe commencer au coucher du ſoleil, la voit finir le lendemain matin au lever du ſoleil, a néceſſairement une nuit fort courte; il eſt par conſéquent ſitué à une latitude fort grande, & fort peu éloignée de celle où le ſoleil ne ſe couche point, il eſt à 169° 47′ 38″ de longitude. Il y a encore deux autres points d'interſection, enſorte qu'on doit conſidérer ſix points, là où les figures ordinaires ſemblent n'en indiquer qu'un ſeul. Mais pour qu'on apperçoive diſtinctement tous ces points d'attouchement & d'interſection qui étoient confondus en un ſeul point, dans les figures de M. de la Caille, je les ai repréſentés ſéparément ſur le côté de la Planche XIV. Le cercle *GHI* eſt le parallèle de 85° 11′, où le ſoleil ne fait que raſer l'horizon le jour de l'éclipſe; les points *G*, *H*, *I* ſont les points où ce cercle eſt touché par les courbes du commencement, du milieu & de la fin; le point *R* eſt celui qui voit le commencement au coucher, & enſuite le milieu au lever du ſoleil; le point *S* eſt celui qui voit le milieu au coucher, & enſuite la fin au lever; le point *K* eſt celui qui voit le commencement au coucher, & enſuite la fin au lever du ſoleil, il eſt à 85° 3′ 28″ de latitude, & à 210° 12′ de longitude; au reſte la différence de ces points, quoiqu'elle faſſe plus de 30° en longi-

tude, n'occupe pas ſur la figure un eſpace ſenſible.

Si la déclinaiſon du ſoleil étoit auſtrale, ce ſeroit à la partie ſupérieure du parallèle de 85°, & non pas à la partie inférieure, que ſe feroient les contacts *G*, *H*, *I*, des trois courbes, & la ligne du commencement au lever, couperoit celle de la fin au coucher, de la même manière que celle du commencement au coucher, coupe la courbe de la fin au lever du ſoleil.

L'heure où arrive chaque phaſe, ſe trouve naturellement par les calculs que nous avons indiqués, ainſi il eſt facile de tirer ſur la figure de l'éclipſe, la courbe qui marque tous les pays où chaque phaſe paroîtra à ſix heures du matin, comme on le voit ſur la gauche dans la figure 123, & ainſi de toutes les autres heures, juſqu'à celles du ſoir qui ſont ſur la droite de la figure; mais il faut obſerver que ces lignes des heures ne ſe rapportent pas aux lignes du commencement & de la fin de l'éclipſe, mais ſeulement à celles du milieu ou des plus grandes phaſes. On pourroit marquer les heures ſur les lignes du commencement & de la fin, puiſque ce ſont les arcs ſemi-diurnes de chaque latitude qui indiquent l'heure du lever & du coucher du ſoleil.

1969. Les opérations graphiques, aidées de quelques calculs aſſez ſimples peuvent ſuffire pour trouver les courbes d'illumination, celles des différentes phaſes, & les principales affections des ſix courbes, qu'aucun Auteur d'aſtronomie n'avoit encore expliquées: il y auroit de plus grands détails à donner ſur cet article, s'il ne falloit mettre des bornes à cet ouvrage. Mais pour donner un modele des calculs que l'on peut faire dans ces cas-là, pour mettre dans l'exemple que j'ai choiſi toute l'exactitude poſſible, & pour qu'on voie préciſément à quels points de la figure 123, doivent paſſer toutes les courbes des phaſes qui y ſont repréſentées, je vais donner une table de tous ces points, par longitudes & latitudes, calculée avec ſoin par les formules rigoureuſes de M. du Séjour, qui ſont dans les mémoires de 1765 & 1767. C'eſt M. du Vaucel, déja connu par

divers mémoires d'aſtronomie, qui a bien voulu ſe charger de calculer les courbes des phaſes, & de placer ces courbes ſur une projection ortographique d'une partie du globe, où la partie géographique a été dirigée par M. Buache, premier Géographe du Roi. Les tables de l'éclipſe centrale & annulaire, avoient été calculées par M. du Séjour, (*Mém. acad.* 1766, *p.* 258, 1767, *p.* 192), de même que la limite de l'éclipſe du côté du midi, (*Mém.* 1768, *pag.* 95), & une partie de la courbe du commencement & de la fin; on trouvera dans les mémoires de 1769, lorſqu'ils paroîtront, la théorie de cette courbe d'illumination (1967).

TABLES DES PAYS DE LA TERRE où l'on a vu les différentes phaſes de l'éclipſe du 1 Avril 1764.

ECLIPSE CENTRALE.

Heures dans chaque lieu.				Longitude en ſupp. celle de Paris 20°.			Latit. géog. ſeptentrionale.		
5h	53′	45″	Lever	333°	8′	30″	18°	5′	24″
6	0	0	du Soleil.	334	41	30	18	14	7
7	0	0	. . . . .	348	2	15	21	7	58
8	0	0	. . . . .	358	44	45	26	38	4
9	0	0	. . . . .	7	17	30	34	26	55
9	21	12	. . . . .	9	57	22	37	38	11
9	30	0	. . . . .	11	2	15	39	0	20
10	0	0	. . . . .	14	44	0	43	48	22
10	30	0	. . . . .	18	34	0	48	38	54
10	31	16	Latitude	18	43	55	48	51	0
11	0	0	de Paris.	22	43	30	53	20	1
11	30	0	. . . . .	27	20	30	57	40	19
Midi			. . . . .	32	28	0	61	31	26
1	0	0	. . . . .	44	6	30	67	34	14
2	0	0	. . . . .	57	5	15	71	36	19
3	0	0	. . . . .	70	52	0	74	7	20
4	0	0	. . . . .	85	6	15	75	33	41
5	0	0	. . . . .	99	36	45	76	11	52
5	25	12	Maximum	105	45	45	76	15	26
6	0	0	de Latitude.	114	18	15	76	8	42
7	0	0	. . . . .	129	9	45	75	23	31
7	13	4	Au coucher du Soleil.	132	25	15	75	7	22

Eclipse annulaire, ou contact intérieur des bords du Soleil & de la Lune, en ſuppoſant l'inflexion de $4''\frac{1}{2}$, & le diamètre de la Lune augmenté à raiſon de ſa hauteur.

Au midi du Soleil.						Au nord du Soleil.					
Latitude.		Longitude.			Heure dans le lieu de l'obſerv.	Latitude.		Longitude.			Heure pour le lieu de l'obſerv.
38°	0′	7°	26′	29″	9h 9′ 7″	36°	0′	11°	17′	0″	9h 24′ 19″
40	0	9	3	15	9 21 59	40	0	14	25	15	9 49 58
42	0	10	36	32	9 34 31	42	0	15	57	45	10 2 34
44	0	12	7	47	9 46 48	44	0	17	31	29	10 15 8
45	0	12	53	8	9 52 53	45	0	18	19	5	10 21 26
46	0	13	38	31	9 58 57	46	0	19	7	15	10 27 44
47	0	14	24	11	10 5 0	47	0	19	56	30	10 34 5
48	0	15	10	30	10 11 2	48	0	20	47	40	10 40 29
48	30	15	33	53	10 14 3	48	30	21	13	50	10 43 43
49	0	15	57	25	10 17 4	49	0	21	40	20	10 46 58
50	0	16	45	0	10 23 8	50	0	22	34	30	10 53 31
51	0	17	33	40	10 29 13	52	0	24	28	50	11 6 53
52	0	18	23	55	10 35 22	56	0	28	50	20	11 35 24
54	0	20	9	25	10 47 50	60	0	34	14	40	12 7 34

Limite de l'Eclipſe, ou table des lieux où l'on a dû obſerver le contact extérieur des limbes au nord du Soleil, calculée pour les différentes valeurs de l'angle que fait la ligne de la plus grande phaſe, avec la perpendiculaire à l'orbite relative (1949) Mém. de l'acad. 1768, pag. 172.

Angle ſuppoſé.	Longitude.			Latitude vraie.			Heure dans chaque lieu.			
0°	334°	31′	0″	20°	5′	47″ Méridion.	5h	25′	12″	Matin.
Lev. du Soleil.	346	3	49	19	36	33	6	6	48	
4	352	39	25	18	51	52	6	30	36	
8	5	32	0	16	0	3	7	24	45	
12	15	50	53	12	0	38	8	12	21	
16	24	20	15	6	57	15	8	57	36	
20	32	10	30	0	15	25	9	47	3	
22	36	32	16	4	36	49 Septentrion.	10	20	2	
23	39	38	2	8	32	30	10	46	22	
23	45	56	10	16	56	53	11	46	6	
22	48	47	37	20	24	48	0	13	40	Soir.
20	51	29	30	24	22	34	0	48	53	
16	58	44	2	29	25	44	1	42	24	
12	65	17	20	33	2	50	2	30	57	
8	73	4	27	35	51	40	3	21	21	
4	82	40	7	37	52	24	4	17	46	
0	96	47	30	38	42	52	5	25	12	
.....	108	13	12	38	10	43	6	15	0	

Courbe


Fin au Lever.
Commencement au Coucher.
K
Milieu au Lever.
R
S
Milieu au Coucher.
H
G
I
Commencement au Lever.
Fin au Coucher.
Parallele de 86°. 11'.
Pole

Fig. 124.

Digitized by Google

Courbe du milieu de l'éclipse.

Latitude vraie.				Milieu au lever. Longitude.			Milieu au coucher. Longitude.		
D.	M.	S.		D.	M.	S.	D.	M.	S.
19	30		Mérid.	346	9	13			
19	0			345	50	52			
15	0			345	4	30			
10	0			343	47	45			
5	0			342	18	30			
0	0			340	40	15			
10			Septent.	336	47	45			
20				332	13	20			
30				326	58	25			
38	42	52		. . . . .			96	47	30
40				320	3	20	108	33	25
48	50			315	13	10	111	28	50
60				306	38	25	117	6	20
70				296	28	40	125	22	20
80				276	8	45	144	49	45
84	11	10		246	53	20	173	33	10
84	41	10		237	44	55	182	40	5
85	11	10		219	7	5	201	17	15
85	11	43		218	21	7½	202	0	7½
85	14	23		210	13	0″	210	13	0″

Le dernier point de chaque colonne eſt commun à la courbe du commencement au coucher, & de la fin au lever du ☉, comme on le voit à la page ſuivante.

Éclipse de 3 doigts au nord du ☉.

Heures.		Longitude.			Latitude vraie.			
7h	Matin.	358°	1′	45″	8°	41′	13″	Mérid.
8		10	53	0	4	9	15	
9		21	29	0	2	29	20	Septent.
10		29	50	45	10	46	38	
11		36	42	30	19	31	10	
Midi.		43	11	15	27	35	48	
1	Soir.	51	20	45	34	20	10	
2		59	30	0	39	41	0	
3		68	7	0	43	34	46	
4		79	49	30	46	5	41	
5		92	16	45	47	16	16	
6		106	30	45	47	7	9	

Éclipse de 6 doigts au nord du ☉.

Heures.		Longitude.			Latitude			
7h	Matin.	354°	34′	0″	0°	43′	11″	Septen.
8		7	39	0	5	26	15	
9		17	13	11	12	15	19	
10		25	21	15	20	7	5	
11		32	2	30	29	18	33	
Midi.		39	22	15	37	22	38	
1	Soir.	47	23	0	44	7	41	
2		57	9	30	49	24	51	
3		68	22	30	53	2	4	
4		80	39	0	55	22	28	
5		93	52	45	56	27	11	
6		107	52	15	56	19	6	

Éclipse de 9 doigts au nord du ☉.

Heures.		Longitude.			Latitude.			
6h	Matin.	338°	11′	15″	8°	25′	59″	Septen.
7		352	4	45	11	2	6	
8		2	56	0	16	0	13	
9		12	29	0	23	8	28	
10		19	42	45	31	44	52	
11		27	5	45	40	41	46	
Midi.		35	20	30	48	51	36	
1	Soir.	45	9	15	55	26	36	
2		56	31	45	60	15	36	
3		69	7	45	63	33	31	
4		82	19	30	65	33	35	
5		96	25	30	66	28	21	
6		111	21	15	66	25	1	

Éclipse de 9 doigts au midi du ☉.

Heures.	Longitude.	Latitude.
6h Matin.	329°35′45″	30°22′38″ Septen.
7	342 20 0	33 51 10
8	352 15 30	40 34 35
9	0 9 30	50 25 47
10	7 40 0	62 43 30
11	17 26 0	74 59 13
Midi.	29 10 0	82 55 15
1 Soir.	44 45 0	86 2 0
2	59 33 30	87 13 59
3	74 36 15	87 47 0
4	89 35 30	88 3 22
5	104 22 15	88 10 51
6	119 19 15	88 9 30

Éclipse de 7 doigts au midi du ☉.

Heures.	Longitude.	Latitude.
6h 0 Matin.	322°53′ 0″	44°31′ 5″ Septen.
7 0	334 32 0	49 53 23
7 52	340 7 45	62 39 38
7 52	337 14 45	68 56 8
7 0	322 3 30	75 57 59
6 0	360 0 45	77 47 9

Commencement & fin de l'éclipse, au lever ou au coucher du Soleil.

Latitude vraie.				Commen. au Lever.			Commen. au Coucher.			Fin de l'écl. au lev. du Soleil.			Fin au Couc.			
D.	M.	S.		D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.	
19	36	12	Mérid.	.	.	.	.	.	.	348	37	13	.	.	.	Sommet *B*.,
19	34	23		346	3	48	.	.	.	.	.	.	.	.	.	(1)
19	30			347	13	58	.	.	.	343	26	28				
19	0			348	43	20	.	.	.	341	46	20	.	.	.	
15	0	0		353	6	45	.	.	.	335	48	45				
10	0	0		355	4	59	.	.	.	331	31	59				
5	0	0		355	49	30	.	.	.	328	4	30				
1	1	54		355	39	39	.	.	.	.	.	.	.	.	.	(2)
0	0	0		355	33	30	.	.	.	325	14	0				
10	0	0	Septen.	353	15	31	.	.	.	320	8	1				
18	5	24		349	59	13	.	.	.	316	18	13	.	.	.	Plus grande largeur.
20	0	0		349	2	12	.	.	.	315	23	22				
30	0	0		342	43	54	.	.	.	309	52	24				
38	10	15		.	.	.	108	48	16	.	.	.	.	.	.	Sommet *M*.
38	12	2		.	.	.	.	.	.	.	.	.	108	13	12	(3)
40	0	0		334	42	50	112	34	10	303	23	50	101	32	10	
48	50			330	31	25	124	19	50	300	2	55	99	33	20	
50	0	0		329	34	32	125	12	43	299	20	32	99	34	13	
56	17	21		.	.	.	.	.	.	.	.	.	100	39	17	(4)
60	0	0		321	29	10	132	58	35	291	48	38	101	41	5	
60	53	52		320	42	2	.	.	.	291	2	2	.	.	.	Plus petite largeur.
70	0	0		311	27	55	142	9	35	281	23	25	108	41	35	
75	7	22		.	.	.	149	16	3	.	.	.	115	35	3	Plus grande largeur.
80	0	0		291	46	31	161	11	44	260	26	31	127	42	14	
84	41	10		253	25	25	199	5	5	221	38	25	166	5	50	
85	0	23		244	40	40	208	14	5	212	11	50	175	21	35	
85	3	28		.	.	.	210	12	22	210	12	22	.	.	.	Intersection *K*.
85	7	10		239	50	5	213	14	40	207	7	35	180	25	10	
85	9	10		237	42	10	215	12	5	205	8	40	182	24	5	
85	11	43		.	.	.	218	21	7	202	0	7	.	.	.	(5)
85	14	27		226	23	59	226	23	59	193	49	30	193	49	30	Sommets *G* & *I*.

(1) Point de paſſage de la portion du commencement à celle de la fin; la durée de l'éclipſe a été inſtantanée pour ce point de la terre; il eſt le plus auſtral de tous ceux qui ont vu le commencement au lever du Soleil. C'eſt auſſi l'extrémité de la courbe du milieu au lever du Soleil.

(2) Lieu qui a vu le premier contact extérieur viſible ſur la terre.

(3) Point du paſſage de la portion de la courbe appartenante au commencement de l'éclipſe, à celle qui appartient à la fin. La durée de l'éclipſe a été inſtantanée pour ce point particulier de la terre; il eſt le moins boréal de tous ceux qui ont vu la fin au coucher du Soleil.

(4) Lieu qui a vu le dernier contact extérieur des limbes viſible ſur la terre.

(5) Ces deux points ſont les interſections avec le milieu au coucher & le milieu au lever du Soleil.

TROUVER LA DIFFÉRENCE DES MÉRIDIENS ou la différence de longitude, au moyen d'une éclipſe de ſoleil, ou d'une éclipſe d'étoile par la lune.

1970. LA MÉTHODE la plus exacte que nous ayons pour connoître les longitudes géographiques (47), ou les différences des méridiens (51, 54), eſt certainement celle des éclipſes de ſoleil ou d'étoiles; le ſeul inconvénient de cette méthode eſt la longueur des calculs qu'elle exige, mais cela n'empêche pas que nous n'en faſſions un uſage continuel; & je vais l'expliquer avec ſoin pour mettre tout le monde à portée de l'employer, & procurer, s'il eſt poſſible, à la géographie & à l'aſtronomie plus de ſecours qu'elle n'en a trouvé juſqu'à préſent, dans cette partie des obſervations.

1971. Lorſqu'on a obſervé le commencement & la fin d'une éclipſe de ſoleil, l'immerſion & l'émerſion d'une étoile cachée par la lune, ou celle d'une planète, il faut en déduire le temps de la conjonction vraie; & quand on a le temps de la même conjonction pour chacun des deux pays, la différence des temps eſt évidemment celle des méridiens, (*Képler, aſtron. pars opt.* 393. *Expoſ. du calc. aſtron. pag.* 150. *Mém. préſentés, tom. I, pag.* 539). Cette méthode eſt la plus directe, la plus élégante & la plus sûre dont on puiſſe faire uſage, & je ne penſe pas même qu'on en doive employer d'autre. Je choiſis, pour exemple, le calcul d'une éclipſe d'étoile, comme renfermant quelques conſidérations de plus que celui d'une éclipſe de ſoleil; mais j'y ajouterai toujours les modifications qu'exigent les éclipſes de ſoleil.

1972. Soit *S* (*fig.* 121), le ſoleil ou l'étoile, qui ſont éclipſés, *L* la ſituation apparente du centre de la lune, par rapport au ſoleil au commencement de l'éclipſe; *F* le lieu apparent du centre de la lune au moment *Fig.* 121.

Fig. 121. de l'émerſion ; *LF* le mouvement apparent de la lune, par rapport au ſoleil dans l'intervalle de la durée de l'éclipſe ; *GHI* un arc de l'écliptique, *DSE* un parallèle à l'écliptique paſſant par le centre du ſoleil ou de l'étoile ; ſi *FA* eſt parallèle à *DE*, l'on aura le mouvement apparent en latitude *AL*, & le mouvement relatif apparent en longitude *FA* ſur un arc de grand cercle ; cet arc ſe confond ſenſiblement avec le parallèle à l'écliptique, mais il eſt plus petit de quelques ſecondes que l'arc *GI* de l'écliptique ; & c'eſt la première choſe qu'il s'agit de trouver.

1973. On connoît par les tables l'heure de la conjonction vraie, calculée, de même que les longitudes & les latitudes vraies de la lune, & de l'aſtre éclipſé au commencement & à la fin de l'éclipſe ; on calcule pour les mêmes inſtans la différence des parallaxes en longitude & en latitude, par les méthodes qui ont été détaillées (1665 & ſuiv. 1922) ; on ajoute chaque parallaxe à la longitude vraie, ou bien on la retranche ſuivant les cas que nous avons expliqués (1676), & l'on a les longitudes apparentes ou affectées de la parallaxe, dont la différence eſt le mouvement apparent de la lune ſur l'écliptique ; on en retranche le mouvement du ſoleil, ou de l'aſtre éclipſé ; s'il eſt rétrograde on les ajoute, & l'on a la valeur de *GI* mouvement relatif apparent ſur l'écliptique.

On applique de même la différence des parallaxes en latitude pour chacun des deux inſtans, à la latitude vraie de la lune calculée par les tables (ou à ſa diſtance au pole boréal de l'écliptique), & l'on a les latitudes apparentes *IL*, *GF*, au commencement & à la fin de l'éclipſe ; la différence de ces latitudes apparentes ou leur ſomme, ſi l'une étoit auſtrale & l'autre boréale, eſt le mouvement apparent de la lune en latitude ; on en ôte le mouvement en latitude de l'aſtre éclipſé, ſi ſa latitude change dans le même ſens que celle de la lune, & l'on a la valeur de *AL* ; on multiplie la différence des longitudes apparentes, c'eſt-à-

dire, GI, par le cosinus de la latitude apparente qui tient le milieu entre les latitudes IL & GF (892), & l'on a la valeur du mouvement FA mesuré dans la région de l'éclipse; il est plus petit que le mouvement sur l'écliptique; j'ai donné une table de la différence, dans la *Connoissance des mouvemens célestes*, pour 1764, *pag.* 118. *Fig.* 121.

1974. Dans le triangle FAL rectangle en A, l'on connoît les deux côtés FA & AL, on trouvera l'hypothénuse FL, en disant : le mouvement en longitude dans la région de l'étoile est au mouvement en latitude, comme le rayon est à la tangente de l'inclinaison de l'*orbite apparente* (1879), ou de l'angle LFA. Le cosinus de l'inclinaison apparente est au mouvement apparent en longitude, dans la région de l'étoile, comme le rayon est au mouvement apparent FL en ligne droite; sur l'orbite apparente de la lune relativement à l'astre S, qui est toujours supposé immobile pendant la durée de l'éclipse. Inclinaison apparente.

Dans le triangle LSF, on connoît 3 côtés, le mouvement apparent FL en ligne droite, la somme des demi-diamètres de la lune & de l'astre éclipsé, celui de la lune étant augmenté à raison de sa hauteur sur l'horizon (1510), cette somme étant diminué de $4'' \frac{1}{2}$, à cause de l'inflexion des rayons (1992); la somme des demi-diamètres pour le commencement est SL, pour la fin c'est SF; on cherchera les angles, SLF & SFL; commençant par l'analogie suivante : le mouvement FL est à la somme des deux distances observées, ou des deux sommes des demi-diamètres, SL & SF, comme leur différence, est à la différence des segmens BL & BF; la moitié de cette différence trouvée, étant ajoutée avec la moitié du mouvement FL donnera le plus grand des deux segmens; cette demi-différence retranchée de la moitié du mouvement FL donnera le plus petit des deux segmens.

1975. L'on prendra le segment qui est du côté de la plus grande latitude apparente, soit qu'elles soient

Fig. 121. de même dénomination, ou de dénominations différentes, c'eſt-à-dire, que ſi dans la première obſervation la latitude apparente calculée *IL* eſt plus petite que dans la ſeconde, on ſe ſervira du rayon de la lune, & du ſegment, qui répondent à la ſeconde obſervation; mais ſi la latitude eſtplus grande au commencement de l'éclipſe, on choiſira le ſegment qui répond à ce commencement. Avec ce ſegment, on fera la proportion ſuivante : la ſomme des demi-diamètres apparens qui répond à ce ſegment eſt au rayon des tables, comme le ſegment correſpondant eſt au coſinus de l'angle adjacent *BLS* ou *BFS*; cet angle ajouté avec celui de l'inclinaiſon apparente *LFA* donnera le complément de l'angle de conjonction apparente, c'eſt-à-dire, l'angle *DSF*, qui répond à la plus grande latitude.

Diſtance à la conjonction apparente. Le rayon eſt à la ſomme des demi-diamètres apparens *SF*, qui répond à la plus grande latitude, diminuée de $4'' \frac{1}{2}$ à cauſe de l'inflexion, comme le coſinus de l'angle *DSF* eſt à *SD*; cette quantité diviſée par le coſinus de la latitude *HS* de l'aſtre *S*, ſi ce n'eſt pas le ſoleil, donnera la diſtance *HG* à la conjonction apparente, pour celle des deux obſervations qui répond à la plus grande des deux latitudes apparentes de la lune. Cette diſtance à la conjonction apparente, avec le mouvement apparent, pourroit ſervir à trouver la conjonction apparente, ſi l'on en avoit beſoin. On ôtera cette diſtance de la longitude vraie du ſoleil ou de l'étoile, ſi c'eſt le commencement de l'éclipſe auquel répond la plus grande latitude, on l'ajoutera avec la longitude du ſoleil, ſi c'eſt la fin de l'éclipſe, & l'on aura la longitude apparente de la lune obſervée. Cette longitude apparente obſervée étant comparée à celle qu'on avoit calculée, donnera l'erreur des tables en longitude. Il pourroit arriver que l'immerſion fût après la conjonction apparente en longitude, le cas eſt rare; mais ſi l'on avoit lieu de le craindre, on pourroit s'en aſſurer en calculant par les tables ſeules l'immerſion, & la conjonction apparente.

1976. Le mouvement vrai de la lune ſeule en longitude ſur l'écliptique, eſt à une heure ou 3600″, comme l'erreur des tables en longitude, eſt à un nombre de ſecondes de temps qu'on ôtera de l'heure de la conjonction calculée par les tables, ſi l'on a trouvé par obſervation une longitude plus grande que par les tables, & l'on aura l'heure de la conjonction obſervée; c'eſt ce qu'il falloit trouver. *Fig.* 121.

En ſe contentant de chercher ainſi l'erreur des tables ſur le temps de la conjonction, au lieu de chercher directement la longitude vraie, & la conjonction vraie; on évite l'attention qu'il faudroit avoir d'employer la parallaxe de la lune ſeule à la fin du calcul dans les éclipſes de ſoleil, au lieu de la différence des parallaxes du ſoleil & de la lune qu'on emploie dans le commencement. Je donnerai, un exemple de l'autre manière de procéder (1980), qui eſt plus ſimple quand il s'agit d'une étoile. Il eſt toujours utile, de trouver également la conjonction & l'erreur des tables, par le moyen de l'autre triangle *S B L*, qui eſt du côté de la plus petite latitude, en prenant l'autre ſegment, & l'autre ſomme des demi-diamètres, & en prenant la différence des deux angles, dont on a pris la ſomme dans le premier calcul. Le réſultat doit être exactement le même, puiſque les deux obſervations du commencement & de la fin n'en font qu'une ſeule pour la détermination de la longitude & de la latitude.

Différence des latitudes apparentes.

Le triangle *S F D* qui a ſervi à trouver la différence de longitude apparente *SD*, ſert auſſi à trouver la différence des latitudes apparentes, c'eſt-à-dire, *FD*, qu'on ajoutera avec la latitude de l'étoile *S*, ſi celle de la lune *F* qu'on a calculée par les tables, a été trouvée plus grande que celle de l'étoile, enſorte que le point *F* ſoit plus éloigné de l'écliptique que le point *D*, & l'on aura la latitude apparente de la lune, qui comparée avec celle qu'on a tirée des tables fera connoître l'erreur des tables en latitude.

Il peut arriver un cas, où l'on ſeroit embarraſſé de

Fig. 121. ſavoir, ſi le point *F* eſt plus ou moins éloigné de l'écliptique *GI* que le point *D*; c'eſt le cas ou la différence *FD* des latitudes apparentes, ne ſeroit que d'environ 30″ dans chacune des deux obſervations; l'erreur des tables laiſſant à peu-près une incertitude de 30″, on ne ſauroit pas ſi le centre de la lune a paſſé au nord ou au midi de l'aſtre *S*; dans ce cas le commencement & la fin d'une éclipſe ne ſuffiroient pas pour déterminer la latitude; il faudroit y ſuppléer ou par la grandeur de l'éclipſe, s'il s'agit du ſoleil, ou par la différence de déclinaiſon obſervée, entre la lune & l'étoile avant l'immerſion ou après l'émerſion; dans ce cas-là, il faudroit calculer la longitude & la latitude apparente de la lune pour le moment de l'obſervation (1973), en conclure l'aſcenſion droite & la déclinaiſon apparente (906); les comparant à celles qu'on auroit obſervées, on jugeroit ſi la lune eſt plus au nord ou au midi par l'obſervation que par les tables. Les préceptes que nous venons de donner pour trouver la conjonction vraie, ſuffiſent à ceux qui ont déja l'habitude de ces ſortes de calculs; les autres auront beſoin de ſe fortifier par l'exemple ſuivant.

1977. Exemple. Le 6 Avril 1749, l'étoile *Antarès* fut éclipſée par la lune à Berlin, à $14^h\ 6'\ 19''$ de temps vrai, & elle reparut de l'autre côté de la lune à $15^h\ 12'\ 54''$. Le même jour, j'obſervai l'émerſion à Paris, à $13^h\ 1'\ 20''$; je me propoſe de chercher la différence des méridiens, entre Paris & Berlin, par la comparaiſon de ces obſervations. Pour faire ce calcul, par la méthode exacte que je viens de détailler, il faut connoître déja à peu-près la différence des méridiens que l'on cherche, ou bien le premier calcul ne ſera qu'une approximation, & on le recommencera pour trouver le même réſultat une ſeconde fois avec plus de préciſion; par exemple, ſi je n'avois aucune idée de la longitude de Berlin, je prendrois la différence entre les heures de l'immerſion à Paris & à Berlin, c'eſt-à-dire, entre $13^h\ 1'\ 20''$, & $14^h\ 6'\ 19''$, & je ſuppoſerois qu'il y

a 1^h $4'$ $59''$ de différence entre les deux méridiens ; mais ſachant dès à préſent que cette différence n'eſt pas fort éloignée de $44'$ $25''$, je me ſuis ſervi de cette connoiſſance.

1978. J'ai donc réduit au méridien de Paris, les deux obſervations de Berlin, je les ai auſſi réduit en temps moyens, & j'ai calculé pour ces deux inſtans les quantités ſuivantes par des tables ſemblables à peu-près à celles qui ſont à la fin du premier volume de cet ouvrage.

Longitudes vraies de la lune,	8^s 5° $43'$ $16''$	8^s 6° $26'$ $9''$
Latitudes vraies de la lune, auſtrales, ...	3° $47'$ $18''$	3° $45'$ $10''$

Pour la hauteur du pole de Berlin, 52° $31'$ $30''$, la parallaxe horizontale étoit de $57'$ $15''$, 7 en la ſuppoſant de $57'$ $18''$ à Paris ; l'angle de la verticale avec le rayon de la terre, que je ſuppoſois alors de $18'$ $42''$ (1708), donne une augmentation de $24''$, 1 (1695) ; ainſi la parallaxe qu'il faut d'abord employer eſt de $57'$ $39''$, 8. Voici les autres élémens du calcul des parallaxes.

a Temps vrai à Paris.
b Le lieu du ſoleil par les tables.
c Aſcenſion droite du milieu du ciel (1011).
d Hauteur du nonagéſ. (1661).
e Longit. du nonagéſ. (1662).
f Parall. de longit. par les formules (1674).
g Applatiſſement en longitude (1700).

	Immerſion.	Emerſion.
a	13^h $21'$ $54''$	14^h $28'$ $29''$
b	0^s 17 20 $17\frac{1}{2}$	0^s 17 23 1
c	227 33 $32''$	244 14 49
d	24 56 6	18 52 37
e	6 13 7 26	7 5 12 24
f	19 $27,8$	9 $43,3$
g	$4,9$	$4,9$
h	19 $22,9$	9 $38,4$
i	53 $18,6$	55 $40,9$
k	$21,0$	$21,0$
l	52 $57,6$	55 $19,9$

h Parallaxe en longitude dans le ſphéroïde.
i Parallaxe de latitude par les formules (1666).
k Applatiſſement en latitude (1698).
l Parallaxe de latitude dans le ſphéroïde.

La formule qui m'a donné l'applatiſſement en latitude

pour Berlin, eſt celle-ci $\frac{57' 16''. \text{ſin. } 18' 44''}{\text{ſin. } 52° 31'}\left(\frac{\text{cof. } 23° 28'}{\text{cof. } 3° 46'} - \text{ſin. } 26° \text{ tang. } 3° 46'\right) = 21''$.

1979. Le mouvement apparent en latitude dans l'eſpace de 1^h 6′ 35″, qu'a duré l'occultation à Berlin, c'eſt-à-dire, la valeur de AL eſt de 11″ 4, dont la latitude apparente croiſſoit; le mouvement apparent en longitude ſur l'écliptique étoit de 27′ 8″, 5 $= GI$, & de 27′ 3″, 2 dans la région de l'étoile, ſur un grand cercle FA; on trouvera donc l'angle AFL de 30′ 17″ & le côté FL, ou le mouvement de la lune ſur ſon orbite apparente 27′ 3″, 2.

1980. Le diamètre horizontal de la lune étant de 31′ 18″, le demi-diamètre apparent ſera 15′ 41″, 9 $= SL$ pour le premier inſtant, & de 15′ 42″, 2 $= SF$ pour la fin; que l'on diminueroit chacun de $4'' \frac{1}{2}$, ſi l'on vouloit avoir égard à l'inflexion. Ayant abaiſſé du centre S de l'étoile une perpendiculaire SB ſur l'orbite apparente FL, les ſegmens ſeront de 13′ 31″, 4 $= BL$, & de 13′ 31″, 8 $= BF$, & l'angle $SLB = 30°$ 31′ 13″. L'angle L étant du côté de la plus petite latitude IL, on en ôtera l'angle AFL ou CLF de 30′ 17″, & l'on aura l'angle $SLC = LSE = 30° 0' 56''$. Dans le triangle ESL, on connoît $SL = 15' 41''$, 9, & l'angle ESL de 30° 0′ 56″, on trouvera SE qui diviſé par le coſinus de la latitude apparente LI 4° 40′ 16″ donne 13′ 38″, 3 pour la diſtance apparente HI de la lune à ſa conjonction ſur l'écliptique: c'eſt ce que Képler & Boulliaud appellent *ſcrupula incidentiæ*. Cette diſtance apparente IH de 13′ 38″ 3, eſt à l'occident de l'étoile, & précède la conjonction apparente, puiſqu'il s'agit de l'immerſion, & que la lune étoit moins avancée que l'étoile; mais la parallaxe de longitude faiſoit paroître la lune plus avancée vers l'orient de 19″ 22″, 9 (*), non pas la différence des parallaxes du ſoleil & de la lune, dont on ſe ſert dans les premiers calculs (1877).

(*) S'il s'agiſſoit d'une éclipſe de ſoleil, il faudroit employer ici, pour plus d'exactitude, la parallaxe ſeule de la lune en longitude, &

parce que la longitude de la lune eſt plus grande que celle du nonagéſime (1876) : ainſi le lieu vrai de la lune étoit encore plus éloigné de l'étoile que le lieu apparent ; il faut donc ajouter la parallaxe avec la diſtance à la conjonction apparente, & l'on aura 33′ 1″, 2 pour la diſtance de la lune à la conjonction vraie, en minutes de degrés comptées ſur l'écliptique ; ce qui fait (a) 0^h 59′ 36″, à raiſon de 36′ 53″ pour 1^h 6′ 35″ de temps qui eſt la différence des deux longitudes calculées ; ces 59′ 36″ ſont la différence entre l'obſervation & la conjonction vraie ; or l'immerſion avoit été obſervée à 14^h 6′ 19″, donc le temps vrai de la conjonction étoit à 15^h 5′ 55″, au méridien de Berlin. On pourroit dans les éclipſes de ſoleil chercher cette conjonction obſervée par le moyen de la conjonction calculée, & de l'erreur des tables, comme je l'ai indiqué (1976).

Temps de la conjonction vraie.

1981. Il y a des cas où la ligne *FL* du mouvement apparent eſt ſituée différemment par rapport à *DE* qui eſt parallèle à l'écliptique ; mais on pourra prendre dans tous les cas, la ſomme de l'angle *SFB* du triangle, & de l'angle d'inclinaiſon *AFL*, l'on aura toujours l'angle *DSF* du côté où la différence de latitude apparente *EL* eſt la plus grande (c'eſt-à-dire, qu'on aura le complément de l'angle de conjonction apparente). Son ſinus & ſon coſinus multipliés par la ſomme des demi-diamètres du ſoleil & de la lune, ou par le demi-diamètre apparent ſeul de la lune, diminué de $4'' \frac{1}{2}$, donneront les différences apparentes de latitude & de longitude, *FD* & *SD*, pour l'obſervation où la différence de latitude étoit la plus grande.

Le même calcul par l'émerſion.

1982. Pour vérifier le calcul précédent, il eſt bon de chercher auſſi la conjonction par l'émerſion de l'étoile. L'on connoît *SF* = 15′ 42″, 2 & le ſegment

(a) Pour réduire en temps ces différences de longitude, on ne fait qu'ajouter à leur logarithme un logarithme conſtant, qui eſt la différence entre le logarithme de 3600″ ou 1^h, & celui du mouvement horaire vrai de la lune ſeule ſur l'écliptique, c'eſt ici 0,2569281.

Fig. 121. $FB = 13' 31''$, 8 on trouve l'angle $SFB = 30° 30' 12''$, l'on ajoute enſemble les deux angles SFB, BFA, l'on a $SFA = DSF = 31° 0' 29''$. Dans le triangle DSF, rectangle en D, dont on connoît l'hypothénuſe $FS = 15' 42''$, 2 & l'angle $DSF = 31° 0' 29''$; on trouve SD, qui étant diviſé par le coſinus de la latitude apparente $4° 40' 31''$, donne $GH = 13' 30''$, 2, diſtance à la conjonction apparente, meſurée ſur l'écliptique. Dans cette ſeconde obſervation, la lune paroiſſoit plus orientale que l'étoile, de $13' 30''$, 2; mais à cauſe de la parallaxe de longitude, qui la faiſoit paroître plus avancée, le lieu apparent étoit plus oriental que le lieu vrai, de $9' 38''$ 4; donc il reſte $3' 51''$ 8, dont la lune avoit réellement paſſé ſa conjonction vraie avec l'étoile, ce qui fait en temps $6' 59''$; cet intervalle étant ôté de l'heure de cette ſeconde obſervation $3^h 12' 54''$, on trouve le temps vrai de la conjonction vraie à $3^h 5' 55''$, auſſi bien que par la première obſervation. On ſent bien qu'il ne doit y avoir aucune différence ſi l'on a bien opéré, puiſque le temps de la conjonction étant déterminé par le mouvement FL, qui dépend des deux obſervations conjointement, on ne ſauroit trouver qu'un ſeul réſultat par ces deux obſervations; mais une différence de quelques décimales qu'il eſt très-difficile d'éviter, n'eſt ici d'aucune conſéquence.

Latitude obſervée. 1983. Pour connoître la vraie latitude de la lune par cette obſervation, on cherchera auſſi les côtés DF & EL, par le moyen des triangles DSF & LSE qu'on a réſolus ci-deſſus; on trouvera $DF = 8' 5''$, 5, & $EL = 7' 51''$; on ajoutera ces quantités à la latitude de l'étoile $4° 32' 12'' = IE = GD$, parce que la lune paroiſſoit plus méridionale que l'étoile, & l'on aura les latitudes apparentes de la lune IL, GF, $4° 40' 3''$, 0, & $4° 40' 17''$ 5; on en ôtera les parallaxes de latitude $52' 57''$ 4, & $55' 19''$ 8, parce que la latitude auſtrale de la lune étoit augmentée par la parallaxe, & l'on aura $3° 47' 5''$ 6, & $3° 44' 57''$ 7 pour les latitudes vraies de la lune IM, GN conclues de l'obſer-

vation ; ces latitudes ſe trouvent être plus petites de 12″ 5 chacune que celles qu'on avoit tirées des premières tables de M. Mayer. On remarquera en paſſant, que l'orbite vraie *MN* de la lune ſe rapproche ici de l'écliptique, quoique l'orbite apparente *LF* s'en éloigne. *Fig.* 121.

1984. Le même jour j'obſervai à Paris l'immerſion d'Antarès à 1ʰ 1′ 20″ du matin (*Mém. acad.* 1755, *p.* 370) du matin; il s'agit de trouver auſſi la conjonction vraie de la lune à l'étoile par l'obſervation de Paris. On feroit la même opération que pour Berlin (1978), ſi l'on avoit obſervé à Paris l'émerſion auſſi bien que l'immerſion ; mais les nuages m'ayant empêché de faire la ſeconde obſervation, je vais y ſuppléer par une autre méthode, qui ſervira d'exemple en pareil cas. Obſervation correſpondante à Paris.

1985. La latitude vraie de la lune calculée par les tables pour le moment de l'obſervation eſt 3° 47′ 58″ ; il en faut ôter 12″, 5, puiſque nous avons trouvé par l'obſervation de Berlin, que les tables donnoient ce jour-là une latitude trop grande de 12″ 5 (1983), & nous aurons pour la latitude vraie de la lune, au moment de l'immerſion obſervée à Paris, 3° 47′ 45″ $\frac{1}{2}$; il y faut ajouter la parallaxe de latitude 48′ 15″, 7, pour avoir la latitude apparente de la lune 4° 36′ 1″, 2 & en ôter la latitude de l'étoile 4° 32′ 12″, ce qui donne, pour la différence apparente en latitude *EL* au moment de l'obſervation, 3′ 49″, 2. Dans le triangle *SLE*, on connoît *LE* = 3′ 49″, 2, & *SL* = 15′ 41″, 7 demi-diamètre apparent de la lune, augmenté à raiſon de ſa hauteur qui étoit de 10 degrés ; l'on cherchera le côté *SE*, par la méthode que j'ai expliquée (1781) ; ce côté diviſé par le coſinus de la latitude apparente de la lune, donnera la différence apparente de longitude *HI*, ſur l'écliptique pour Paris, 15′ 16″, 4 ; il y faut ajouter la parallaxe de longitude 29′ 19″, 6, pour avoir la diſtance à la conjonction vraie, 44′ 36″. On réduira cette différence en temps, par le moyen du mouvement horaire de la lune, (en ajoutant à ſon logarithme le logarithme conſtant 0, 256536), & l'on aura

celui de $1^h\ 20'\ 31''$, intervalle de temps entre l'obſervation de Paris, $13^h\ 1'\ 20''$, & le temps vrai de la conjonction vraie, qui ſe trouvera par conſéquent être à $14^h\ 21'\ 51''$ pour Paris.

Conjonction pour Paris.

1986. On aura donc les deux temps de la conjonction, de la manière ſuivante :

Comparaiſon des 2 temps.

Temps vrai de la conjonction vraie à Berlin,	15^h	$5'$	$55''$
Temps vrai de la conjonction vraie à Paris,	14	21	51
Donc la différence des Méridiens,	0	44	4
Et par rapport à l'obſervatoire R. de Paris,	0	44	6

Cette quantité eſt plus petite de $19''$ que ſuivant M. Griſchow, (*Mémoires préſentés à l'acad. tom. I.*).

Longitude de la lune.

La longitude de l'étoile Antarès étoit alors $8^s\ 6°\ 16'\ 20''$, c'eſt auſſi la longitude vraie de la lune pour le 5 Avril $14^h\ 21'\ 51''$, temps vrai à l'Obſervatoire Royal de Paris, ou $14^h\ 24'\ 2''$, temps moyen, & la latitude vraie de la lune étoit de $3°\ 45'\ 11''$, ſuivant l'obſervation. La longitude calculée par les anciennes tables de Mayer n'étoit que de $9''$ trop grande, & la latitude l'étoit de 12 à 13 ſecondes.

1987. Quand on a obſervé le commencement & la fin d'une éclipſe de ſoleil, on a pareillement deux diſtances égales SL & SF; mais elles ſont égales à la ſomme des demi-diamètres du ſoleil & de la lune, diminuée auſſi de $4'' \frac{1}{2}$ à cauſe de l'inflexion (1992). Quand on a obſervé deux phaſes avec un micromètre (1991); on a également deux diſtances entre les centres de la lune & du ſoleil, on les prend deux à deux, l'une avant & l'autre après le milieu, & calculant le mouvement apparent de la lune dans l'intervalle des deux obſervations, on a toujours un triangle SLF, dont les trois côtés ſont connus, & par lequel on trouve la diſtance à la conjonction, & le temps de la conjonction vraie.

Uſage de la fin d'une éclipſe.

1988. Si l'on n'a que la fin d'une éclipſe obſervée exactement en deux endroits, comme cela arrive ſouvent, on eſt obligé de ſuppoſer la latitude de la lune

exactement connue, dans chaque obſervation, & cela n'influe pas beaucoup ſur le réſultat, ſur-tout ſi la diſtance des deux obſervateurs n'eſt que de peu de degrés. Dans ce cas, on peut ſe contenter de calculer par les tables la diſtance apparente des centres (1877, 1918); ces calculs peuvent aiſément ſe faire avec ma méthode des angles parallactiques (1881); car dès qu'on connoît la latitude de la lune & ſa longitude, on calcule la diſtance apparente des centres pour l'heure de l'obſervation faite ſous le méridien inconnu; ſi on la trouve plus grande ou plus petite que par l'obſervation, on change la ſuppoſition faite pour la différence des méridiens, & par conſéquent la longitude & la latitude, ce qui donne une autre diſtance apparentes des centres. Alors par une règle de trois, on trouve quelle eſt la différence des méridiens qu'il faut ſuppoſer pour trouver par le calcul la même diſtance des centres que par obſervation. On peut auſſi calculer par ma méthode la conjonction vraie, en cherchant l'orbite apparente comme je l'ai indiqué (1919).

1989. La manière de déterminer les longitudes des différens pays de la terre, par la conjonction vraie calculée pour les deux pays, eſt la plus exacte que nous ayons; le ſeul inconvénient qu'on y trouve, eſt la longueur du calcul qu'elle ſuppoſe; c'eſt un très-grand obſtacle, à cauſe du peu de perſonnes qui s'occupent de ces recherches. On verra dans le XIVe. livre (2481) différentes conſidérations ſur la manière d'obſerver les éclipſes de lune & celles des ſatellites de Jupiter, pour en déduire la différence des méridiens entre deux villes; mais celle que je viens d'expliquer par les éclipſes de ſoleil & d'étoiles, ſera peut-être toujours la plus exacte. *Utilité de cette méthode.*

1990. Lorſque la lune a paſſé l'oppoſition, ſa partie orientale eſt éclairée, ſa partie occidentale eſt obſcure; ainſi les immerſions ſe font dans la partie éclairée, & les émerſions ſe font dans la partie obſcure, c'eſt-à-dire, à gauche dans une lunette aſtronomique. Je crois que ce ſont-là les ſeules émerſions dont on puiſſe être

bien aſſuré; car quand l'étoile ſort de la partie éclairée de la lune, ſa lumière, trop foible par rapport à celle de la lune, ne ſe diſtingue pas facilement au premier inſtant de l'émerſion.

Lorſqu'on a vu une planète, ou une étoile entrer ſous la lune, & que l'on ſait à quelle diſtance elle doit paſſer par rapport au centre de la lune, on conçoit une ligne au travers des taches de la lune, & l'on eſſaie de remarquer vis-à-vis de quelles taches doit ſe faire l'émerſion; car ſi l'on n'eſt pas prévenu de la ſituation du point d'émerſion, c'eſt en vain que l'on eſpere appercevoir l'étoile au moment de ſon émerſion; & ces obſervations, au lieu d'être les plus exactes que l'on ait, deviennent les plus défectueuſes: je pourrois citer pluſieurs exemples, ou des aſtronomes habiles s'y ſont trompés conſidérablement.

1991. Il arrive ſouvent dans les éclipſes d'étoiles ou de planètes par la lune que l'aſtre éclipſé paroît tout entier pendant quelques ſecondes ſur le diſque éclairé de la lune; on a attribué ce phénomène à l'atmoſphère de la lune, & M. Euler entreprend de prouver ſon exiſtence par les éclipſes de ſoleil (*Mém. de Berlin*, 1748, *pag.* 103). M. de l'Iſle l'attribuoit à la diffraction ou à l'inflexion des rayons qui raſent les bords de la lune (*Mémoires pour ſervir à l'Hiſtoire de l'Aſtronomie*, 1738, *pag.* 249); ce phénomène obſervé par le Pere Grimaldi, & par Newton (*Opt. parte* 3), ſervoit ſurtout à M. de l'Iſle, pour expliquer les anneaux que l'on voit autour du ſoleil dans les éclipſes totales; pour moi, je penſe que c'eſt une ſimple illuſion optique, occaſionnée par l'irradiation ou le débordement de lumiere de la lune (a); l'atmoſphère de la lune ne ſauroit produire un effet ſi ſenſible; car dans les éclipſes de

(a) On peut voir dans l'eſſai du Docteur Jurin ſur la viſion diſtincte & indiſtincte, que l'apparence d'une étoile ſur le diſque de la lune, ne vient que du cercle de diſſipation, dans lequel l'étoile ſe trouve lorſqu'elle eſt fort proche de la lune, (*Optique de Smith*, *Tom. I. p.* 236, de la traduction du P. Pezenas, Avignon 1767, 2 vol. *in*-4°).

ſoleil



de la Gardette Sculp.

Digitized by Google

ſoleil on voit le bord de la lune très-net & très-bien terminé, à l'exception de quelques inégalités dans certaines parties de ſa circonférence; les taches de la lune ſont toujours de la même couleur; Vénus quand elle eſt éclipſée par la lune, ne change pas de forme & de couleur; enfin on a vu dans une occultation de Jupiter par la lune, que le bord de la lune paroiſſoit ſur le bord même de Jupiter. (*Mém. acad.* 1715). Ainſi l'atmoſphère de la lune eſt trop peu conſidérable pour faire paroître les étoiles ſur le diſque éclairé de la lune, quoiqu'elle ſuffiſe pour produire le phénomène dont nous allons parler.

1992. L'INFLEXION des rayons qui raſent les bords de la lune paroît cependant démontrée par les obſervations de l'éclipſe de 1764, que M. du Séjour a diſcutées dans pluſieurs mémoires avec beaucoup d'habileté; il la trouve d'environ $4''\frac{1}{2}$, & il l'attribue à une petite réfraction de l'atmoſphère de la lune. Ayant comparé d'abord les diſtances des cornes de l'éclipſe de ſoleil à divers inſtans, que M. Short avoit obſervées à Londres, il vit qu'on ne pouvoit les concilier. La réfraction dans l'atmoſphère de la lune, & les cauſes phyſiques d'inflexion dont M. de la Hire, M. Euler, &c. avoient parlé, lui firent naître l'idée de calculer les mêmes phaſes avec une formule, dans laquelle entroit la ſuppoſition d'une inflexion, dont la valeur pouvoit ſe déterminer enſuite en comparant la formule avec les obſervations, & il trouva qu'il falloit, pour concilier toutes ces obſervations, faire l'inflexion d'environ $4''\frac{1}{2}$. Inflexion de $4''\frac{1}{2}$.

1993. La durée de l'éclipſe entre le commencement & la fin eſt diminuée par l'inflexion, qui fait toujours paroître trop grande la diſtance des bords de la lune & du ſoleil; au contraire la durée de l'éclipſe annulaire eſt augmentée par l'inflexion, & la bande terreſtre où l'éclipſe paroît annulaire, eſt élargie par cette cauſe phyſique; M. du Séjour a comparé toutes les obſervations de l'anneau faites en 1764, & il a reconnu

que la durée en avoit été plus longue qu'elle n'auroit dû l'être. (*Mém. acad.* 1767, *pag.* 201). Il desire cependant que les astronomes profitent des observations semblables qui pourront se présenter pour constater davantage ce phénomène ; la circonstance la plus favorable seroit celle d'une éclipse qui seroit totale pour les pays où la lune seroit fort élevée sur l'horizon, & annulaire dans les pays où la lune seroit plus basse ; telle fut l'éclipse du 23 Septembre 1699. Ce point d'astronomie physique mériteroit qu'on entreprît quelques voyages pour observer les éclipses de soleil dans les pays où elles sont totales ou annulaires ; il exige du moins qu'on se rende très-attentif à mesurer les distances des cornes avec de bons héliomètres, le plus près qu'il est possible du commencement ou de la fin d'une éclipse.

1994. Cette inflexion de $4''\frac{1}{2}$ est égale au double de la réfraction horizontale qui a lieu dans l'atmosphère de la lune, multipliée par la distance de la lune au soleil, & divisée par la distance du soleil à la terre (*Mém. acad.* 1767, *p.* 215). L'attraction du globe lunaire sur le rayon qui en rase les bords, y produiroit une courbure hyperbolique & une semblable inflexion, mais elle est absolument insensible, comme l'a fait voir M. du Séjour, (*Ibid. pag.* 213).

Différentes sortes d'Éclipses.

Eclipses des planètes par la lune.

1995. Les éclipses des planètes par la lune se calculent de la même manière que les éclipses de soleil, ou d'étoiles ; la seule différence consiste à prendre la somme des mouvemens de la planète & de la lune, en latitude, & de leurs mouvemens en longitude réduits à la région de l'étoile (892), ou bien leur différence, suivant que les mouvemens se font en sens contraire, ou du même sens, cela donne le mouvement relatif en longitude & en latitude, qui sert à trouver l'inclinaison de l'orbite relative (1765). On prend de même la somme ou la

différence des mouvemens apparens (1973), pour avoir l'inclinaiſon apparente, avec laquelle on calcule l'immerſion, l'émerſion & le milieu de l'éclipſe (1919).

Les éclipſes des planètes par la lune ſont aſſez fréquentes; Mercure eſt la ſeule planète que l'on puiſſe rarement obſerver quand elle eſt cachée par la lune; je n'en connois qu'une ſeule obſervation qui fut faite au Bréſil par Margraf, dans le dernier ſiècle; ces éclipſes ſeroient utiles pour déterminer les longitudes des villes où on les obſerve.

Eclipſe d'une planète par une autre.

1996. Les planètes ſont quelquefois aſſez proches l'une de l'autre pour s'éclipſer mutuellement; Mars parut éclipſer Jupiter le 9 Janvier 1591, & il fut éclipſé par Vénus le 3 Octobre 1590, (Képler, *Aſtron. Pars Optica*, *pag.* 305); Mercure fut caché par Vénus le 17 Mai 1737, (*Philoſ. tranſact. n°.* 450).

1997. On trouve auſſi dans les ouvrages des aſtronomes pluſieurs exemples des occultations d'étoiles par les planètes: Saturne couvrit l'étoile ι de la ſixième grandeur qui eſt à la corne auſtrale du Taureau, le 7 Janvier 1679, ſuivant M. Kirch, (*Miſcell. Berolin*, *p.* 205).

Jupiter couvrit l'étoile du Cancer appellée l'*Ane auſtral*, le 4 Sept. 241 avant J. C.; Gaſſendi obſerva le 19 Décembre 1633, Jupiter qui cachoit une étoile aux pieds des Gémeaux, & M. Pound obſerva en 1716 l'occultation de l'étoile *a* des Gémeaux par Jupiter, (*Phil. tranſ. n°.* 350. Abrégé, IV. 319).

Le 18 Janvier 272 avant J. C. Mars couvrit l'étoile boréale au front du Scorpion; & Gaſſendi a vu Mars couvrir auſſi l'étoile qui eſt à l'extrémité de l'aîle de la Vierge. Mars en 1672 couvrit une des étoiles du Verſeau, & nous avons eu occaſion de parler des remarques dont ce phénomène fut l'occaſion (1733).

Vénus dut cacher la belle étoile au cœur du Lion, le 16 Sept. 1574, ſuivant Mœſthlinus, & le 25 Sept. 1598, ſuivant Képler. (*Aſtr. Pars Opt. p.* 305. Riccioli, *Alm. I.* 721).

1998. Les comètes couvrent auſſi quelquefois des étoiles fixes. Le 12 de Janvier 1764, je vis la comète, qui paroiſſoit alors, ſortant de deſſus une étoile de ſeptième grandeur à la queue du cygne; l'étoile étoit encore enveloppée dans la chevelure de la comète. Ces ſortes d'obſervations ſeroient très-curieuſes pour la théorie des comètes, ſi l'on connoiſſoit parfaitement les poſitions des petites étoiles.

1999. Enfin, on peut regarder comme une autre ſorte d'éclipſes les paſſages de Mercure & de Vénus ſur le diſque du ſoleil dans leurs conjonctions inférieures; mais à cauſe de l'importance de ces paſſages, je ſuis obligé d'en parler plus au long, & ce ſera la matière du livre ſuivant.





Fig. 117





Fig. 110





Fig. 121.

LIVRE ONZIEME.

DES PASSAGES DE VÉNUS ET DE MERCURE sur le Soleil.

VÉNUS & Mercure qui tournent autour du ſoleil à une moindre diſtance que la terre, (art. 1082), ſe trouvent entre nous & le ſoleil à chaque révolution ſynodique ; & ſi ces planètes n'ont alors que peu de latitude, on voit ſur le ſoleil une tache noire & ronde, dont la largeur paroît occuper environ la trentième partie de celle du ſoleil, ſi c'eſt Vénus, & ſeulement la 150e partie ſi c'eſt Mercure.

2000. Averrhoës crut avoir apperçu Mercure ſur le ſoleil, mais Albategnius & Copernic, (*L. II. c.* 10), ne penſoient pas qu'il fût poſſible de l'y voir à la vue ſimple, & ils avoient raiſon. Képler crut auſſi avoir apperçu Mercure ſur le ſoleil à la vue ſimple ; mais il reconnut enſuite que ce ne pouvoit être qu'une tache du ſoleil ; il s'en trouve quelquefois d'aſſez groſſes pour qu'on puiſſe les entrevoir ſans lunettes ; Gallilée aſſuroit en avoir vu & les avoir montré à d'autres à la vue ſimple, & nous en citerons des exemples (3131). Mais à l'égard de Mercure qui n'a que 12″ de diamètre, il eſt impoſſible qu'on l'ait jamais apperçu ſur le ſoleil ; c'eſt tout ce que l'on pouvoit faire, en 1761, que d'y appercevoir Vénus, qui avoit 58″ de diamètre (1391, 2157), je n'oſerois même aſſurer qu'on l'ait apperçue à la vue ſimple ; Gaſſendi nous aſſure que pluſieurs fois & entr'autres le 10 Septembre 1621, il n'a pu voir à la vue ſimple des taches qui meſurées avec des lunettes, avoient cependant une minute & un tiers de diamètre. Il n'eſt donc pas étonnant qu'avant la découverte des lunettes, on n'eût jamais obſervé Mercure ni même Vénus ſur le ſoleil.

Ces paſſages ne ſe voient pas à la vue ſimple.

2001. Ces paſſages n'arrivent que lorſque Vénus & Mercure dans leur conjonction inférieure, n'ont pas une latitude plus grande que le demi-diamètre du ſoleil, c'eſt-à-dire, lorſque la conjonction arrive fort près du nœud, tout au plus, à la diſtance de $1^{\circ}\frac{1}{4}$ pour Vénus.

Ils ſont très-importans.

2002. Ces paſſages ſont importans; ils fourniſſent un moyen de déterminer exactement le lieu du nœud de Mercure, ou de Vénus, & la longitude héliocentrique indépendamment de la parallaxe du grand orbe; mais les paſſages de Vénus ont ſur-tout l'avantage ſingulier de pouvoir faire connoître exactement la parallaxe du ſoleil (2149); d'où dépendent les diſtances de toutes les planètes entr'elles & par rapport à nous (1222); c'eſt ce qui leur a donné une ſi grande célébrité, & ce qui m'oblige de les traiter ſéparément dans ce XIe livre.

Il y a dans les paſſages de Vénus trois choſes qui concourent à donner de l'avantage & du mérite à ces ſortes d'obſervations; 1°, la grande préciſion avec laquelle on obſerve le contact de deux objets, dont l'un eſt obſcur & placé ſur un autre qui eſt lumineux; il n'y a dans l'aſtronomie que ce ſeul cas où l'on puiſſe obſerver un angle de diſtance à un dixième de ſeconde près; 2°, le rapport connu de la parallaxe de Vénus au ſoleil, avec celles de toutes les autres planètes; 3°, la grandeur de cette parallaxe qui produit un quart-d'heure de différence entre les obſervations, & qui eſt plus que double de celle du ſoleil.

2003. Képler fut le premier qui en 1627 après avoir dreſſé ſur les obſervations de Tycho ſes tables Rudolphines, oſa marquer les temps où Vénus & Mercure paſſeroient devant le ſoleil; il annonça même un paſſage de Mercure pour 1631, & deux paſſages de Vénus, l'un pour 1631, & l'autre pour 1761, dans un avertiſſement aux aſtronomes, publié à Leipſick en 1629: *Admonitio ad Aſtronomos rerumque cœleſtium ſtudioſos, de miris rariſque anni* 1631 *phœnomenis, Veneris puta, & Mercurii in ſolem incurſu.* Képler n'avoit pas pu donner à ſes tables

un degré de perfection aſſez grand, pour annoncer d'une manière exacte & infaillible ces phénomènes, qui tiennent à des quantités fort petites ; le paſſage qu'il annonçoit pour 1631 n'eut pas lieu ; & Gaſſendi qui s'y étoit rendu fort attentif à Paris ne l'avoit point apperçu ; mais auſſi il y eut en 1639 un paſſage de Vénus que Képler n'avoit point annoncé & qui fut obſervé en Angleterre. Képler mourut en 1631 quelques jours avant le paſſage de Vénus qu'il avoit annoncé pour 1631 ; mais celui de Mercure fut obſervé, comme il l'avoit prédit.

2004. Avant que de tracer l'hiſtoire de ces obſervations, examinons d'abord pourquoi les paſſages de Mercure & ſur-tout ceux de Vénus ſur le ſoleil, ſont ſi rares : Vénus revient toujours à ſa conjonction inférieure au bout d'un an & 219 jours (1173) ; il ſembleroit donc qu'à chaque conjonction Vénus devroit paroître ſur le ſoleil, étant placée entre le ſoleil & nous ; mais il en eſt de ces éclipſes comme des éclipſes de lune (1770), il ne ſuffit pas que Vénus ſoit en conjonction avec le ſoleil, il faut qu'elle ſoit vers ſon nœud, & que ſa latitude vue de la terre n'excède pas le demi-diamètre du ſoleil, c'eſt-à-dire, environ 16'. Soit *C* le centre du ſoleil (*Pl. XV, fig.* 125), *NCD* l'écliptique, *NSVE* l'orbite de Vénus ; *V* Vénus en conjonction, c'eſt-à-dire, au moment où elle répond perpendiculairement au point *C* de l'écliptique où eſt le ſoleil ; *CV* la latitude géocentrique de Vénus ; ſi cette latitude eſt plus petite que le rayon *CO* du ſoleil, il eſt évident que Vénus paroîtra ſur le diſque *SOE* du ſoleil, il en eſt de même de Mercure. *Planche XV. Fig.* 125.

2005. Lorſqu'on connoît la révolution ſynodique moyenne de Mercure ou le retour de ſes conjonctions au ſoleil, qui eſt de 115j 21h 3' 22" 3 (1173), on peut trouver pour un intervalle quelconque toutes les conjonctions inférieures de Mercure au ſoleil ; on choiſit celles qui arrivent quand le ſoleil eſt près du nœud de Mercure, c'eſt-à-dire, vers le commencement de Mai & de Novembre, & en les calculant avec plus de ſoin (2043), l'on Trouver les années des paſſages.

voit bientôt ſi la latitude géocentrique au moment de la conjonction vraie n'excède pas le demi-diamètre du ſoleil, & ſi Mercure peut paroître ſur le diſque du ſoleil. C'eſt ainſi que M. Halley calcula, en 1691, pluſieurs paſſages de Mercure ſur le ſoleil, qui ſont rapportés dans les tranſactions philoſophiques, n°. 193, *pag.* 511, dans le premier volume de l'Abrégé, *pag.* 427, & dans les leçons d'aſtronomie de Whiſton, dictées en 1703 & imprimées en 1708 *in*-8°, (*Prælectiones Aſtronomicæ*, pag. 267); on y trouve les calculs que M. Halley avoit faits de 29 paſſages tant pour le dernier ſiècle que pour celui-ci. Il y employoit des périodes de 6 ans, de 7, de 13, de 46 & de 265, qui font ſouvent ramener les paſſages de Mercure ſur le ſoleil au même nœud; & qui ſuffiſent pour indiquer les années où il peut y en avoir, comme nous le dirons bientôt. M. Halley avoit fait la même choſe pour les paſſages de Vénus; il y reconnut les périodes de 8 ans, de 235 & de 243, qui ramènent les paſſages de Vénus ſur le ſoleil, & il calcula 17 paſſages de Vénus, comme nous le dirons, après que nous aurons parlé de l'hiſtoire de ces obſervations.

Périodes des paſſages de Mercure & de Vénus.

2006. La premiere obſervation que l'on ait eu d'un ſemblable phénomène, eſt le paſſage de Mercure obſervé à Paris par Gaſſendi, le 7 Novembre 1631 au matin; il en rendit compte lui-même dans une lettre adreſſée à Schickardus la même année; & qui ſe trouve à la fin de ſon *Inſtitutio aſtronomica*, ſous ce titre: *Mercurius in ſole viſus*. J'ai été plus heureux, dit-il, que tous ces philoſophes hermétiques occupés à chercher *Mercurium in ſole*; (c'eſt-à-dire, la pierre philoſophale): je l'ai trouvé, je l'ai contemplé, là où perſonne avant moi ne l'avoit vu. En conſéquence de l'avertiſſement de Képler, publié en 1629, Gaſſendi ſe préparoit à obſerver Mercure ſur le ſoleil dans une chambre obſcure, en recevant l'image du ſoleil ſur un carton, au travers d'une lunette, comme il avoit coutume de le faire pour les éclipſes de ſoleil; dans la chambre qui étoit au-deſſous, il avoit placé un obſervateur avec un quart de cercle de deux pieds, pour meſurer

Premier paſſage de Mercure.

meſurer la hauteur du ſoleil au premier ſignal ; ce qui devoit lui donner le temps vrai de chaque obſervation (1030). Dès le 5 de Nov. il vouloit chercher Mercure ſur le ſoleil, mais le ciel fut pluvieux toute la journée, & le 6 il eut encore preſque tout le jour un ciel couvert. Le 7 au matin, il ne put appercevoir le ſoleil qu'au travers des nuages juſqu'à 9 heures ; il remarqua pour lors quelque choſe de noir ſur ſon image du ſoleil ; mais ne croyant pas que le diamètre de Mercure pût être ſi petit, il ne ſoupçonna pas que ce fût cette planète, & ne marqua ſa poſition que d'une manière aſſez vague. Cependant Gaſſendi fit enſuite réflexion que ce pouvoit être une petite tache formée ce jour-là ; elle pouvoit ſervir à y comparer Mercure s'il venoit à y paroître enſuite, au moyen de quoi l'on pourroit déterminer la parallaxe de Mercure par cette tache, ſi dans quelqu'autre pays on ſe trouvoit avoir fait une pareille obſervation ; en conſéquence il meſura ſa diſtance au centre du ſoleil ; quelque temps après il la meſura de nouveau, & trouva la diſtance un peu plus grande ; il fut très-étonné de cette différence, & commença de croire que ce n'étoit point une tache ordinaire, puiſqu'elle avoit un mouvement ſi ſenſible ; il eût même quelque idée que ce pouvoit être Mercure, mais ſans oſer ſe le perſuader, tant il étoit préoccupé de l'idée que Mercure paroîtroit beaucoup plus gros. Mais enfin le ſoleil ayant reparu, Gaſſendi meſura de nouveau la diſtance des centres, & l'ayant trouvé fort augmentée, il comprit enfin que c'étoit Mercure qu'il voyoit ſur le ſoleil ; il frappa du pied pour avertir de prendre hauteur, afin d'avoir le temps vrai ; mais celui qu'il avoit placé au quart de cercle avoit quitté ſon poſte, ce qui lui fit perdre encore beaucoup de temps, enſorte qu'il ne pût faire, pour ainſi dire, d'autre obſervation que celle de la ſortie de Vénus ; elle arriva à $10^h\,28'$, ſuivant le calcul de Gaſſendi, le ſoleil ayant $21°\,44'$ de hauteur apparente ; Mercure étoit à $32°\frac{1}{2}$ du vertical du centre du ſoleil, mais Gaſſendi avoit quelque doute ſur ce dernier point.

Ce paſſage de 1631 obſervé à Paris par Gaſſendi, le fut auſſi à Inſpruck, par le P. Jean-Baptiſte *Cyſatus*, Jéſuite; à Rufac en Alſace, par Jean *Remus Quietanus*, Médecin; & à Ingolſtad par un anonyme; mais l'obſervation de Gaſſendi eſt la ſeule dont ont ait tiré des conſéquences aſtronomiques.

Réſultat de ce paſſage.

Ce premier paſſage de Mercure étant la premiere obſervation que les aſtronomes aient eue d'une longitude héliocentrique de Mercure, a été employé pour la théorie de Mercure par pluſieurs aſtronomes, & en particulier par M. Caſſini (*Elemens d'aſtron. pag.* 592): il trouve que le milieu de ce paſſage a dû arriver le 7 Novembre 1631 à $7^h\ 44'\ 16''$ du matin, & la conjonction vraie à $7^h\ 50'$, le lieu du ſoleil & celui de Mercure étant à $7^s\ 14^\circ\ 41'\ 35''$, & le lieu du nœud à $1^s\ 13^\circ\ 24'\ 43''$; on peut voir auſſi le calcul qu'en fit M. Halley, (*Philoſ. tranſ.* 1725, n°. 386). J'ai placé le réſultat de ce paſſage parmi les obſervations de Mercure *pag.* 167.

Douze autres paſſages.

2007. Depuis ce temps-là, nous avons eu 12 autres paſſages de Mercure ſur le ſoleil, dont les réſultats ont été rapportés dans le VIe livre avec les autres obſervations de Mercure (*pag.* 167): on trouvera le détail des 8 premiers dans M. Caſſini, *pag.* 585. *& ſuiv.*

Après le paſſage de 1631, on trouve d'abord le ſecond paſſage qui fut celui du 3 Novembre 1651 n. ſt., obſervé à Surate dans les Indes, par *Shakerlæus*, Anglois, qui avoit entrepris exprès ce grand voyage, pour obſerver Mercure ſur le ſoleil; l'obſervation eſt rapportée dans l'ouvrage de Wing intitulé: *Aſtronomia britannica.*

2008. Le troiſième eſt celui du 3 Mai 1661. Il fut obſervé à Dantzick par *Hevelius*, qui compoſa à ce ſujet l'ouvrage intitulé, *Mercurius in ſole viſus*; mais ſon calcul a été réformé par M. Caſſini (*pag.* 584), qui en a fait un grand uſage pour la théorie de Mercure. C'étoit le premier paſſage qu'on eût obſervé vers le nœud deſcendant; il fut auſſi obſervé à Londres par *Huygens*, *Mercator* & *Street.*

2009. Le 4e paſſage de Mercure arriva le 7 Nov. 1677, & fut obſervé par M. Halley à l'iſle de Ste Hélène, où il étoit allé pour cette obſervation; par M. Gallet, à Avignon; par M. Tounley, en Angleterre; & par un Anonyme à Montpelier.

2010. Le 5e paſſage de Mercure fut obſervé le 10 Nov. 1690, à Canton dans la Chine, par les PP. Fontanay & le Comte, Jéſuites; à Nuremberg, par M. *Wurtzelbaur*; à Erford, par M. *Kirch*; à Varſovie, par le P. A. A. *Kochanski*; à Sommerfeld, près de Leipſick, par Michel *Arnoldus*.

2011. Le 6e paſſage fut obſervé le 3 Novembre 1697; à Paris, par M. Caſſini, M. Maraldi & M. de la Hire; à Roterdam, par le fils de M. Caſſini; à Tchaotcheoufou dans la Chine, par le P. Fontanay, Jéſuite; à Pékin, par le P. Visdeloup, Jéſuite; à Nuremberg, par M. Wurtzelbaur, &c. M. de l'Iſle qui, dans un avertiſſement parle de toutes ces obſervations, a laiſſé dans ſes manuſcrits les détails de l'obſervation faite à la Chine; celle qui fut faite à Paris eſt rapportée dans les élémens de M. Caſſini, *pag.* 597.

Je ne parle pas ici d'un paſſage du 5 Mai 1707, qui fut entrevu à Copenhague, par M. Roemer, ſans qu'on en ait tiré aucune conſéquence utile. On en attendoit un le 8 Mai 1720 au matin; M. de l'Iſle qui étoit pour lors à l'hôtel de Taranne, chercha Mercure inutilement, & le paſſage ne dut pas arriver ſuivant mes tables.

2012. Le 7e paſſage eſt du 9 Novembre 1723; il fut obſervé à Paris, à Londres, à Gênes, à Bologne, à Padoue, &c. M. Halley dans les tranſactions philoſophiques de 1725, en a fait uſage pour corriger ſes tables de Mercure, & M. de l'Iſle donna à cette occaſion un grand mémoire dans le volume de l'académie pour 1723.

2013. Le 8e paſſage eſt arrivé le 11 Novembre 1736, c'eſt l'obſervation la plus complette qu'on ait eue en Europe d'un paſſage de Mercure; car en pluſieurs endroits l'on obſerva l'entrée & la ſortie. On peut voir à

ce ſujet les mémoires de l'académie, année 1736.

2014. Le 9e paſſage eſt celui du 2 Mai 1740, obſervé ſeulement à Cambridge dans la nouvelle Angleterre, par M. Wintrop; l'obſervation ſe trouve dans les tranſactions philoſophiques, elle ſervit à M. de l'Iſle en 1752 à prédire le paſſage de 1753, en lui apprenant qu'il falloit ajouter 1′ 23″ à la longitude héliocentrique de Mercure, tirée des tables de M. Halley; c'étoit le ſecond paſſage qu'on eût vu dans le nœud deſcendant. M. de l'Iſle étoit allé exprès de Péterſbourg à Bereſow, en Sibérie, pour y faire cette obſervation, mais les nuages ſe diſſipèrent une heure trop tard, & il manqua l'objet de ce pénible voyage.

2015. Le 10e paſſage a été obſerve dans toute l'Europe, le 5 Novembre 1743, Voyez les mémoires de l'académie pour cette année-là.

2016. Le 11e eſt celui du 6 Mai 1753, c'eſt le troiſième qu'on ait vu dans le nœud deſcendant; il a été obſervé de même dans toute l'Europe; on eut à Paris, & j'eus moi-même au Château de Meudon l'obſervation la plus complette; ce fut à cette occaſion que je donnai ma méthode pour calculer ces ſortes d'obſervations (2125). *Mém. de l'acad.* 1753 & 1754.

2017. Le 12e paſſage de Mercure eſt celui du 7 Novembre 1756, obſervé à Pékin par le P. Amiot & le P. Gaubil, & à Pondicheri par le P. Cœurdoux, tous trois ſavans Miſſionnaires Jéſuites. M. de l'Iſle a donné le détail de cette obſervation avec les conſéquences qu'il en avoit tirées, dans les mémoires de l'acad. pour 1758, j'aurai occaſion d'en parler encore à l'art. 2159.

2018. Enfin, il y a eu un 13e paſſage le 9 Novembre 1769 au ſoir, dont la conjonction a dû arriver à 10h 33′ avec 7s 17° 50′ 49″ de longitude, & 7′ 39″ de latitude géocentrique; j'apprends qu'il a été obſervée en Amérique, mais les obſervations ne me ſont point encore parvenues. (Août 1770).

Paſſages du mois de Novembre.

2019. Les obſervations de ces 13 paſſages font voir qu'il y a des périodes ou des retours aſſignables pour ces

ſortes de phénomènes, & M. Halley qui les avoit apperçus, s'en ſervit pour les prédire tous. La période la plus courte pour les paſſages de Mercure, dans ſon nœud aſcendant au mois de Novembre, eſt celle de 6 ans 8j 18^h 27′; il y a un jour de plus, quand l'année du premier paſſage eſt la biſſextile ou la ſuivante, par exemple 1776; il n'y a pour lors qu'une biſſextile entre les deux paſſages qui arrivent dans les 6 ans. Après cet intervalle de temps Mercure paroît de 31′ 35″ plus au nord que la premiere fois au moment de la conjonction, ſuivant nos nouvelles tables.

2020. Ainſi pour que l'on puiſſe obſerver deux paſſages de Mercure ſur le ſoleil au nœud aſcendant, ou au mois de Novembre dans l'intervalle de 6 ans, il faut que dans le premier paſſage, Mercure ait eu une latitude très-méridionale, & qu'il ait preſque raſé le bord auſtral du ſoleil, afin que dans le paſſage ſuivant, il puiſſe rencontrer le bord boréal du ſoleil; mais cette circonſtance arrivera très-rarement. Le calcul précédent pour la quantité dont Mercure paroît plus au nord dans un paſſage que dans l'autre, ſe fera par les règles des articles 2045 & ſuiv. Ces nombres ſont un peu plus exacts que ceux de M. Halley. (*Philoſ. tranſ.* 1691, *n°.* 193, *pag.* 511. Abrégé I. 430).

2021. La ſeconde période eſt celle de 7 ans moins 7 jours & 44′, elle a lieu de 1769 à 1776; mais lorſqu'il n'y a qu'une biſſextile en 7 ans, ce qui arrive quand l'année du premier paſſage eſt biſſextile, on retranche ſeulement 6 jours. A la fin de cette période, Mercure paſſe 23′ 24″ plus au midi que la premiere fois; c'étoit ſeulement 22′ 47″, ſuivant les calculs de M. Halley, dans leſquels il donnoit la plus courte diſtance, ou la perpendiculaire ſur l'orbite relative.

2022. La troiſième période eſt celle de 13 années Juliennes, 2j 17^h 48′; il y a un jour de moins, s'il ſe trouve 4 biſſextiles dans l'intervalle. Mercure paſſe 8′ 21″ plus au nord que la premiere fois, au moment de

la conjonction. Cette période a lieu de 1743 à 1756, de 1756 à 1769, &c.

2023. La quatrième période du retour de Mercure au soleil est de 46 années Juliennes 1j 4^h 47′, ou un jour de moins, s'il y a douze bissextiles dans l'intervalle, comme cela arrive lorsque la premiere observation a lieu dans la seconde ou la troisième année après la bissextile ; il y a un jour de plus quand le calendrier Grégorien fait omettre une intercalaire. Mercure à la fin de cette période passe 1′ 22″, plus au nord qu'au commencement de cette période, suivant le calcul de M. Halley, ou 1′ 36″, suivant mes tables. Cette période a eu lieu de 1631 à 1677.

2024. Enfin, la cinquième & la plus exacte de toutes ces périodes, est celle de 263 années Juliennes, 11^h 7′ environ ; l'on comptera un jour de plus, si la premiere année de la période est une bissextile. A cause de l'omission de deux intercalaires en 1700 & en 1800 dans le calendrier Grégorien, la période entre le passage de 1631 & celui de 1894, sera de 263 ans 3j 11^h. Mercure passe 10″ seulement plus au nord, suivant le calcul de M. Halley, mais suivant mes tables qui donnent un mouvement du nœud beaucoup moindre (1337), Mercure doit passer 1′ 20″ plus au nord.

Passages du mois de Mai.

2025. Dans les retours de Mercure au nœud descendant, les périodes de 6 & de 7 ans ne peuvent avoir lieu, parce que dans les passages du mois de Mai, Mercure étant plus loin du soleil, & plus près de la terre que dans ceux du mois de Novembre, sa latitude géocentrique est plus grande, même à égale distance du nœud ; Mercure paroît donc nécessairement au nord du disque du soleil, s'il a rencontré ce disque même dans sa partie la plus méridionale, au commencement de cette période.

2026. Ainsi la période la plus courte pour les retours de Mercure sur le soleil à son nœud descendant au mois de Mai, est celle de 13 années Juliennes 3j 7^h & 38′, ou un jour de moins, si l'année précédente est la troisième après

une biſſextile, c'eſt-à-dire, ſi la premiere conjonction eſt arrivée dans l'année qui précède une biſſextile. Mercure paſſe plus au midi de 17′ 15″. Cette période a eu lieu de 1740 à 1753.

2027. La ſeconde période des paſſages de Mercure dans le nœud deſcendant eſt de 46 années Juliennes, en ſuppoſant qu'il y en ait 12 de biſſextiles, avec $5^h\,40'$ environ. Mais ſi la premiere année eſt la biſſextile, ou celle qui ſuit la biſſextile, il faut ajouter un jour de plus pour avoir le ſecond paſſage; on trouve même entre 1661 & 1707, 2j $5^h\,46'$ de différence, à cauſe de la biſſextile de 1700 qui avoit été omiſe (1547). Mercure étoit 2′ 59″ plus au midi, à la fin de cette période.

2028. La troiſième eſt celle de 263 années Juliennes $1^j\,2^h$ & un quart; on compte un jour de plus, ſi l'année du premier paſſage a été biſſextile, & encore deux autres jours de plus, s'il y a deux interruptions du calendrier. Mercure paſſe ſeulement de 27″ plus au midi que la premiere fois, ſuivant mes tables de Mercure. M. Halley comptoit un jour de moins, mais il me paroît que c'eſt une mépriſe.

2029. Il y avoit pluſieurs paſſages dans la liſte de M. Halley, qui ne pourront avoir lieu, parce que la latitude ſera plus grande qu'il n'avoit cru; M. Trebuchet en avoit fait la remarque à l'occaſion des paſſages de Vénus; en conſéquence, il a cru devoir vérifier les calculs de M. Halley en ſe ſervant de mes tables de Mercure, plus exactes que celles de cet auteur; il a employé auſſi les nouvelles tables du ſoleil, mais en négligeant les petites équations. En même temps il a pouſſé les calculs beaucoup plus loin que M. Halley qui s'étoit arrêté à 1799, voici la nouvelle table de M. Trebuchet qui s'étend juſqu'à la fin du 19e ſiècle, & contient 40 paſſages. Ceux qui doivent arriver juſqu'en 1815, ſont figurés dans une planche gravée, que Whiſton publia à Londres en 1723. La table ſuivante contient le temps moyen de la conjonction vraie de Mercure au ſoleil, & la latitude vraie de Mercure au moment de la conjonction.

Paſſages de Mercure ſur le Soleil dans ſon nœud deſcendant, au mois de Mai pendant trois ſiècles.

Années.	Temps moy. à Paris.				Longit. géocent. vraie en conjonc.				Latitude géoc.		
		H.	M.	S.	J.	D.	M.	S.	M.	S.	
1615	3 Mai.	1	23	50	1	12	34	17	6	33	B
1628	5	9	20	17	1	15	38	59	10	52	A
1661	3	6	58	58	1	13	38	17	3	36	B
1674	6	15	0	37	1	16	43	19	13	51	A
1707	5	12	45	0	1	14	43	5	0	37	B
1740	2	10	47	36	1	12	43	23	14	52	B
1753	5	18	25	37	1	15	47	28	2	22	A
1786	3	16	27	0	1	13	47	44	12	3	B
1799	7	0	5	48	1	16	51	52	5	20	A
1832	4	22	6	12	1	14	52	6	9	3	B
1845	8	5	46	36	1	17	56	17	8	19	A
1878	6	3	45	12	1	15	56	25	6	8	B
1891	9	11	27	12	1	19	0	41	11	19	A

Paſſages de Mercure ſur le Soleil dans ſon nœud aſcendant, au mois de Novembre pendant trois ſiècles.

Années.	Temps moy. à Paris.				Longit. géocent. vraie en conjonc.				Latitude géoc.		
		H.	M.	S.	J.	D.	M.	S.	D.	S.	
1605	1 Nov.	7	57	29	7	9	29	20	13	58	A
1618	4	1	49	30	7	12	5	32	5	32	A
1631	6	19	37	10	7	14	41	45	2	48	B
1644	8	13	21	25	7	17	17	56	11	7	B
1651	2	12	47	30	7	10	32	10	12	16	A
1664	4	6	38	50	7	13	8	21	3	58	A
1677	7	0	26	20	7	15	44	33	4	25	B
1690	9	18	9	15	7	18	20	44	12	44	B
1697	2	17	37	50	7	11	35	2	10	40	A
1710	6	11	28	30	7	14	11	12	2	19	A
1723	9	5	15	52	7	16	47	26	6	0	B
1736	10	22	59	40	7	19	23	38	14	21	B
1743	4	22	27	0	7	12	37	50	9	3	A
1756	6	16	18	0	7	15	14	3	0	42	A
1769	9	10	6	0	7	17	50	19	7	39	B
1776	11	9	21	40	7	11	4	26	15	45	A
1782	12	3	48	41	7	20	26	30	15	50	B
1789	5	3	16	35	7	13	40	37	7	25	A
1802	8	21	7	35	7	16	16	53	0	55	B
1815	11	14	53	30	7	18	53	7	9	15	B
1822	4	14	11	46	7	12	7	14	14	8	A
1835	7	8	6	50	7	14	43	31	5	49	A
1848	9	1	57	0	7	17	19	44	2	31	B
1861	11	19	43	50	7	19	56	0	10	52	B
1868	4	19	2	34	7	13	10	7	12	33	A
1881	7	12	56	10	7	15	46	20	4	12	A
1894	10	6	46	40	7	18	22	40	4	9	B

2030. Pour faire ſur les paſſages de Vénus de ſemblables calculs, on ſe ſert auſſi de ſa révolution ſynodique (1173), par laquelle on trouve les temps de toutes les conjonctions moyennes; lorſqu'on a calculée ces conjonctions, on choiſit celles qui arrivent aux environs des nœuds, c'eſt actuellement vers le commencement de Juin & de Décembre : on les calcule plus exactement (2043), & l'on trouve les retours de ces conjonctions à peu-près tels que je vais les rapporter (2038).

2031. La premiere période qu'on remarque dans les paſſages de Vénus ſur le ſoleil à ſon nœud aſcendant, ou au mois de Décembre, eſt celle de 8 ans, en ôtant du premier paſſage $2^j\ 10^h\ 52'$; Vénus paſſe la ſeconde fois $24'\ 18''$ plus au midi que la premiere fois. Il n'y a point de différence à faire pour le nombre de jours, relativement aux années biſſextiles. Périodes de Vénus.

2032. La ſeconde période eſt celle de 235 ans $2^j\ 10^h\ 10'$. On compte un jour de plus, ſi la premiere conjonction s'eſt trouvée dans une année biſſextile; la route de Vénus eſt de $21'\ 30''$ plus boréale dans la ſeconde obſervation que dans la premiere; au lieu que M. Halley la croyoit plus au nord de $11'\ 33''$ ſeulement.

2033. La période de 243 ans ramène auſſi les paſſages de Vénus, en ôtant ſeulement $43'$ du premier; mais ſi la premiere année a été biſſextile, on compte un jour de plus pour l'intervalle. La route de Vénus au bout des 243 ans eſt de $2'\ 48''$ plus méridionale, ſuivant mes tables; M. Halley la croyoit plus méridionale de $13'\ 8''$ par le défaut des tables que l'on avoit alors.

2034. Dans tous les paſſages du mois de Décembre vers le nœud aſcendant, l'inclinaiſon relative de l'orbite de Vénus ſuivant M. Halley, eſt de $9°\ 5'$, le mouvement horaire de Vénus $4'\ 7''$, & le temps qu'il lui faudroit pour traverſer le diſque entier du ſoleil eſt de $7^h\ 56'$. Dans ceux du mois de Juin les élémens ſont à peu-près tels qu'on les trouvera ci-après (2058), la durée

du paſſage du centre de Vénus par le centre du ſoleil, ne peut être que de $7^h\ 37'$.

2035. Dans les conjonctions de Vénus qui arrivent au mois de Juin vers le nœud deſcendant, les mêmes périodes ont lieu, avec quelques petites différences: la premiere période eſt de 8 ans moins 2j $7^h\ 37'$, & Vénus devient plus boréale de $19'\ 34''$, ſuivant les obſervations qu'on a faites dans les deux paſſages de 1761 & 1769.

2036. La ſeconde période eſt de 235 ans 2j $8^h\ 18'$, ou un jour de plus, ſi la premiere année eſt biſſextile. On ajoute encore un jour, ſi le calendrier Grégorien a ſouffert quelque interruption, comme en 1700, 1800 & 1900. Vénus devient plus auſtrale de $18'\ 10''$ à la fin de cette période; il eſt vrai que ſuivant M. Halley qui ne tenoit pas compte du mouvement du nœud de Vénus, elle devoit paſſer plus au midi de $9'\ 21''$, mais ce mouvement étant de $19''$ par année (1340), cela rend Vénus plus méridionale.

2037. La troiſième période eſt de 243 ans, $1^h\ 23'$, ou un jour de plus, ſi la premiere année eſt biſſextile; Vénus à la fin de cette période paroît plus boréale, non pas de $10'\ 37''$, comme l'avoit cru M. Halley, mais de $1'\ 20''$ ſeulement.

2038. En ſe ſervant de pareilles périodes, M. Halley calcula les 17 paſſages de Vénus qui ſont dans la table ſuivante; mais M. Trébuchet ayant corrigé le calcul des latitudes, d'après le mouvement du nœud de Vénus qui a été obſervé, en a trouvé 6 où Vénus ne paroîtra point ſur le ſoleil, quoiqu'elle dût y paſſer ſuivant le le calcul de M. Halley, & je les ai marqués d'une aſtériſque * dans la table ſuivante. Les plus courtes diſtances y ſont rectifiées, & j'y ai corrigé deux autres erreurs que M. Trébuchet avoit remarquées dans le calcul de M. Halley.

Table des paſſages de Vénus ſur le diſque du Soleil pendant 12 ſiècles.

	Temps vrai de la conjonction à Paris.				La plus courte diſtance de Vénus au centre du Soleil.		
V.St.	918	20 Nov.	22h	3′	25′ 30″	A	*
	1048	20 Mai	0	6	26 35	B	*
	1161	20 Nov.	21	20	27 22	A	*
	1283	23 Mai	8	24	7 50	B	
	1291	21 Mai	1	29	27 40	B	*
	1396	23 Nov.	7	30	5 47	A	
	1518	25 Mai	16	42	10 55	A	
	1526	23 Mai	9	47	8 55	B	
N.St.	1631	6 Déc.	17	39	15 48	B	
	1639	4 Déc.	6	47	8 30	A	
	1761	5 Juin	18	5	9 50	A	
	1769	3 Juin	11	10	10 0	B	
	1874	8 Déc.	16	56	13 0	B	
	1996	10 Juin	2	23	28 0	A	*
	2004	7 Juin	19	28	8 30	A	
	2109	13 Déc.	3	6	34 42	B	*
	2117	10 Déc.	16	13	10 23	B	

2039. Nous avons dit que Képler avoit annoncé un paſſage de Vénus pour l'année 1631, & qu'il n'y en avoit point eu (2003); mais il y en eut un 8 ans après, en 1639: Gaſſendi qui étoit déjà à Paris en 1631, ſe rendit très-attentif au paſſage que Képler avoit annoncé pour 1631; il raconte fort au long ſes tentatives à ce ſujet. (*Mercurius in ſole viſus, & Venus inviſa*); mais elles furent infructueuſes. La conjonction devoit arriver à 9h 6′ du ſoir, avec une latitude boréale de $11''\frac{1}{3}$, enſorte que l'entrée de Vénus ſur le ſoleil, devoit ſe faire le 6 Décembre vers le coucher du ſoleil; il auroit voulu examiner le ſoleil & ſe préparer deux jours d'avance à cette obſervation, mais le 4 & le 5 on n'eut que de la

Paſſage de Vénus annoncé pour 1631.

pluie avec un vent impétueux ; le 6 Gaſſendi vit pluſieurs fois le ſoleil, & le ſoir juſqu'à trois heures paſſées, ſans que Vénus y parût ; le 7 & le 8 au matin Vénus n'y étoit point, & Gaſſendi reſta dans le doute, ſi ce paſſage étoit arrivé tout entier pendant la nuit du 6 au 7, comme nous le croyons aujourd'hui, ou ſi la latitude s'étant trouvée trop grande, le paſſage avoit manqué totalement.

Paſſage obſervé en 1639.

2040. Le paſſage de Vénus qu'il y eut en 1639 fut le premier qu'on obſerva ; mais ce fut par un hazard heureux ; Horoccius s'étoit occupé à calculer des éphémérides ſur les tables de Lanſberge, beaucoup moins parfaites que les tables Rudolphines ; ces tables de Lanſberge donnoient une erreur de 16′ pour la latitude de Vénus, & les tables Rudolphines une erreur de 8′ ſeulement ; mais l'erreur de Lanſberge faiſoit remonter Vénus ſur le ſoleil, de ſorte que le paſſage devoit être viſible, tandis que l'erreur des tables de Képler la faiſoit paſſer au-deſſous ; c'eſt ainſi que de mauvaiſes tables occaſionnèrent une bonne obſervation ; ſur la foi de ces tables, que Lanſberge avoit célébrées avec une aſſurance capable d'en impoſer, Horoccius ſe prépara à obſerver ce paſſage, & le 24 Novembre 1639 vieux ſtyle, ou le 4 Décembre N. St., il vit en effet pendant environ une demi-heure Vénus ſur le ſoleil ; il en avoit donné avis à *Cabtrée* ſon ami, qui étoit à quelques lieues d'Hoole & qui l'obſerva également. J'en ai donné le réſultat parmi les obſervations de Vénus, *pag.* 169, d'après M. Honſby ; ſuivant M. Caſſini, la conjonction arriva le 4 Décembre 1639 à 6^h 20′ du ſoir, temps vrai, avec 8^s 12° 31′ 44″ de longitude, & 9′ 8″ de latitude géocentrique (*Elém. d'aſtr. pag.* 559).

M. Halley calcule les paſſages de Vénus.

2041. Dans le temps qu'on obſerva le paſſage de Vénus ſur le ſoleil en 1639, on ne connoiſſoit pas encore toute l'utilité qu'on retireroit un jour de ces ſortes de phénomènes : ce fut M. Halley qui en 1677 apperçut que la durée d'un paſſage de Mercure ou de Vénus ſur le ſoleil pouvoit ſervir à trouver ſa parallaxe ; il eſſaya

même de la trouver par le moyen du paſſage de Mercure ; mais en 1691 il donna dans les tranſactions philoſophiques un mémoire exprès ſur les paſſages de Vénus, où il parla de 17 paſſages, c'eſt-à-dire, de ceux qui avoient dû avoir lieu depuis 918, ou qu'on pouvoit eſpérer juſqu'à l'an 2117. (V. l'art. 2038). (*The Philoſophical tranſactions*, *n°* 193, *pag.* 511, *ou l'Abrégé de Lowthorp*, *tom. I. pag.* 434).

2042. Enfin M. Halley annonça que ſi l'intervalle de temps entre les deux contacts intérieurs des bords de Vénus & du ſoleil, pouvoit ſe déterminer, à une ſeconde près, en deux pays ſitués d'une manière convenable, on en concluroit la parallaxe du ſoleil & ſa diſtance, à $\frac{1}{100}$ près. Il développa enſuite cette dernière conſéquence en 1716 dans un autre mémoire : (Voyez *Philoſoph. tranſ. n°.* 348, *pag.* 454, *ou l'Abrégé de* Jones, *tom. IV*, *pag.* 213). Il aſſigna pour lors les lieux de la terre où il croyoit qu'on devoit ſe tranſporter pour faire, en 1761, cette importante obſervation avec tout l'avantage convenable ; mais il ſe trompa conſidérablement dans cette partie de ſon mémoire, comme je l'ai expliqué fort au long dans l'*Hiſt. de l'acad.* année 1757, *pag.* 83. Il annonce leur importance.

Méthodes pour calculer les circonſtances d'un paſſage de Vénus ou de Mercure ſur le Soleil.

2043. Les circonſtances d'un paſſage de Vénus ſont le temps de la conjonction, le milieu du paſſage, l'entrée & la ſortie ; la latitude au temps de la conjonction, & la plus courte diſtance des centres de Vénus & du ſoleil ; les méthodes qu'on emploie pour ces calculs ſont les mêmes pour Vénus & pour Mercure ; ainſi l'on devra entendre de Mercure tout ce que je dirai de Vénus dans les articles ſuivans.

On commence par calculer ces paſſages tels qu'ils paroîtroient s'ils étoient vus du centre de la terre ; on cherche enſuite l'effet des parallaxes en différens points de

Deux méthodes différentes.

la ſurface de la terre. Il y a deux méthodes pour calculer les circonſtances d'un paſſage de Vénus pour le centre de la terre, l'une par les longitudes & latitudes héliocentriques, l'autre par les longitudes & latitudes géocentriques; la premiere eſt la plus ſimple; M. de l'Iſle eſt le premier qui l'ait employée; je m'en ſervirai dans l'exemple ſuivant.

2044. Lorſqu'on connoît par le moyen des périodes indiquées ci-deſſus (2005, 2031), le jour où il peut y avoir un paſſage de Venus ſur le ſoleil, il s'agit de trouver l'heure de la conjonction: on calcule pour ce jour-là & pour la veille, la longitude du ſoleil & la longitude héliocentrique de Vénus réduite à l'écliptique, pour avoir le vrai mouvement diurne de Vénus vu du ſoleil; on calcule auſſi le mouvement diurne de la terre auſſi vu du ſoleil, qui eſt égal au changement de la longitude du ſoleil.

Ainſi le 5 Juin 1761 à midi, la longitude de la terre oppoſée à celle du ſoleil étoit de $8^s\ 14^\circ\ 53'\ 34''$, & celle de Vénus $8^s\ 14^\circ\ 24'\ 47''$, par les tables dont je me ſervois alors; le 6 Juin la longitude de la terre $8^s\ 15^\circ\ 50'\ 56''$, & celle de Vénus $8^s\ 15^\circ\ 59'\ 55''$. Ainſi le mouvement diurne du ſoleil ou de la terre étoit de $57'\ 22''$, & celui de Vénus de $1^\circ\ 35'\ 8''$; la différence $37'\ 46''$ eſt le mouvement diurne de Vénus par rapport à la terre, vu du ſoleil, ſur l'écliptique. La longit. de Vénus pour le 5 à midi étant moindre que celle de la terre de $28'47''$, on fera cette proportion; le mouvement relatif $37'\ 46''$ eſt à 24^h comme $28'\ 47''$, diſtance de Vénus à ſa conjonction avec la terre, ſont à $18^h\ 17''\frac{1}{2}$, temps de la conjonction ſuivant les tables; je l'ai trouvée par obſervation à $17^h\ 50'$, c'eſt-à-dire, le 6 à $5^h\ 50'$ du matin; ainſi l'erreur des tables étoit de près de demi-heure; quoique j'euſſe choiſi les élémens dont on pouvoit eſpérer le plus d'exactitude, (*Mém. acad.* 1761, *pag.* 107); mais il ne faut pas s'en étonner, car une erreur de $50''$ dans la longitude de Vénus ſuffit pour changer d'une demi-heure le temps de la conjonction, à cauſe de la lenteur de ſon mouvement

Temps de la conjonction.

relatif. En employant les tables ſeules de M. Halley, on trouve la conjonction à 5^h $56'$; mais cette exactitude eſt produite par la compenſation de deux erreurs. (*Ibid. pag.* 111). L'heure de la conjonction vue du ſoleil ou de la conjonction vue de la terre, eſt exactement la même ; puiſque la conjonction a lieu quand Vénus eſt ſur le plan du cercle de latitude qui paſſe par les centres du ſoleil & de la terre ; ainſi nous n'avons aucun autre calcul à faire pour trouver la conjonction.

Latitudes & diſtances.

2045. Ayant trouvé l'heure de la conjonction, l'on calcule par les tables la latitude héliocentrique de Vénus, le rayon vecteur ou la diſtance au ſoleil, auſſi bien que la diſtance de la terre au ſoleil. Cette latitude vue du ſoleil étoit, ſuivant mes tables de $3'\,54''$ auſtrale ; le mouvement horaire en latitude vu du ſoleil $14''08$, la diſtance de Vénus au ſoleil 72643, celle de la terre au ſoleil 101546, & par conſéquent celle de Vénus à la terre 28903 ; je ſuppoſe cent mille pour la diſtance moyenne du ſoleil à la terre, comme l'a fait M. Halley dans ſes tables. On cherchera auſſi le demi-diamètre du ſoleil, qui dans cet exemple eſt de $15'\,46''\frac{1}{2}$, mais que je réduirai dans la ſuite à $15'\,43''$ (2159).

Section du cône ſolaire.

Fig. 126.

2046. Soit S le centre du ſoleil (*fig.* 126), dont le demi-diamètre eſt SA, T le centre de la terre, TV la diſtance de Vénus à la terre ; ſi l'on conçoit un cône ATB, dont le ſommet ſoit au centre de la terre T, & dont le ſoleil ſoit la baſe, l'angle ATB de ce cône ſera la valeur du diamètre du ſoleil vu de la terre (1383). Ce cône étant coupé dans la région de Vénus par un plan perpendiculaire à ſon axe, la ſection eſt un cercle dont le diamètre eſt CD ; lorſque Vénus traverſe le cône ATB, elle paſſe dans ce plan de ſection, ou dans le cercle dont le diamètre eſt CD, & elle y eſt néceſſairement pendant toute la durée du paſſage. En effet, quand Vénus entre en C dans le cône ATB, elle paroît vue de la terre T, être ſur le bord A du ſoleil ; quand elle quitte ce cône en D, elle paroît ſur l'autre bord B du diſque ſolaire, & c'eſt la fin du paſſage : ainſi nous allons cher-

Fig. 126. cher par le moyen des longitudes vues du ſoleil (2044); à quelle heure Vénus entrera dans la ſection du cône CD, & ce ſera le commencement du paſſage.

2047. Il faut ſavoir d'abord quelle eſt la grandeur apparente vue du ſoleil de la ſection CD, que Vénus doit traverſer pendant la durée du paſſage, ou de l'angle CSV; pour cela on conſidère les triangles rectilignes rectangles SCV, TCV, qui ont un côté commun CV; ſi l'on prend CV pour rayon, on aura SV pour tangente de l'angle SCV, ou cotangente de CSV, on aura de même TV pour cotangente de l'angle CTV, qui eſt égal au demi-diamètre du ſoleil; on pourra donc faire cette proportion, $TV : SV ::$ cotang. : CTV : cot. CSV, ou parce que les tangentes ſont en raiſon inverſe des cotangentes, $SV : TV ::$ tang. CTV : tang. CSV; mais de ſi petits angles ſont entre eux comme leurs tangentes, il n'y auroit pas une ſeconde d'erreur à craindre, même pour des arcs d'un degré; ainſi l'on dira : *la diſtance de Vénus au ſoleil eſt à la diſtance de Vénus à la terre, comme le demi-diamètre du ſoleil vu de la terre eſt au demi-diamètre de la ſection vue du ſoleil.*

Règle pour trouver cette ſection.

2048. Au moyen des diſtances rapportées ci-deſſus (2045) pour le paſſage de Vénus ſur le ſoleil en 1761, on aura cette proportion, $7264 : 2890 :: 15' 46'' \frac{1}{2} : 6' 16'' 59$, enſorte que le demi-diamètre de la ſection que Vénus traverſoit le jour du paſſage, étoit de $6' 16'' 59$ vu du ſoleil.

Fig. 125. 2049. Soit un cercle AES (*fig.* 125), dont le demi-diamètre CO vu du ſoleil ſoit de $6' 16'' \frac{1}{2}$ (2048), la circonférence AES repréſentera celle de la ſection que Vénus doit traverſer; CN étant ſuppoſée une portion de l'écliptique; on tirera ſur CN une perpendiculaire CV, égale à $3' 54''$, latitude héliocentrique de Vénus que nous avons trouvée ci-deſſus (2045) pour le moment de la conjonction; le point V ſera celui où Vénus devra ſe trouver au moment de la conjonction, & c'eſt par le point V qu'il faudra tirer une ligne EVS, pour repréſenter la trace ou l'orbite relative de Vénus, après

après que nous aurons déterminé l'inclinaiſon relative de cette orbite vue du ſoleil. *Fig.* 125.

2050. Nous avons fait voir en parlant des éclipſes (1765), que pour trouver l'inclinaiſon relative d'une orbite par rapport à un aſtre *C*, ſuppoſé fixe, il faut faire cette proportion : la ſomme ou la différence des deux mouvemens en longitude, eſt à la ſomme ou à la différence des mouvemens en latitude, comme le rayon eſt à la tangente d'un angle qui ſe trouve être l'inclinaiſon de l'orbite relative. Dans le cas dont il s'agit ici, les mouvemens en longitudes vont du même ſens ; ainſi l'on prendra la différence des mouvemens diurnes de la terre & de Vénus, qui eſt $37' 46''$; & le mouvement diurne de Vénus en latitude, qui eſt de $5' 38''$, le ſoleil n'en a aucun, l'on dira donc, $37' 46'' : 5' 38'' :: R :$ tang. $8° 29''$, c'eſt à peu-près l'inclinaiſon de l'orbite relative de Vénus ſur l'écliptique ; ou plus exactement $8° 28' 47''$ (2058). On tirera donc une ligne *SVE*, qui faſſe avec le cercle de latitude *CV* un angle de $81° 31'$, c'eſt le complément de l'inclinaiſon $8° 29'$; & comme la latitude de Vénus *CV* va en croiſſant, on fera l'angle aigu *OVS* extérieurement du côté de la ſortie *S* de Vénus, ou du côté de l'orient. Je dis que la ſortie eſt du côté de l'orient, parce que toutes les planètes vues du ſoleil paroiſſent aller à l'orient ; c'eſt-à-dire, ſelon l'ordre des ſignes ; quoiqu'il n'y ait véritablement ni orient ni occident quand on ſe ſuppoſe dans le ſoleil, on eſt convenu de dire, comme ſur la terre, qu'une planète va d'occident vers l'orient, quand elle va ſuivant l'ordre des ſignes, le Bélier, le Taureau, &c. en augmentant de longitude. Orbite relative.

2051. On abaiſſera ſur l'orbite *ES* une perpendiculaire *CM* ; le point *M* ſera le milieu du paſſage de Vénus, & *CM* ſera la plus courte diſtance de Vénus à la terre, vue du ſoleil ; c'eſt ſa diſtance à la ligne des centres, ou à l'axe du cône dont nous avons parlé (2046). Pour trouver la quantité *MV*, on fera attention que l'angle *MCV*, formé par la perpendiculaire à l'orbite, & la perpendiculaire à l'écliptique, eſt égal à celui que

Fig. 125. forment l'orbite relative & l'écliptique, c'eſt-à-dire, à l'inclinaiſon 8° 28′ 47″; on fera donc cette proportion, $R : CV$: ou 3′ 54″ : : ſin. 8° 28′ 49″ : MV qui ſe trouvera 34″ 505.

Mouvement relatif. 2052. Le mouvement diurne de Vénus ſur ſon orbite relative ſe trouvera en diſant (1765), le coſinus de l'inclinaiſon eſt au rayon, comme la différence des mouvemens diurnes 37′ 46″ eſt au mouvement ſur l'orbite relative 38′ 11″, dont la vingt-quatrième partie eſt le mouvement horaire vu du ſoleil 1′ 35″ à peu-près; nous le trouverons enſuite par une méthode plus exacte, 1′ 35″ 504 (2057).

Milieu du paſſage. Au moyen de ce mouvement horaire, il eſt aiſé de trouver le milieu du paſſage & le temps que Vénus emploie à aller de V en M; on dira pour cet effet, 1′ 35″ 504 : 3600″ : : 34″ 505 : 21′ 41″, différence entre la conjonction & le milieu du paſſage. La différence des logarithmes de 3600″ & du mouvement horaire, forme un logarithme conſtant 1576281 qui, ajouté avec celui de la quantité VM vue du ſoleil, donne le temps correſpondant. Si l'on ſuppoſe l'heure de la conjonction $5^h\ 50''$ (2044), on aura pour le milieu du paſſage 5^h 28′ 19″.

La plus courte diſtance. Le triangle CVM, qui a ſervi à trouver MV (2051) ſervira auſſi à trouver CM, en diſant, $R : CV$: : coſ. $VCM : CM$, qui ſera 231″ 44 : ainſi la plus courte diſtance CM vue du ſoleil eſt de 3′ 51″ 44. Pour trouver cette diſtance vue de la terre; on dira comme dans l'article 2047, la diſtance de Vénus à la terre eſt à celle de Vénus au ſoleil, comme 3′ 51″ 44 ſont à 9′ 41″ 69, c'eſt la plus courte diſtance de Vénus au ſoleil vue de la terre.

2053. Si l'orbite de Vénus traverſoit le centre C de la ſection, l'arc ME de l'orbite ſeroit égal à CD, c'eſt-à-dire, au rayon même de la ſection, 6′ 16″ 6; mais à cauſe de la latitude CV, Vénus traverſe une corde ES plus petite que le diamètre; ainſi Vénus ne ſera pas auſſi long-temps dans le cercle ASE, & la durée du paſſage ſera moindre, que ſi Vénus n'avoit point de latitude.

Pour connoître la longueur *ME*, qui eſt égale à *SM*, on réſoudra le triangle *CME*, dans lequel on a *CE* = 6′ 16′ 59 & *CM* 3′ 51″ 44 : l'on trouvera *ME* de 4′ 57″,08. Le temps que Vénus employera à parcourir *ME*, ſera la demi-durée du paſſage : ainſi on la trouvera par cette proportion ; le mouvement horaire relatif 1′ 35″ 504, eſt à une heure ou 3600″, comme 4′ 57″ 08 ſont à 3h 6′ 38″. C'eſt le temps que Vénus emploie à aller de *E* en *M*, & c'eſt la demi-durée du paſſage, vue du centre de la terre. *Fig.* 125. Demi-durée du paſſage.

La demi-durée 3h 6′ 38″ étant ôtée de 5h 28′ 19″, milieu du paſſage (2052), donnera 2h 21′ 41″, pour le moment de l'entrée du centre de Vénus dans la ſection du cône ſolaire, ou dans le cercle *ASE* ; & cette même demi-durée étant ajoutée à 5h 28′ 19″, donnera 8h 34′ 57″ pour la ſortie du centre de Vénus ; c'eſt auſſi la ſortie vue du centre de la terre ; c'eſt-à-dire, telle qu'elle eſt, en faiſant abſtraction des parallaxes (2060). Entrée & ſortie.

2054. Telle eſt la méthode la plus ſimple de trouver le commencement & la fin du paſſage de Vénus par rapport au centre de la terre ; on n'y emploie autre choſe que les longitudes de Vénus vues du ſoleil, qui ſont beaucoup plus aiſées à calculer que les longitudes géocentriques (1143). On pourroit faire la même choſe en y employant les longitudes géocentriques, & le mouvement de Vénus vu de la terre (2057) ; il ſuffiroit de prendre pour rayon du cercle *AES* le demi-diamètre du ſoleil 15′ 46″ 5 : on trouveroit *CM* = 9′ 42″ 626 le logarithme conſtant 11760380 & la demi-durée 3h 6′ 38″ ; avec un mouvement rétrograde.

2055. Le changement de la diſtance de Mercure au ſoleil eſt aſſez ſenſible dans l'eſpace de quelques heures, pour qu'on ne doive pas ſuppoſer égaux les rayons du diſque ou de la ſection *ASE* au commencement & à la fin du paſſage. M. de l'Iſle, en calculant le paſſage de Mercure pour le 7 Novembre 1756 (*Mém. acad.* 1758, *pag.* 148), trouve le rayon *CE* pour l'entrée 34′ 24″ 43, & le rayon *CS* pour la ſortie 34′ 30″ 25, c'eſt-à-dire, Inégalité des diſtances de Mercure.

Fig. 125. plus grand de $5''$ 82; parce que dans l'eſpace de 5^h $25'$ que dura ce paſſage, Mercure s'étoit rapproché de ſon périhélie, & par conſéquent du ſoleil; ce qui lui faiſoit parcourir une ſection plus voiſine de la baſe du cône, & par conſéquent plus étendue : mais cette inégalité peut ſe négliger dans les paſſages de Vénus.

Inégalité de ſon mouvement.

2056. L'inégalité du mouvement de Mercure doit auſſi entrer dans le calcul, ſi l'on veut être aſſuré du réſultat à quelques ſecondes près. Dans le paſſage de 1756, le mouvement héliocentrique de Mercure ſur ſon orbite relative, dans la premiere demi-durée du paſſage étoit de $34'$ $21''$ 18; & dans la ſeconde demi-durée, il étoit de $34'$ $26''$ 07, c'eſt-à-dire, plus grand, en temps égal, de $4''$ 89. (*Mém.* 1758, *pag.* 143); la moitié de cette inégalité vaut $11''\frac{1}{2}$ de temps, dont le vrai milieu du paſſage eſt différent d'un milieu pris entre l'entrée & la ſortie, obſervées en E & en S, enſorte que la ſeconde demi-durée, à compter du point M, étoit plus courte de $23''$ que la premiere demi-durée EM (*Ibid. pag.* 153).

Calcul du mouvement horaire.

2057. J'ai donné dans les mémoires de l'académie pour 1762, *pag.* 96, une méthode exacte, pour trouver avec la préciſion d'un centième de ſeconde, les mouvemens horaires de Mercure & de Vénus, & par conſéquent leur inégalité; mais les bornes de ce traité ne me permettent pas d'en donner ici la démonſtration : il me ſuffira de rapporter mes formules, elles ſont tirées des règles que j'ai démontrées (1240, 1241), & des formules différentielles (3307, & ſuiv.). Soit x l'anomalie excentrique, u l'anomalie vraie, a la diſtance aphélie, p la diſtance périhélie, e l'excentricité en ſecondes; on a $dx = du\frac{\sqrt{a}\cos.\frac{1}{2}x^2}{\sqrt{p}\cos.\frac{1}{2}u^2}$, & $e\,dx$ cos. x eſt la quantité qu'il faut ajouter au mouvement dx de l'anomalie excentrique (dans le premier & le dernier quart de l'anomalie excent.) pour avoir le mouvement de l'anomalie moyenne. On ſuppoſera le mouvement vrai du connu à peu-près, pour en déduire d'abord dx, & enſuite le mouvement moyen, qui doit ſe trouver de $4'$ $0''$ 32 pour

Vénus, & de 10′ 13″ 86 pour Mercure, ſi l'on a bien ſuppoſé le mouvement vrai. Si l'on trouve un mouvement moyen plus grand, l'on diminuera la valeur qu'on a ſuppoſée pour mouvement vrai, à peu-près comme on a fait pour trouver l'équation du centre (1244). Le mouvement horaire vrai ſur l'orbite multiplié par le coſinus de l'inclinaiſon vraie de l'orbite, donnera le mouvement horaire ſur l'écliptique; & multiplié par le ſinus de l'inclinaiſon, & le coſinus de la diſtance au nœud, il donnera le mouvement horaire en latitude vu du ſoleil. Ayant pris la différence entre le mouvement ſur l'écliptique & celui de la terre, on trouvera le mouvement relatif (2052), l'on en conclura les mouvemens géocentriques relatifs, de Vénus ou de Mercure par rapport au ſoleil, par le ſimple rapport des diſtances de la planète à la terrre & au ſoleil.

2058. C'eſt ainſi que j'ai trouvé pour le paſſage de Vénus ſur le ſoleil en 1761, le mouvement horaire 1′ 35″ 504 vu du ſoleil, & le mouvement vu de la terre 3′ 57″ 40 ſur l'écliptique, 4′ 0″ 03 ſur l'orbite, 35″ 39 en latitude & l'inclinaiſon 8° 28′ 47″; mais pour 1769 le mouvement relatif vu de la terre eſt de 3′ 57″ 49 ſur l'écliptique, 4′ 0″ 11 ſur l'orbite relative, & 35″ 42 en latitude, l'inclinaiſon 8° 28′ 59″; il faut avoir ſoin d'employer ou le mouvement ſur l'orbite ou le mouvement ſur l'écliptique, ſuivant les différens cas (2065, 2150).

2059. Pour Mercure dans ſon paſſage ſur le ſoleil, le 6 Mai 1753, à 10ʰ 20′ du matin; le mouvement héliocentrique vrai de Mercure ſeul étoit de 7′ 17″ 56 ſur l'orbite, 7′ 14″ 31 ſur l'écliptique, 53″ 24 en latitude, les mouvemens géocentriques relativement au ſoleil 3′ 59″ 83, 3′ 55″ 87 & 43″ 46; l'inclinaiſon relative 10° 25′ 28″ vue du ſoleil ou de la terre.

Méthode pour trouver l'effet de la parallaxe dans les paſſages de Vénus & de Mercure ſur le Soleil, par un calcul rigoureux.

2060. Lorsqu'on veut ſimplement calculer & prédire un paſſage de Vénus ſur le ſoleil, il ſuffit de calculer l'effet des parallaxes en différens lieux de la terre par les méthodes graphiques, dont je donnerai bientôt l'explication (2070); mais lorſqu'un paſſage de Vénus a été obſervé en différens pays de la terre, comme ceux de 1761 & de 1769, & qu'on veut en conclure la parallaxe du ſoleil, on ne ſauroit mettre trop d'exactitude & trop de ſcrupule dans le calcul de la parallaxe, pour réduire chaque obſervation au centre de la terre, & pour trouver le rapport qu'il y a entre les effets de la parallaxe dans ces différens lieux d'obſervations: c'eſt ce que nous allons exécuter par la méthode la plus rigoureuſe & la plus exacte, en ne négligeant pas même les centièmes de ſecondes dans la parallaxe; car cette préciſion eſt néceſſaire, ſi l'on veut avoir pour les temps cherchés la préciſion d'une ſeconde.

2061. Je prendrai pour exemple l'obſervation que je fis à Paris le 6 Juin 1761. Le contact intérieur des deux bords de Vénus & du ſoleil arriva à $8^h\ 28'\ 25''$ du matin; il faut trouver pour ce moment la parallaxe de Vénus par rapport au ſoleil, l'effet qu'elle produiſoit ſur la diſtance du centre de Vénus au centre du ſoleil, & le temps où ce même contact a dû arriver pour le centre de la terre. La premiere opération conſiſte à trouver pour cet inſtant la hauteur vraie du centre de Vénus, & l'angle du vertical, avec le cercle de déclinaiſon au centre de Vénus. La longitude du ſoleil étoit de $2^s\ 15°\ 42'\ 29''$, ſon aſcenſion droite $74°\ 28'\ 43''$, ſa déclinaiſon $22°\ 42'\ 15''$, l'angle de poſition $6°\ 7'\ 6''$. L'angle horaire ou la diſtance du ſoleil au méridien, ſe trouve en convertiſſant en degrés, ce qui manque au

temps vrai donné pour aller à 12^h, c'eſt-à-dire, $3^h\ 31'\ 35''$, à raiſon de $15°$ par heure; il eſt de $52°\ 53'\ 45''$. Vénus étant aſſez éloignée du centre du ſoleil, pour que ſa hauteur ſoit différente de celle du ſoleil; il faut, pour trouver exactement cette hauteur, avoir l'angle horaire de Vénus & ſa déclinaiſon.

2062. Soit S (*fig.* 131) le centre vrai de Vénus au moment du contact intérieur apparent, CS la diſtance vraie des centres de Vénus & du ſoleil, elle eſt égale à la différence des demi-diamètres du ſoleil & de Vénus; le premier eſt de $15'\ 46''\frac{1}{1}$ dans les tables, nous le réduirons à $15'\ 43''$ (2159), le ſecond eſt d'environ $29''$ (2157). Il faut encore ôter $3''$, c'eſt à peu-près l'alongement que la parallaxe produiſoit dans la diſtance, mais que l'on pourroit négliger, ſi l'on n'en ſavoit pas déjà la valeur par des calculs préliminaires; ainſi CS eſt $15'\ 11''$; CM eſt la perpendiculaire ou la plus courte diſtance ſuppoſée de $9'\ 30''$ (a); on trouvera par la réſolution du triangle MCS que l'angle MCS eſt de $51°\ 16'\ 3''$, on en prendra le complément $SCV = 38°\ 43'\ 57''$; on y ajoutera l'angle $VCO = 14°\ 35'\ 53''$, inclinaiſon de l'orbite ſur l'équateur pour le moment de l'obſervation, qui étoit la ſomme de l'inclinaiſon $8°\ 28'\ 47''$, & de l'angle de poſition pour le ſoleil $6°\ 7'\ 6''$, la ligne CV étant ſuppoſée parallèle à l'orbite relative & CO parallèle à l'équateur, l'on aura l'angle $SCO = 53°\ 19'\ 50''$. Par le moyen du triangle SCO, dont on connoît l'hypothénuſe CS $15'\ 11''$ & l'angle OCS, on trouvera OS, différence de déclinaiſon vraie $= 12'\ 11''$, & CO qui diviſée par le coſinus de la déclinaiſon du ſoleil (892), parce que CO n'eſt qu'un parallèle à l'équateur, & non pas l'équateur lui-même, donnera la différence d'aſcenſion droite vraie entre Vénus & le ſoleil $9'\ 50''$.

Fig. 131.

(a) Je l'ai trouvée ainſi par le calcul d'un grand nombre d'obſervations (2135), en ſuivant les méthodes dont je donnerai l'explication ci-après (2153). On pourroit ſuppoſer quelques ſecondes de plus ou de moins, ſans que les calculs ſuivans en fuſſent ſenſiblement affectés.

On retranchera cette différence d'aſcenſion droite de l'angle horaire du ſoleil 52° 53′ 45″, puiſque Vénus à ſa ſortie étoit plus près du méridien que le centre du ſoleil, & l'on aura l'angle horaire pour Vénus 52° 43′ 55″; on retranchera la différence de déclinaiſon 12′ 11″ de la déclinaiſon du ſoleil 22° 42′ 15″ & l'on aura la déclinaiſon vraie de Vénus 22° 30′ 4″; avec ces deux élémens, & la hauteur du pole 48° 51′ 0″, (comme elle eſt au Palais du Luxembourg où je faiſois alors mes obſervations), je trouve la hauteur vraie de Vénus 41° 1′ 7″; & l'angle du vertical avec le cercle de déclinaiſon pour le lieu vrai de Vénus 43° 57′ 10″, (1034, 1036).

La différence d'aſcenſion droite étant retranchée de celle du ſoleil, donne l'aſcenſion droite de Vénus 74° 18′ 53″; cette aſcenſion droite avec la déclinaiſon vraie 22° 30′ 4″, & l'obliquité de l'écliptique 23° 28′ 19″ fait trouver l'angle de poſition 6° 10′ 59″ pour le lieu vrai de Vénus; il faut réſoudre pour cela un triangle dont on connoît deux côtés, & l'angle compris qui eſt la diſtance de Vénus au colure des ſolſtices; c'eſt un angle obtus dans ce cas-ci; l'angle de poſition 6° 10′ 59″, ajouté avec l'inclinaiſon ſur l'écliptique 8° 28′ 47″ donne l'inclinaiſon de l'orbite de Vénus par rapport à l'équateur ou à ſon parallèle 14° 39′ 46″.

2063. La parallaxe horizontale du ſoleil eſt de 9″, ce qui donne pour celle de Vénus 31″ 62; car la diſtance de Vénus eſt à celle du ſoleil comme 9″ eſt à 31″ 62 au moment de la conjonction: ainſi la différence des parallaxes horizontales de Vénus & du ſoleil eſt 22″ 62; on la multipliera par le coſinus de la hauteur vraie de Vénus, diminuée, ſi l'on veut de la parallaxe à peu-près connue, ou de 17″, & l'on aura 17″ 068 pour la différence des parallaxes de hauteur. Soit *V* (*fig.* 134) le vrai lieu du centre de Vénus au moment de l'obſervation, *ZVD* le vertical, *D* ſon lieu apparent, qui étoit plus bas de 17″ 068; *GF* le bord du ſoleil, *VM* l'orbite relative de Vénus, vue du centre de la terre, *CE* une ligne tirée par le centre du ſoleil, ſuppoſée parallèle

Fig. 134.

au

au vertical ZVD de Vénus ; il faut trouver la valeur exacte de l'angle CVM formé par l'orbite VM, & par la vraie diſtance CV de Vénus au centre du ſoleil ; pour cela je ſuppoſe que le milieu du paſſage eſt arrivé en M à $5^h\ 30'\ 10''$ (2135), ou environ $2^h\ 58'\ 15''$ avant le moment du contact ; le mouvement horaire de Vénus ſur ſon orbite étant de $4'\ 0''\ 03$ (2058) ; on peut en conclure la portion MV de l'orbite vraie de Vénus parcourue depuis le milieu du paſſage ; de ſon logarithme on ôte celui de la plus courte diſtance vraie CM, $9'\ 30''$, & l'on a celui de la tangente de l'angle MCV ; on peut auſſi le conclure des valeurs de $CV = 15'\ 11''$ & de $CM = 9'\ 30''$, je le trouve par-là de $51°\ 16'\ 3''$. Fig. 134.

L'angle ECF eſt ſuppoſé formé par une ligne CE parallèle au vertical ZVD de Vénus & par la ligne PCF parallèle au cercle de déclinaiſon qui paſſe par Vénus, cet angle eſt de $43°\ 57'\ 10''$; on en retranchera l'angle MCF du cercle de déclinaiſon CF avec la perpendiculaire à l'orbite, qui eſt de $14°\ 39'\ 41''$, & l'on aura $29°\ 17'\ 29''$ pour l'angle ECM, qui ajouté avec MCV, donnera $80°\ 33'\ 32''$ pour l'angle ECV, égal à CVZ, formé au lieu vrai de Vénus ; ſon ſupplément eſt l'angle CVD dont nous avons beſoin. En prenant l'angle parallactique & l'angle de poſition pour le centre vrai de Vénus V, c'eſt-à-dire, en ſuppoſant que CE n'eſt point le vertical du ſoleil, mais une ligne parallèle au vertical de Vénus, on ne ſuppoſe point que les deux verticaux ſoient réellement parallèles. On pourroit chercher auſſi ces angles pour le lieu apparent D de Vénus, comme je l'ai fait ailleurs (2148), mais il faut ſuppoſer que CV ſoit connu à très-peu-près.

2064. Dans le triangle CVD, l'on connoît donc deux côtés & un angle, ſavoir, CD qui eſt la différence des demi-diamètres de Vénus & du ſoleil, $= 914''$, VD qui eſt la parallaxe de hauteur $17''\ 068$, l'angle CVD oppoſé à CD, & que nous venons de trouver ; on cherchera l'angle VCD qui eſt de $1°\ 3'\ 19''\ 8$, on le retranchera de l'angle $CVZ = 80°\ 33'\ 32''$, & l'on aura

Fig. 134. l'angle CDV 79° 30′ 12″ 2. Alors on dira ſin. $V : CD ::$ ſin. $D : CV$, &l'on aura la vraie diſtance $CV = 911''\ 03$; ſi l'on retranche cette diſtance vraie de la diſtance apparente $CD = 914''$, égale à la différence des demi-diamètres, on aura $2''\ 97$ pour l'allongement que la parallaxe cauſoit dans la diſtance du centre de Vénus au centre du ſoleil, obſervée à Paris, au moment du contact intérieur des deux bords de Vénus & du ſoleil.

Allongement à Paris.

2065. Par le moyen de la diſtance vraie CV, nous ſaurons combien Vénus étoit éloignée du contact vrai, qui eût été obſervé du centre de la terre : pour que ce contact ait lieu, il faut que Vénus ſoit en un point X de ſon orbite vraie MVX, tel que la diſtance vraie CX des deux centres ſoit égale à la différence des demi-diamètres $91''$, c'eſt-à-dire, égale à CD ; il faudra donc réſoudre ſéparément les deux triangles CMV, CMX, avec la plus courte diſtance $CM = 9'\ 30''$ qui eſt un côté commun à tous les deux ; mais en employant d'abord le côté CV de $911''\ 03$, comme nous l'avons trouvé, & enſuite le côté CX de $914''$; on trouvera MV de $710''$ 68 & MX de $714''$ 49, la différence $3''$ 81 eſt la valeur de VX ; les temps qui correſpondent à MV & MX ſont $2^h\ 57'\ 39''\ 0$ & $2^h\ 58'\ 36''\ 0$; ainſi la portion de l'orbite de Vénus parcourue depuis le moment du contact obſervé à Paris, Vénus étant alors réellement en V, juſqu'au moment du vrai contact vu du centre de la terre, qui eſt arrivé lorſque Vénus étoit en X, ou l'arc VX correſpond à $57''$ de temps ; on trouveroit la même choſe avec ſa valeur $3''$ 81 convertie en temps, (par le moyen du logarithme conſtant 1, 176038 qui eſt celui de $3600''$ ou 1^h diviſées par le mouvement horaire $4'\ 0''\ 03$) ; car on trouveroit $57''$ pour le temps que l'on cherche ; c'eſt l'effet de la parallaxe ſur le temps de l'attouchement intérieur, à Paris ; il y eſt donc arrivé $57''$ plutôt qu'on ne l'auroit vu du centre de la terre, en ſuppoſant la parallaxe du ſoleil de $9''$.

Effet de la parall. à Paris en 1761.

On pourroit trouver auſſi l'arc VX de l'orbite, en abaiſſant ſur CX la petite perpendiculaire VA ; dans le

triangle VAX on connoît $AX = 2'' 97$ différence entre la diſtance vraie & la diſtance apparente, avec l'angle $AVX = MCX$ qui pourroit être pris pour $MCV = 51° 16'$, quoiqu'il ſoit plus grand de quelques minutes ; l'on trouveroit facilement l'hypothénuſe VX ; mais cette méthode n'eſt pas tout-à-fait auſſi exacte que celle dont je viens de donner le détail. Fig. 134.

2066. La ſortie apparente, en général, arrive plutôt que la vraie, quand elle ſe fait au-deſſous du diamètre horizontal. *Mém.* 1756, *pag.* 263. *Journal des Savans*, *Mars* 1760, *Février* 1762), c'eſt-là l'unique règle ; mais pour prévenir la difficulté qui pourroit avoir lieu quand la ſortie vraie ſe fait au-deſſus du diamètre horizontal & l'apparente au-deſſous, on peut dire que la ſortie apparente eſt avancée toutes les fois qu'elle ſe fait au-deſſous du diamètre horizontal, & plus loin de ce diamètre que la ſortie vraie ; par la même raiſon, l'entrée apparente eſt retardée toutes les fois qu'elle ſe fait au-deſſous & plus loin du diamètre horizonal, que l'entrée véritable, enſorte que ſi la parallaxe de hauteur eſt une corde partagée également par le diamètre horizontal du ſoleil, l'entrée ſera la même qu'au centre de la terre.

Ainſi dans l'obſervation de la ſortie faite à Naples, en 1761, il n'y avoit, pour ainſi dire, aucun effet de parallaxe, parce que la parallaxe y étoit partagée preſque également par le diamètre horizontal, ſuivant une table que M. Trébuchet a miſe à la fin d'un mémoire imprimé dans les mercures de Mai & Juin 1764.

2067. Si l'on ſuppoſoit la parallaxe du ſoleil de $10''$, on trouveroit l'accélération qui en réſulte en faiſant cette proportion ; $9'' : 57'' :: 10'' : 63'' 4$; cela prouve que cette différence eût été de $1' 3''$ de temps, ſi la parallaxe horizontale du ſoleil eût été de $10''$, car l'effet augmente proportionnellement ; en faiſant de ſemblables hypothèſes pour les pays où le paſſage a été obſervé, on reconnoîtra quelle eſt la parall. qui ſatisfait aux obſervations.

2068. C'eſt par la méthode que je viens d'expliquer, que j'ai calculé pour 1761 l'effet des parallaxes à

Fig. 134. Tobolsk, à Rodrigues, à Stockolm, &c. pour le comparer avec ce qui avoit été obſervé, & reconnoître par-là ſi la parallaxe du ſoleil que j'avois ſuppoſée dans mes calculs étoit la véritable, j'en donnerai le détail ci-après (2143); je paſſe à la manière de calculer la parallaxe pour les autres momens du paſſage, afin de donner enſuite une méthode infiniment plus courte, & d'une exactitude ſuffiſante, pour les autres obſervations.

2069. On doit employer à peu-près la méthode précédente pour calculer l'effet de la parallaxe ſur les diſtances de Vénus au bord du ſoleil, quand on a meſuré les diſtances de Vénus au bord du ſoleil, en obſervant le paſſage (2131), mais ces calculs n'exigent pas la même préciſion. Je ſuppoſe que le 6 Juin 1761 à $7^h\ 18'\ 55''$ du matin, on ait obſervé une diſtance DC, & qu'on veuille en conclure la diſtance vraie CV, on abaiſſera ſur le rayon CD une perpendiculaire VH, & l'on aura $CH=CV$, du moins ſenſiblement, & DH ſera l'effet de la parallaxe ſur cette diſtance obſervée; je ſuppoſe que le milieu ſoit arrivé à $5^h\ 30'\ 10''$ (2151), on aura la diſtance du milieu du paſſage $1^h\ 48'\ 45''$, & par conſéquent la portion MV de l'orbite $7'\ 15''$, CM eſt de $9'\ 30''$: ainſi l'on trouvera l'angle MCV de $37°\ 21'$. L'inclinaiſon MCF étant $8°\ 29'$, & l'angle parallactique ECI du vertical avec le cercle de latitude (1884), étant ſuppoſé de $39°\ 23'$, on aura l'angle $ECM=30°\ 54'$, & l'angle $ECV=68°\ 15'=CVZ$: c'eſt l'angle de la vraie diſtance CV avec le vertical ZV. Comme cette opération n'a pas beſoin d'une auſſi grande préciſion que la précédente, je ſuppoſe, vû la petiteſſe du triangle HDV que l'angle CDV ou HDV eſt égal à l'angle CVZ, & dans le triangle HDV, connoiſſant la parallaxe de hauteur VD de $21''$ pour l'heure de l'obſervation, je la multiplie par le coſinus de l'angle HDV qui eſt l'angle d'azimut (1888) ou l'angle du vertical avec le rayon DC, & je trouve $HD=8''$, c'eſt l'allongement que la différence des parallaxes produiſoit dans la diſtance obſervée à l'heure donnée: mais on va voir une ma-

nière bien plus commode de trouver cet allongement, par une opération graphique.

2070. C'eſt une choſe très-avantageuſe pour l'aſtronomie que toutes les opérations & les calculs de parallaxes dans les paſſages de Mercure & de Vénus, puiſſent s'exécuter par une opération graphique très-facile, & cela juſqu'à la préciſion des dixièmes de ſecondes. Le travail eſt ſi long par les autres méthodes, que la plupart des aſtronomes ont négligé de calculer leurs obſervations, d'en faire uſage, & d'en tirer des réſultats, parce qu'ils n'appercevoient pas le moyen que je vais expliquer d'exécuter fort vîte, & avec une exactitude ſuffiſante, la partie la plus difficile de ce travail.

Trouver les parall. avec le compas.

2071. Il faut appliquer ici ce qui a été dit ſur les projections dans les éclipſes de ſoleil (1796, 1835 & ſuiv.). On imaginera du centre du ſoleil un cône de rayons qui environnent la terre, enſorte que le cercle de la terre que nous avons appellé cercle d'illumination (1829) en ſoit la baſe; & que l'angle au centre du ſoleil ſoit de 18″, puiſque du ſoleil on verroit la terre ſous un angle de 18″ (1742). Ce cône de rayons coupé dans l'orbite de Vénus y forme un petit cercle qui eſt la projection de la terre dans la région de Vénus; ſon demi-diamètre vu de la terre, paroît ſous un angle égal à la différence des parallaxes de Vénus & du ſoleil (1797), qui eſt d'environ 22″ $\frac{1}{2}$ dans ſon paſſage ſur le ſoleil, en ſuppoſant la parallaxe du ſoleil de 9″ (2063).

Projection dans l'orbite de Vénus.

2072. Soit le diſque du ſoleil *GEKSV* (*fig.* 131), tel qu'il étoit vu de la terre dans le paſſage de Vénus, en 1761; *EMRS* l'orbite relative de Vénus ſur le ſoleil; *LCK* le cercle de déclinaiſon, ou méridien univerſel, paſſant par le centre du ſoleil; *LQN* le cercle qui repréſente la projection de la terre dans l'orbite de Vénus, & dont le rayon *CL* ou *CN* vu de la terre paroît de 22″ $\frac{1}{2}$. Sur ce cercle de projection l'on tracera l'ellipſe de projection *PQ*, qui repréſente le parallèle diurne de Paris, ou du lieu pour lequel on veut faire le calcul des parallaxes (1829). Par exemple, je ſuppoſe qu'à une heure quelconque, Vénus étant au point *R* de ſon orbite

Rayon de projection.

Fig. 131.

fig. 131. *EMRS*, on veuille ſavoir l'effet de la parallaxe ; on conſidèrera premièrement, que *CP* exprime la parallaxe de hauteur (1834). Ayant enſuite tiré la ligne *PR*, on verra que ſi *CR* eſt la vraie diſtance de Vénus au centre du ſoleil, vue du centre de la terre, la ligne *PR* eſt leur diſtance apparente pour Paris, parce que *P* eſt le lieu où Paris voit le centre du ſoleil, au lieu de le voir en *C*, & le lieu où le centre du ſoleil voit Paris ; c'eſt le point où la projection eſt coupée par le rayon viſuel mené de Paris au centre du ſoleil. Ainſi du point *R*, comme centre, on décrira un petit arc *CH*, pour avoir *RH* égal à *RC*, & la ligne *PH* ſera la différence entre ladiſtance apparente *PR* & la diſtance vraie *CR*, c'eſt-à-dire, la parallaxe de diſtance.

2073. Au lieu du petit arc *CH* décrit du centre *R*, on peut prendre ſans erreur ſenſible une ligne droite perpendiculaire à la ligne *CR* ; car *CH* étant extrêmement petite en comparaiſon de la longueur de *CR*, ſa courbure eſt abſolument inſenſible ; mais on peut tirer une perpendiculaire *CH*, ſans avoir beſoin du point *R*, qui devient inutile dès-lors qu'on ne prend plus *CH* pour un arc décrit du centre *R*. En conſéquence, on peut ſe paſſer totalement de l'orbite *EMS* & du grand cercle *GEKS* qui exigeroit une figure exceſſivement grande ; il ſuffira de tirer dans le petit cercle de projection une ligne *ms* parallèle à l'orbite *MS*, & de la diviſer également en heures & minutes, auſſi bien que ſi c'étoit l'orbite même ; au point *r* qui répond à l'heure & à la minute pour laquelle on calcule, on tirera la ligne *Cr* ; ſur cette ligne *Cr* une perpendiculaire *CH*, & une parallèle *PH*, qui ſera la parallaxe de diſtance. Ainſi rien n'empêche de tracer en grand ce petit cercle de projection, & de lui donner 8 à 9 pouces de rayon ; alors on y pourra faire avec la règle & le compas, d'une maniere fort exacte toutes les opérations précédentes.

Parallaxe de diſtance.

2074. Suppoſons donc que le cercle *LBN* (*fig.* 132), qui eſt plus grand & plus ſenſible, repréſente également le petit cercle de projection, *m RS* étant l'orbite de Vénus ; on voit que ſi *R* eſt le lieu de Vénus ſur ſon

orbite ; CH perpendiculaire à CR, & PH parallèle à CR, cette ligne PH ſera la parallaxe de diſtance. *Fig.* 131.

Pour éviter de faire uſage du centre C de la projection qui eſt variable pour différens pays (2076), je tire par le centre D de l'ellipſe une ligne DM qui ſoit parallèle à l'orbite mRS, & MG qui lui ſoit perpendiculaire ; ayant ſuppoſé la plus courte diſtance des centres DM de $9'\,30''$ (2135), je prens ſur MG le mouvement horaire, ou $4'$ par heure, pour la diviſer en temps, tout ainſi que l'orbite de Vénus ; je tire par le centre de l'ellipſe une ligne DG au point où ſe trouve Vénus à un inſtant donné, cette ligne eſt néceſſairement parallèle à la ligne CH trouvée par l'opération précédente : ainſi je me ſers de la ligne DG pour tirer CH & pour avoir PH qui eſt la parallaxe de diſtance, en ſuppoſant que P marque la ſituation de Paris ſur l'ellipſe QPV, au moment pour lequel on calcule.

Parallaxe d'aſcenſion droite.

2075. On peut trouver de même la parallaxe en aſcenſion droite & en déclinaiſon, & cela eſt extrêmement commode pour ceux qui en obſervant le paſſage de Vénus emploient une machine parallatique ou un micromètre ordinaire (2136). Je ſuppoſe que BCA ſoit une portion du parallèle à l'équateur, & que du point P où Paris eſt ſitué à l'heure donnée ſur ſon parallèle diurne, on abaiſſe une perpendiculaire PK ; on aura CK pour la parallaxe d'aſcenſion droite meſurée ſur un grand cercle, & PK pour la parallaxe de déclinaiſon ; parce que c'eſt le point P au lieu du point C qui eſt le centre apparent du ſoleil, en vertu de la parallaxe, ou ſi l'on veut, parce que le lieu de l'obſervateur eſt projetté au point P, qui répond au point K du parallèle à l'équateur, au lieu que le centre de la terre eſt projetté en C (2072). Pour le comprendre encore mieux, ſoit tirée du point R (*fig.* 131), une perpendiculaire RA ſur le parallèle à l'équateur ou ſur CO, elle ſera la différence de déclinaiſon, & CA la différence d'aſcenſion droite du ſoleil & de Vénus vue du centre de la terre, donc ſi l'obſervateur eſt en P, ou ſi le lieu du ſoleil paroît en P & qu'on tire du point P une perpendiculaire PK ſur CO, elle ſera la *Fig.* 131.

Fig. 131. parallaxe de déclinaiſon, & *CK* celle d'aſcenſion droite. Ainſi ayant diviſé le rayon *CA* de la projection (*fig.* 131), en autant de parties qu'en contient la parallaxe horizontale de Vénus au ſoleil, (c'étoit $22'' \frac{1}{2}$ en 1761), on portera ſur les diviſions de *CA* les quantités *PK* & *CK*, & l'on aura en ſecondes & en dixièmes de ſecondes, la valeur des parallaxes d'aſcenſion droite & de déclinaiſon.

Cette parallaxe d'aſcenſion droite ſur un arc de grand cercle dans la région du ſoleil deviendroit plus grande d'un treizième, ſi on la rapportoit ſur l'équateur par le moyen des deux cercles de déclinaiſon qui paſſent par les extrémités de l'arc (892); mais on peut dans les calculs ne ſe ſervir que de celle qui eſt meſurée ſur un grand cercle, en rapportant les obſervations à la région du ſoleil.

La même opération pour divers pays.

2076. Juſqu'ici j'ai ſuppoſé que c'étoit pour Paris que l'on vouloit calculer les parallaxes; il faut étendre maintenant cette méthode à tout autre pays, puiſque les paſſages de Vénus arrivés en 1761 & 1769 ont été obſervés dans un grand nombre de pays différens; toutes ces obſervations peuvent ſe calculer par la méthode que nous allons expliquer, d'une maniere extrêmement ſimple & commode.

2077. L'ellipſe qui repréſente le parallèle de Paris ayant été tracée pour 22° 42′, déclinaiſon du ſoleil le jour du paſſage de 1761, elle a la même figure ou la même proportion dans ſes axes pour tous les pays; mais le rayon de projection & la diſtance *CD* du centre de l'ellipſe au centre de projection, doivent être différens (1862): j'ai fait voir qu'en ſuppoſant le demi-axe *QD* de l'ellipſe diviſé en mille parties, *la diſtance des centres* C *&* D *eſt égale à la tangente de la latitude du lieu multipliée par le coſinus de la déclinaiſon de l'aſtre*; j'ai donné une table à la page 487, dans laquelle y a une colonne pour la déclinaiſon de 22° 42′, & où l'on voit la diſtance du centre de la projection à celui de l'ellipſe, & le rayon avec lequel on doit décrire le cercle de la projection, quand on a trouvé le centre qui convient à un pays quelconque: en voici une plus détaillée pour les paſſages de Vénus.

TABLE

TABLE de la diſtance qu'il y a entre le centre de la projection, & le centre de l'ellipſe décrite pour 22° 42′ de déclinaiſon, avec le rayon de la projection, pour différentes latitudes.

Deg. de latit.	Diſtan. des centres.	Rayon de projection.	Deg. de latit.	Diſtan. des centres.	Rayon de projection.	Deg. de latit.	Diſtan. des centres.	Rayon de projet.
0	0	1000	24	411	1095	48	1025	1494
2	32	1001	26	450	1112	50	1099	1556
4	65	1002	28	491	1132	52	1181	1624
6	97	1006	30	533	1155	54	1270	1701
8	130	1010	32	577	1179	56	1368	1788
10	163	1015	34	622	1206	58	1476	1887
12	196	1022	36	670	1236	60	1598	2000
14	230	1031	38	721	1269	62	1735	2130
16	265	1040	40	774	1305	64	1892	2281
18	300	1051	42	831	1346	66	2072	2459
20	336	1064	44	891	1390	68	2283	2669
22	373	1079	46	955	1449	70	2535	2914
24	411	1095	48	1025	1494	72	2839	3236

Dans le cas où la déclinaiſon du ſoleil ſera différente, on ſe ſervira toujours de la deuxième colonne qui contient le rayon de projection pour différens pays ; mais pour avoir la diſtance des centres il faudra multiplier les nombres de la premiere colonne par le coſinus de la déclinaiſon donnée, diviſé par le coſinus de 22° 42′, qui eſt la déclinaiſon employée dans la table précédente, parce qu'il faudra détruire la multiplication par coſ. 22° 42′ & la faire par le coſ. de la nouvelle déclinaiſon (1862).

2078. L'ellipſe de la *figure* 127 a été décrite aſſez en grand pour qu'on puiſſe y faire toutes les opérations précédentes dans les paſſages de Vénus, en ſe ſervant de l'échelle qui eſt à côté, dans la figure 128 ; cette échelle ſuppoſe la différence des parallaxes horizontales de 26″, parce que la figure avoit été gravée avant le paſſage de 1761, dans un temps où l'on croyoit la parallaxe du ſoleil un peu plus grande qu'elle n'eſt réellement, mais l'explication ſera la même, & chacun ayant choiſi le rayon de projection dont il voudra faire uſage, pourra le diviſer de maniere qu'il réponde à 22″ & $\frac{6}{10}$ qui eſt la différence des parallaxes, en ſuppoſant celle du ſoleil de 9″.

Explication d'une figure par la laquelle on trouve, ſans aucun calcul, tous les effets de la Parallaxe ſur les paſſages de Vénus, dans tous les pays de la terre (a).

2079. Les différentes ſortes d'obſervations que l'on a faites dans les paſſages de Vénus ſur le ſoleil, en 1761 & en 1769, ſont toutes affectées des parallaxes en différentes manières; le calcul de ces parall. eſt d'une extrême longueur par les méthodes ordinaires; mais il devient de la plus grande facilité par l'opération graphique, dont nous allons donner l'explication.

Fig. 127.

Je décris une ellipſe *LVGP* (*fig.* 127), dont le grand axe eſt au petit, comme le ſinus total eſt au ſinus de la déclinaiſon du ſoleil, qui eſt de 22° 42′, ou à peu-près, dans les paſſages de Vénus ſur le ſoleil qui arrivent au mois de Juin; on a diviſé cette ellipſe en temps, de deux en deux minutes, pour avoir à chaque inſtant la ſituation de Paris ſur ſon ellipſe de projection.

Parallaxe de hauteur.

2080. Si *P* eſt le lieu de Paris ſur ſon parallèle le 6 Juin à 8^h 15′ du matin, & *C* le centre de la projection pour Paris, la ligne *PC* tirée au centre de la projection repréſentera la parallaxe de hauteur (1834); ſi l'on porte la longueur de cette ligne *PC* ſur l'échelle de 49° de latitude, près de laquelle eſt marqué Paris, (*fig.* 128), l'on verra qu'elle eſt de 19″. Ainſi la parallaxe de hauteur de Vénus au ſoleil, à 8^h 15′ du matin, étoit de 19″ à Paris; en ſuppoſant 26″ pour la différence des parall. horiz. comme dans l'échelle de la *figure* 128.

Fig. 128.

Parallaxe d'aſcenſ. droite.

2081. Pour trouver la parallaxe d'aſcenſion droite on abaiſſera une perpendiculaire *PZ* (*fig.* 127) du point *P* où eſt ſitué Paris, ſur le parallèle à l'équateur, mené par le point *C* qui eſt le centre de la projection pour Paris; la ligne *CZ* compriſe depuis le centre juſqu'à cette perpendiculaire étant portée ſur l'échelle (*fig.* 128), doit ſe trouver de 14″. C'eſt la parallaxe d'aſcenſion

(a) Il y a eu quelques exemplaires des articles ſuivans publiés ſous le nom de M. de l'Iſle, à qui je crus devoir en faire honneur, parce qu'il avoit eu la premiere idée de ce genre d'opérations.

droite meſurée ſur un arc de grand cercle paſſant par le ſoleil (2075), telle par conſéquent qu'il faut l'avoir pour réduire les obſervations faites au micromètre (2136), dans leſquelles on n'a pour objet que de trouver la différence d'aſcenſion droite dans la région du ſoleil ; elle ſeroit plus grande d'un treizième, ſi on la diviſoit par le coſinus de la déclinaiſon (892) pour la réduire à l'équateur. *Fig.* 128.

2082. La parallaxe de déclinaiſon n'eſt autre choſe que la perpendiculaire elle-même tirée du point *P* ſur le parallèle à l'équateur (2075) ; dans cet exemple elle doit être de $14''\frac{1}{2}$. C'eſt la quantité qu'il faut ôter de la différence apparente de déclinaiſon entre Vénus & le ſoleil, obſervée à Paris le 6 Juin 1761 à $8^h\ 15'$ du matin, déjà corrigée par la différence des réfractions (2546 & ſuiv.), pour avoir cette vraie différence de déclinaiſon. Parallaxe de déclinaiſon.

2083. On trouvera de la même manière la parallaxe de longitude & de latitude au moyen de la ligne *AC* marquée *parallèle à l'écliptique* ſur la *figure* 127, elle fait avec la parallèle à l'orbite de Vénus, un angle égal à l'inclinaiſon relative qui étoit, en 1761, de $8°\ 29'$. Sur ce diamètre qui repréſente une portion de l'écliptique, on abaiſſera du point *P* une perpendiculaire *PB*, qu'on trouvera dans l'exemple propoſé de $16''$; ce ſera la parallaxe de latitude. La diſtance entre cette perpendiculaire & le centre *C* de la projection, meſurée le long de l'écliptique, ſera la parallaxe de longitude ; elle ſe trouve de $12''\frac{1}{2}$. Je ne vois pas qu'on ait beſoin de ces deux ſortes de parallaxes dans la réduction & dans le calcul des obſervations ; mais j'ai voulu les expliquer pour qu'il ne manquât rien à l'uſage & à l'intelligence de la figure que je propoſe. Parallaxe de longit. & de latitude.

2084. La parallaxe de diſtance eſt une des plus néceſſaires, puiſque les meilleures obſervations que l'on ait faites dans les paſſages de Vénus, ſont celles où l'on a employé des héliomètres, pour obſerver la diſtance de Vénus au bord du ſoleil (2131), & que ces obſervations ſeroient difficiles à réduire ſans le ſecours de l'opération graphique dont il s'agit. Pour trouver la parallaxe de Parallaxe de diſtance.

Fig. 127. distance, on eſt obligé d'avoir égard à la ſituation de Vénus ; on tirera par le centre de l'ellipſe une ligne *E M* parallèle à l'orbite, & une autre ligne *M N* perpendiculaire à l'orbite ; ayant pris *E M* pour repréſenter la plus courte diſtance des centres, 9′ 30″, on prendra ſur *MN* la valeur de 4′ par heure, pour diviſer cette orbite *MN*, & marquant au point *M* le temps obſervé du milieu du paſſage, (c'étoit 5^h 30′ en 1761), on diviſera *MN* en heures & minutes (2074); le point *N*, par exemple, répondra à 8^h 15′, qui étoit 2^h 45′ avant le milieu du paſſage ; alors on tirera une ligne occulte *EN*, & par le centre *C* de la projection une ligne *CH* parallèle à *EN*; la perpendiculaire *PH* abaiſſée du point *P* ſur cette ligne ſera la parallaxe de diſtance ; ſi dans l'exemple précédent on porte *PH* ſur l'échelle qui convient à la latitude de Paris, on la trouvera d'environ $3''\frac{1}{2}$ pour $8^h\frac{1}{4}$ du matin. Cette parallaxe de diſtance doit ſe retrancher de la diſtance apparente de Vénus au centre du ſoleil, parce que le point *H* eſt au midi du point *P*, auſſi bien que Vénus ; ſi le point *H* n'étoit pas entre le point *P*, & la parallèle à l'orbite de Vénus, tirée par le centre *C* de la projection, il faudroit ajouter la parallaxe à la diſtance apparente.

Parallaxe pour 1769. 2085. La ligne *MN* doit être tirée plus loin du centre *E* de l'ellipſe, ſi l'on emploie cette figure pour le paſſage de 1769, parce que la plus proche diſtance des centres étoit de 10′ 10″ (2147) : on pourra prendre *EO* au lieu de *EM*, & par ce moyen l'on conſervera les diviſions de la ligne *NM* pour l'entrée, & on les portera au-deſſous de la ligne *EO* pour la ſortie de Vénus ; le point *O* répondra à 10^h 36′ du ſoir, milieu du paſſage à Paris.

Pour l'entrée à Paris. 2086. Je ſuppoſe qu'à 7^h 20′ du ſoir, temps où Vénus commençoit à paroître ſur le ſoleil à Paris, l'on veuille avoir la parallaxe de diſtance ; on tirera une ligne du centre *E* au point *D* qui répond au-deſſus du point *O*, à 3^h 16′ de diſtance au milieu du paſſage ; du centre *C* de la projection on tirera une perpendiculaire

ſur cette ligne *DE* prolongée à gauche ou au-deſſous du point *E*, cette perpendiculaire va ſe diriger vers le lieu de Vénus ſur ſon orbite pour 7^h 20′ ; alors du point *R* qui eſt à 7^h 20′ du ſoir ou à la gauche de l'ellipſe, l'on tirera une perpendiculaire *RV* ſur cette derniere ligne, ou ce qui revient au même, une parallèle à *ED* ; le point *V* où elle rencontrera *CV*, marquera l'endroit qui paroît auſſi éloigné de Vénus que le point *R* où Paris eſt projetté, & la diſtance *CV* du centre *C* au point *V* ſera la parallaxe de diſtance. On peut auſſi tirer par le centre *C* une parallèle à *DE*, & la perpendiculaire abaiſſée du point *R* où eſt Paris ſur cette parallèle à *ED* ſera la parallaxe de diſtance ; cette parallaxe étant portée ſur les diviſions du rayon de projection pour Paris, l'on y verra qu'elle contient 26″, c'eſt-à-dire, qu'elle eſt à très-peu-près égale à la parallaxe horizontale. *Fig.* 117.

2087. Le commencement de la ſortie à Péteſbourg eſt arrivé à 3^h 27′ 25″ du matin, & 2^h 59′ après le milieu du paſſage. Pour trouver la parallaxe de diſtance à ce moment-là, je tire du centre *E* de l'ellipſe une ligne au point *Q* qui répond à 2^h 59′ au-deſſous du point *O* ; par le point *K* marqué 60°, qui eſt le centre de la projection pour Pétersbourg, je tire une parallèle à cette ligne *EQ* ; du point *G* où eſt Pétersbourg ſur ſon parallèle à 3^h 27′ du matin j'abaiſſe une perpendiculaire *GT* ſur la derniere parallèle *KT*, & *GT* eſt la parallaxe de diſtance ; en la portant ſur l'échelle de 60°, je trouve 19″, qui eſt la parallaxe de diſtance, pour la ſortie, en ſuppoſant toujours que la parall. horiz. ſoit de 26″ ; il y auroit 16″ ſeulement, ſi l'on avoit ſuppoſé la parallaxe relative de 22″ 6, & que l'échelle de la figure 128 eût été diviſée en $22\frac{1}{2}$ parties, au lieu de l'être en 26. Pour la ſortie à Pétersbourg.

2088. Dans les exemples précédens le point *H* où aboutit la perpendiculaire *PH* eſt au midi du point *P* pour l'entrée, c'eſt une preuve que l'entrée apparente eſt accélérée par l'effet de la parallaxe de diſtance *PH* ; & tant que le point *T* ou la ligne *KT* eſt à la gauche ou au midi du lieu *G* pour la ſortie, cette ſortie eſt également

Fig. 127. accélérée; cela revient au même que la règle dont j'ai déja parlé (2066).

Au lieu du grand nombre d'échelles qui ſont dans la figure 128, on pourroit ſe contenter d'une ſeule, ou même des diviſions du demi-grand axe de l'ellipſe, en faiſant ſeulement cette règle de trois: la ſécante de la latitude pour un rayon 1000 eſt à la différence des parallaxes horizontales, comme le nombre de millièmes trouvées ſur les diviſions du demi-grand axe de l'ellipſe eſt à leur valeur en ſecondes, ainſi dans le dernier exemple ayant trouvé 144, je dis 1996 : 26 : : 1440 : 19″, c'eſt la parallaxe de ſortie à Pétersbourg.

Centres pour différens pays.

2089. Le centre *C* de la projection pour Paris, (*fig.* 127), eſt marqué par les trois lignes qui y paſſent; mais il doit changer ſi l'on calcule des obſervations faites ſous d'autres latitudes (2076): on voit ſur la ligne *ECK* les points qui répondent à différentes latitudes, c'eſt-à-dire, les centres de la projection qu'il faut ſubſtituer au point *C*, & par leſquels on doit tirer les parallèles à l'écliptique & à l'équateur, c'eſt-à-dire, toutes les lignes qui donnent les parallaxes. Les degrés marqués au-deſſus du centre *E* de l'ellipſe ſont pour les pays ſitués au midi de l'équateur à des latitudes auſtrales, & quoiqu'ils ne ſoient marqués que juſqu'à 30°, il eſt aiſé d'étendre les diviſions en tranſportant vers le haut, ſur un papier qu'on y ajoutera, les diviſions qui ſont au-deſſous du centre de l'ellipſe. Quand on aura trouvé une parallaxe quelconque pour une latitude différente de celle de Paris, on portera cette ouverture de compas dans l'échelle générale (*fig.* 128), ſur celles des lignes verticales qui ſera marquée de la latitude dont il s'agit; & l'on y verra ſa valeur en ſecondes & dixièmes de ſecondes, parce que la projection ne donne les parallaxes qu'en ſuppoſant le rayon de la projection égal à la parallaxe horizontale.

Inconvénient du papier.

2090. Le racorniſſement du papier eſt un obſtacle à l'exactitude des figures imprimées; Hévélius s'en plaignoit à l'occaſion de ſes phaſes de la lune, (*Selenogr. pag.* 214): le papier que l'on mouille pour l'impreſſion,

ſe dilate & s'étend, il ſe comprime plus ou moins, ſuivant ſa qualité & ſon épaiſſeur ; il ſe retire enſuite inégalement lorſqu'on le fait ſécher, & la proportion n'eſt plus la même entre ſa longueur & ſa largeur ; Hévélius en avertiſſoit le lecteur pour qu'on ne l'accuſât pas d'avoir mal deſſiné la ſituation des taches de la lune, & d'avoir fait ovales des figures qui devoient être circulaires.

2091. Dans une des épreuves de la grande ellipſe, (*fig.* 127), j'ai obſervé que les extrémités du grand axe de l'ellipſe étoient plus près du centre de l'ellipſe ſur le papier que ſur le cuivre, de 1 ligne $\frac{1}{4}$ d'un côté, & 2 lignes $\frac{1}{4}$ de l'autre, les ſommets du petit axe étoient rapprochés du centre, l'un de $\frac{1}{3}$, l'autre de $\frac{1}{5}$ de ligne ; le centre de la projection pour Paris étoit rapproché d'une ligne du centre de l'ellipſe ; ainſi le papier s'étoit rétréci dans toutes ſes parties, mais beaucoup plus dans ſa longueur, qui eſt la direction de l'enverjure de la forme, parce qu'il a beaucoup moins de denſité dans le ſens des fils de l'enverjure, que dans le ſens des pontuſeaux, où les fils étant ſerrés l'un contre l'autre, ont donné à la pâte plus de fermeté & de conſiſtance, (Voyez l'*Art de faire le Papier*, que j'ai donné en 1760), on pourroit croire que le rouleau de la preſſe contribue à l'extenſion du papier, mais l'expérience fait voir que les eſtampes ne laiſſent pas de ſe rétrécir même dans le ſens où la preſſe auroit dû les étendre. *Fig.* 127.

Manière d'y remédier.

2092. Pour y remédier dans les cartes géographiques, *Guillaume de l'Iſle*, premier géographe du Roi, avoit eu l'attention d'altérer ſur ſes cuivres les dimenſions des cartes, & de changer ſes cercles en ovales, de la quantité dont le papier avoit coutume de ſe rétrécir, en longueur plus qu'en largeur. *Joſeph Nicolas de l'Iſle* en faiſant graver la figure que l'on voit ici, a pris une autre précaution qui n'eſt pas moins bonne, pour mettre chacun à portée de remédier à l irrégularité de la figure imprimée : on voit tout autour de la figure un rectangle *AABB*, dont la longueur *AA* ou *BB*, a été faite exactement de 23 pouces ſur le cuivre, & la hauteur *AB*

de 17 pouces. Il arrivera communément par le tirage que la longueur ſe réduira à 22 pouces 8 lignes, & la hauteur à 16 pouces 10 lignes; mais comme l'on humecte néceſſairement la figure en la collant ſur un carton, il ſera aiſé de l'étendre de manière qu'elle rempliſſe exactement un rectangle fait ſur le carton, dont un côté ſoit à l'autre comme 17 eſt à 23 : on la laiſſera ſécher dans cet état, & elle conſervera ſes dimenſions proportionnelles, parce que le carton s'oppoſera ſuffiſamment à la contraction du papier (a).

DE L'ENTRÉE ET DE LA SORTIE DE VÉNUS pour tous les pays de la Terre.

2093. C'est une partie eſſentielle du calcul des paſſages de Vénus ſur le ſoleil, que de déterminer à la fois pour tous les pays de la terre, & cela par une méthode facile, l'effet de la parallaxe, qui fait paroître l'entrée ou la ſortie plutôt ou plus tard. M. de l'Iſle fut le premier qui eut l'idée de marquer ſur une ſeule Mappemonde, au moyen d'un certain nombre de cercles, la quantité dont l'entrée & la ſortie arrivent dans les différens pays plutôt ou plus tard que pour le centre de la terre. Il l'exécuta d'abord pour le paſſage de Mercure, en 1753, enſuite pour celui de Vénus, en 1761, & j'en ai tracé une ſemblable pour le paſſage de 1769 (b), dont il y a un petit extrait dans la *figure* 133.

2094. En expliquant cette Mappemonde, je pris pour exemple le paſſage de Vénus qui étoit annoncé pour 1769, dont j'avois fait le calcul & conſtruit la figure par une méthode particulière. J'en donnai l'explication & les calculs à l'académie, lorſqu'on y étoit occupé à traiter du paſſage de 1761 & de celui de 1769, en diſcutant les avantages qu'il pourroit y avoir dans l'un & l'autre (Voyez l'*Hiſt. de l'acad. pour* 1757, *pag.* 100, *& les Mém. pag.* 232); je conſerverai ici le même exemple, mais j'y ajouterai enſuite les réſultats de l'obſervation.

(a) On en trouvera encore quelques exemplaires chez *Lattré*, graveur, rue S. Jacques.

(b) Elle ſe trouve gravée en grand, avec tous les détails & les diſtinctions de couleurs, à Paris, chez *Lattré*.

2095.

2095. Je calculai d'abord les circonſtances de ce paſſage par la méthode expliquée ci-deſſus (2044); en corrigeant les tables de Vénus par l'obſervation de 1761, je trouvai le temps de la conjonction vraie en *C*, (*fig.* 129), le 3 Juin 1769 à $10^h\ 10'$ du ſoir, ſa longitude étant de $8^s\ 13°\ 27'\ 10''$, la latitude géocentrique $10'\ 13''\ 4$ boréale [a], l'entrée du premier bord de Vénus en *E* à $7^h\ 21'$, & la ſortie du ſecond bord de Vénus en *S* à $13^h\ 44'$, la perpendiculaire $TM = 10'\ 7''$; la différence des parallaxes horizontales $22''\ 6$, en ſuppoſant celle du ſoleil de $9''$; le mouvement horaire $4'\ 0''\ 11$ (2058); l'inclinaiſon de l'orbite ſur l'écliptique étoit de $8°\ 2'\ 59''$ & ſon inclinaiſon ſur l'équateur (ou la ſomme de $8°\ 29'$ & de l'angle de poſition) de $15°\ 32'$. Circonſtances du paſſage de 1769. *Fig.* 129.

La projection *TA* de la terre étant vue ſous un angle de $22''\ 6$, la diſtance *TA* eſt de $22''\ 6$, tandis que *TS* eſt de $15'\ 47''$, c'eſt la valeur que je ſuppoſois au demi-diamètre apparent du ſoleil; ainſi le lieu de la terre, dont la projection ſe trouve en *A*, & qui rapporte le centre du ſoleil au point *A* (1797), verra Vénus éloignée du centre du ſoleil de $15'\ 23''\ 4$ ſeulement, ou de la quantité *SA*, lorſque le centre de Vénus étant en *S*, quittera véritablement le ſoleil pour un obſervateur qui répondroit au centre *T*; il faudra donc que Vénus en avançant dans ſon orbite ſoit arrivée en *V*, pour que la diſtance *VB* du centre du ſoleil qui paroît en *B* (pour le lieu de terre dont la projection eſt au point *B*), & du centre de Vénus qui eſt en *V* ſoit de $15'\ 47''$, c'eſt-à-dire, que *VD* ſoit de $22''\ 6$, auſſi bien que *TB*; alors le pays de la terre projetté en *B* verra le centre de Vénus ſortir de deſſus le ſoleil, puiſque ſa diſtance apparente au centre du ſoleil ſera égale au demi-diamètre du ſoleil (1800); & le point *B* ſera le dernier de tous les points de la terre, d'où l'on verra la ſortie.

2096. Par la même raiſon, ſi l'on prend une ligne *TN* qui ſoit plus petite de $22''\ 6$ que *TS*, enſorte que

(a) Par les obſervations, j'ai trouvé la conjonction à $10^h\ 13'\ 40''$ & la latitude $10'\ 16''$ (2155).

Fig. 129. la ligne entiere *NTI* ſoit égale au demi-diamètre du ſoleil ; le point de la terre dont la projection eſt actuellement en *I* verra Vénus ſortir du ſoleil, quoiqu'elle ait encore tout l'eſpace *NS* à parcourir pour en ſortir réellement par rapport au centre *T* de la terre ; ainſi le point *I* ſera le premier de tous les points de la terre qui verra le centre de Vénus ſortir du ſoleil, parce qu'il verra Vénus éloignée du ſoleil de la quantité *IN*, égale au demi-diamètre du ſoleil, dans le temps qu'elle ſera encore en *N*; de même que le point *B* ſera le dernier de tous. Le point *I* n'eſt pas diamétralement oppoſé au point *B*, mais la différence eſt aſſez légère pour pouvoir ſe négliger dans une opération purement graphique ; d'ailleurs, il n'en réſulteroit pas 5″ d'erreur ſur les temps que l'on cherche, & il s'en faut beaucoup que nous ſoyons aſſurés d'une ſi grande exactitude, dans ces ſortes de prédictions.

2097. Ce que nous avons dit des points *B* & *I* pour la ſortie de Vénus, doit s'entendre auſſi des points *H* & *K* pour l'entrée de Vénus ſur le ſoleil : le point *H* eſt le premier de tous les pays de la terre qui verra Vénus entrer ſur le ſoleil ; le point *K* ſera le dernier de tous : je ſuppoſe les points *H* & *K* diamétralement oppoſés par la raiſon que je viens de dire (2096). On trouveroit facilement les longitudes & les latitudes géographiques des pays de la terre qui ſont en *A*, en *I*, en *H* & en *K* par les méthodes que nous avons employées pour les éclipſes de ſoleil (1930).

2098. La différence entre le temps où le point *H* verra l'entrée de Vénus, & le temps où elle arrivera pour le point *K*, dépend de la diſtance *HK* qui eſt de 45″ ; il en eſt de même de la ſortie. Il faut que Vénus, qui a paru quitter le ſoleil pour le point de la terre dont la projection eſt en *I*, s'éloigne encore de 45″, pour pouvoir paroître de même à l'obſervateur ſitué en *B* ; ainſi l'on connoîtra la différence de temps entre ces deux phaſes, ſi l'on trouve combien il faut de temps à Vénus pour s'éloigner du centre du ſoleil de cette quantité de 45″.

Pour trouver exactement cet intervalle de temps, il

faut réſoudre ſéparément les deux triangles *TMN*, *TMV*; on connoît la perpendiculaire *TM*, avec les hypothénuſes, on cherchera les autres côtés. Pour faire ce calcul, je ſuppoſerai que le point *N* & le point *V* ſoient ceux du dernier contact extérieur de Vénus en 1769, le demi-diamètre de Vénus étant ſuppoſé de 29″ (2157), l'on aura 16′ 16″ pour la ſomme des demi-diamètres du ſoleil & de Vénus; mais puiſqu'il s'agit du contact extérieur des deux bords, l'hypothénuſe *TN* eſt plus petite de 22″ 6, & *TV* plus grande de la même quantité, c'eſt-à-dire, que *TN* eſt de 15′ 53″ 4, & *TV* de 16′ 38″ 6; en conſéquence, on trouvera *MN* de 735″ 20, & *MV* de 792″ 94, la différence *NV* eſt 57″ 74; or Vénus emploie 14′ 27″ de temps à parcourir ſur ſon orbite un arc de 57″ 74, parce que ſon mouvement apparent eſt de 4′ par heure: ainſi le plus grand effet de la parallaxe eſt de 14′ 27″, en ſuppoſant de 9″ la parallaxe horizontale du ſoleil. Je ſuppoſerai cette quantité de 15′, en nombres ronds, pour la facilité des opérations ſuivantes, c'eſt-à-dire, que je ſuppoſerai 15′ de temps entre la ſortie de Vénus pour le point *I* de la terre, & ſa ſortie pour le point *B*, comme on les auroit réellement ſi la parallaxe du ſoleil étoit de $9''\frac{1}{3}$, à peu-près comme la donne l'obſervation faite à la Baie d'Hudſon (2149). En ôtant 15′ de l'entrée pour le centre de la terre & de plus la valeur du demi-diamètre de Vénus, on trouvera que le point *H* a le premier contact à 7^h 14′ du ſoir.

Fig. 129.

Le plus grand effet de la parallaxe.

2099. Conſidérons maintenant des points de la terre *Z*, *F*, & *Y*, qui ſont éloignés du point *E* d'une quantité *EF*, plus grande que *EH* d'un tiers du diamètre *HK* de la projection; tous ces pays verront l'entrée de Vénus 5′ plus tard que les pays ſitués en *H*; car puiſque du point *H* au point *K*, il y a 15′ de différence, il doit y en avoir cinq du point *H* au point *F*; & tous les points qui ſont ſur la ligne ou ſur l'arc *ZFY* étant à même diſtance du point *E*, verront la même diſtance apparente des centres de Vénus & du ſoleil, & Vénus entrera au même inſtant ſur le ſoleil pour tous les pays de la terre projettés ſur l'arc *ZFY*; je pren-

drai l'arc *ZFY* pour une ligne droite, à cauſe de ſon extrême petiteſſe, en comparaiſon de *EF*.

2100. Si l'on partage le diamètre *HK* en 15 parties égales (comme nous l'avons fait ſéparément dans la *figure* 130 pour éviter la confuſion), & que le point *H* ait vu l'entrée lorſqu'il étoit $7^h\ 14'$ à Paris, le pays de la terre qui répond au premier point de diviſion verra l'entrée une minute plus tard ou à $7^h\ 15'$; le ſecond point la verra à $7^h\ 16'$, &c. J'ai marqué à la droite du diamètre *HK* les minutes de l'entrée, & à gauche celles de la ſortie, pour les différens points de la terre, qui répondent aux 15 portions du diamètre de la projection. Fig. 130.

2101. Si donc on prend un globe terreſtre d'un diamètre égal à *HK* (*fig.* 129); qu'on prenne l'ouverture ou la diſtance *GH* (*fig.* 130), & qu'on décrive un cercle en prenant pour centre ou pour pole le point du globe que repréſentoit le point *H* de la projection; on tracera aiſément ſur ce globe un petit cercle, dont la circonférence marquera tous les pays de la terre, où l'entrée doit commencer à $7^h\ 19'$. Tous ces pays de la terre étoient marqués ſur la projection (*fig.* 129) par le cercle *ZFY*, ils étoient par conſéquent à une diſtance du bord de Vénus, égale à $16'\ 16''$, ſomme des demi-diamètres de Vénus & du ſoleil : ainſi ils ont tous obſervé au même inſtant le premier contact des deux bords : j'appellerai *cercles d'entrée* ces petits cercles décrits ſur le globe, & qui paſſent ſur tous les points où l'entrée paroît au même inſtant. Cercles d'entrée.

2102. Ainſi la premiere opération préliminaire conſiſte à trouver ſur le globe terreſtre le point *H*, (*fig.* 129), qui doit ſervir de pole à tous ces cercles d'entrée que nous avons à décrire, & qui ſeront à peu-près parallèles entre eux; on peut trouver ce point avec le globe même, & l'on peut auſſi y employer le calcul : on cherchera d'abord l'angle *ETM* qui eſt de $50°\ 48'$. Si l'on en ôte l'angle *OTM* de $15°\ 32'$ (2095), on aura l'angle *OTE*, ou l'arc *HX* de la terre qui en eſt la meſure, égal Trouver les poles d'entrée. Fig. 129.

à 35° 16′; & ſi on les ajoute enſemble, on aura l'arc *XA*, de 66° 20′. *Fig.* 129

2103. On prendra un globe terreſtre monté ſur ſon horizon; on élévera le pole de 22° 36′, qui eſt la déclinaiſon de Vénus; & dans cet état l'horizon du globe repréſentera le cercle d'illumination (1829), ou un plan de la terre parallèle au plan de projection. Car le ſoleil étant dans l'hémiſphère boréal, eſt plus près du pole arctique, il faut que ce pole ſoit toujours dans la partie illuminée, & avancé de 22° ſur le cercle d'illumination qui dans tous ſes points eſt à 90° du ſoleil. Si la déclinaiſon de Vénus étoit méridionale, ce ſeroit le pole antarctique ou méridional qu'il faudroit élever au-deſſus de l'horizon.

2104. Le globe étant ainſi élevé, ſuivant la déclinaiſon du ſoleil, il faut le tourner ſuivant l'heure qu'il eſt. Par exemple, à 7^h 20′ temps vrai à Paris, le ſoleil eſt éloigné de 110° du méridien; il faut donc faire tourner le globe d'occident en orient, comme tourne la terre, juſqu'à ce qu'il y ait 110° de l'équateur entre Paris & le méridien; on ſuppoſe le ſoleil fixe dans ce méridien univerſel, comme nous l'avons fait pour les éclipſes de ſoleil.

2105. Les pays de la terre qui ſont à 110° du méridien de Paris vers l'occident ont 270° de longitude, en prenant 20° pour la longitude de Paris, comme les géographes ont coutume de le faire (49); il n'y a donc qu'à tourner le globe, enſorte que le point marqué à 270° de longit. terreſtre ſe trouve ſous le méridien. Dans cet état, le globe ſera dans la poſition où le verroit un obſervateur placé dans le ſoleil, quand il eſt à Paris 7^h 20′ du ſoir; l'horizon de ce globe repréſentera le cercle *HBKI* de la *fig.* 129, ou le plan de projection.

2106. Tous les pays ſitués alors dans l'horizon de notre globe artificiel du côté de l'orient auront le ſoleil couchant; tous ceux qui ſe trouveront à l'occident verront le ſoleil ſe lever. Ce cercle d'illumination paſſe dans la partie orientale de la France & dans la mer Baltique; Entrée au lever ou au coucher du ſoleil.

il paſſe au nord de la Sibérie, de-là il s'étend en Aſie juſqu'à la terre d'Yeſſo; il entre dans la mer du Sud près des Iſles Marianes, va rejoindre l'Amérique méridionale vers le détroit de le Maire, l'Afrique vis-à-vis du Cap-verd, & enfin la France d'où nous étions partis. Ces points ſont marqués dans la *fig.* 133 par le cercle *FGO BAD*, tracé ſur la Mappemonde; & ils déſignent d'un côté tous les pays qui verront l'entrée de Vénus au coucher du ſoleil, de l'autre tous ceux qui verront l'entrée au lever du ſoleil; en négligeant pour ce moment l'effet des parallaxes. Si l'on prend à l'orient du méridien un arc de $35^{\circ}\frac{1}{4}$ (2102) ſur l'horizon du globe, en partant du nord, cet arc ſe terminera vers le midi de la Baviere, entre Munich & Inſpruck, à $28^{\circ}\frac{1}{3}$ de longitude & $47^{\circ}\frac{1}{2}$ de latitude; c'eſt le pays dont la projection eſt au point *H* (*fig.* 129); c'eſt l'endroit d'où il faut partir, comme d'un pole pour décrire les cercles d'entrée dont nous avons déja commencé de parler (2101), & que l'on voit dans la *fig.* 133.

Fig. 133. *Fig.* 129.

2107. L'on trouvera par la même méthode le pole *B* de ſortie à 20° de latit. boréale, & $73^{\circ}\frac{1}{2}$ de longit. ce qui tombe en Arabie près du détroit d'Ormus, en mettant le globe de maniere qu'il ſoit à Paris $13^{h}\ 43'\frac{1}{2}$. On remarquera auſſi quels ſont alors les pays qui ſe lèvent & qui ſe couchent, afin de tracer ſur la mappemonde le cercle d'illumination au moment de la ſortie vue du centre de la terre, qui eſt repréſenté par les arcs *CAI* & *EGH*; ainſi les quatre portions de cercles *FGB*, *BAD*, *EGH*, *CAI* marqueront tous les points où l'on doit voir l'entrée & la ſortie au moment du lever ou du coucher du ſoleil, & ſerviront par conſéquent de limites pour les autres cercles que nous avons à décrire, car il ſera inutile de marquer les cercles d'entrée ſur les pays où le ſoleil eſt couché, quand Vénus entre ſur ſon diſque.

Fig. 133.

2108. Dans tous les pays qui ſont au-deſſus de *FGB*, c'eſt à-dire, au nord de l'Europe & de l'Aſie ou au-deſſus de *BAD*, c'eſt-à-dire, dans toute l'Amérique, le ſoleil étoit levé, & par conſéquent on a vu l'entrée

de Vénus ſur le ſoleil. Chaque pays, par le mouvement diurne de la terre, avance vers l'orient; ceux qui ſont dans ce moment ſur la ligne *FG* ſeront à droite ou au-deſſous de cette ligne un inſtant après, ils ſeront hors du cercle d'illumination, & ne verront plus le ſoleil: ainſi la ligne *FG* eſt celle des points où l'on verra l'entrée au coucher du ſoleil; il en de même des pays ſitués ſur l'arc *AD*, en avançant vers l'orient ou vers la droite ils ceſſeront de ſe trouver ſur le cercle d'illumination *AD*, & perdront le ſoleil de vue: ainſi l'entrée de Vénus arrivera pour eux au coucher du ſoleil. Au contraire les pays ſitués ſur *GB* & ſur *BA*, en avançant vers l'orient, monteront alors ſur le cercle d'illumination, & verront l'entrée au lever du ſoleil, comme nous l'avons marqué ſur les arcs *GB* & *BA*. *Fig.* 133.

2109. On trouvera par une opération ſemblable le cercle d'illumination, pour le moment de la ſortie du centre de Vénus, ou pour $13^h\ 44'$ au méridien de Paris. L'angle horaire étant de 206°, les pays ſitués à 174° de longitude ſeront alors dans le méridien, car $360 - 206 + 20 = 174$; on diſpoſera donc le globe, élevé de 22°, enſorte que le 174e degré de longitude ſoit ſous le méridien; alors on verra du côté de l'orient, dans l'horizon, tous les pays où la ſortie doit paroître au coucher du ſoleil, & à l'occident tous ceux où la ſortie doit arriver au ſoleil levant; ces lignes ſont marquées *EGH* & *CAI* ſur la mappemonde. Les pays ſitués ſur *CI*, en avançant vers l'orient, quitteront alors le cercle d'illumination, & perdront de vue le ſoleil; ainſi la ſortie de Vénus arrivera pour eux au coucher du ſoleil. Cette ligne s'étend depuis le Groenland, au travers de l'Amérique ſeptentrionale & du Méxique, juſques dans la Mer du Sud. Au contraire les lieux ſitués ſur la ligne *EGH* & qui, par le mouvement diurne, avancent vers l'orient s'élèvent au-deſſus du cercle d'illumination *EGH*, & verront la ſortie au lever du ſoleil. La ligne qui paſſe dans tous ces points s'étend depuis le nord de l'Europe, au travers de la Turquie & de l'Arabie, juſques dans la mer des Indes, & finit dans les terres auſtrales.

fig. 133. Le point *G* où ſe coupent les lignes *FGB*, *EGH*, voit l'entrée au coucher du ſoleil, & la ſortie le lendemain matin au lever du ſoleil; mais la durée de ce paſſage y eſt inviſible, c'eſt ce qui arrivoit vers Marienbourg, en Livonie. Le point *A* où ſe coupent les deux lignes *CAI* & *BAD* voyoit l'entrée au ſoleil levant, & la ſortie au coucher du ſoleil, on y voyoit par conſéquent toute la durée du paſſage.

Dans tout l'eſpace *FGBEF*, on a vu l'entrée de Vénus auſſi bien que dans tout l'eſpace *BCDAB*. Dans l'eſpace *HBEGH* & *CBIAC*, on a vu la ſortie, ainſi les eſpaces communs à tous les deux; ſçavoir, *CBAC* & *BGEB* ont vu l'un & l'autre, c'eſt-à-dire, l'entrée & la ſortie. Dans les eſpaces *ADCA* & *FGEF* on ne voyoit que l'entrée. Dans les eſpaces *EGHB* & *BAI*, on ne voyoit que la ſortie. Dans les parties *IGHF*, *IADI*, l'on ne voyoit ni l'un ni l'autre. Dans les mappemondes que M. de l'Iſle a publiées pour les paſſages de Mercure & de Vénus, en 1753 & 1761, de même que dans la mienne pour 1769, ces différens eſpaces ſont déſignés par des couleurs différentes; on fait enluminer de bleu les pays où ſe voit l'entrée ſeulement, de jaune ceux où il n'y a de viſible que la ſortie, & de rouge ceux où les deux phaſes peuvent être obſervées.

2110. Il s'agit maintenant de tracer ſur la carte les cercles d'entrée & de ſortie pour $7^h\ 17'$, $20'$, $23'$, $26'$, afin de connoître les pays où l'effet de la parallaxe eſt le plus conſidérable, & de pouvoir choiſir en conſéquence la poſition la plus favorable pour l'obſerver.

Suppoſons que le cercle *HGK* *fig.* 130, ſoit exactement de la même grandeur que le globe dont on veut ſe ſervir, par exemple, de ſix pouces; que le point *H* repréſente le premier de tous les pays de la terre où ſe voit l'entrée, c'eſt-à-dire, où elle s'apperçoit dès $7^h\ 14'$, tandis qu'au point oppoſé *K* elle ſe voit ſeulement à $7^h\ 29'$; dans les points comme *G*, on la voit à des temps intermédiaires entre $7^h\ 14'$ & $7^h\ 29'$. On diviſera *HK* en 15 parties égales, puiſque nous ſuppoſons $15'$ de temps

pour

pour la différence entiere des deux points *H* & *K* (2098); par chacun de ces points de diviſion, on tirera des perpendiculaires au diamètre *HK*, elles intercepteront des arcs *HG*, qui ſeront les largeurs des cercles d'entrée & de ſortie pour les différens temps marqués ſur le diamètre *HK*; ainſi prenant avec un compas la diſtance du point *H* au point *G*, marqué par la ligne de la cinquième diviſion, on prendra cette même diſtance qui eſt d'environ 70° 32′ ſur le globe, puiſque ſon ſinus verſe eſt un tiers du diamètre; avec cette ouverture, partant du pole que nous avons déterminé près de Munich (2106), & faiſant tourner circulairement une pointe du compas, on formera un cercle qui coupe l'équateur à 330° de longitude, le premier méridien à 17° de latitude auſtrale, le méridien de 60° de longitude à 16° de latitude auſtrale, celui de 90° à 2° ½ de latitude boréale, celui de 120° à 29° de latitude boréale, le méridien de 180° de longitude, ſur le parallèle de 59°, & celui de 290° ſur le parallèle de 35°. Il ſuffit d'avoir trois de ces points ſur un hémiſphère, on les marquera ſur la mappemonde par leurs longitudes & leurs latitudes; on fera paſſer un cercle par ces trois points, & ce même cercle paſſera néceſſairement ſur tous les autres points de l'hémiſphère qui appartiennent au même cercle, & où l'entrée de Vénus doit arriver à 7^h 19′ comptées ſur le méridien de Paris. *Fig.* 130.

2111. Nous parlons de ces cercles décrits ſur la mappemonde, comme des cercles décrits ſur le globe; parce qu'on verra que dans la projection des mappemondes, qui eſt la projection ſtéréographique ordinaire, tous les cercles du globe deviennent des cercles, quoique plus ou moins grands ſuivant leur ſituation (3874); ainſi nous ſommes aſſurés que le même trait de compas, qui paſſe ſur trois points de notre mappemonde, paſſera auſſi par tous les autres lieux, qui ſur le globe terreſtre, ſe trouvoient appartenir au même cercle. Projection ſtéréographique.

2112. La mappemonde repréſente le globe coupé en deux parties différentes, ce qui nous a obligé de cou-

per auſſi en deux portions la plupart des cercles d'entrée. Par exemple, on voit ſur l'hémiſphère du nouveau
Fig. 133. monde (*fig.* 133), une portion *LM* du cercle d'entrée de $7^h\ 17'$, & l'on voit encore à gauche dans l'autre hémiſphère une portion *NO* du même cercle, marquée de même $7^h\ 17'$. Chacune de ces deux portions exige 3 points pour la déterminer; mais on voit que le point *N* & le point *L* ne ſont qu'un même point, l'un & l'autre étant ſur le premier méridien vers 71° de latitude; & d'ailleurs, quand on a ſon compas ouvert ſur le globe, il eſt aiſé de marquer par longitude & latitude autant de points qu'on juge à propos, & d'en prendre trois dans l'hémiſphère oriental, & trois dans l'hémiſphère occidental, ſi cela eſt néceſſaire. Il ſeroit inutile de marquer ſur notre mappemonde la partie d'un cercle d'entrée qui paſſe ſur les pays où le ſoleil n'eſt pas levé, & où par conſéquent l'on ne peut voir l'entrée de Vénus ſur le ſoleil; c'eſt pourquoi j'ai terminé tous les cercles d'entrée à la ligne *GOBAD* qui ſur la mappemonde ſépare les pays où l'on voyoit le ſoleil à $7^h\ 14'$ de ceux où on ne le voyoit pas.

Cercles de ſortie. 2113. Les cercles de ſortie ſe décriront de la même manière lorſqu'on aura les poles de ſortie, (art. 2107).
Fig. 129. Le pole *B* (*fig.* 129), ſe trouve vers Maſcate en Arabie; le point ou pole oppoſé *I* ſe trouve dans la Mer du Sud; celui-ci voit la ſortie à $13^h\ 36'$, tandis que le point *B*
Fig. 130. la voit à $13^h\ 51'$, comme je l'ai marqué dans la *fig.* 130; la différence eſt encore de $15'$; ainſi l'on peut prendre le cercle *HGK*, pour repréſenter les différens arcs dont on aura beſoin pour la ſortie; le point *H* étant marqué $13^h\ 51'$, les points de diviſion qui ont ſervi à marquer d'un côté $7^h\ 17'$, $20'$, $23'$ & $26'$, ſerviront à marquer de l'autre $13^h\ 48'$, $45'$, $42'$, $39'$, & les mêmes ouvertures de compas qui ont ſervi pour tracer les cercles d'entrée (2110), ſerviront à décrire les cercles de ſortie. Le cinquième point de diviſion du diamètre *HK*, par lequel on a tiré une perpendiculaire *GG*, a déterminé l'arc *HG* pour $7^h\ 19'$, & il détermine l'arc *HG* pour

$13^h\ 46'$; l'arc HG étant toujours de $70^o\ 32'$. *Fig.* 130.

2114. Ayant tracé de même tous les cercles d'entrée & de ſortie dans le paſſage de 1769, j'ai vu que l'entrée à *Mexico* dans la nouvelle Eſpagne devoit être à $7^h\ 21'\ 10''$, la ſortie à $13^h\ 37'\ 40''$; ainſi la durée totale du paſſage y étoit de $6^h\ 16'\ 30''$; tandis qu'aux environs de Péterſbourg la durée y devoit être plus grande de $18'\frac{1}{4}$, je dis aux environs de Péterſbourg, c'eſt-à-dire un peu au nord, parce qu'à Péterſbourg on ne pouvoit voir l'entrée.

Voyages qu'il étoit utile d'entreprendre.

2115. En conſéquence j'annonçai que deux obſervations complètes de ce paſſage, en 1769, dont l'une ſeroit faite au Méxique & l'autre au nord de Péterſbourg, nous donneroient la parallaxe avec une préciſion deux fois auſſi grande que celle qu'on auroit pu avoir dans le paſſage obſervé en 1761, en ſuppoſant même toutes ces obſervations d'accord. (*Mém. acad.* 1757, *pag.* 244). En effet la plus grande différence que nous euſſions pu comparer, étoit de $8'$ entre Tobolsk & l'Iſle Rodrigues, encore falloit-il ſuppoſer qu'on connût exactement leur différence de longitude, au lieu qu'on avoit, en 1769, une différence double, indépendante de la longitude, ſuppoſé que l'on parvînt à obſerver la durée entiere du paſſage de 1769 en Laponie & au Méxique, ou en Californie ; c'eſt ce qui fut adopté par toutes les académies, & qui détermina les voyages dont nous parlerons en faiſant l'hiſtoire de ces obſervations (2146). Celles de la mer du Sud étoient encore plus importantes, puiſque la durée totale du paſſage pouvoit s'y trouver de $25'$ plus courte qu'en Laponie ; j'en avertis dans le mémoire que je publiai en 1764 ſur ce paſſage ; mais il n'y a eu qu'un vaiſſeau Anglois avec lequel on ait tenté d'aller faire cette obſervation dans la mer du Sud, & nous ignorons encore le ſuccès de ce voyage, (en Octobre 1770).

Méthodes pour observer un passage de Vénus, ou de Mercure sur le Soleil, & pour tirer des Observat. toutes les conséquences qui en résultent.

2116. Il y a trois sortes d'observations différentes que l'on peut faire dans un passage de Vénus & de Mercure sur le soleil ; chacune exige une méthode pour calculer ces observations, & en tirer les résultats convenables. Je ne parle que de trois espèces d'observations, parce qu'on ne peut guères employer pour un passage de Vénus que trois sortes d'instrumens ; 1°, le quart-de-cercle (2311), pour avoir les différences de hauteur & d'azimut ; 2°, le micromètre (2358), ou l'héliomètre (2433), pour avoir les distances au bord le plus proche ; 3°, le micromètre dans la lunette parallatique (2400), pour avoir les différences d'ascension droite & de déclinaison : l'explication de ces méthodes pourroit être réservée pour le XIVe livre ; mais elle devient nécessaire ici à cause des résultats que nous avons à en tirer.

Par le moyen du quart-de-cercle.

2117. Le quart-de-cercle est de tous les instrumens d'astronomie le plus familier aux astronomes, celui dont les observations sont les plus simples, la manipulation la plus aisée ; c'est en général celui que l'on doit préférer à tous, lorsqu'il est possible de l'employer : M. de l'Isle en fit sentir toute l'utilité dans le temps du passage de Mercure sur le soleil en 1723, (*Mém. acad.* 1723) ; & il est communément préférable à la lunette parallatique, pour les raisons suivantes.

Raisons de préférence pour le quart-de-cercle.

2118. Dans un quart-de-cercle les fils conservent toujours leur position exacte, l'un est toujours vertical, & l'autre toujours horizontal, au lieu que dans la machine parallatique il est difficile que le mouvement soit aussi régulier, & la position aussi exacte que celle que détermine un fil à plomb. Dans ces observations du quart-de-cercle la réfraction ne change point les quantités, ou les différences de hauteur observées, au lieu qu'elle affecte & complique beaucoup les différences d'ascension

droite & de déclinaiſon. Enfin, les réductions & le calcul qu'exigent les parallaxes & les réfractions, rendent le calcul plus long dans les obſervations faites à la lunette parallatique, que dans celles qu'on fait au quart-de-cercle.

2119. Soit *AB* le fil vertical de la lunette, & *ED* le fil horizontal, qui ſe coupent au foyer de la lunette d'un quart-de-cercle, en ſorte que *AEBD* repréſente le champ de la lunette, *S* le diſque du ſoleil ſur lequel on apperçoit Vénus en *V*, dont on veut déterminer la poſition. On diſpoſera la lunette de maniere que le ſoleil ne touche point les fils; mais que par le mouvement diurne il ſoit obligé de venir les rencontrer; ſi c'eſt le matin, comme les lunettes aſtronomiques renverſent les objets, il faut faire paroître le ſoleil au haut de la lunette & ſur la droite, comme on le voit dans la figure; alors le mouvement diurne étant dirigé de *S* en *C*, le ſoleil traverſera le fil vertical, & l'horizontal auſſi bien que Vénus. *Planche XVI. Fig. 135.*

2120. On obſervera donc attentivement avec une horloge à ſecondes les ſix inſtans ſuivans, dans l'ordre où ils arriveront: car il pourra ſe faire que les paſſages au fil horizontal, précèdent les paſſages au fil vertical; & que l'ordre ſuivant ſoit changé, cela dépendra de l'endroit où l'on aura placé le ſoleil, & de la direction de ſon mouvement par rapport à l'horizon. *Momens des ſix obſervations.*

1. Paſſage du bord précédent du ſoleil, au fil vertical.
2. Paſſage du bord inférieur du ſoleil, au fil horizontal.
3. Paſſage du bord précédent de Vénus, au fil vertical.
4. Paſſage du bord inférieur de Vénus, au fil horizontal.
5. Paſſage du bord ſuivant du ſoleil, au fil vertical.
6. Paſſage du bord ſupérieur du ſoleil, au fil horizontal.

J'appelle bord inférieur du ſoleil celui qui paroît tel dans la lunette, (quoiqu'il ſoit réellement ſupérieur), afin de ne pas compliquer l'attention de l'obſervateur par des conſidérations incidentes.

2121. Je n'obſerve que le paſſage d'un des bords de

Fig. 135. Vénus, parce que le diamètre de cette planète étant assez connu (2157), il est inutile de se charger d'une double observation qui peut nuire à l'exactitude des autres, & détourner l'attention de l'observateur; si cependant on a avec soi une personne pour compter les secondes & une autre pour les écrire; on fera bien d'observer les deux bords de Vénus au fil vertical *AB* & au fil horizontal, *ED*; le milieu donnera plus surement le passage du centre de Vénus.

2122. Quoique j'aie indiqué le passage de chaque bord du soleil au fil vertical, & au fil horizontal, on peut se contenter d'observer un seul bord, en choisissant celui dont Vénus est le plus près; car le diamètre du soleil étant très-bien connu, on trouvera fort exactement par le calcul combien son diamètre a dû employer de temps à traverser le fil vertical & le fil horizontal du quart-de-cercle (84); mais si l'on a la facilité d'observer chaque bord, on aura une confirmation de l'un par l'autre, & un double terme de comparaison pour la situation de Vénus.

2123. Lorsqu'on a par observation le temps qui s'est écoulé entre les passages du bord du soleil & du bord de Vénus à un même fil, on en conclud leur différence de hauteur si c'est le fil horizontal, & leur différence d'azimut si c'est le fil vertical; j'appellerai ici différence d'azimut comme dans le calcul des éclipses (1891), un arc de grand cercle perpendiculaire au vertical.

On connoît ou par observation ou par le calcul (897) le temps que le demi-diamètre du soleil emploie à traverser le fil horizontal du quart-de-cercle; on fera donc cette proportion: le temps que le demi-diamètre entier met à traverser le fil, est la valeur du demi-diamètre du soleil (1388), comme le temps écoulé entre les passages du bord de Vénus & du bord du soleil au fil horizontal, est à un quatrième terme, qui sera la différence de hauteur entre les bords observés de Vénus & du soleil. Je suppose que le demi-diamètre du soleil étant de 15′ 46″

Différence de hauteur par observation.

emploie 2′ de temps à traverſer le fil horizontal dans le temps de l'obſervation, & qu'entre les bords inférieurs de Vénus & du ſoleil au fil horizontal il ſe ſoit écoulé une minute de temps, il eſt évident qu'il y aura la moitié de 15′ 46″, ou 7′ 53″, pour la différence de hauteur entre les deux bords de Vénus & du ſoleil. *Fig.* 135.

2124. On connoît de même ou par l'obſervation (2120) ou par le calcul (896), le nombre de minutes & de ſecondes de temps que le demi-diamètre entier du ſoleil met à paſſer le fil vertical; on a par obſervation le temps écoulé entre les paſſages du bord de Vénus & de celui du ſoleil au même fil; on fera donc auſſi cette proportion: le temps employé par le demi-diamètre du ſoleil à traverſer le fil vertical, eſt à la valeur du demi-diamètre du ſoleil en min. & en ſec., comme le temps écoulé dans l'obſervation entre le bord précédent du ſoleil & celui de Vénus au même fil vertical, eſt au nombre de minutes & de ſecondes qui forme la différence d'azimut entre ces deux bords obſervés. Si le bord occidental du ſoleil *F* a paſſé au fil vertical 2′ plutôt que le centre *S*, & 1′ plutôt que Vénus *V*, on ſent aſſez que la différence d'azimut doit être la moitié de la différence *FS*, l'une & l'autre étant meſurée perpendiculairement au vertical.

2125. Quand on a obſervé par le moyen du quart-de-cercle la différence de hauteur & d'azimut entre Vénus & le centre du ſoleil, il faut en conclure la différence de longitude & de latitude, pour le moment de l'obſervation. En expliquant la maniere d'en faire le calcul je prendrai pour exemple une des obſervations que je fis le 6 Juin 1761. A $6^h\ 31'\ 46''$ du matin temps vrai à Paris, le bord précédent ou le bord occidental *A* de Vénus, (*fig.* 136), ſuivoit le bord précédent *P* du ſoleil de 43″ au fil vertical, & le bord boréal *F* de Vénus précédoit de $59''\frac{1}{2}$ le bord auſtral *M* ou le dernier bord du ſoleil; il s'agit d'en conclure d'abord la différence de hauteur & la différence d'azimut entre les centres de Vénus & du ſoleil. Ces deux paſſages de Vénus au vertical & à l'horizontal n'étoient pas éloignés l'un de l'autre d'une minute de

Déterminer le lieu de Vénus par cette obſervation.

Fig. 136.

Fig. 136. temps, ſans quoi il faudroit les réduire à un même temps, au moyen du changement qu'on auroit remarqué entre ces obſervations & les ſuivantes. Le temps que le demi-diamètre du ſoleil emploie à traverſer le méridien (895), étoit ce jour-là de $1' 8'' 2$, l'angle du vertical avec le cercle de déclinaiſon $44° 39'$ pour l'heure de cette obſervation (1036); on en déduit le temps que le demi-diamètre employoit à traverſer le fil horizontal $1' 37'' 0$, & le temps qu'il employoit à traverſer le vertical $1' 36'' 0$; on fera donc ces proportions, $1' 36'' : 15' 46'' :: 43'' : 7' 4''$; d'où il ſuit que le bord occidental A de Vénus (*fig.* 136), étoit éloigné horizontalement du bord occidental P du ſoleil de la quantité AB égale à $7' 4''$; & y ajoutant le demi-diamètre de Vénus AD (2157), on aura la quantité $BD = 7' 33''$, on retranchera BD de BE qui eſt égale au demi-diamètre du ſoleil $15' 46''$, & l'on aura $ED = 8' 13''$, c'eſt la différence d'azimut entre le centre du ſoleil & le centre de Vénus, au moment où Vénus a été obſervée.

2126. On fera enſuite cette ſeconde proportion; $1' 37'' : 15' 46'' :: 59'' \frac{1}{2} : 9' 40''$; c'eſt la différence FG de hauteur apparente entre le bord précédent F de Vénus, qui paroiſſoit inférieur dans la lunette, & le bord ſuivant M du ſoleil; on en ôtera le demi-diamètre FD de Vénus $29''$, & l'on aura $DG = 9' 11''$; on retranchera DG de GH égale au demi-diamètre du ſoleil $15' 46''$, & l'on aura DH différence de hauteur apparente entre les centres de Vénus & du ſoleil $6' 35''$ au moment où Vénus a paſſé au fil horizontal.

2127. Cette différence de hauteur apparente n'a pas beſoin d'être corrigée par la réfraction; comme ſi on l'avoit meſurée au micromètre; d'ailleurs, le ſoleil étoit aſſez haut & les deux points aſſez voiſins l'un de l'autre pour que cette quantité fût inſenſible; mais cette différence doit être corrigée par le moyen de la parallaxe. Pour cet effet, ayant calculé la hauteur du ſoleil (1034), on la trouve de $21° 59'$; le coſinus de cette hauteur multiplié par la différence des parallaxes horizontales $22''$

donne

donne la différence des parallaxes de hauteur 19″ qui n'exige aucune correction pour la différence des réfractions. Il faut donc ôter 19″ de la différence en hauteur 6′ 35″ pour avoir la vraie différence 6′ 16″ ; c'eſt la véritable valeur de *HD* ou *CE*. On a vu ci-devant une méthode beaucoup plus ſimple pour trouver la parallaxe (2080). Dans le triangle *CED* qui eſt ſenſiblement rectiligne & rectangle, on connoît *CE* = 6′ 16″ & *ED* = 8′ 13″, on trouvera l'angle *DCE* = 52° 40′, & l'hypothénuſe *CD* = 10′ 21″, c'eſt la vraie diſtance du centre de Vénus au centre du ſoleil. *Fig.* 136.

2128. On cherchera enſuite la poſition du cercle de latitude ſur la figure, pour avoir l'angle de conjonction. L'angle de poſition pour l'heure donnée eſt 6° 23′ qu'il faut ſouſtraire (1884), de l'angle 44° 39′ que fait le vertical avec le cercle de déclinaiſon ; il reſte 38° 16″ pour l'angle parallactique du vertical avec le cercle de latitude, c'eſt l'angle *ECI*, on le retranchera de l'angle *ECD* = 52° 40′ ; il reſtera 14° 24′ pour l'angle de conjonction *DCI* (1887).

2129. On abaiſſera du centre *D* de Vénus une perpendiculaire *DK* ſur le cercle de latitude, ce ſera la différence de longitude entre les centres de Vénus & du ſoleil ; & *CK* ſera la latitude de Vénus. Dans le triangle *DCK* l'on connoît l'hypothénuſe *CD* = 10′ 21″ & l'angle *DCK* 14° 24′ ; on trouvera la latitude *CK* = 10′ 1″ & la différence de longitude *DK* = 2′ 34″ ; c'eſt le réſultat immédiat de l'obſervation (2125) ; mais on doit en conclure auſſi la conjonction & la latitude, comme nous le dirons ci-après (2150). La méthode que nous venons d'expliquer eſt auſſi celle dont on ſe ſert pour obſerver les taches du ſoleil & de la lune (3141). Différence de longitude & de latitude.

2130. M. de Fouchy a donné une méthode pour calculer de ſemblables obſervations ſans ſuppoſer que l'un des fils ſoit horizontal & l'autre vertical, mais ſeulement qu'ils ſoient perpendiculaires l'un à l'autre : ſoit *RH fig.* 135, la route du centre du ſoleil, *MLKO* celle du centre de Vénus ; ſi l'on a obſervé le bord du ſoleil en

Fig. 135. *T* & en *I*, le milieu entre ces deux inſtans d'obſervation donne l'heure où le centre a paſſé en *N*; de même le milieu entre les paſſages des deux bords au fil *AB* donne le moment du paſſage du centre du ſoleil au point *O*; on a donc la valeur de *NO*. Dans le triangle *RNT*, on connoît *RN* & *RT*, on trouve l'angle *N*, ce qui fait connoître le côté *NC* du triangle *NOC*. Dans le triangle *CYI* on connoît *YL* par le temps du paſſage de Vénus en *L* & en *Y*, & l'angle *L* égal à l'angle *N*, on cherche *CL*, on en ôte *NC*, & l'on a *NL*. Dans le triangle *NLK* l'on a *NL* avec l'angle *L*, on trouve *NK* différence de déclinaiſon entre Vénus & le ſoleil, & *KL* qui donne le temps du paſſage de Vénus en *K*, & par conſéquent la différence entre l'aſcenſion droite du ſoleil pour le moment où il a paſſé en *N*, & celle de Vénus lorſqu'elle étoit en *K*. (*Mém. acad.* 1737, *pag.* 250).

Avec le micromètre. 2131. Lorſqu'on peut obſerver pendant pluſieurs heures un paſſage de Vénus ou de Mercure ſur le ſoleil, & qu'on a un bon héliomètre (2433), ou micromètre objectif; la méthode la plus exacte de toutes pour obſerver la poſition de la planète ſur le diſque du ſoleil, eſt de meſurer ſa diſtance au bord le plus proche du ſoleil; ſur-tout quand la hauteur eſt aſſez grande pour qu'on n'ait pas à craindre une grande inégalité de réfractions; j'ai employé cette méthode avec ſuccès dans le paſſage de 1761, quoique je n'euſſe pas un long eſpace de temps pour meſurer des diſtances fort différentes entr'elles. Par la diſtance du bord de Vénus au bord le plus proche du ſoleil, on trouve aiſément la vraie diſtance des centres, par

Fig. 137. exemple *CA* (*fig.* 137); ſi l'on a une autre diſtance, telle que *CD*, avec l'intervalle de temps compris entre ces deux obſervations, on calcule le mouvement *AD* de Vénus ſur ſon orbite dans cet eſpace de temps; alors dans le

Uſage de 2 diſtances. triangle *CAD* dont on connoît les trois côtés, on cherche un angle *A* & la perpendiculaire *CB* qui eſt la plus courte diſtance des centres; d'où il eſt aiſé de conclure le milieu du paſſage, le temps de la conjonction & la latitude pour ce temps-là. C'eſt à peu-près de même

que nous avons cherché le temps de la conjonction vraie par le moyen d'une éclipſe de ſoleil (1973). Si l'on a obſervé la plus courte diſtance CB, on la compare avec une des diſtances comme CD, la plus éloignée du milieu du paſſage, & l'on en conclut BD que l'on réduit en temps, pour avoir le temps du milieu du paſſage en B. *Fig.* 137. Uſage de la plus courte diſtance.

2132. Enfin ſi l'on n'a obſervé que deux diſtances telles que CD & CV du même côté de la perpendiculaire, comme cela m'eſt arrivé en 1761, on peut également s'en ſervir pour trouver le temps de la conjonction & la latitude pour cet inſtant; c'eſt ici le cas le plus compliqué, c'eſt pourquoi je vais l'expliquer en détail, en l'accompagnant d'un exemple. Les autres cas s'en déduiront facilement.

2133. EXEMPLE. Je choiſis pour terme de comparaiſon & pour une de mes deux diſtances, le contact intérieur des bords de Vénus & du ſoleil obſervé le ſix Juin 1761 à $8^h\ 28'\ 25''$. Je ſuppoſe que la diſtance vraie des deux centres de Vénus & du ſoleil étoit à ce moment-là de $915''\ 1$, après l'avoir corrigée par la parallaxe (2084); c'eſt la diſtance CV. Le même jour à $7^h\ 18'\ 45''$, j'avois meſuré la diſtance du bord de Vénus au bord du ſoleil le plus éloigné, à laquelle ajoutant le demi-diamètre de Vénus je trouve la diſtance du centre de Vénus au bord boréal du ſoleil $27'\ 53''$; ſi le ſoleil eût été moins élevé, il faudroit encore la corriger par la réfraction (2247); j'en ôte le demi-diamètre du ſoleil, & j'ai la diſtance apparente des centres de Vénus & du ſoleil $12'\ 6''\ 5$; j'en ôte $7''$ dont la parallaxe faiſoit paroître cette diſtance trop grande (2084), & j'ai la diſtance vraie CD $11'\ 59''\ 5$. L'intervalle de temps entre D & V eſt de $1^h\ 9'\ 40''$, pendant lequel Vénus parcouroit ſur ſon orbite un arc DV de $4'\ 38''\ 5$, (2058). Uſage du premier contact de Vénus.

2134. Dans le triangle CVD l'on connoît donc les trois côtés $CV = 914''\ 95$, $CD = 719''\ 5$; & $VD = 278''\ 5$, le grand côté CV eſt à la ſomme de CD & VD, comme leur différence eſt à la différence des ſegmens que la perpendiculaire DX forme ſur le grand côté CV;

Fig. 137. la moitié de cette différence eſt 240″ 5, ce qui donne le plus petit ſegment $VX = 216''\ 9$. A cauſe du triangle VDX, on a $VD : VX :: R :$ coſin. V, 38° 44′, & à cauſe du triangle CVB, on a $R :$ ſin. $V :: CV : CB$, & $R :$ coſ. $V :: CV : VB$; par-là on trouve la perpendiculaire CB ou la plus courte diſtance des centres de 9′ 32″ 4, & ayant trouvé le logarithme de VB, on y ajoute tout de ſuite le logarithme conſtant 1, 176038, qui eſt celui d'une heure diviſée par 4′ 0″ 03, & l'on a le logarithme de 2^h 58′ 25″; cette quantité eſt la diſtance en temps du milieu du paſſage à l'heure du contact; on la retranchera du temps vrai de l'obſervation, & l'on aura 5^h 30′ 0″ pour le temps du milieu du paſſage.

Réſultat de la plus courte diſtance.

2135. C'eſt ainſi que j'ai calculé toutes mes obſervations des diſtances de Vénus au bord du ſoleil en les comparant toutes à celle que donne le contact en V, qui eſt néceſſairement l'obſervation la plus exacte de toutes (2140), & j'ai trouvé par un milieu général la plus courte diſtance de 9′ 30″, & le milieu du paſſage de 3^h 30′ 10″; d'où il ſuit que le temps de la conjonction étoit à 5^h 51′ avec une latitude pour ce temps-là de 9′ 36″ 3. Je montrerai ci-après comment l'on doit tirer une ſemblable concluſion de chaque obſervation priſe ſéparément, lorſqu'on ſe ſert du quart-de-cercle (2150).

Troiſième méthode.

2136. Le réticule appliqué à une lunette ordinaire (2350) eſt de tous les inſtrumens d'aſtronomie le plus ſimple, le plus ordinaire, le plus facile à ſe procurer; ainſi nous devons expliquer ici la méthode d'y obſerver les différences d'aſcenſion droite & de déclinaiſon dans un paſſage de Vénus ou de Mercure ſur le ſoleil; M. J. Dom. Caſſini propoſa cette méthode en 1698, & M. Maraldi en a donné le détail, (*Mém. de l'acad.* 1736). On diſpoſe la lunette ſur une machine parallatique (2400), ou ſur un pied ordinaire, en inclinant les fils de maniere que le bord du ſoleil décrive par ſon mouvement diurne parallèle à l'équateur, un des fils de la lunette tel que AB Fig. 138. (*fig.* 138); dans cet état l'on compte à l'horloge la minute & la ſeconde à laquelle le premier bord du

ſoleil *D* touche le fil horaire *CDE*, & enſuite le moment où le bord *V* de Vénus y arrive à ſon tour ; la différence des temps convertie en degrés, & multipliée par le coſinus de la déclinaiſon (892), donne la différence d'aſcenſion droite entre le bord du ſoleil & celui de Vénus, meſurée dans la région même du ſoleil ; on peut auſſi employer le temps que le demi-diamètre du ſoleil emploie à paſſer le méridien (894), en faiſant cette règle de trois ; le temps du demi-diamètre du ſoleil eſt à ſa valeur en ſecondes de degré, comme le temps entre les bords du ſoleil & de Vénus eſt à leur différence d'aſcenſion droite en ſecondes de degré. *Fig.* 138.

Différence d'aſcenſion droite.

2137. La différence de déclinaiſon ſe meſure ou par le moyen d'un micromètre dont le curſeur *VR* ſoit placé ſur Vénus, ou par le temps qu'elle emploie à aller de *F* en *G*, c'eſt-à-dire, d'un des fils obliques à l'autre (2352) ; on conclura aiſément de ces deux obſervations la différence d'aſcenſion droite & de déclinaiſon entre les centres de Vénus & du ſoleil ; on la corrigera par la parallaxe (2081) ; & par la réfraction ſi le ſoleil a été aſſez bas, & la différence des hauteurs aſſez ſenſible pour qu'on en ait beſoin, & l'on aura la vraie différence d'aſcenſion droite & de déclinaiſon entre le centre de Vénus & celui du ſoleil.

2138. Je ſuppoſe que *CE* & *DE* (*fig.* 136) ſoient les différences de déclinaiſon & d'aſcenſion droite, la ligne *CE* étant le cercle de déclinaiſon ; & *DE* un parallèle à l'équateur ; voici la maniere la plus ſimple de calculer ces ſortes d'obſervations. Dans le triangle *CED* où l'on connoît les deux côtés, on cherchera l'angle *ECD* & l'hypothénuſe *CD* ; on tirera enſuite le cercle de latitude *CKI* faiſant avec le cercle de déclinaiſon *CE* un angle *ECI* qu'on appelle l'angle de poſition (1044), & qui pour le centre du ſoleil étoit de 6° 7′ au temps du paſſage de Vénus en 1761 ; on prendra la ſomme ou la différence de ces angles *ECD* & *ECK* ſuivant la ſituation du cercle de latitude (1884), & l'on aura l'angle *KCD*. Dans le triangle *KCD* l'on connoît l'hypothénuſe *Fig.* 136.

Fig. 136. Différence de longitude & de latitude.

CD & l'angle *KCD*, l'on trouvera la latitude *CK* & la différence de longitude *DK*, d'où l'on conclura le temps de la conjonction & la latitude au même inſtant (2150). Le 6 Juin 1761, à 8h 13′ 3″, le bord précédent de Vénus ſuivoit de 32″ de temps au fil horaire le bord du ſoleil, & il y avoit 3′ 43″ 4 de différence de déclinaiſon entre le centre de Vénus & le bord boréal du ſoleil. En ſuivant les régles précèdentes, on trouvera la latitude de Vénus 11′ 0″ & la différence de longitude 9′ 20″. On verra ci-après (2150) la maniere dont on doit déduire de deux ſemblables élémens le temps de la conjonction, & la latitude pour ce même inſtant.

2139. Cette maniere de calculer les obſervations faites avec le micromètre, eſt celle que je donnai dans les *Mém. de l'acad.* pour 1754; elle eſt la plus ſimple qu'on ait imaginée: avant moi les aſtronomes calculoient l'aſcenſion droite du ſoleil & ſa déclinaiſon, enſuite celle de Vénus, & enfin ſa longitude & ſa latitude, (*Mém. de l'acad.* 1723), ce circuit rendoit le calcul d'une longue rebutante; je crois l'avoir réduit à la plus grande facilité.

Obſervations de l'entrée & de la ſortie de Vénus, en 1761 *&* 1769, *avec les réſultats qu'on en déduit.*

2140. La plus importante de toutes les obſervations que l'on fait dans un paſſage de Vénus ou de Mercure ſur le ſoleil, eſt celle de l'entrée ou de la ſortie, principalement du contact intérieur des deux bords de Vénus & du ſoleil; ce n'eſt qu'une diſtance de Vénus au bord du ſoleil que l'on obſerve; mais elle ſe meſure avec plus de préciſion qu'aucune diſtance que pourroient donner les inſtrumens d'Aſtronomie: car l'on peut ſe tromper d'une ou deux ſecondes de degré avec les meilleurs inſtrumens, & l'on ne doit pas craindre ici une erreur de plus d'un cinquième de ſeconde, ou moins encore, ſi l'on opère avec les précautions convenables.

D'ailleurs c'eſt une diſtance qui eſt exactement & rigoureuſement la même pour tous ceux qui l'obſervent, & pour tous les pays de la terre; car elle eſt réellement égale au diamètre apparent du ſoleil, qui eſt égal pour tous les obſervateurs du monde, enſorte que la comparaiſon de toutes ces obſervations devient très-facile, & en même temps très-exacte.

2141. Au moment où le bord de Vénus touche celui du ſoleil, le filet de lumiere qui reſtoit au bord du ſoleil ſe trouve tranché ſubitement; on diſtingue ce filet de lumiere lors même qu'il n'a qu'un dixième de ſeconde, & l'on voit un point noir ſe détacher de Vénus & s'élancer vers le ſoleil (2159); voilà pourquoi l'on ne doit ſe tromper que d'une ou de deux ſecondes de temps au plus, ſur cette obſervation. C'étoit l'avis de M. Halley; c'eſt celui de M. Pingré: (*Mém. acad.* 1761, *pag.* 480); & M. Short avec qui j'eus à Londres, en 1763, une converſation à ce ſujet, m'aſſura qu'il avoit vu le contact de Vénus de la même maniere que moi; auſſi la différence des méridiens qu'il a trouvée de 9′ 16″ entre les obſervatoires de Greenwich & de Paris par ſon obſervation comparée avec la mienne, tombe à la même ſeconde que le milieu pris entre tous les paſſages de Mercure obſervés juſqu'ici, & les calculs des éclipſes de ſoleil de 1764 & 1769. De quelle maniere ſe fait le contact.

Je négligerai ici la différence qu'il peut y avoir entre les différentes lunettes qui ont ſervi à cette obſervation, je crois qu'elle eſt peu conſidérable, & très-peu conſtatée juſqu'à préſent, on peut voir cependant la maniere dont le P. Hell deſire qu'on y ait égard, dans ſes *Ephémérides pour* 1765, depuis la page 281 juſqu'à la page 308, & ſur-tout le *Suppoſitúm* VII, *pag.* 283, ſur lequel il n'a pas voulu s'expliquer complettement.

2142. J'ai raconté dans l'hiſtoire de l'académie pour 1757, quels étoient les préparatifs du monde ſavant, pour obſerver avec fruit le paſſage de Vénus en 1761, lorſque ce phénomène ſi deſiré arriva enfin le 6 Juin, comme on l'avoit prédit. Il fut obſervé en une multitude de

provinces de France, d'Angleterre, d'Allemagne, d'Italie. On trouvera les obſervations dans *la connoiſſance des mouvemens céleſtes de* 1763, *pag.* 211; dans *les éphémérides du* P. Hell *pour* 1762; dans *les tranſactions Philoſ.*; dans *les mém. de l'acad.*, & dans le mémoire que j'ai donné avec la figure du paſſage de 1769, à Paris chez Latré, Graveur, 1764. Je parlerai ci-après des élémens que j'en ai déduits; mais les plus importantes obſervations ſont celles qui furent faites au Cap de Bonne-eſpérance, à Tobolsk, à Rodrigues, & dont il eſt néceſſaire de parler, afin d'expliquer les conſéquences importantes qu'on en a déduites.

2143. Les déterminations de la parallaxe les plus ſûres, ſont celles qui ſont indépendantes de la différence des méridiens ou de la longitude des lieux, élément toujours difficile à bien conſtater; telles ſont celles qui ſe tirent de la durée totale du paſſage, obſervée tout à la fois à Stokolm & à Tobolsk en 1761: voici le calcul que j'en donnai à l'académie le 23 Décembre 1761, auſſitôt après que nous eûmes reçu les obſervations des pays éloignés. La latitude de Tobolsk eſt de 58° 12′ 30″, celle de Stokolm 59° 20′ 30″; le contact intérieur fut obſervé par M. l'Abbé Chappe à Tobolsk, lorſque Vénus entra totalement ſur le ſoleil, à 7^h 0′ 28″ du matin; & le contact intérieur, lorſque Vénus commença de ſortir, 0^h 49′ 20″ $\frac{1}{2}$ après midi.

Les contacts intérieurs obſervés par M. Wargentin à Stokolm, ſont 3^h 39′ 29″ & 9^h 30′ 10″. En ſuppoſant la parallaxe horizontale du ſoleil de 10″ $\frac{1}{4}$, je trouvai par un calcul très-exact & très-rigoureux, fait de la même maniere que celui de l'article 2061, que les corrections néceſſaires pour réduire ces quatre obſervations au centre de la terre, étoient de — 6′ 19″ 7, & + 2′ 46″ 2 pour Stokolm; — 6′ 23″ 6, & + 4′ 29″ 4 pour Tobolsk; par ce moyen, la durée ſe trouve 5^h 59′ 46″ 9 par les obſervations de Stokolm, & 5^h 59′ 45″ 5 par celles de Tobolsk. Il y a 1″ 4 de différence dans cette ſuppoſition; enſorte que pour trouver exactement la même durée, il faut employer

Parallaxe déduite de l'obſervation de M. Chappe, 10″ $\frac{1}{2}$.

employer 10″ 4 pour la parallaxe du ſoleil, en ſuppoſant ces 4 obſervations rigoureuſement exactes ; cependant nous verrons bientôt que cette parallaxe eſt un peu trop grande (2149). La différence des méridiens qui réſulte de cette détermination eſt de $4^h\ 24'\ 23''$ entre Paris & Tobolsk ; (Voyez les *Mém. de l'ac.* 1761, *p.* 112 & 485).

Ces deux obſervations ſeroient déciſives ſi la diſtance des lieux eût été plus grande ; mais il faut conſidérer que l'effet de la parallaxe ayant été preſque le même ſur l'entrée, & ſeulement de 1′ 43″ plus grand à Tobolsk pour la ſortie, 5″ d'erreur ſur l'inſtant de chacune des obſervations de la ſortie, c'eſt-à-dire, 10″ de différence entre les temps vrais de ces obſervations & ceux qu'on a pris pour tels changeroient la parallaxe d'une ſeconde.

2144. La durée obſervée d'un côté à Upſal, par M. Bergman, de l'autre à Cajanebourg, par M. Planman, ne donne que 9″ pour la parallaxe quand on les compare avec la durée obſervée à Tobolsk, (*Mém. acad.* 1761, *pag.* 458) ; mais comme les différences entre les durées obſervées n'alloient pas à 2′ de temps, il reſtoit toujours à cet égard un petit degré d'incertitude.

M. Pingré obſerva le contact intérieur à $0^h\ 36'\ 49''$, à l'Iſle Rodrigues, ſituée par 19° 40′ 40″ de latitude méridionale. Il détermina par quelques obſervations de la lune & des ſatellites la différence des méridiens entre Paris & l'Iſle Rodrigues $4^h\ 3'\ 26''$: ainſi la différence des temps obſervés a été de 4′ 58″ plus grande que celle des méridiens. Cette différence devoit être de 4′ 33″ 56 ſeulement, en ſuppoſant la parallaxe de 10″ ; d'où M. Pingré conclut que la parallaxe horizontale du ſoleil, dans ſes moyennes diſtances, eſt de 10″ 18, (*Mém. acad.* 1761, *pag.* 482). Obſervation de M. Pingré, 10″ un cinquième.

2145. Enfin M. Maſon ayant déterminé au Cap de Bonne-Eſpérance le contact intérieur à $9^h\ 39'\ 52''$, ſi l'on ſuppoſe la différence des méridiens entre Paris & le Cap de $1^h\ 4'\ 17''$, on trouvera pour Paris $8^h\ 35'\ 35''$, au lieu de $8^h\ 28'\ 25''$: ainſi la différence des temps obſervés eſt de 7′ 10″ ; on trouve par la méthode de l'art. Obſervation de M. Maſon, 8″ ½.

2061 qu'elle ſeroit de 8′ 17″ 2, en ſuppoſant la parallaxe du ſoleil de 10″; d'où il ſuit que cette parallaxe ne doit être ſuppoſée que de 8″ 6, pour concilier ces obſervations.

Longitude du Cap. La longitude du Cap doit être regardée comme bien connue; car M. de la Caille la trouvoit 1h 4′ 18″ ½, par ſes obſervations, (*Mém. acad.* 1761, *pag.* 11); & M. Short la trouvoit 1h 4′ 13″, par quatre obſervations de M. Maſon, très-bien d'accord entre elles & faites avec d'excellens téleſcopes de même longueur, mais il l'a augmentée enſuite juſqu'à 1h 4′ 19″, (*Phil. tranſ.* 1763, *pag.* 321); ainſi l'on doit regarder, ce me ſemble, l'obſervation du Cap comme très-concluante; d'ailleurs M. Short par un grand nombre de comparaiſons trouvoit la parallaxe de 8″ 56. (*Philoſ. tranſ.* 1762, *pag.* 621 & 1763, *pag.* 340), ce qui donne pour la moyenne 8″ 7.

Obſervations faites en 1769. 2146. Au milieu de ces incertitudes nous attendîmes le paſſage de 1769; il étoit encore plus important que celui de 1761, parce que l'effet de la parallaxe y devoit être plus ſenſible, en ſuppoſant que l'obſervation fût faite dans les points les plus favorables, tels que la mer du ſud, la Californie, & les parties les plus ſeptentrionales de l'Europe. Auſſi tous les Princes qui aiment & qui favoriſent les ſciences, firent pour cette obſervation des dépenſes & des préparatifs immenſes.

M. le Gentil étoit reſté aux Indes depuis le paſſage de 1761, pour y attendre celui de 1769. D'un autre côté l'académie n'ayant pu obtenir de la Cour d'Eſpagne des facilités pour un voyage dans la mer du ſud, M. l'Abbé Chappe partit pour la Californie, avec deux Officiers Eſpagnols, le 29 Décembre 1768 (a); j'étois deſtiné pour l'Iſle de S. Domingue, où il s'agiſſoit auſſi d'aller vérifier les montres marines de M. Berthoud, commiſſion dans laquelle M. Pingré voulut bien me remplacer, ma ſanté ne m'ayant pas permis de l'exécuter. M. Véron fut chargé d'aller faire le tour du monde ſur le vaiſſeau commandé par M. de Bougainville, avec M. Commerſon, habile naturaliſte, pour revenir aux Indes, où M. Véron

(a) Il eſt mort à S. Joſeph près le Cap S. Lucas, le 1 Aout 1769

eſpéroit auſſi faire l'obſervation du paſſage de Vénus; mais il n'a pu y parvenir; le P. Chriſtophe, Capucin, ſe chargea de la faire à la Martinique, & il y réuſſit.

La ſociété royale de Londres, ſous la protection du Roi d'Angleterre, envoya M. Dymond & M. Wales dans l'Amérique ſeptentrionale; M. Green dans la mer du ſud, ſur un vaiſſeau commandé par le Capitaine James Cook; & M. Call à Madras, aux Indes; il y avoit d'ailleurs pluſieurs perſonnes qui étoient déja à portée de faire cette obſervation dans divers endroits des colonies Angloiſes; ſavoir, M. Wintrop, à Cambridge; M. Smith, à Norriton en Penſilvanie; M. Wright, à l'Iſle Coudre, près de Québec; M. le Capitaine Helland, près du Fort S. Louis, & d'autres obſervateurs à Philadelphie & aux environs.

L'académie de Péterſbourg, par ordre de l'Impératrice de Ruſſie, attira des aſtronomes de Genève & d'Allemagne, & fit faire à Londres & à Paris un grand nombre d'inſtrumens; elle envoya des obſervateurs dans trois endroits de la Laponie Ruſſienne; ſavoir, M. Rumowsky, à Kola, lat. 69°, long. 50° $\frac{1}{2}$; M. Pictet, de Genève, à Oumba, lat. 67°, long. 52°; M. Mallet, de Genève, à Ponoi, lat. 67°, long. 59°: on envoya le Capitaine Iſlenief, dans la Ruſſie Aſiatique, à Yakoutsk, ſur la Lena, lat. 62°, long. 147° $\frac{1}{2}$ environ; d'autres aſtronomes allèrent du côté de la mer Caſpienne, dans le gouvernement d'Aſtracan; M. Lowitz, à Gurief, lat. 47°, long. 70°; M. Kraft, à Orenbourg, lat. 52°, long. 73°; & M. Chriſt. Euler, à *Orſk*, lat. 51°, long. 76°. Chacun de ces obſervateurs étoit bien accompagné, & muni de toutes les choſes néceſſaires pour le ſuccès de ſa miſſion. J'étois ſur le point d'aller moi-même à Saint Péterſbourg, lorſqu'ayant appris que l'Electeur Palatin vouloit bien contribuer à ces obſervations, en laiſſant voyager le P. Mayer ſon aſtronome, je me repoſai ſur lui de cette commiſſion. Le P. Mayer partit de Manheim pour aller à Péterſbourg, où il fit l'obſervation, avec M. Albert Euler, M. Stahl & M. Kotelnikoff qui y étoient déja: toutes ces obſervations ont été imprimées ſucceſſive-

ment en Ruſſie, & elles ſeront encore inſérées dans le XIVe volume des mémoires de l'académie de Péterſbourg.

Le Roi de Dannemarck demanda le P. Hell, aſtronome de L. M. Impériales, pour faire l'obſervation à l'Iſle *Whardus* ou Wardoë, extrémité ſeptentrionale de notre continent. Ces obſervations ont été imprimées à Copenhague, & nous les avons reçues au commencement de Mars 1770.

Parmi les aſtronomes Suédois, nous avions pour obſervateurs à *Stokolm*, M. Wargentin, M. Ferner & M. Wilcke; à *Upſal*, M. Mélander, M. Proſpérin, M. Bergman, M. Salénius & M. Stromer; à *Pello*, M. Mallet; à *Torneo*, M. Hellant; à *Cajanebourg*, M. Planman; à *Gripſwald*, en Poméranie, M. Mayer.

En France l'obſervation fut faite à Paris, à la Meute, à Colombes, à Saron, à S. Hubert, à Laon, à Calais, à Montreuil, à Caen, à Rouen, au Havre, à Breſt, à Kergais, à Bordeaux, à Bayonne, à Toulouſe. Les aſtronomes Anglois l'ont faite à Londres, à Greenwich, à Oxfort, à Shirburn, à Edimbourg; à Cavan & à Londonderry, en Irlande; au Cap-Lizard, & à Gibraltar; on l'a faite auſſi à Cadix, à Porto en Portugal, &c. mais il me ſuffit de parler ici des obſervations que j'ai calculées, & dont je puis tirer des conſéquences.

2147. L'empreſſement que j'avois de ſavoir le réſultat de tant de préparatifs, fut ſecondé par M. Maskelyne, aſtronome royal d'Angleterre; par M. Albert Euler, ſecretaire de l'académie Impériale de Péterſbourg; & M. Wargentin, ſecretaire de l'académie royale de Suede: ils m'envoyèrent ſans délai, toutes les obſervations qu'ils reçurent, & dès la fin de l'année 1769, je fus en état de comparer des obſervations aſſez éloignées, pour pouvoir en conclure avec une préciſion ſuffiſante, la diſtance du ſoleil à la terre; ce réſultat fut publié dans la Gazette de France du 10 Janvier. Parmi les obſervations faite dans l'Amérique ſeptentrionale; celle de la Baie d'Hudſon étoit la plus complette, de même que celle de Cajanebourg.

MM. Dymond & Wales ayant été envoyés dans le nord de l'Amérique ſeptentrionale, avoient choiſi leur ſtation au Fort du Prince de Galles, ſur la côte occidentale de la Baie d'Hudſon, près de la rivière Churchil, à 58° 47′ 30″ de latitude ſeptentrionale, 6^h 26′ 23″ à l'occident de Paris, dans un endroit, par conſéquent où l'on devoit voir l'entrée & la ſortie de Vénus; ils obſervèrent, en effet, le contact intérieur de l'entrée à 1^h 15′ 23″, & le contact intérieur de la ſortie à 7^h 0′ 47″ $\frac{1}{2}$; j'ai pris un milieu entre deux réſultats qui ne différoient que de 3″, ces obſervations furent faites avec des téleſcopes de M. Short de deux pieds de foyer. Obſervation faite à la Baie d'Hudſon.

Le calcul de cette obſervation eſt donc indépendant de la longitude du lieu, avantage conſidérable à cauſe de l'incertitude qu'il eſt ſi difficile de lever dans les obſervations de longitude; pour profiter de tout l'avantage de cette obſervation d'Amérique, il falloit la comparer à une autre qui fût également complette dans notre continent; je n'avois pas encore reçu celle du P. Hell, qui ne nous eſt parvenue qu'au mois de Mars; je choiſis celle de M. Planman, faite à Cajanebourg dans la Finlande, Province de Suede, qui avoit la plus grande autenticité, nous ayant été envoyée auſſi-tôt après le jour de l'obſervation. M. Planman avoit auſſi obſervée la durée du paſſage; ſavoir le contact intérieur de l'entrée à 9^h 20′ 45″ $\frac{1}{2}$, & ſeulement le contact extérieur de la ſortie à 13^h 32′ 27″ de temps vrai, ſous une latitude de 64° 13′ 30″, & 1^h 41′ 42″ à l'orient de Paris. Obſervation faite à Cajanebourg.

Si la parallaxe du ſoleil eſt bien connue, & ſi elle eſt de 9″, comme je l'ai ſuppoſée dans la premiere édition de cette aſtronomie, il faut qu'en ſuppoſant cette parallaxe, & réduiſant les quatre obſervations au centre de la terre, la durée du paſſage entre deux contacts intérieurs ſoit parfaitement la même. Si cette durée eſt plus petite à Cajanebourg, où l'effet de la parallaxe faiſoit paroître la durée plus longue qu'au Fort du Prince de Galles, c'eſt une preuve que la parallaxe employée dans le calcul eſt trop forte; mais en ſuppoſant 9″ 04 pour la paral-

laxe de ce jour-là, j'ai concilié ſi bien les quatre obſervations que j'ai trouvé la même durée pour les deux ſtations de Cajanebourg & de la Baie d'Hudſon, à un tiers de ſeconde près, ce qui eſt abſolument inſenſible. En augmentant de $0''\ 15$ la parallaxe on a une durée moindre de $6''\ 7$ pour Cajanebourg, que pour le Fort; ce qui fait voir qu'il faut mettre dans le calcul une très-grande préciſion, & dans les données une grande exactitude, ſi l'on veut avoir rigoureuſement l'effet des parallaxes; j'ai donc été obligé de recommencer pluſieurs fois ces opérations, je ne rapporterai ici que le réſultat de la dernière, avec la méthode que j'y ai employée. Soit C le centre du ſoleil (*fig.* 134), MV l'orbite de Vénus vue du centre de la terre, D le lieu apparent de Vénus au moment du contact intérieur obſervé; VD la parallaxe de hauteur dans le vertical ZVD; j'ai calculé d'abord à peu-près le temps où Vénus avoit été réellement en M, & en V pour le lieu de l'obſervateur; avec l'angle ECV ou CVZ; CV étoit alors égale à la différence des demi-diamètres du ſoleil & de Vénus, que je ſuppoſe ici de $917''\frac{1}{2}$ ou à la ſomme $976''\frac{1}{2}$, plus ou moins l'accourciſſement ou l'allongement produit par la parallaxe; mais CD étoit par-tout égale à la différence ou à la ſomme des demi-diamètres, je m'en ſuis ſervi pour calculer la différence apparente de déclinaiſon, & la différence d'aſcenſion droite, ou la différence des angles horaires de Vénus & du ſoleil. Ayant ainſi pour chaque obſervation l'angle horaire & la déclinaiſon de Vénus, j'ai calculé ſa hauteur, l'angle parallactique, & la parallaxe de hauteur; je pourrois ne ſuppoſer ici la hauteur vraie diminuée que par la différence des parallaxes de Vénus & du ſoleil; mais pour plus d'exactitude, il faut en ôter la parallaxe de hauteur du ſoleil, pour avoir la hauteur apparente de Vénus, par laquelle on trouve la différence des parallaxe de Vénus & du ſoleil plus exactement; connoiſſant auſſi à peu-près le temps que Vénus a mis à aller de M en V, j'en ai conclu l'arc MV, l'angle MCV, l'angle ECV, que je ſuppoſe égal à CVZ, puiſque CE n'eſt

Fig. 134.

pas le vertical du ſoleil, mais une parallèle au vertical de Vénus *ZVD*. *Fig.* 134.

Dans le triangle *CVD* connoiſſant l'angle *V*, le côté *VD* qui eſt la différence des parallaxes de hauteur, & le côté *CD* qui eſt la différence ou la ſomme des demi-diamètres, j'en ai conclu l'angle *DCV*, dans lequel il faut employer juſqu'aux dixièmes de ſecondes; enſuite l'angle *CDV* qui eſt la différence ou la ſomme de l'angle *V* & de l'angle *C*, & enſuite le côté *CV* diſtance vraie de Vénus au centre du ſoleil. Dans le triangle *CMV*, l'on connoît la plus courte diſtance *CM*, qui par mes premiers caculs ſe trouvoit de 609″, 693, & *CV* que l'on vient de trouver, on cherche *MV* qui réduit en temps à raiſon de 4′ 0″ 115 par heure, donne la diſtance de Vénus depuis le milieu *M* du paſſage. Mais avec la même valeur de *CM* & la diſtance des centres *CX* égale à la différence des demi-diamètres du ſoleil & de Vénus, ſuppoſés ici de 15′ 43″ 55 (2159) & 29″$\frac{1}{2}$ (2157), on trouve 2^h 50′ 8″ 1 pour la diſtance *XM* vue du centre de la terre, qui diffère de la précédente, de la quantité *VX* qui eſt l'effet cherché de la parallaxe le long de l'orbite. Si au lieu de la différence des demi-diamètres, on emploie leur ſomme, on trouvera 3^h 9′ 28″ 0 pour la diſtance entre le contact extérieur & le milieu du paſſage. Voici le détail des quantités que j'ai trouvées, dans lequel il faut obſerver que la ſituation du vertical eſt orientale ou à gauche du cercle de déclinaiſon pour l'entrée, ſoit à Cajanebourg, ſoit à la Baie d'Hudſon, & même pour la ſortie dans ce dernier endroit, mais que le vertical eſt plus occidental ou plus à droite du côté du nord, que le cercle de déclinaiſon *PC*, dans la ſortie de Cajanebourg, parce que la ſortie de Vénus y eſt arrivée le matin.

Élemens du calcul des Parallaxes dans les observations de Cajanebourg *&* de *la* Baie-d'Hudſon.	CAJANEBOURG 64° 13′ 30″			FORT-DU-PRINCE 58° 47′ 30″		
	H.	M.	S.	H.	M.	S.
Temps vrai des 4 obſerv. ſous leurs méridiens reſpectifs. . .	9	20	45,5	15	32	27
Milieu du paſſage à peu-près connu.	12	18	3	12	18	3
Diſtance de l'obſervation au milieu du paſſage.	=	57	17,5	3	14	24
Ang. *CVM fig.* 134, formé par la perp. *CM* & le ray. du lieu vr.	49°	5	16	51°	40	51
Ang. *DCM* formé par la perpend. *CM* & le rayon du lieu app.	49	30	20	52	38	6
Différence appar. d'aſcenſ. droite entre Vénus & le Soleil.	—	9	16	—	16	22
Différence de déclinaiſon à ajouter à celle du Soleil. . .		12	41		6	3
Angle horaire de Vénus.	140	2	6,5	126	36	53
Diſtance de Vénus au pole du Monde.	67	21	32	67	26	22
Hauteur apparente de Vénus.	2	14	11	6	4	53
Parall. de Vénus au Soleil, en ſuppoſant 9″ 04 pour le Soleil.	22″711			22″605		
Angle de poſition pour Vénus.	7	1	56	7	5	43
Som. de l'ang. de poſition & de l'inclin. de l'orb. 8° 28′ 59″.	15	30	55	15	34	42
Angle parallactique du cercle horaire avec le vertical de Vénus.	16	13	53	20	32	57
Ang. *P* qui eſt la ſom. ou la dif. des angl. préc. & de l'ang. *LCV*.	17	20	28	46	42	36
Angle *D* formé par le vertical & le rayon apparent *CD*. . .	17	45	55,7	47	40	43,7
Diſtance apparente *CD*.		913,	95		972,	95
Diſtance vraie des centres de Vénus & du Soleil, ou *CV*. .		935,	60		988,	30
Temps correſpondant ou diſtance *MV* au milieu du paſſage.	2	57	19,9	3	14	21,8
Diſtance vraie vue du centre de la terre ou valeur de *MX*. .	2	50	8,1	3	9	28,0
Eſf. de la parall. en tems, en ſup. la parall. horiz. du Sol. 9″04.	+	7	11,8	—	4	53,2
Temps des 4 obſervations réduits au centre de la terre. . .	9	27	57,3	15	27	33,2

	H.	M.	S.
	1	15	23
	4	10	0
	2	54	37
	48°	39	27
	48	55	27
	—	9	8
		12	46
	18	41	37
	67	21	27
	51	27	59
	14″159		
	7	1	57
	15	30	56
	15	27	42
	17	40	49
	17	56	59,5
		913,	95
		927,	43
	2	54	37,6
	2	50	8,1
	+	4	29,5
	1	19	52,5

	H.	M.	S.
	7	0	47,5
	4	10	0
	2	50	47,5
	48°	1	34
	49	23	49
	+	15	0
		6	29
	105	26	52,5
	67	26	3
	11	34	45
	22″265		
	7	6	28
	15	34	27
	30	39	5
	94	15	6
	84	21	23,3
		913,	95
		912,	03
	2	49	29,4
	2	50	8,1
	—		38,7
	7	0	8,8

2148. Le milieu entre les deux phaſes réduites au centre de la terre, pour le Fort-du-Prince, ou le milieu du paſſage eſt $4^h\ 10'\ 0''\ 6$. A l'égard des phaſes de Cajanebourg, les deux diſtances obſervées n'étant pas les mêmes, il faut réſoudre

réſoudre un triangle dans lequel on connoît deux côtés 913″ 95 & 972″ 95 avec l'arc parcouru en 5^h 59′ 35″ 9 de temps, qui eſt 1439″ 08 ; on trouve les deux ſegmens 680″ 86 & 758″ 22, qui réduits en temps donnent 3^h 9′ 28″ 0, & 2^h 50′ 8″ 1, d'où l'on conclud le milieu 12^h 18′ 5″ 4 ; mais le milieu, pour le fort eſt 4^h 10′ 39″ 3, la différence de longitude de ces deux villes ſeroit de 8^h 7′ 26″. Mais la demi-durée 2^h 50′ 8″ 1, étant plus petite de 38″ 5 que celle qu'on tire de l'obſerv. du fort, il s'enſuit qu'il faut diminuer la parall. de 1″ 31, & quelle étoit ce jour-là de 7″ 73, ce qui donne pour la parall. moy. 7″ 86 ; en adoptant ces deux obſ. le milieu du paſſage ſe trouve à 4^h 10′ 17″ & 12^h 17′ 59″. Parallaxe de 8″.

2149. M. Pingré obſerva l'entrée de Vénus au Cap-François à 2^h 44′ 44″ ½, 4^h 58′ 40″ à l'occ. de Paris ; ayant calculé ſon obſerv. de même que celle de M. Wintrop, à Cambridge, 4^h 53′ 59″ à l'occ. de Paris, il trouve la parall. moy. 9″ 3 ; en comparant l'obſ. de Wardhus avec celle de la Baie d'Hudſon, il trouve 9″ 27 ; par les obſervations de Stokolm, de Péterſbourg, & de la Baie d'Hudſon 9″ 3. Autres obſervations.

Parmi les obſervateurs qui attendoient le paſſage de Vénus, il y en a pluſieurs qui n'ont pu l'obſerver, tels ſont M. le Gentil, à Pondichery ; M. Call, à Madras ; M. Pictet, à Oumba en Laponie ; M. Helland, à Torneo ; M. Mallet, Suédois, à Pello ; M. Rome, à Rochefort ; le P. Béraud, à Lyon ; & il y en a pluſieurs auſſi dont les obſerv. ont été incomplettes. Mais M. l'abbé Chappe qui étoit à S. Joſeph en Californie à 23° 3′ 37″ de latitude, obſerva le premier contact intérieur à 0^h 17′ 27″ & le ſecond contact à 5^h 54′ 50″ 3 ; cette obſervation comparée avec celle de Wardhus me donne 8″ 80 pour la parallaxe moyenne : je trouve 8″ 36 par Cajanebourg & S. Joſeph, 8″ 54 par S. Joſeph & le Fort du Prince ; enfin je trouve 9″ 07 par l'obſervation de Wardhus & celle du Fort du Prince de Galles. Tout cela fait voir que la parallaxe moyenne approche beaucoup de 9″ ; il ſemble qu'on peut s'en tenir à 8″ ¼. Nous n'attendons plus, pour confirmer ce réſultat, qu'une obſervation faite dans la mer du Sud ; mais qui ne nous eſt point encore parvenue (Juillet 1771).

2150. Après cette obſervation des contacts intérieurs, les réſultats les plus importans des paſſages de Vénus ſont la conjonction & la latitude : on a vu ci-deſſus la manière de trouver par chaque obſ. faite au quart-de-cercle ou au micromètre, la différence de long. & de latit. entre Vénus & le Soleil (2129, 2138). La différ. de long. de Vénus au moment de l'obſ. que nous avons trouvée de $2'34''$ (2129), ou plus exactement $2'\,34''\,4$, nous fera trouver le moment de la conjonction, en nous ſervant du mouvement hor. ſur l'écliptique $3'\,57''\,4$ (2058) ; nous ferons donc cette proportion $3'\,57''\,4 : 60'\,0'' :: 2'\,34''\,4 : 39'\,1''$ de temps, qu'il faut ôter de l'heure de l'obſervation $6^h\,31'\,46''$ (2125), parce que la conjonction étoit paſſée, & l'on aura $5^h\,52'\,45''$ pour l'heure de la conjonction qui réſulte de cette obſervation ; il ſuffit d'ajouter le logar. conſtant 1,180822 au logar. de la différence de longitude ſur l'écliptique, pour avoir celui du temps en ſecondes.

Heure de la conjonction.

2151. On cherchera auſſi la latit. de Vénus pour ce moment, par le moyen du mouvement hor. en latitude, que l'on ſait être de $35''\,4$ (2058), en diſant ; $60'\,0'' : 35''\,4 :: 39'\,1'' : 23''$; on ôtera ces $23''$ (qui ſont le mouvement en latitude) de la différence trouvée pour le moment de l'obſ. $10'\,1''\,2$ (2129), & l'on aura enfin $9'\,38''\,2$ pour la latit. de Vénus au moment de la conjonction ; c'eſt le ſecond élément que nous avions à trouver : il faut en ôter $6''\,3$ pour avoir la plus courte diſtance des centres, comme il eſt aiſé de s'en aſſurer par la méthode de l'art. 2052 ; ainſi la plus courte diſtance étoit de $9'\,32''$, par cette obſervation ; le milieu entre un grand nombre d'autres m'a donné $9'\,30''$, & le milieu du paſſage $5^h\,30'\,10''$ (2135).

Latitude en conjonction.

2152. Je ſuis ſurpris que les aſtronomes n'aient pas encore remarqué l'avantage qu'il y avoit à déduire ainſi de chaque obſervation, ſoit le temps de la conjonction, ſoit la latitude pour ce temps-là. Les plus célèbres aſtronomes ont cru qu'il falloit comparer deux obſervations entre elles, pour déterminer le temps de la conjonction, le mouvement en longitude & en latitude, & l'inclinaiſon de l'orbite ; ils n'ont pas fait attention que le mouvement

horaire & l'inclinaiſon ſont donnés par les tables, dix fois plus exactement qu'on ne peut les déduire de deux obſervations de cette eſpece, & qu'ils perdroient ainſi tout l'avantage que le grand nombre d'obſervations doit procurer, celui d'avoir un grand nombre de fois le réſultat eſſentiel pour la théorie de Vénus. En ſuivant la méthode que je viens d'expliquer, on trouve le temps de la conjonction autant de fois que l'on a d'obſervations; on eſt en état de prendre un milieu entre beaucoup de réſultats, de diſtinguer les obſervations défectueuſes, & de les diſcuter toutes avec très-peu de calcul.

La plus courte diſtance des centres, en 1761.

2153. C'eſt ainſi que j'ai calculé une multitude d'obſervations faites pendant la durée de ce paſſage, à Paris, à Béziers, à Gottingen, &c; elles m'ont donné $9'\ 30''$ à peu-près pour la plus courte diſtance des centres; M. de Thury la trouva de $9'\ 30''$ à Vienne en Autriche, (*Mém. acad.* 1761, *pag.* 411); M. Pingré, de $9'\ 33''$, (*Ibid. pag.* 466), mais il la diminue de $3''$ pour le cas où la différence des demi-diamètres ne ſeroit que de $917\frac{1}{2}$: or c'eſt en effet la quantité que l'on devoit ſuppoſer, comme on le verra par les diamètres du Soleil & de Vénus, que j'ai déterminés, (1388, 2157), il faudroit même diminuer encore la perpendiculaire de $5''\frac{1}{2}$ à cauſe de la diminution du diamètre du ſoleil (2159).

Temps de la conjonction.

2154. Les obſervations faites pendant la durée du paſſage, par l'une des trois méthodes que j'ai données, (2116 & ſuiv.) doivent toujours ſe réduire à trouver un grand nombre de fois le temps de la conjonction, qui dans le paſſage de 1761 eſt arrivé à $5^h\ 51'$ de temps vrai, & la latitude pour cet inſtant de la conjonction, qui a été trouvée de $9'\ 36''$, (2135, 2151); cette latitude géocentrique obſervée doit ſe réduire au ſoleil, lorſqu'on veut en déduire le lieu du nœud; pour cela on fait cette proportion: la diſtance de Vénus au ſoleil eſt à ſa diſtance à la terre, comme la latitude géocentrique eſt à la latitude héliocentrique. Ainſi la latitude en 1761 ayant été trouvée de $9'\ 36''3$ au moment de la conjonction (2135), & le rap-

port des distances étant celui de 28903 à 72643, (2045); on trouve 3′ 49″ 3 pour la latitude héliocentrique *CV* (*fig.* 125).

Latitude héliocentrique. *Fig.* 125.

Pour en conclure la distance de Vénus à son nœud, il suffit de résoudre le triangle *CVN* rectangle en *C*, & qui est sensiblement rectiligne, en disant : la tangente de l'inclinaison vraie, 3° 23′ 20″, est au rayon, comme le côté *CV* de 3′ 49″ 3 est au côté *CN* qui se trouvera de 1° 4′ 40″, c'est l'arc de l'écliptique vu du soleil, & compris entre le nœud *N* de Vénus & le point *C* de la conjonction. Cet arc retranché du lieu du soleil au moment de la conjonction 2ˢ 15° 36′ 10″, donnera le lieu du nœud de Vénus 2ˢ 14° 31′ 41″; peu différent de celui dont j'ai fait usage ci-dessus, (1339); on trouve 2ˢ 14° 32′ 6″ en diminuant de 7″ le diamètre du soleil (2159).

Lieu du nœud.

On trouveroit le même résultat avec la latitude géocentrique observée 9′ 36″3, & l'inclinaison relative vue de la terre 8° 28′ 47″; mais de l'une ou de l'autre maniere, l'opération précédente se réduit sommairement à ajouter le logarithme constant 082731 avec celui de la latitude géocentrique observée 9′ 36″, & l'on a le logarithme de la distance au nœud, qu'on ajoute avec la longitude de Vénus au temps de la conjonction, qui est l'opposite de celle du soleil, ou qu'on en retranche, suivant que la conjonction est arrivée avant ou après le passage au nœud; en 1761 elle étoit soustractive; en 1769 additive.

2155. En 1769 le contact intérieur fut observé à Paris à 7ʰ 38′ 45″, l'effet de la parallaxe étoit de 7′ 30″; ainsi le contact intérieur vu du centre de la terre, arriva à 7ʰ 46′ 15″; la demi-durée du passage intérieur étoit de 2ʰ 50′ 8″ (2148), ainsi le milieu du passage est 10ʰ 36′ 23″, & ôtant 22′ 43″½, on a la conjonction 10ʰ 13′ 39″½ temps vrai, ou 10ʰ 11′ 26″½ temps moyen. La durée vue du centre de la terre nous donne l'arc parcouru sur le soleil, & par conséquent la plus courte distance 10′ 9″ 69; d'où je tire la latitude 10′ 16″, & la distance de Vénus au nœud 1° 9′ 0″, qui ajoutée au lieu du soleil 2ˢ 13°

Résultat pour 1769.

27′ 19″ au moment de la conjonction donne le lieu du nœud aſcendant de Vénus 2ˢ 14° 36′ 20″ pour le 3 Juin 1769 ; en négligeant l'aberration.

C'eſt une choſe ſingulière que cette méthode, ſi naturelle & ſi ſimple, de trouver le nœud de Vénus ou de Mercure par obſervation, n'ait point été employée par les aſtronomes qui ont calculé ces paſſages ; la plupart ſe ſont ſervi d'opérations compliquées qui quelquefois les ont jettés dans l'erreur ; je pourrois en citer pluſieurs exemples.

2156. Les réductions & le calcul des obſervations que nous venons de diſcuter, ſuppoſe qu'on connoiſſe la parallaxe, par la méthode expliquée ci-devant (2147) ; mais on pourroit encore choiſir des obſervations par leſquelles on éviteroit l'effet de la parallaxe. M. le Monnier conſidère, par exemple, qu'en 1769, elle étoit preſque nulle en latitude pour S. Domingue, & en longitude pour Ponoi, de ſorte qu'en combinant ces deux obſervations enſemble, on peut avoir complettement le vrai lieu de Vénus ſans connoître la parallaxe ; mais elle eſt trop bien déterminée pour qu'on puiſſe craindre actuellement d'en faire uſage dans les calculs.

Trouver le diamètre de Vénus.

2157. Le diamètre de Vénus meſuré ſur le ſoleil par M. de la Caille avec un bon micromètre, en 1761, s'eſt trouvé de 59″, (*Mém. ac.* 1761, *p.* 80) ; ſuivant le P. la Grange à Marſeille 58″4 ; d'autres obſervateurs l'ont trouvé un peu plus petit, ou un peu plus grand de quelques ſecondes. Mais la meilleure maniere de le déterminer exactement, eſt d'y employer le temps qu'il a mis à quitter le ſoleil ; car chaque ſeconde du diamètre de Vénus emploie 19″ de temps à ſortir du ſoleil ; & comme on ne ſe trompe pas de 5″ ſur la durée de la ſortie, cette durée doit faire trouver, à un quart de ſeconde près, le vrai diamètre de cette planète.

Lorſque le dernier bord de Vénus touche le bord extérieur du ſoleil en *E*, (*fig.* 137), Vénus eſt au point *F* de ſon orbite, & la diſtance *CF* des centres de Vénus & du ſoleil eſt égale à la ſomme des demi-diamètres de *Fig.* 137.

Fig. 137. Vénus & du ſoleil ; au contraire dans le contact intérieur Vénus eſt en *D*, & la diſtance des centres eſt égale à la différence des demi-diamètres ; on connoît la plus courte diſtance *CB* (2153) ; ainſi en réſolvant ſéparément les deux triangles *CBD*, *CBF*, on trouvera les portions *BD* & *BF* de l'orbite de Vénus, dont la différence *DF* étant réduite en temps, nous donnera le temps que le diamètre de Vénus devoit employer à ſortir, vu du centre de la terre ; mais la durée de la ſortie n'eſt point la même vue de la ſurface de la terre.

Il faut donc connoître auſſi la quantité dont la parallaxe fait varier cette durée de la ſortie, pour le lieu de l'obſervation ; quand on ſe tromperoit de quelque choſe ſur la parallaxe, l'erreur ſeroit inſenſible dans l'eſpace de 18′ de temps ; ainſi l'on peut calculer, comme dans l'art. 2061, l'effet de la parallaxe ſur le

Fig. 134. temps de chacun des deux contacts : je trouve en ſuppoſant les demi-diamètres 15′ 43″, & 29″ que l'intervalle *MV* eſt de $3^h\ 16'\ 5''5$, celui qui répond à *MX* de $3^h\ 16'\ 48''5$; la différence entre ces intervalles de temps & ceux que l'on trouveroit pour le contact intérieur, vu de Paris & du centre de la terre, $2^h\ 57'\ 39''0$, & $2^h\ 58'\ 36''0$ (2065), fait voir que la durée de la ſortie du diamètre de Vénus étoit de 18′ 12″ 5 pour le centre de la terre, & 18′ 26″5 pour Paris, en ſuppoſant le demi-diamètre de 29″. Or, par mon obſervation cette durée s'eſt trouvée de 18′ 25″ : on fera donc cette proportion ;

Diamètre de Vénus. 18′ 26″ 5 : 0′ 58″ :: 18′ 25″ : 57″9 ; c'eſt le diamètre de Vénus conclu de la durée de ſa ſortie, en 1761. On pourroit faire un ſemblable calcul par les obſervations de 1769.

2158. Au moyen des diſtances données ci-deſſus, entre Vénus, la terre & le ſoleil, (2045), on trouve que ſi Vénus eût été à la même diſtance que le ſoleil, ſon diamètre eût paru de $16''\frac{1}{2}$, le jour du paſſage de 1761 ; or, ſi la parallaxe du ſoleil eſt de 9″, le diamètre de la terre, vu à la même diſtance, eſt de 18″, donc le diamètre de Vénus eſt à celui de la terre, comme $16\frac{1}{2}$

eſt à 18 ; d'où il ſuit que le volume de Vénus eſt à celui de la terre, comme 77 eſt à 10[illegible] : ce ſeroit auſſi le rapport de leurs maſſes, de leurs poids ou de leurs quantités de matiere, ſi la denſité de Vénus étoit égale à celle de la terre ; mais on verra qu'elle eſt probablement un peu plus grande (3410), ce qui me fait regarder la maſſe de Vénus comme étant à peu-près égale à celle de la terre ; ou plus exactement 1,01818 (1391, *p.* 158). *Groſſeur de Vénus.*

C'eſt par la même méthode que je déterminai en 1753 le diamètre de Mercure, tel que je l'ai inſéré dans la table générale des diamètres des planètes (1391). Voyez les *Mém. de l'académie* 1756, *pag.* 264.

2159. On a vu que le diamètre du ſoleil doit paroître amplifié par le débordement de la lumière qui l'environne (1388), & que les meilleures lunettes ne dégagent pas tout-à-fait les bords du ſoleil de cette aberration : les paſſages de Mercure & de Vénus en donnent un indice très-fort : M. de l'Iſle ayant examiné le paſſage de Mercure, arrivé en 1756, dans lequel l'orbite de Mercure paſſoit preſque au centre du ſoleil, trouva que la durée du paſſage ſuppoſoit le diamètre du ſoleil d'environ 32′ 4″, tandis que, ſuivant moi, il auroit été de 32′ 21″ (*Mém. acad.* 1758, *pag.* 145). M. du Séjour a trouvé que pour concilier les obſervations de l'éclipſe annulaire de 1764, il falloit diminuer auſſi de quelques ſecondes le diamètre du ſoleil. Nous n'avons pas de paſſage de Vénus par le centre du ſoleil, mais puiſque en 1761 Vénus a paſſé au midi du centre, & en 1769 au nord, nous pouvons, en comparant ces deux paſſages, en tirer une induction ſur le diamètre du ſoleil. J'ai trouvé que le lieu du nœud conclu de ces deux paſſages par le moyen du diamètre du ſoleil que j'avois obſervé (1388), étoit différent de 1′ 18″, en tenant compte du mouvement de ce nœud en 8 ans : pour avoir le même lieu du nœud par les deux obſervations, il falloit que les diſtances au nœud fuſſent de 1° 4′ 20″ & 1° 8′ 43″, & que les plus courtes diſtances fuſſent de 9′ 28″3 & 10′ 7″. Pour trouver cette diſtance de 10′ 7″, par le moyen de la durée du paſſage, il faut ſuppoſer que le dia- *Diamètre du Soleil.*

mètre du ſoleil ſoit plus petit d'environ 6″, ou de 15′43″7 dans le paſſage de 1769 ; c'eſt ce que j'ai fait voir dans un mémoire lu à l'académie, au commencement de 1770.

Phénomène du contact.

Le contact de Vénus, avec le bord du ſoleil, eſt accompagné d'un phénomène qui paroît confirmer cette diminution ; on voit un point noir ou une eſpèce de ligament noir allongé qui unit les deux bords de Vénus & du ſoleil, lors même que leurs circonférences paroiſſent ſéparées (2141) ; il me ſemble que cela vient de l'irradiation qui environne le bord du ſoleil, & qui diſparoît néceſſairement dans un point, auſſi-tôt que les bords réels ſe touchent ; en effet, l'expanſion de lumière ne ſauroit avoir lieu quand la cauſe primitive de cette lumière, c'eſt-à-dire, le bord effectif du ſoleil ne nous envoie plus de rayons ; il doit donc y avoir dans cette partie du bord apparent du ſoleil une ceſſation & une interruption ſubite de la lumiere exorbitante ; & comme cette interruption n'a pas lieu dans les parties voiſines du point de contact, il paroît dans ce point-là une gibboſité, ou un ligament noir, que grand nombre d'obſervateurs ont remarqué, comme je l'ai dit plus au long dans les mémoires de 1769. En conſéquence de cette explication j'ai diminué le diamètre du ſoleil, dans les calculs les plus importans de ce XIe Livre.

LIVRE XII.

LIVRE DOUZIEME.

DES RÉFRACTIONS ASTRONOMIQUES.

2160. L'ATMOSPHERE (a), c'eſt-à-dire, la maſſe d'air qui environne la terre, affoiblit la lumiere, la diſperſe, la décompoſe, & change ſa direction. Il eſt prouvé par un grand nombre d'expériences qu'on trouve dans tous les livres d'optique, & par la théorie même de l'attraction, que les rayons de lumiere qui entrent obliquement d'un milieu moins denſe dans un milieu plus compact, changent de direction, & ſe rapprochent d la perpendiculaire, comme s'ils étoient plus fortement attirés par la matiere la plus denſe; ce changement des rayons de lumiere eſt différent ſuivant l'obliquité du rayon, & les tables qui en contiennent l'effet, s'appellent *Tables de Réfractions*, ou *Tables Anaclaſtiques* (b).

2161. Soit *ABD* la ſurface de la terre, (*fig.* 139); *EKG* la ſurface extérieure de l'atmoſphère qui environne la terre, & dont la denſité eſt ſenſible juſqu'à quelques lieues de hauteur; *A* le lieu de l'obſervateur, & *MK* un rayon de lumiere qui entre obliquement dans l'atmoſphère en *K*; ce rayon plié & courbé dans l'atmoſphère, parvient au point *A*, comme s'il avoit ſuivi la ligne droite *NKA*; l'œil reçoit l'impreſſion de la lumiere ſuivant la direction *NKA* du rayon qui arrive à l'œil en *A*; l'obſervateur rapporte ſur le rayon *AKN* l'aſtre qui eſt véritablement en *M*, enſorte que la réfraction fait paroître l'aſtre plus élevé de la quantité de l'angle *NKM*, que nous appellons la RÉFRACTION ASTRONOMIQUE. De quelle maniere ſe fait la réfraction. *Fig.* 139.

Le rayon *CKR* étant perpendiculaire à la ſurface ré-

(a) Ἀτμος, *Vapor*, Σφαῖρα, *Globus*.
(b) Ce mot vient de Κλάω, *frango*.

fringente en *K*, on appelle ANGLE D'INCIDENCE l'angle *MKR*, que forme le rayon incident avec la perpendiculaire, avant la réfraction, & l'on appelle ANGLE DE RÉFRACTION, l'angle *NKR*, ou ſon égal *AKC* que forme ce rayon avec la même perpendiculaire, après la réfraction ; les ſinus de ces deux angles ont entre eux un rapport conſtant, qu'on appelle le *Rapport de Réfraction*, & que Newton ſuppoſe ici être de 3201 à 3200 ; auſſi n'y a-t-il point de réfraction quand le rayon eſt perpendiculaire à la ſurface réfringente, car un des angles étant nul, l'autre s'évanouit néceſſairement ; d'ailleurs le rayon perpendiculaire a une ſurface plus denſe, ne change pas de direction pour en être plus attiré, puiſqu'il y arrive le plus directement poſſible, & par le plus court chemin. Delà il ſuit que la réfraction ſe fait toujours dans un plan vertical ; car le rayon rompu n'ayant de tendance que pour ſe rapprocher de la ligne verticale ou du zénit, ne déviera ni à droite ni à gauche, le rayon rompu ſera dans le même plan que le rayon direct & la ligne du zénit ; ainſi le lieu vrai & le lieu apparent ſeront dans le même vertical.

Auteurs qui ont écrit ſur l'optique.

2162. On trouvera les loix, les propriétés & les effets de la réfraction, & ceux de la lumiere, dans pluſieurs livres d'optique, ſur-tout dans celui qui a pour titre : *A compleat Syſtem of Optiks by* Robert SMITH. Cambridge, 1738, 2 vol. *in*-4°. Il y en a deux éditions Françoiſes d'Avignon & de Breſt, données par le P. Pézenas & par M. le Roy. On peut conſulter auſſi l'optique de NEWTON, celle de M. BOUGUER, celle de M. DE COURTIVRON ; la Dioptrique oculaire du P. d'ORLEANS, in-fol. 1671, KIRKER, *Ars magna Lucis & Umbræ* ; la Dioptrique d'HUYGENS, celles d'HARTSOEKER, de MOLINEUX, de DESCARTES ; SCHOT, *Magia naturalis* ; ZAHN, *Oculus fundamentalis artificialis* ; RHEITA, *Oculus Enochi & Eliæ* ; CRAIGE, *Optica analytica*, les leçons d'optique de M. DE LA CAILLE, de VOLF, &c.

2163. Les anciens connurent très-bien le phénomène des réfractions en général. Ariſtote dans un de ſes gro-

blêmes parle de la courbure apparente d'une rame dans l'eau, & Archimède paſſe pour avoir écrit un traité ſur la figure d'un cercle vu ſous l'eau ; on croyoit alors que les angles de réfraction étoient proportionnels aux angles d'incidence ; Snellius & Descartes ont fait voir que la proportion n'avoit lieu qu'entre les ſinus de ces angles.

La réfraction aſtronomique ne fut même pas inconnue à Ptolomée, quoiqu'il n'en ait pas fait uſage dans ſes calculs, (*Riccioli I*, 642) ; il dit ſur la fin du VIIIe livre de l'Almageſte, qu'il y a des différences dans le lever & le coucher des aſtres, qui dépendent des changemens de l'atmoſphère : il en faiſoit mention d'une maniere plus détaillée dans ſon *Optique*, Ouvrage qui ne nous eſt pas parvenu, (Montucla, *Hiſtoire des Mathématiques*, *I.* 308. Roger Bacon, *Specula Math. pag.* 37). Alhazen, Opticien Arabe du dixieme ſiècle (393), qu'on ſoupçonne généralement d'avoir pris dans Ptolomée preſque toute ſon optique, en parle décidément & fort au long, (*lib. VII. cap.* 4, *n°.* 15, *pag.* 251. *edit. an.* 1574) : il donne la maniere de s'en aſſurer par l'expérience.

Comment les Anciens ont apperçu la réfraction.

2164. Prenez, dit-il, un inſtrument compoſé avec des armilles qui tournent autour des poles (2274), meſurés la diſtance d'une étoile au pole du monde, lorſqu'elle paſſe près du zénit dans le méridien, & lorſqu'elle ſe lève près de l'horizon, vous trouverez la diſtance au pole plus petite dans ce dernier cas ; Alhazen démontre enſuite que cela doit arriver par l'effet de la réfraction ; il ne dit point, à la vérité, quelle eſt la quantité qui en réſulte ſur les obſervations ; mais ce paſſage d'Alhazen fait voir de quelle maniere on obſerva l'effet de la réfraction, & comment on parvint d'abord à le reconnoître. De même quand les anciens obſervoient l'équinoxe avec ces armilles, ils pouvoient l'apperçevoir deux fois en un même jour, par l'effet des réfractions, (Flamſteed, *Prolegom. pag.* 21), cet effet pouvoit auſſi ſe reconnoître facilement par les étoiles circompolaires ; car ſi l'on obſerve deux étoiles, comme γ d'Andromède

& l'étoile polaire, éloignées l'une de l'autre de 47°; on trouvera leur diſtance plus grande d'un demi-degré, quand la premiere paſſera par le méridien, près du zénit, que quand elle paſſera ſous le pole, près de l'horizon; & toutes les diſtances des étoiles entre elles changeront ainſi plus ou moins.

2165. Snellius, en publiant les obſervations de Waltherus, remarqua (*pag.* 51) que ces obſervations étoient ſi exactes, qu'elles avoient appris à Waltherus l'augmentation de hauteur que cauſe la réfraction; mais Tycho fut le premier qui la détermina d'une maniere à en dreſſer des tables: voici la maniere dont il raconte lui-même cette découverte aſtronomique (*Progymn. pag.* 15).

Tycho en donne des tables.

2166. Il avoit déterminé avec un ou deux inſtrumens aſſez bien faits, la hauteur du pole par les hauteurs ſupérieures & inférieures de l'étoile polaire (33), il la détermina auſſi par les hauteurs du ſoleil dans les deux ſolſtices (70), & il trouva la ſeconde plus petite de 4′; il eut d'abord un ſoupçon ſur la bonté de ſes inſtrumens, il continua d'en faire conſtruire juſqu'à dix de différentes grandeurs & de différentes formes, travaillés avec le plus grand ſoin, & il trouva toujours le même réſultat; il ne pouvoit plus alors attribuer cette différence au défaut des obſervations; il penſa ſérieuſement à chercher une cauſe de ce phénomène, & il imagina enfin, qu'il provenoit d'une réfraction conſidérable que le ſoleil devoit éprouver au ſolſtice d'hyver, n'étant élevé que de 11° pour lui. Cette explication étoit d'acord avec les démonſtrations de l'optique, cependant il avoit peine à ſe perſuader que cette réfraction fût aſſez conſidérable pour produire une ſi grande erreur; il jugeoit qu'il y avoit au moins 9′ de réfraction (a) à la hauteur de 11°; c'eſt pourquoi Tycho fit faire encore des armilles de dix pieds de diamètre, dont l'axe

(a) Il n'y en a réellement que 4½, mais Tycho en augmentoit l'effet par la parallaxe du ſoleil qu'il ſuppoſoit de 1′ 50″ à cette hauteur (1716).

répondoit exactement au pole du monde, & avec leſquelles il meſuroit la déclinaiſon des aſtres hors du méridien, il reconnut alors que, même en été, la réfraction, quoique inſenſible à la hauteur méridienne du ſoleil, devenoit ſenſible près de l'horizon, & que l'effet alloit à un demi-degré dans l'horizon.

2167. Tycho-Brahé crut que la réfraction du ſoleil devenoit nulle à 45° de hauteur, & celle des étoiles à 20°; quoiqu'à cet hauteur elle ſoit de $2'\frac{1}{2}$; cette erreur ſubſiſta long-temps: le P. Riccioli, même en 1665, ſuppoſoit encore que les réfractions n'avoient plus lieu au-delà de 26° de hauteur, ou environ, qu'il n'y avoit que 29′ de réfraction horizontale pour la lune en été, 30 pour le ſoleil, & 30′ 27″ pour les étoiles. *Aſtron. reform. Tabularum, pag.* 47.

2168. Ce fut M. Caſſini qui vers l'an 1660, entreprit de former une nouvelle table de réfractions, en même temps que les nouvelles tables du ſoleil, qui repréſentèrent les obſervations avec une juſteſſe beaucoup plus grande qu'on ne l'avoit fait avant lui (554, 1730). Mais pour éprouver la juſteſſe de ſa nouvelle table de réfractions, M. Caſſini ſouhaita d'avoir des obſervations du ſoleil faites au zénit, où tout le monde convenoit qu'il n'y avoit point de réfractions, pour vérifier ſi les obſervations qui y ſeroient faites ne ſeroient pas beaucoup mieux répréſentées par ſes nouvelles tables du ſoleil, que par les Tychoniciennes; car dès lors il n'y avoit plus de doute que les tables du ſoleil & celles des réfractions, ne fuſſent préférables aux Tychoniciennes, repréſentant mieux les obſervations faites, & dans les cas où il y a réfraction & dans ceux où il n'y en a point.

Louis XIV, & le grand Colbert, dont le zèle pour la gloire des ſciences avoit déja paru tant de fois, laiſſoient à l'académie le choix des entrepriſes: elle jugea qu'il n'y avoit point de lieu plus commode pour de pareilles obſervations que l'Iſle de Cayenne qui eſt à 5° de l'équateur, & où la France envoyoit des vaiſſeaux pluſieurs fois l'année. Les hauteurs méridiennes du ſoleil

Voyage de Cayenne.

devoient être, en tout temps, exemptes de réfractions; ſi cette réfraction étoit nulle au-deſſus de 45°, car la plus petite hauteur du ſoleil y eſt de 61°. On y devoit donc trouver l'obliquité de l'écliptique, ſans aucune diminution de réfractions, mais au contraire, augmentée par l'effet de la parallaxe du ſoleil dans les deux ſolſtices; ainſi dans les hypothèſes Tychoniciennes, la diſtance des deux tropiques devoit ſe trouver à Cayenne de plus de 47° 3′, & ſelon M. Caſſini qui diminuoit la parallaxe & ſuppoſoit de la réfraction, même dans les grandes hauteurs, cette diſtance ne devoit paroître à Cayenne que de 46° 58′; il y avoit donc entre ces hypothèſes une différence de 5′ qui pouvoit s'obſerver exactement à Cayenne, & décider à la fois ces trois objets, la réfraction, la parallaxe & l'obliquité de l'écliptique. Ces ſeuls motifs étoient plus que ſuffiſans pour faire entreprendre le voyage de Cayenne, & cependant il y avoit encore d'autres objets intéreſſans à conſtater, tels que la longueur du pendule, la parallaxe de la lune, de Mars & du ſoleil, la théorie de Mercure, & les longitudes géographiques, la poſition des étoiles auſtrales, les marées, les variations du baromètre; tels furent les motifs curieux du voyage qu'entreprit M. Richer (538, 546). Il partit de Paris au mois d'Octobre 1671, & il ſéjourna à Cayenne depuis le 22 Avril 1672, juſqu'à la fin de Mai 1673, accompagné du Sr. *Meuriſſe*, qu'on lui avoit donné pour l'aider dans ſes obſervations; elles furent publiés en 1679, & ſont auſſi rapportées dans le receuil d'obſervations que l'académie donna en 1693.

2169. Les choſes arrivèrent à Cayenne à peu-près comme M. Caſſini l'avoit prévu; l'obliquité apparente de l'écliptique y parut de 23° 28′ 32″, c'eſt-à-dire, beaucoup plus petite qu'elle ne devoit être, ſuivant Tycho-Brahé; elle ne différa que de 5″ de celle qu'ildevoit y avoir, en adoptant pour les réfractions, & pour la parallaxe du ſoleil, les tables de M. Caſſini; il n'eut d'autre conſéquences à tirer des obſervations de Cayenne, ſi ce n'eſt que les élémens par leſquels il avoit repréſenté les

obſervations faites en Europe, repréſentoient avec la même juſteſſe les obſervations faites en Amérique, ce que ne faiſoient point, les élémens dont s'étoit ſervi Tycho-Brahé à l'égard de l'obliquité de l'écliptique, de la parallaxe du ſoleil & des réfractions aſtronomiques.

MÉTHODES pour obſerver la quantité des Réfractions Aſtronomiques.

Méthodes anciennes.

2170. APRÈS avoir tracé l'hiſtoire de la réfraction, je paſſe aux méthodes qui ont été employées ſucceſſivement pour l'obſerver. On a vu celle des déclinaiſons (2164) : voici celle des hauteurs. La réfraction étant la différence entre la hauteur apparente & la hauteur vraie, il s'agit de pouvoir calculer celle-ci pour le moment où l'on a obſervé la premiere.

Fig. 89.

Lorſqu'on n'avoit pas l'uſage des horloges, on employoit l'azimut ou l'angle *Z* (*fig.* 89), pour réſoudre le triangle *PZS*, & trouver la véritable hauteur ; l'angle *Z* ou *PZS* ne dépend point de la réfraction & n'en eſt point affecté, puiſque le lieu vrai & le lieu apparent, ſont dans un ſeul & même vertical *ZS* (2161), & par conſéquent au même degré d'azimut ; ainſi dans le triangle *PZS*, on connoîtra pour l'inſtant donné les côtés *PZ* & *PS* avec l'angle *Z* oppoſé à l'un d'eux ; l'on trouvera par la trigonométrie ſphérique, le troiſième côté *ZS*, dont le complément eſt la hauteur vraie, qui comparée avec la hauteur apparente, obſervée en même temps que l'azimut, donne la quantité de la réfraction. (Tycho, *Progymn. pag.* 93). Cette méthode des azimuts n'eſt point uſitée actuellement.

Par les hauteurs correſpondantes.

2171. Les hauteurs correſpondantes du ſoleil, ou d'une étoile ſont très-propres à faire connoître la quantité de la réfraction, ſi elles ſont priſes avec un grand quart-de-cercle & une horloge excellente. Je ſuppoſe, par exemple, que la hauteur du ſoleil obſervée à ſix heures de diſtance du méridien, le matin & le ſoir, ſe ſoit trouvée de 9° préciſément, & que ſuivant le calcul

(1034), elle ne doive être réellement que de 8° 54′; on ſaura dès-lors qu'à la hauteur apparente de 9° il y a 6′ de réfraction, & que le ſoleil paroît trop élevé de 6′.

Fig. 89. 2172. Dans le triangle *PZS* (*fig.* 35 ou 89), formé au pole, au zénit & au ſoleil, on ſuppoſe connues la diſtance *PZ* du pole au zénit, & la diſtance *PS* du ſoleil au pole boréal du monde, indépendamment des réfractions; mais l'erreur qui peut en réſulter ſur les grandes réfractions eſt trés-petite, & elle ſera corrigée par d'autres méthodes (2174, 2181, 2215); on connoît auſſi, par l'obſervation des hauteurs correſpondantes, l'heure qu'il eſt, & l'angle horaire *ZPS*: ainſi l'on trouvera par la réſolution du triangle *PZS* la diſtance au zénit, ou *ZS*; c'eſt le complément de la hauteur vraie, puiſque les deux côtés *PZ* & *PS*, auſſi bien que l'angle *P*, ſont des quantités vraies, & données indépendamment des réfractions. Cette hauteur vraie, trouvée par le calcul, eſt toujours plus petite que la hauteur apparente obſervée avec le quart-de-cercle, & la différence eſt la quantité de réfraction qui convient à la hauteur obſervée. Cette méthode fut employée autrefois par M. Picard, & l'a été récemment par M. de la Caille; c'eſt par ſon moyen qu'on a reconnu que la réfraction horizontale, la plus grande de toutes les réfractions, eſt d'environ $32'\frac{1}{2}$.

Réfraction horizontale.

2173. M. de la Caille avant ſon voyage en Afrique, avoit auſſi entrepris de déterminer les réfactions par le moyen des angles horaires & des hauteurs correſpondantes du ſoleil, & des étoiles fixes les plus brillantes; il eſt le premier qui ait eu l'avantage d'employer cette méthode d'une maniere indépendante des hypothèſes; car à ſon retour du Cap, connoiſſant la réfraction à la hauteur du pole (2187), & les déclinaiſons des étoiles obſervées près du zénit du Cap, indépendamment des réfractions, il avoit les côtés *PS* & *PZ* avec une extrême exactitude; il a donc calculé à ſon retour la plupart de ces hauteurs correſpondantes; elles étoient d'autant plus exactes qu'il les avoit obſervées avec l'intention d'en conclure, & la théorie du ſoleil, &

les

les aſcenſions droites des étoiles, dans un temps où il ne penſoit point à aller au Cap ; mais où il cherchoit à vaincre la difficulté qu'il y a de bien déterminer les aſcenſions droites des étoiles dans une ſphère auſſi oblique que la nôtre ; il eut la ſatisfaction de trouver de la conformité entre ces réſultats & ceux d'une méthode plus parfaite que nous expliquerons bientôt.

M. de la Caille détermina ſur-tout en 1753, la réfraction de 18° par la méthode des hauteurs correſpondantes, avec un ſoin particulier, & par un grand nombre d'obſervations ; cette réfraction de 18° eſt une des plus importantes, parce que c'eſt celle du bord du ſoleil à Paris, dans le tropique du capricorne. M. de la Caille y emploie 9 étoiles, & il trouve 20 réſultats, entre 2′ 59″ & 3′ 25″, le milieu entre tous donne la réfraction moyenne à 18° de hauteur apparente pour Paris, de 3′ 12″ 6. Réfraction ſolſtitiale d'hyver.

2174. Il y a un moyen de trouver la réfraction à de certaines hauteurs, ſans ſuppoſer l'angle *P* ; elle conſiſte à obſerver une étoile qui paſſe au méridien, par le point même du zénit, ou fort près de-là, & qui paſſe enſuite au méridien ſous le pole. La réfraction étant nulle au zénit, on aura la diſtance de l'étoile au pole, ſans autre réfraction que celle de la hauteur du pole ; mais lorſque l'étoile, environ 12ʰ après, paſſera au méridien ſous le pole & fort près de l'horizon, on trouvera ſa diſtance au pole beaucoup moindre, parce qu'elle ſera accourcie par la réfraction qui élève l'étoile. Par les étoiles circompolaires.

Exemple. La Claire de Perſée paſſoit il y a quelques années à ſix minutes du zénit de Paris ; ainſi l'on étoit ſûr que ſa diſtance au pole étoit de 41° 4′ ; par conſéquent elle devoit paſſer au méridien ſous le pole à 41° 4′ du pole, ou à 7° 46′ de hauteur vraie. On l'obſervoit cependant à 7° 52′ 25″ ; ainſi l'on étoit aſſuré que la réfraction élevoit cette étoile de 6′ 25″ à 7° 52′ $\frac{1}{2}$ de hauteur apparente, (*Inſtit. aſtr. pag.* 418). On trouvera d'autres exemples de cette méthode, art. 2226.

2175. Mais la plus grande difficulté conſiſtoit à déterminer la réfraction vers 45° de hauteur ; comme elle Réfraction à 45°.

n'eſt que d'environ une minute, la méthode précèdente étoit trop peu exacte pour qu'on pût l'employer ; Flamſteed & Halley faiſoient cette réfraction de 54″, Caſſini de 59″, Picard & la Hire de 71″, Bradley de 57″; M. de la Caille l'a trouvée de $66'' \frac{1}{2}$ par la méthode que nous allons expliquer ; mais on croit aſſez généralement quelle ne paſſe pas 60″.

Travail de M. de la Caille ſur les réfractions.

2176. Le travail de M. de la Caille ſur les réfractions, eſt cependant un des fruits les plus précieux de ſon voyage au Cap de Bonne-Eſpérance ; il eſt fondé ſur la comparaiſon répétée des diſtances de 160 étoiles au zénit de Paris & du Cap, obſervées dans chacune de ces deux ſtations, au moins ſix fois chacune, & cela avec des inſtrumens de ſix pieds de rayon, (*Mém. acad.* 1755).

2177. La premiere partie du mémoire de M. de la Caille, conſiſte à prouver que les réfractions au Cap de Bonne-Eſpérance, ſont plus petites d'un quarantième que celles de Paris, (2232). La ſeconde partie eſt deſtinée à prouver par la ſomme de 4 réfractions, qu'à la hauteur du pole de Paris, qui eſt 49°, la réfraction moyenne eſt de 58″ 2, & que la vraie différence en latitude de Paris au Cap, eſt de 82° 46′ 42″ (2186).

Depuis la hauteur de 48° juſqu'au zénit, il calcula toutes les autres réfractions pour Paris, en les ſuppoſant proportionnelles aux tangentes de la diſtance au zénit (2207). Ces réfractions ainſi connues, ſervirent à réduire en hauteurs vraies, les hauteurs apparentes des étoiles qu'il avoit obſervées au Cap depuis 48° juſqu'au zénit ; il compara enſuite ces hauteurs vraies aux hauteurs apparentes des mêmes étoiles, qui étant obſervées à Paris, avoient depuis 7° juſqu'à 48° de hauteur ; par ce moyen il eut un grand nombre de diſtances apparentes des parallèles de Paris & du Cap, affectées ſeulement des réfractions pour Paris à de petites hauteurs.

2178. Ces diſtances apparentes des deux parallèles étoient toutes plus grandes que 82° 46′ 42″, différence vraie des parallèles de ces deux obſervatoires (2186), & leur excès donnoit la réfraction pour chaque hauteur

obſervée à Paris. Ayant comparé de même les étoiles obſervées à de grandes hauteurs à Paris, & à de petites hauteurs au Cap, il trouva les réfractions pour le Cap, & elles ſe ſont trouvées plus petites d'un quarantième que celles de Paris.

Réfraction plus petite au Cap.

2179. Toutes ces réfractions ainſi obſervées à Paris, à la hauteur de différentes étoiles, étant priſes conſécutivement de cinq en cinq, & réduites à des degrés juſtes de hauteur apparente, & à une certaine régularité dans leur progreſſion, au moyen des interpolations, M. de la Caille en forma ſa table des Réfractions, que j'ai donnée dans mon *Expoſition du calcul aſtronomique*, *p.* 251. Ce long travail fut recommencé pluſieurs fois, vérifié par un nombre immenſe de hauteurs obſervées dans le même-temps à Greenwich par M. Bradley; à Gottingen par M. Mayer; à Bologne par M. Zanotti; & par moi-même à Berlin. J'y étois allé en 1751 pour faire des obſervations correſpondantes à celles de M. l'Abbé de la Caille, & je m'occupai ſpécialement des hauteurs méridiennes des étoiles qui étoient près du zénit & près de l'horizon, pour en déduire la réfraction au Cap & à Berlin. Les comparaiſons des étoiles obſervées au Cap, fort près du zénit, & en Europe à de petites hauteurs, ont ſervi à trouver auſſi les réfractions pour Paris à ces petites hauteurs, c'eſt-à-dire, juſqu'à 30°, telles qu'elles ſont dans la table de M. de la Caille; les autres ont été conclues par la règle de M. Bradley (2206).

Doute ſur la réfraction à 45°.

2180. Il eſt vrai qu'une partie de ce travail eſt fondée ſur la réfraction de 45° que M. de la Caille a trouvée plus grande que tous les autres aſtronomes (2175); on lui en fit l'objection de ſon vivant, & j'ai vu à Londres, en 1763, une lettre que M. de la Caille écrivoit à M. Bévis le 21 Décembre 1760, dans laquelle il lui diſoit qu'il avoit réſolu de faire l'été ſuivant une nouvelle vérification de ſon ſecteur, en conſéquence du ſoupçon de M. Bradley. Il avoue que pluſieurs obſervations de M. Mayer & de M. Zanotti s'accordoient à indiquer une réfraction plus petite que la ſienne, mais il avoit ſoupçonné que

l'arc de 90°, dans ces inſtrumens étoit trop petit de quelques ſecondes ; c'eſt ainſi que celui de Greenwich eſt trop grand de 15″, & que l'arc de 60° du quart-de-cercle que j'avois porté à Berlin en 1751 eſt trop petit de 30″. La vérification que M. de la Caille ſe propoſoit de faire ſur ſon inſtrument n'a pas été exécutée, du moins, je n'en ai pas connoiſſance ; & quoiqu'il ſoit actuellement entre mes mains, je n'ai pas cru qu'il fût poſſible de déterminer avec bien de la certitude une ſi petite différence, ſur un inſtrument de ſix pieds, dont la ſuſpenſion eſt une aiguille (2385). Nous parlerons encore d'une autre objection (2217).

Maniere de tripler la réfraction.

2181. Malgré le doute qui nous reſte ſur les réfractions de M. de la Caille, je vais continuer à expliquer les méthodes ingénieuſes dont il s'eſt ſervi, & qu'on pourra employer encore avec ſuccès. M. de la Caille, (*Mém. acad.* 1751, *pag.* 411), trouva une maniere heureuſe de tripler l'effet de la réfraction, à 34° de hauteur pour la rendre plus ſenſible : la diſtance apparente du ſoleil au zénit du Cap, en 1752, fut obſervée dans le ſolſtice de 57° 21′ 55″6, affectée de la réfraction ſeulement, & la diſtance apparente du pole au zénit 56° 3′ 10″3, auſſi affectée de la réfraction ; la premiere réfraction eſt plus grande de 4″9 que la ſeconde, il faut l'augmenter de cette quantité pour avoir la diſtance du zénit au tropique du cancer 57° 22′ 0″5, affectée de la même réfraction que celle de la diſtance du zénit au pole.

La diſtance vraie du tropique du Capricorne au zénit du Cap étant fort petite, on peut ſuppoſer d'abord que ſa réfraction ſoit connue, & l'employer de 10″1 ; s'il y a une erreur, elle ſera d'autant plus petite, que la quantité elle-même eſt moindre, & l'on ſera à même d'y revenir enſuite. Cela étant ſuppoſé, M. de la Caille trouve la vraie diſtance du tropique au zénit du Cap de 10° 26′ 53″3, il y ajoute la diſtance du zénit au pole auſtral affectée de la réfraction, 56° 3′ 10″3, de ſorte que la diſtance du pole auſtral au tropique du Capricorne, altérée par la réfraction de la hauteur du pole eſt 66° 30′ 3″6.

2182. On a donc ſéparément trois quantités affectées chacune de la réfraction qui convient à la hauteur apparente du pole 33° 57′, & qui ſans la réfraction devroient faire enſemble 180° degrés, ſavoir :

La diſtance du pole au trop. du cancer.	66°	30′	3″6
La diſtance du pole au zénit.	56	3	10 3
La diſtance du zénit au trop. du cancer. . .	57	22	0, 5
Som. de ces 3 quant. dimin. de 3 réf. égal.	179	55	14, 4
La véritable ſomme devoit être.	180	0	0
Donc le triple de la réfraction eſt.		4	45, 6
Et la réfraction à 34° de hauteur		1	35, 2

2183. M. de la Caille trouva auſſi un moyen pour quadrupler la réfraction : la poſition du Cap de Bonne-Eſpérance à l'égard de Paris étoit ſinguliere, par deux circonſtances qui ſe trouvèrent favorables pour la détermination directe des réfractions, & M. de la Caille ſut en profiter d'une maniere ingénieuſe pour quadrupler l'effet qu'il avoit beſoin de déterminer, & rendre par-là quatre fois moindres les petites incertitudes qu'on pouvoit craindre ſur le réſultat. Manière de quadrupler la réfraction.

La premiere circonſtance eſt que la hauteur du tropique du cancer au Cap, eſt à peu-près la même que celle du pole auſtral ; de-là il eſt aiſé de conclure, ſans aucun calcul & ſans aucune hypothèſe, la réfraction abſolue à cette hauteur de 34°, en comparant la hauteur ſolſticiale du ſoleil, avec la hauteur apparente du pole, (*Mém. acad.* 1751, *pag.* 411).

La ſeconde circonſtance eſt que la diſtance du pole boréal du monde au zénit de Paris, 41° 10′, eſt preſque égale à la moitié de l'arc intercepté, entre le Cap & Paris, qui eſt de 82° 46′ 42″ ; d'où il ſuit que ſi les réfractions ſont les mêmes, ou ſi l'on connoît leur rapport, on peut trouver directement la réfraction qui convient à la hauteur du pole de Paris.

2184. La diſtance vraie des parallèles de Paris & du Cap eſt de 82° 46′ environ, dont la moitié eſt 41° 23′,

ainſi une étoile ſituée à 41° 23′ du zénit de chacun, auroit la même hauteur méridienne, & la même réfraction; mais chaque diſtance au zénit étant diminuée par la réfraction de 58″, la ſomme de ces deux diſtances doit être diminuée du double, ou de 1′ 56″ par l'effet de la réfraction; ainſi la diſtance apparente des deux parallèles conclue de la ſomme de ces deux diſtances obſervées eſt trop petite du double de la réfraction qui a lieu à 41° 23′ du zénit.

Il y a grand nombre d'étoiles qui ayant environ 41° de diſtance au zénit, ont pu ſervir à cette recherche, M. de la Caille y employa 13 étoiles qui ſont entre 38° 50′ & 44° 10′, ſavoir β du Serpentaire, δ de la Vierge, ε du Serpent, β de l'Aigle, Procyon, γ d'Orion, α du Serpent, α d'Orion, α de l'Aigle, ε de Pégaſe, β du petit Chien, β de l'Écreviſſe, & γ de l'Aigle; elles étoient toutes également propres à cette recherche, parce que ſi l'une de ces étoiles paſſe à moins de 41° 23′ du zénit de Paris, & y éprouve une moindre réfraction, elle paſſe au Cap à une diſtance plus grande & y éprouve une plus forte réfraction, ainſi la ſomme des deux réfractions eſt encore la même que ſi chacune de ces étoiles étoit préciſément à 41° 23′ de chaque zénit. Si la réfraction croiſſoit en raiſon ſimple des diſtances au zénit, il ſeroit inutile de s'aſſujettir à certaines limites, comme celles de ces 13 étoiles; or, dans toutes les hypothèſes & dans toutes les tables de réfraction, on trouve un progrès uniforme de 38 à 44° de diſtance au zénit, ainſi toutes les étoiles précédentes ont dû donner la diſtance apparente des parallèles de Paris & du Cap, affectée du double de la réfraction qui a lieu à 41° 23′ de diſtance au zénit, en ſuppoſant qu'à même hauteur elle ſoit la même au Cap & à Paris. Cette diſtance apparente diminuée de deux réfractions, s'eſt trouvée de 82° 44′ 46″.

La hauteur apparente du pole au Cap, affectée de la réfraction à cette hauteur, fut obſervée ſur un grand nombre d'étoiles de 33° 56′ 49″ 1, & celle du College Mazarin à Paris, où M. de la Caille avoit fait une

multitude d'obſervations, de 48° 52′ 27″ 5 ; la ſomme de ces deux hauteurs apparentes, donne 82° 49′ 16″ 6 pour la diſtance des deux parallèles de Paris & du Cap, augmentée par la ſomme de deux réfractions qu'il eût fallu en ſouſtraire pour avoir les hauteurs vraies. Cette diſtance augmentée eſt plus grande de 4′ 30″ 6, que la diſtance diminuée qui eſt de 82° 44′ 6″ ; ainſi l'on a 4′ 30″ 6 pour la ſomme des quatre réfractions qu'il s'agit de ſéparer.

Diſtance apparente plus grande que la vraie.

2185. Si ces 4 réfractions étoient égales, il ſuffiroit de prendre le quart des 4′ 30″6 pour avoir la réfraction cherchée ; mais de ces 4 réfractions, il y en a deux qui doivent être différentes d'un quarantième, & qui répondent à 41° 23′, une pour 56° 3′, diſtance du pole au zénit du Cap, & une pour 41° 8′, diſtance apparente du pole au zénit de Paris ; ainſi il faut diviſer 4′ 30″6 en 4 parties, qui ayent les conditions requiſes dans les 4 cas que je viens d'expliquer.

Partage des 4 réfractions.

Pour parvenir à ce partage convenable, & pour ſéparer les 4 réfractions contenues dans la quantité de 4′ 30″, il n'y a qu'à employer la règle démontrée ci-aprés (2207), que les réfractions ſont comme les tangentes des diſtances au zénit, en faiſant celles du Cap plus petites d'un quarantième que celles de Paris ; l'on trouvera 1′ 36″5 pour la hauteur de 33° 57′ au Cap, 57″ 2 pour 41° 22′ de diſtance au zénit du Cap, 58″ 2 pour 48° 52′ de hauteur apparente à Paris ; & 58″7 pour 41° 22′ de diſtance au zénit à Paris ; ce ſont là les quatre réfractions dont la ſomme eſt de 4′ 30″6, & qui ont ſervi à M. de la Caille pour trouver les réfractions moindres, en ſuivant les tangentes des diſtances au zénit (2207), (*Mém.* 1755, *p.* 568).

Réfraction à la hauteur du pole.

2186. La réfraction trouvée, par ce moyen, pour 41° diſtance au zénit étant appliquée à chacune des hauteurs égales d'une même étoile, obſervées au Cap & à Paris, a fait connoître que la vraie diſtance des parallèles eſt de 82° 46′ 42″, & cette vraie diſtance a ſervi à trouver toutes les réfractions à de petites hauteurs, depuis 6° où elle eſt de 8′ 42″, juſqu'au zénit ; M. de la Caille n'a rien voulu ſtatuer ſur les hauteurs plus petites (2254).

Diſtance vraie des parallèles.

2187. On peut ſéparer encore par une autre méthode ſans le ſecours d'aucune hypothèſe, les 4 réfractions contenues dans 4′ 30″6. Il faut d'abord en retrancher 1′ 35″2, réfraction trouvée immédiatement par obſervation pour 33° 57′ de hauteur apparente (2182); le reſte 2′ 55″4 ſera la ſomme de trois réfractions preſque égales, qui répondent aux diſtances apparentes de 41° 8′ à Paris, & 41° 22′ au Cap & à Paris; l'on aura donc 58″6 pour 41° 8′ à Paris, 57″8 pour 41° 22′ au Cap, & 59″0 pour 41° 22′ à Paris, quantités qui ne diffèrent pas ſenſiblement de ce que nous venons de trouver (2185), & d'où il réſulte, ſuivant M. de la Caille, qu'à 45° la réfraction eſt de $66''\frac{1}{2}$; il eſt aiſé d'en conclure toutes les autres qui ſont comme les tangentes des diſtances au zénit (2207).

2188. A l'égard des réfractions à de moindres hauteurs, il les a déterminées immédiatement en comparant les hauteurs méridiennes d'étoiles qu'il avoit obſervées au Cap, avec celles qu'il obſerva enſuite à Paris & avec celles des autres aſtronomes (2179).

2189. Jamais table de réfractions, ni aucune autre table aſtronomique n'a été vérifiée par tant d'obſervations, ni avec des précautions auſſi grandes que celle dont on vient de voir la conſtruction; il étoit donc bien naturel que M. de la Caille jugeât de l'exactitude des tables qui avoient paru juſqu'alors par leur comparaiſon avec la ſienne. Dans la table de réfraction, dreſſée par M. Caſſini, & qui étoit depuis long-temps celle du livre de la *Connoiſſ. des temps*, les réfractions ſont un peu plus petites; ſavoir de 4″ à 18°, de 16″ à 30°, de 6″ à 49°, &c. Cette table fut calculée vers 1662, par Dominique Caſſini, & imprimée la même année à la fin des éphémérides de *Malvaſia*, ſous le titre de *Refractio æſtiva*. Il y avoit dans le même livre une table qu'il appelloit *Refractio æquinoctialis*, & une autre qui étoit deſtinée pour l'hiver, la réfraction équinoxiale, qui étoit ſa réfraction moyenne, étoit ſi conforme à celle de M. de la Caille, ſur-tout depuis 23° de hauteur, qu'à peine trouve-t-on une

Réfractions de M. Caſſini.

une ſeconde de différence, de ſorte qu'on peut dire, à la gloire de ce grand homme, qu'il fut le premier qui calcula géométriquement la réfraction, & que de ceux qui vinrent après lui, pas un ne réuſſit auſſi-bien. Il eſt vrai que ces réfractions équinoxiales deviennent enſuite un peu trop grandes en approchant de l'horizon, mais il s'en faut beaucoup qu'elles ſoient en excès autant que les tables de Flamſteed & de Newton ſont en défaut; & M. de la Caille penſe que cette table des réfractions équinoxiales, eſt la meilleure de toutes celles qui ont été calculées depuis 1662. (*Mém. acad.* 1755, *pag.* 576).

Les réfractions publiées dans les tables de M. de la Hire, (*pag.* 6), & qui avoient été calculées en tout ou en partie, par M. Picard, s'accordent aſſez bien avec celles de M. de la Caille, depuis l'horizon juſques vers 35° de hauteur, mais depuis 35° juſqu'au zénit, elles ſont toujours trop grandes.

Réfractions de Flamſteed.

Les réfractions de Flamſteed, ſont celles qui s'éloignent le plus de celles de M. de la Caille, elles ſont plus petites de 1′ 4″ à 10°, de 40″ à 20°, de 31″ à 30°, & de 21″ à 40° de hauteur.

Réfractions de Bradley.

Les réfractions de Newton & de Halley ſont auſſi trop petites de 45″ à 10° de hauteur, de 29″ à 20°, de 22″ à 30°, & de 15″ à 40°. Enfin, celles de M. Bradley ſont plus petites de 14″ à 6°, de 22″ à 10°, de 26″ à 20°, de 11″ à 40°.

Mais de peur qu'on n'objecte à M. de la Caille que les réfractions peuvent être moindres en Angleterre qu'à Paris, M. de la Caille rapporte la comparaiſon de 23 hauteurs méridiennes d'étoiles obſervées à Greenwich, à de petites hauteurs, en même temps qu'il les obſervoit au Cap près du zénit, & il les trouve d'accord, en les corrigeant par ſa table de réfractions, en ſuppoſant la latitude de Greenwich de 51° 28′ 53″, & la diſtance vraie des parallèles de Greenwich & du Cap 85° 24′ 5″8; il ne s'en trouve que quatre qui s'écartent de 5 à 6″, & toutes les autres s'accordent à 2 ou 3″ près, à donner la même diſtance des paralelles. Il a fait de même la comparaiſon

de 35 étoiles obſervées à Gottingen, 24 à Bologne, & 50 que j'avois obſervées à Berlin, chacune pluſieurs fois avec un mural de cinq pieds de rayon, & il a trouvé continuellement le même accord. Ainſi quoique l'on ſoit perſuadé aſſez généralement que les réfractions de M. de la Caille ſont un peu trop fortes, je crois qu'il importe de s'en aſſurer encore, & l'on ne pourra faire mieux que de ſuivre la route de cet incomparable aſtronome.

Des hypothèses Physiques propres à repréſenter les réfractions.

2190. Quoiqu'on puiſſe déterminer immédiatement par obſervation à toutes les hauteurs poſſibles la réfraction aſtronomique, il ſeroit très-utile d'en connoître la loi, de maniere à pouvoir remplir par un calcul exact les intervalles que l'obſervation a laiſſés : voici les diverſes tentatives qu'on a faites à ce ſujet.

M. Caſſini, en 1662, voyant que la maniere d'obſerver les réfractions qu'avoit employé Tycho, ne pouvoit faire connoître la réfraction à de grandes hauteurs, & dès qu'elle eſt moindre qu'une minute, ſongea à y employer le calcul & la théorie ; ſa méthode fut perfectionnée dans la ſuite, & on la trouve dans les élémens d'*Aſtronomie de M. Caſſini le fils*, page 15.

Hypothèſe de M. Caſſini.

2191. Soit *AB* la ſurface de la terre, (*fig.* 139) *EKG* la ſurface de l'atmoſphère ou de la matiere réfractive, ſuppoſée homogène, *IG* le rayon de l'étoile avant ſon entrée dans l'atmoſphère, *GA* le rayon rompu, qui eſt perpendiculaire à la ligne verticale *CAZ*, lorſque l'étoile paroît à l'horizon ; au lieu de voir l'étoile ſur le rayon *FG*, on la doit voir ſur la ligne droite *AGT*, & l'angle *TGF* que forme le rayon direct, avec le prolongement *GT* du rayon rompu eſt la quantité de la réfraction horizontale, que M. Caſſini avoit trouvée par obſervation de 32′ 20″. Lorſque l'étoile ſe ſera élevée en *M* ſon rayon direct ſera *MK*, & le rayon rompu *AKN*;

Fig. 139.

l'angle *MKN* eſt l'angle de réfraction à cette hauteur; je ſuppoſe avec M. Caſſini qu'elle ait été obſervée de 5′ 28″ à 10° de hauteur apparente (2172, 2189).

La hauteur *AE* que l'on veut donner à l'atmoſphère ſuppoſée homogène doit être telle que les ſinus des angles d'incidence *PGF*, *MKR*, ſoient aux ſinus des angles rompus *PGT* *RKN* dans un rapport conſtant, & que les réfractions *FGT* *MKN* ſoient entre elles, comme 32′ 20″ & 5′ 28″, ces deux réfractions étant ſuppoſées immédiatement & exactement connues par obſervation.

Pour trouver cette hauteur, M. Caſſini emploie la méthode indirecte de fauſſe poſition; il ſuppoſe de 2000 toiſes la hauteur *AE* de l'atmoſphère uniforme, le rayon *AC* de la terre étant de 3271600 toiſes, ainſi la longueur totale *CE* ou *CG* ſera de 3273600 toiſes. (*Elém. d'aſtron. pag.* 15). Dans le triangle *CAG* rectangle en *A*, dont on connoît *CA* & *CG*, on trouvera l'angle *CGA* de 87° 59′ 50″, auquel on ajoutera la réfraction *FGT* de 32′ 20″, & l'on aura l'angle *FGP* de 88° 32′ 10″; c'eſt l'angle d'incidence pour le rayon *FG* à ſon entrée dans l'atmoſphère en *G*. De même dans le triangle *CAK*, dont on connoît les côtés *CA*, *CK* & l'angle *CAK* de 100° à la hauteur apparente de 10°, l'on trouvera l'angle *AKC* égal à l'angle *RKN* de 79° 48′ 12″.

2192. Pour trouver la réfraction en *K*, l'on dira: le ſinus de l'angle rompu *CGA* 87° 59′ 50″, eſt au ſinus de l'angle d'incidence *FGP*, 88° 32′ 10″, comme le ſinus de l'angle rompu *RKN*, 79° 48′ 12″, eſt au ſinus de l'angle d'incidence *MKR* 79° 53′ 40″, dont retranchant l'angle *NKR* 79° 48′ 12″, il reſte l'angle *MKN* de 5′ 28″; c'eſt la réfraction à la hauteur apparente de 10°; & comme cette réfraction eſt véritablement égale à celle que M. Caſſini avoit obſervée, il s'en ſuit que la hauteur de l'atmoſphère ſuppoſée de 2000 toiſes ſuffit pour repréſenter les deux réfractions obſervées de 5′ 28″, & 32′ 20″. Si l'on avoit trouvé dans le calcul précédent une réfraction plus ou moins grande que 5′ 28″, on auroit recommencé le calcul, en ſuppoſant une hauteur de l'atmoſphère

Règle pour trouver la réfraction.

un peu différente de 2000 toiſes. La même règle ſervira pour trouver toute autre réfraction par le calcul.

2193. Cette hypothèſe de M. Caſſini ſur la hauteur d'une matiere réfractive équivalente à la hauteur de l'atmoſphère, s'eſt trouvée aſſez bien d'accord avec les obſervations faites à différens degrés de hauteurs, enſorte qu'elle peut donner avec très-grande facilité, comme on vient de le voir, & avec une préciſion ſuffiſante, la réfraction qui convient à une hauteur quelconque.

Cependant il y a une grande différence entre l'hypothèſe de M. Caſſini qui ſuppoſe une matiere homogène finiſſant à 2000 toiſes d'élévation, & l'état réel de l'atmoſphère qui diminue inſenſiblement & par degrés, & qui eſt encore ſenſible à 54 mille toiſes de hauteur, par l'ombre qu'elle répand ſur le diſque de la lune (1776), & à 34 mille par ſon effet ſur les crépuſcules (2270); mais malgré cette différence entre l'hypothèſe de 2000 toiſes, & la nature de l'air, il ſuffit pour l'aſtronomie d'y trouver un équivalent qui compenſe, par la ſimplicité du calcul, le petit degré de préciſion qui manque peut-être à l'hypothèſe. Au reſte, nous allons paſſer à une détermination plus rigoureuſe de ce problême Phyſico-Mathématique.

2194. La découverte du principe général de l'attraction, fit reconnoître à Newton que la réfraction de la lumiere étoit un effet de l'attraction que l'atmoſphère exerce ſur les corpuſcules de la lumière. En partant de ce principe, on peut déterminer la trajectoire du rayon, & la loi ſuivant laquelle varie la réfraction depuis le zénit juſqu'à l'horizon. Un rayon de lumière qui eſt attiré ſucceſſivement vers le centre de la terre par les différentes couches de l'atmoſphère, ſe trouve par-là détourné de la ligne droite qu'il ſuivroit dans le vide; cette attraction, qui va toujours en augmentant lorſque le rayon s'enfonce dans l'atmoſphère, produit une réfraction qui augmente toujours de plus en plus; la ſomme de toutes ces réfractions, quand le rayon arrive à notre œil, forme la réfraction aſtronomique.

Trajectoire d'un rayon.

2195. Puſieurs auteurs ont cherché à déterminer la courbe décrite par ce rayon dans l'atmoſphère ; M. Taylor, (*Method. increm. directa & inverſa*) ; M. Bernoulli, (*Hydrodyn. pag.* 221) ; M. Euler, (*Mém. de Berlin* 1754, *Tom.* X. *pag.* 131) ; M. Simpſon, (*Mathematical Diſſertations, pag.* 46, 1743). On peut voir encore ſur cette matiere un ouvrage qui a pour titre : *Les propriétés remarquables de la route de la lumière*, par J. H. Lambert, à la Haye 1759, *in*-8°. Enfin, le P. Boſcovich ayant traité cette matiere d'une façon plus ſimple & plus élégante qu'aucun des géomètres qui l'avoient précédé, & m'ayant communiqué ſon travail ; je me ſervirai de ſa méthode pour démontrer la loi des réfractions, trouvée par M. Simpſon, & celle que M. Bradley en a déduite, ſans en avoir donné la démonſtration (2203), mais que j'avois démontrée déjà dans la premiere édition de cet ouvrage (a).

Méthode du P. Boſcovich.

2196. Pour déterminer la réfraction, il s'agit de conſidérer, en général, la courbe qu'une particule de lumière doit décrire lorſqu'elle eſt ſans ceſſe attirée vers le centre de la terre avec une force quelconque. Soit *C* le centre de la terre, (*fig.* 140) vers lequel eſt attiré le corpuſcule *F* de lumière ; *A* le lieu de l'obſervateur, *Z* le zénit ; *FA* la courbe que doit décrire le rayon ; *SF* la ligne par laquelle il entre dans l'atmoſphère, *BIA* la direction du rayon qui arrive au point *A*, *FH* & *AG* les tangentes à la courbe en *A* & en *F*, & qui ſe coupent en *I* ; on abaiſſera du centre *C* de la terre des perpendiculaires *CH* & *CG* ſur ces tangentes ; l'angle *ZAI* eſt la diſtance apparente au zénit pour un aſtre *S* ou *F*, & ſi l'on ſuppoſe *AK* parallèle à *FS*, l'angle *ZAK* ſera la diſtance vraie. La premiere tangente *SFH* de la courbe décrite par le rayon de lumière étant continuée, rencontre en un point *I* la derniere tangente *AIB*, qui marque

Fig. 140

(a) On ne peut ſe diſpenſer de ſuppoſer ici la connoiſſance du calcul différentiel dont il ſera parlé dans le XXIe Livre : ainſi le lecteur qui n'y auroit pas encore pénétré, doit paſſer les démonſtrations ſuivantes, & ſe contenter d'en voir les réſultats.

Fig. 140. le lieu apparent de l'aſtre ; la réfraction aſtronomique eſt égale à l'angle *BIS* ou *GIH* des deux tangentes ; & puiſqu'on ſuppoſe *AK* parallèle à *SFIH*, elle eſt encore égale à l'angle *BAK*.

2197. La première choſe qu'il eſt bon de démontrer relativement à la cauſe phyſique des réfractions, c'eſt que leur changement ne dépend que de la conſtitution de la partie baſſe de l'atmoſphère, & pour cela nous ferons ſur le mouvement, en général, quelques remarques néceſſaires. Dans toutes les courbes décrites en vertu d'une force de projection uniforme & d'une force centrale quelconques, la force à égales diſtances du centre étant égale, *la vîteſſe en différens points de la courbe eſt en raiſon inverſe des perpendiculaires* abaiſſées ſur les tangentes en ces différens points ; car les aires étant toujours égales (1233), & étant le produit de l'arc de la courbe par la perpendiculaire abaiſſée ſur cet arc prolongé, ou ſur la tangente, les petits arcs de la courbe diminueront dans le même rapport que les perpendiculaires augmenteront, & de maniere à former toujours le même produit. Ainſi la vîteſſe du corpuſcule de lumière en F eſt à ſa vîteſſe en A, comme CG eſt à CH ; & faiſant le rayon de la terre $CA = 1$, $CH = y$, la vîteſſe dans un point F de la courbe $= v$, la vîteſſe finale en $A = c$, l'angle CAG ou la diſtance apparente au zénit $= a$, enſorte que $CG =$ ſin. a, on aura $v = \frac{c \text{ ſin. } a}{y}$.

2198. Suppoſons pour un inſtant que FA ſoit un arc infiniment petit, compris entre deux lignes droites finies FC, AC, dont l'angle FCA ſoit $= dx$; ſoient tirées deux tangentes FI, AI, une ligne AL parallèle à CF, AQ perpendiculaire à CF, & QO perpendiculaire ſur la corde AOF. Si la réfraction totale HIG eſt égale à r, on aura dans le cas de la portion infiniment petite $FCA = dx$, $LIA = dr$, puiſque l'une eſt la différentielle de l'angle au centre C, & l'autre l'angle d'une tangente de la courbe avec la tangente qui en eſt infiniment proche, & que la ſomme de tous ces angles eſt l'inclinaiſon de

la derniere tangente ſur la premiere. Si l'on fait encore $CA = z$, $IQ = dz$, la force réfractive en $F = f$, $CH = y$, la vîteſſe en F étant $\frac{v \text{ ſin. } a}{y}$; l'eſpace FA qui eſt comme le produit du temps par la vîteſſe ſera $v\,dt$, & l'effet AL de la force accélératrice ſera proportionel à la force & au carré du temps (3365) ou $f\,dt^2$. La force ſuivant FQ ou la force réfractive abſolue f eſt à cette même force décompoſée ſuivant FA ou FO, comme FQ eſt à FO, comme FA eſt à FQ, comme $v\,dt$ eſt à dz, c'eſt-à-dire, $v\,dt : dz :: f : \frac{f\,dz}{v\,dt}$, expreſſion de la force attractive, dans la direction du mouvement FI de la lumière; ainſi la différentielle de la vîteſſe, qui eſt comme la force & le temps conjointement, c'eſt-à-dire, $dv = \frac{f\,dz\,dt}{v\,dt}$; donc $v\,dv = f\,dz$; ainſi l'augmentation du carré de la vîteſſe dans chacun des petits arcs de la courbe eſt comme la force abſolue, & le changement de la diſtance au centre.

2199. De-là il ſuit que ſi deux particules de lumiere appartenantes à deux rayons différens, ont eu une fois des vîteſſes égales à même diſtance du centre, elles les auront toujours; car en ſe rapprochant également du centre elles éprouveront des forces égales, des accroiſſemens égaux dans les carrés de vîteſſes égales, ainſi les vîteſſes elles-mêmes ſeront égales. Mais tous les rayons homogènes parviennent à la premiere ſurface de l'atmoſphère avec des vîteſſes égales, ainſi ſous quelle direction qu'ils traverſent l'atmoſphère, ils auront des vîteſſes égales à même diſtance du centre, la valeur de c ou de la vîteſſe finale en A ſera conſtante pour tous les rayons; le rapport de CH à CG ou de la vîteſſe finale à la vîteſſe initiale, ſera également le même; ce rapport différera peu de l'égalité, puiſque la réfraction eſt toujours fort petite en comparaiſon de la diſtance au zénit.

Vîteſſes égales à même diſtance.

2200. Quelque changement qui arrive dans l'atmoſphère, pourvu que ſon état reſte le même en A, la vîteſſe finale ſera la même; car l'augmentation du carré de la vîteſſe, ſera comme la ſomme de tous les produits des

forces attractives dans chaque couche par leurs épaiſſeurs relatives, c'eſt-à-dire, des *fdz*. Que l'on conçoive l'atmoſphère diviſée en pluſieurs couches de même épaiſſeur; la force en chaque point ſera l'excès des actions qu'exerçent les couches inférieures ſur celles des couches ſupérieures; le rayon approchant de la terre, les effets des couches intermédiaires ſeront ſucceſſivement détruits, & il ne reſtera que l'effet produit par l'excès de la dernière force ſur la première. Ainſi quoique la lumière parvienne à l'air qui nous touche par un nombre quelconque de milieux différemment denſes, ſa vîteſſe eſt la même que ſi elle y parvenoit immédiatement de l'Ether.

La réfraction ne dépend que de l'air inférieur.

La vîteſſe de la lumière en A ne dépend donc que de la conſtitution de l'atmoſphère en A, & de la hauteur du thermomètre ou du baromètre dans le lieu de l'obſervation; mais la ſituation du point I ou de l'interſection des deux tangentes, peut rendre plus variable la réfraction aux environs de l'horizon.

2201. Pour avoir la loi des réfractions, il faut trouver leur rapport avec la diſtance au zénit & avec l'angle FCE, formé au centre de la terre. La hauteur de l'atmoſphère ou la longueur de CF étant la même pour tous les rayons de même eſpèce, le rapport du ſinus d'incidence CFH, au ſinus de réfraction CAG ſera le même pour tous, car ces ſinus ſont $\frac{CH}{CF}$ & $\frac{CG}{CA}$ (3613); ſi le rapport des vîteſſes en A & en F ou de CH à CG eſt celui de $1+b$ à 1, & que la hauteur de l'atmoſphère MF ſoit $= e$, ce rapport de $\frac{CH}{CF}$ à $\frac{CG}{CA}$ ſera celui de $\frac{1+b}{1+e}$ à 1. Si l'on fait $\frac{1+b}{1+e} = m$, on aura $1 : m ::$ ſin. CAG ou ſin. a : ſin. CFH, qui ſera $= m$ ſin. a.

Dans le quadrilatère rectiligne $CFIA$ les quatre angles internes ſont néceſſairement quatre angles droits, auſſi bien que les angles internes A & I réunis avec leurs externes; retranchant de part & d'autre les deux internes A & I, l'on aura les deux externes A & I égaux aux deux autres internes C & F, ou $CFI + ACF = CAG + GIH$;

GIH; CFI ou $CFH = CAG - ACF + GIH = a - (x - r)$, ainſi l'on aura m ſin. a = ſin. $(a - (x - r))$. Nous en déduirons la règle de Simpſon (2210). La ſomme de deux ſinus qui ſont comme 1 & m eſt à leur différence, comme la tangente de la demi-ſomme des angles a, & $a - (x - r)$ eſt à la tangente de leur demi-différence (3644); ainſi $1 + m : 1 - m ::$ tang. $(a - \frac{1}{2}(x - r)) :$ tang. $\frac{1}{2}(x - r)$; & puiſque ce rapport eſt conſtant, il s'enſuit que la tangente de $\frac{1}{2}(x - r)$ ou le petit angle lui-même $x - r$ ſera comme la tangente de $(a - \frac{1}{2}(x - r))$ ou de la diſtance apparente au zénit diminuée du petit angle $\frac{x - r}{2}$.

2202. Si le rapport de x à r ou de l'angle au centre à la réfraction eſt conſtant, le petit angle $\frac{x - r}{2}$ ſera un certain multiple de la réfraction r; & la réfraction elle-même ſera comme la tangente de la diſtance au zénit, diminuée d'un certain multiple de la réfraction, nous verrons que c'eſt à peu-près trois fois la réfraction. Pour que le rapport de x à r ſoit conſtant, il faut ſuppoſer que la force attractive des couches de l'atmoſphère croît uniformément, & que le rayon éprouve continuellement la même force, en paſſant d'une couche à la ſuivante. Dans cette ſuppoſition de la force conſtante, ſoit un arc infiniment petit $AF = v\,dt$ (2198); la tangente AI ſenſiblement égale à la moitié de l'arc, ſera $\frac{v\,dt}{2}$; le ſinus de CFA, ou de CFL (qui lui eſt égal, parce que l'angle AFL eſt infiniment petit) eſt $= \frac{AQ}{AF}$, mais l'arc AQ eſt comme l'angle multiplié par le rayon (3357); ainſi $AQ = z\,dx$, & comme $AF = v\,dt$ le ſinus de CFA ſera $\frac{z\,dx}{v\,dt}$; mais $AI : AL ::$ ſin. ALI ou $ALH :$ ſin. AIL; c'eſt-à-dire, $\frac{v\,dt}{2} : f\,dt^2 :: \frac{z\,dx}{v\,dt} :$ ſin. dr, donc ſin. dr ou dr lui-même $= \frac{2fz\,dx}{v^2}$, & $\frac{dr}{dx} = \frac{2fz}{v^2}$; ainſi l'on a le rapport entre le petit changement de la réfraction & l'angle au centre.

Force conſtante.

Le rapport $\frac{2z}{vv}$ eſt pour ainſi dire conſtant, parce que les vîteſſes & les diſtances au centre de la terre ne changent que très-peu, ainſi $\frac{dr}{dx}$ eſt ſenſiblement comme la force réfractive f, qui a lieu dans chacune des couches de l'atmoſphère, & ſi cette force f eſt ſenſiblement conſtante, ou égale dans les différentes hauteurs de l'atmoſphère, le rapport $\frac{dr}{dx}$ ſera conſtant.

2203. Ainſi en ſuppoſant que la force réfractive eſt conſtante dans toute l'atmoſphère, le rapport de x à r eſt un rapport conſtant; dans cette hypothèſe Simpſon, en prenant deux réfractions obſervées, trouvoit $r = \frac{2}{111}(x - r)$, ou $x = 6\frac{1}{2}r$; Bradley ſuppoſoit $\frac{1}{112}$ ou $\frac{1}{60}$, au lieu de $\frac{2}{111}$, & faiſoit $x = 7r$; d'où il ſuit que $a - \frac{x-r}{2} = a - 3r$, ainſi *la réfraction eſt comme la tangente de la diſtance au zénit diminuée de trois fois la réfraction.* C'eſt la règle trouvée par M. Bradley peu de temps avant ſa mort, mais qui n'avoit été ni publiée ni démontrée avant la premiere édition de mon Ouvrage; elle s'eſt trouvée aſſez bien d'accord avec les obſervations; nous verrons bientôt la maniere de trouver ce nombre trois par le moyen des obſervations (2210, 2213). Cette démonſtration de la règle de Bradley, que le P. Boſcovich déduit des notions les plus ſimples du mouvement eſt la plus élégante & la plus ſimple qu'on eût pu deſirer.

Règle de Bradley.

2204. Les principes que l'on vient de voir ſuffiſent pour prouver que dans toutes les hypothèſes qu'on fait ſur le progrès de la force réfringente, le ſinus d'incidence eſt au ſinus de réfraction en raiſon conſtante, & en raiſon inverſe de la vîteſſe dans le premier milieu, à la vîteſſe dans le ſecond, (on ſuppoſe que le rayon ſoit attiré perpendiculairement à la ſurface réfringente & à une très-petite diſtance). Car ſi AC devenoit paralléle à CF, CA & CF ſeroient égaux, CFH ſeroit l'angle d'incidence, CAG l'angle de réfraction, & le rapport de leurs ſinus ſeroit celui des perpendi-

laires *CH* & *CG* ou des vîteſſes, donc les vîteſſes ſont en raiſon inverſe des ſinus de réfraction & d'incidence.

2205. D'après la règle de Bradley on a $x = 7r$, c'eſt-à-dire, l'angle *FCA* égal à 7 fois la réfraction; ainſi la réfraction eſt toujours la ſeptieme partie de l'angle au centre de la terre, dans lequel eſt renfermé tout l'eſpace que le rayon a parcouru dans l'atmoſphère. Nous en ferons uſage pour les réfractions terreſtres (2252).

2206. Pour faire uſage de la règle de Bradley, je ſuppoſe que la réfraction ſoit de 33′ à l'horizon, & qu'on demande celle qui a lieu à 45°: le triple de la réfraction horizontale, 1° 39′, étant ôté de la diſtance apparente au zénit 90°, on a 88° 21′, on en conclura la réfraction pour 45°, dès qu'on ſaura que cette réfraction eſt d'environ 1′, en diſant, la tangente de 88° 21′ eſt à la tangente de 44° 57′, comme la réfraction horizontale 33′ eſt à 57″, qui eſt exactement la réfraction pour 45° 0′ de diſtance apparente au zénit. C'eſt par cette règle qu'on a conſtruit la table de réfractions de M. Bradley, que j'ai publiée dans la connoiſſance des mouvemens céleſtes pour 1765, & pour les années ſuivantes juſqu'à 1770, ainſi que dans la premiere édition de cet ouvrage. Cette même règle a ſervi à calculer une partie de la table de M. de la Caille (2177).

Règle plus ſimple.

2207. Cette règle qui a lieu dans les petites hauteurs comme dans les grandes, & qui eſt confirmée ſenſiblement par les obſervations, prouve auſſi que les réfractions ſont proportionnelles aux tangentes des diſtances au zénit, tant que ces réfractions ne paſſent pas environ 3′, ou que leurs hauteurs excedent 20°; car alors les tangentes des diſtances ſimples ou celles de ces diſtances diminuées de trois fois la réfraction, ont ſenſiblement le même rapport; ainſi nous avons pu ſuppoſer, ſans aucune erreur ſenſible, que les réfractions au-deſſus du pole à Paris étoient comme les tangentes des diſtances au zénit (2187). Mais en approchant de l'horizon la ſimple diſtance au zénit ne ſuffit plus, parce que la réfraction étant triplée, produit dans les tan-

gentes une différence énorme, il faut alors employer une fauſſe poſition pour calculer la réfraction par la règle de Bradley, comme dans l'exemple précédent.

Qualité réfractive de l'air.

2208. On ſait par les expériences du baromètre que les denſités de l'air groſſier croiſſent en progreſſion géométrique, & non pas en progreſſion arithmétique en s'approchant de la terre. (Voyez Mariotte, Graveſande, Muſſenbroëck, Nollet, l'Encyclopédie; la connoiſſance des mouvemens céleſtes 1765, *pag.* 212). Mais on a lieu de croire que la réfraction, ou en général la force attractive des corps ſur les rayons de lumiere, ne dépend pas ſeulement de leur denſité, mais auſſi d'une cauſe interne qui eſt peut-être la ſtructure de leurs parties, leur diſtribution, leurs interſtices, leur viſcoſité, leur adhérence, leur qualité plus ou moins huileuſe, plus ou moins inflammable. M. Simpſon attribuoit cette différence entre la loi des denſités obſervées avec le baromètre, & celle que nous admettons pour les réfractions dans l'étendue de l'atmoſphère à la chaleur de l'air, beaucoup plus grande vers la ſurface de la terre que dans la région ſupérieure. Mais, quoi qu'il en ſoit de cette cauſe, on ſait d'ailleurs que la réfraction n'augmente pas toujours comme les peſanteurs ou les denſités des corps réfringens : l'eſprit de térébenthine eſt bien plus léger que le verre, & cependant la réfraction y eſt preſque auſſi grande; ainſi rien n'empêche de croire que la matiere réfractive change de denſité d'une maniere uniforme en s'élevant au-deſſus de la terre, quoique cela ne ſoit pas vrai pour l'air groſſier. Quoique les expériences faites ſur un air condenſé faſſent paroître la réfraction proportionnelle à la denſité, il peut arriver que la matiere électrique, ou la matiere du feu, beaucoup plus abondante dans la région ſupérieure de l'atmoſphere que dans la partie baſſe, rende la réfraction plus grande à une certaine hauteur qu'elle ne devroit être, ſi l'air étoit homogène avec celui que nous reſpirons; par-là il peut arriver que la force réfractive approche bien plus de l'uniformité que de la

progreſſion géométrique. Au reſte, M. Caſſini, (*Mém. acad.* 1714), employoit une courbe circulaire pour les rayons de lumiere, ce qui ſuppoſe implicitement une force réfractive conſtante; & M. Bouguer, (*Mém. acad.* 1749), trouvoit auſſi un rapport conſtant entre x & r (2203), dans des ſuppoſitions qui reviennent à celle d'une force conſtante.

Force conſtante.

2209. Cette hypothèſe s'accorde avec les réfractions obſervées; tandis que la loi des denſités démontrée par les hauteurs du baromètre ne ſauroit s'y appliquer; ſi l'on calcule la quantité de la réfraction horizontale ſuivant cette loi des denſités au moyen de la peſanteur ſpécifique de l'air & de la force réfractive, qui ſont connues, l'on trouve cette réfraction horizontale de $52'$, au lieu de $32'$ que l'on obſerve réellement; mais quand on calcule cette même réfraction horizontale en ſuppoſant que la denſité croiſſe uniformément, on approche beaucoup de l'obſervation. Au-deſſus de 7° de hauteur, il eſt indifférent, quelle ſuppoſition l'on faſſe ſur les denſités de l'atmoſphère; car ſi l'on prend une réfraction obſervée à une hauteur qui ne ſoit pas au-deſſous de 7°, & qu'on en déduiſe les autres réfractions ſuivant les deux hypothèſes différentes, on ne trouvera jamais plus de $2''$ de différence, d'où M. Simpſon. (*Math. diſſ.* pag. 61), conclut que l'hypothèſe des accroiſſemens égaux étant beaucoup plus conforme à l'obſervation vers l'horizon, doit donner elle ſeule une table fort exacte des réfractions à de plus grandes hauteurs, auſſi-tôt que les grandes réfractions ſont une fois obſervées.

Règle de Simpſon.

2210. Suivant la règle de Simpſon, il y a un rapport conſtant entre le ſinus de la diſtance apparente au zénit, & le ſinus d'un certain angle; & la différence de ces deux angles eſt à la réfraction cherchée dans un autre rapport conſtant; or, par l'art. 2201, en mettant au lieu de $x - r$ un multiple nr de la réfraction, l'on a m ſin. a = ſin. $(a - nr)$, & c'eſt par les obſervations que l'on détermine m & n; par exemple, en

ſuppoſant la réfraction de 33′ à l'horizon & de 1′ 30″ $\frac{1}{2}$ à 30° de hauteur, Simpſon trouvoit $m =$ ſin. 86° 58′ $\frac{1}{2}$ ou 0,99861 & $n = \frac{11}{2}$.

Suivant la règle de Bradley, la réfraction eſt proportionnelle à la tangente de la diſtance apparente au zénit diminuée d'un certain multiple de la réfraction (2203), ou en général r proportionnel à tang. $(a - hr)$, & il ſuppoſe $h = 3$, ce qui revient à $n = 6$ au lieu de $\frac{11}{2}$ qu'il y a dans la règle de Simpſon ; or ces deux règles peuvent facilement ſe déduire l'une de l'autre.

En effet par celle de Simpſon l'on a $1 : m ::$ ſin. $a :$ ſin. $(a - nr)$, ainſi $1 + m : 1 - m ::$ ſin. $a +$ ſin. $(a - nr) :$ ſin. $a -$ ſin. $(a - nr)$, ou ce qui revient au même :: tang. $(a - \frac{1}{2} nr) :$ tang. $\frac{1}{2} nr$, parce que la ſomme de deux ſinus eſt à leur différence, comme la tangente de la demi-ſomme des deux arcs eſt à la tangente de leur demi-différence (3644) ; ainſi tang. $\frac{1}{2} nr$, & r lui-même ſont proportionnels à tang. $(a - \frac{1}{2} nr)$, ainſi la valeur de h dans Bradley eſt $= \frac{1}{2} n$ dans Simpſon, & ſi $n = 6$ on a $h = 3$, mais ſi $n = \frac{11}{2}$ comme Simpſon le ſuppoſoit, on a $h = \frac{11}{4} = 2\frac{1}{4}$ au lieu de 3 ; ainſi dans ce cas-là, il faut diminuer la diſtance au zénit de deux fois & $\frac{1}{4}$ la réfraction. Au contraire le nombre n dans Simpſon ſe déduit facilement de la valeur de h dans Bradley $= \frac{1}{2} n$: pour trouver enſuite l'autre coëfficient m, on emploie une réfraction r obſervée à une diſtance a du zénit ; ayant, par exemple, $m = \frac{\text{ſin. } (a - nr)}{\text{ſin. } a}$, ſi l'on ſuppoſe $a = 90°$, on a ſin. $(a - nr) =$ cof. $nr = m$.

Avantage de cette règle.

2211. La règle de Bradley eſt plus facile à retenir & plus ſimple dans l'énoncé, que la règle de Simpſon ; mais elle n'eſt pas auſſi commode lorſqu'il s'agit de conſtruire une table par le moyen des obſervations, parce qu'elle ſuppoſe qu'on connoiſſe d'avance la réfraction que l'on cherche. Ainſi dans l'uſage il vaudroit mieux la diſpoſer ſuivant la forme de Simpſon : pour chaque diſtance apparente au zénit a' à laquelle répond une réfraction r' on a cette équation ſin. $(a' - nr') = m$

ſin. a' (2210); la valeur de $a' - nr'$ étant trouvée & retranchée de a' il reſte nr' qui diviſée par n donne la réfraction cherché r'. Par exemple, ſi la réfraction horizontale eſt de $33' = r$, on a $nr = 6r = 3°\ 18'$ & cof. $nr = m =$ cof. $3°18' = 0{,}9983$; ſi maintenant l'on veut avoir la réfraction à 50° de diſtance au zénit, on trouve cof. $3°\ 18'$ ſin. $50° =$ ſin. $49°\ 53'\ 13''$, cet angle eſt plus petit que 50°, de $6'\ 47''$ dont la ſixieme partie $1'\ 7''\ 8$ eſt la réfraction qui convient à 50° de diſtance apparente au zénit.

2212. Si l'on veut employer la hauteur apparente $= p$, l'on pourra prendre cof. $q = m$ cof. p, p ſera le complément de a, & q le complément de $a - nr$; ainſi $a = 90° - p$; $q = 90° - (a - nr) = p + nr$, $nr = q - p$, $r = \frac{q-p}{n}$: cette formule nous ſervira bientôt pour les réfractions qui ont lieu au-deſſous même de l'horizon (2220).

2213. Il faut maintenant trouver dans cette hypothèſe les coëfficiens néceſſaires à la conſtruction d'une table, au moyen de deux réfractions obſervées; on conſidérera que par les formules de la trigonométrie la valeur de m ſin. a, ou ſin. $(a - nr) =$ ſin. a cof. $nr -$ ſin. nr cof. a (3619), mais l'arc nr étant très-petit, l'on a cof. $nr = 1 - \frac{1}{2} n^2 r^2$ (3316); c'eſt pourquoi l'on aura ſin. $(a - nr) =$ ſin. $a - \frac{1}{2} n^2 r^2$ ſin. $a - nr$ cof. a; & parce que m ſin. $a =$ ſin. $(a - nr)$, diviſant par ſin. a & mettant cot. a pour $\frac{\text{cof. } a}{\text{ſin. } a}$, on aura $m = 1 - \frac{1}{2} n^2 r^2 - nr$ cot. a. En employant une autre réfraction r' à une diſtance du zénit a', on a la même valeur; ainſi $\frac{1}{2} n^2 r'^2 - \frac{1}{2} n^2 r^2 = nr$ cot. $a - nr'$ cot. a', & $\frac{1}{2} n = \frac{r \text{ cot. } a - r' \text{ cot. } a'}{r'^2 - r^2}$. Si r' eſt la réfraction horizontale, on aura cot. $a' = 0$ & $n = \frac{2r \text{ cot. } a}{r'^2 - r^2}$. Connoiſſant la valeur de n on trouvera auſſi celle de $m = 1 - \frac{1}{2} n^2 r^2 - nr$ cot. a. Si r eſt une réfraction aſſez éloignée de l'horizon pour que cot. a ne ſoit pas trop petite on pourra omettre $\frac{1}{2} n^2 r^2$ & faire $m = 1 - nr$ cot. a.

Pour la réfraction horizontale r', on aura cot. $a = 0$ & $m = 1 - \frac{1}{2} n^2 r'^2 =$ cos. nr' (3316).

Simpson employoit les valeurs suivantes, $a = 60°$, $r = 1' 30'' \frac{1}{2}$, $r' = 33'$, ce qui donne $n = \frac{1}{1}$, $m =$ cos. $3° 1' \frac{1}{2} =$ sin. $86° 58' \frac{1}{2} = 0{,}9983$. Bradley supposoit $r = 1' 38''4$, ce qui donne $n = 6$ & $m =$ cos. $3° 18'$. Si l'on employoit les réfractions de M. Cassini, (*Mém. ac.* 1714) $r' = 32' 20''$, $r = 5' 24''$, $a = 80°$, on trouveroit $n = 6,452$ & $m =$ cos. $3° 28' 37''$. Si l'on prenoit deux réfractions dans la table de M. de la Caille, $r = 1' 54''4$ pour 60° & $r' = 8' 42''$ pour 84°, on trouveroit $n = 17,78$ au lieu de 6 & $m =$ cos. $6° 7'$; mais les réfractions de M. de la Caille n'étant point faites sur cette théorie ni assujetties à cette règle, il n'est pas étonnant qu'elles s'y accordent mal; il suffit d'une différence de quelques secondes dans les données pour en produire une très-grande dans les coëfficiens.

2214. Pour réduire en nombre la valeur de $\frac{1}{2} n$ donnée ci-dessus, il faut réduire le numérateur & le dénominateur en décimales du rayon; mais on peut simplifier l'opération en ôtant le logarithme de l'arc égal au rayon 5,3144251 de la somme des logarithmes de $r' + r$ & de $r' - r$ qui font celui de $r'^2 - r^2$, & l'on a pour valeur de n une quantité dont toutes les parties sont homogènes entr'elles (3359); parce que pour lors r & $r' + r$ restent exprimées en secondes de degré, & $r' - r$ se convertit en décimales du rayon.

Méthodes pour avoir les réfractions absolues.

2215. La loi des réfractions ou la règle de leur progression étant supposée connue par la théorie précédente, il seroit facile de trouver les réfractions absolues. Je suppose, par exemple, qu'on ait observé la hauteur apparente de deux étoiles circompolaires au-dessus & au-dessous du pole (33); en corrigeant ces quatre observations par les réfractions, elles doivent donner exactement la même hauteur du pole; on pourra donc par de fausses positions trouver quelle est la réfraction horizontale qui, en suivant la théorie précédente, donnera quatre réfractions telles que la hauteur

du

du pole ſe trouve exactement la même par chacune des deux étoiles. On pourroit même les donner par une formule directe ; mais on en a rarement beſoin, & le calcul eſt auſſi court par la méthode indirecte. De même la déclinaiſon du ſoleil obſervée très-exactement en divers temps de l'année a ſervi à M. Bradley pour conſtruire ſa table des réfractions, en ſuppoſant le rapport de ces réfractions connu par les règles précédentes.

2216. La règle de Bradley étant fondée ſur une hypothèſe qui n'eſt pas abſolument conforme à la phyſique (2208), mais que les obſervations nous font admettre, il étoit permis d'examiner ſi l'on ne repréſenteroit pas encore mieux les obſervations en changeant un peu la forme de cette règle & la valeur des coëfficiens ; M. Bonne ayant combiné un très-grand nombre d'obſervations, a trouvé qu'on les repréſentoit mieux en mettant au lieu du nombre 3 conſtant pour toutes les hauteurs, celui-ci $3{,}19953 + 0{,}03428$ cof. a, enſorte que ſa formule de réfraction ſe réduit à celle-ci, en ſuppoſant a égale à la diſtance au zénit.

Règle de M. Bonne.

$$\text{Réfraction} = \frac{\text{tang.}\,(a - R'' 3{,}19953 + 0{,}03428\ \text{co}\ a)}{\text{tang.}\,(90° - 1944\,(3{,}19953 + 0{,}03428\,\text{cof.}\,a)\frac{1}{1944}}.$$

A la fin de nos tables, on trouvera la table de réfractions calculée ſur ce principe par M. Bonne, pour le cas où le baromètre eſt à 28 pouces de hauteur, & le thermomètre de M. Réaumur à 10° au-deſſus de la congélation.

2217. Je reviens à l'hypothèſe de la force conſtante (2209), pour en tirer l'augmentation de vîteſſe de la lumiere dans l'atmoſphère, où la valeur de b. Soit ACI (*fig.* 140) $= x'$, CIG ou $CIA = a - x'$; $CIH = a - x' + r$; leurs ſinus ſont comme les perpendiculaires CG, CH, ou les vîteſſes 1 & $1 + b$ (2197. 2201), donc $(1 + b)$ ſin. $(a - x') =$ ſin. $(a - x' + r)$, & ſuppoſant que l'angle r ſoit fort petit $(1 + b)$ ſin. $(a - x') =$ ſin. $(a - x') + r$ cof. $(a - x')$, (3617) ; diviſant par ſin. $(a - x')$ & mettant cotang. pour $\frac{\text{cof.}}{\text{ſin.}}$, on a $1 + b =$

Changement de vîteſſe de la lumière.

Fig. 140.

$1+r$ cot. $(a-x')$ & $b=r$ cot. $(a-x')$. Pour faire uſage de cette formule, il faut obſerver que la valeur de x' eſt très-petite en comparaiſon de a, ſur-tout lorſque a n'approche pas beaucoup de 90°, car ſin. CAG ou a : ſin. CIG ou $a-x'$: : CI : CA, c'eſt-à-dire, dans un rapport qui diffère peu de l'égalité. Si la réfraction à 60° de diſtance au zénit eſt $1'\ 38''4=r$, on trouve $b=r$ cot. a, ou ſin. r cot. $a=0{,}000275$; Haukſbée trouvoit 0,000264 en ſe ſervant de la réfraction obſervée du vide dans l'air, le ſinus d'incidence étant au ſinus de réfraction, comme $1+b$ eſt à 1 ; cela s'accorde aſſez avec les réfractions de Bradley, tandis que celles de M. de la Caille donneroient 0,00032, qui eſt ſenſiblement trop fort ; auſſi eſt-on perſuadé que les réfractions de M. de la Caille ſont un peu trop conſidérables (2180). On peut auſſi déduire b de la valeur de m, car $b=r$ cot. a & $1-m=nr$ cot. a, donc $b=\frac{1-m}{n}$ & ſi $m=0{,}9983$ (2213), on a $b=0{,}000277$, ce qui ne diffère pas beaucoup de ce qu'on vient de trouver par une méthode indépendante de l'hypothèſe de la force conſtante.

2218. Sous la zone torride au niveau de la mer M. Bouguer a trouvé la réfraction horizontale de 27′, & à 83° de 5′ 30″ ; par-là on trouve $\frac{1}{2}n=\frac{r\text{ cot. }a}{r''-r'}=3{,}262$; $m=$ cof. $nr=0{,}99866$ & $b=0{,}0002054$; cette quantité eſt plus petite que dans nos climats, & nous verrons bientôt que la raréfaction produite par la chaleur de l'air diminue les réfractions (2222).

Hauteur de l'atmoſphère.

La hauteur e de l'atmoſphère ſenſible ou réfringente ſe trouvera facilement par ces formules, car $m=\frac{1+b}{1+e}$ (2201) ; donc $e=\frac{1-m+b}{m}$, & parce que $b=\frac{1-m}{n}$ (2217), on a $e=\frac{(n+1)(1-m)}{nm}$. Cette expreſſion fait voir que la diſtance au centre de la terre change réellement plus que la vîteſſe, car le changement e de la diſtance eſt au changement b de la vîteſſe, comme $n+1$ qui ſurpaſſe un peu l'unité eſt à m qui eſt un peu moindre que l'unité,

quand on l'exprime en parties du rayon de la terre (2219); mais on peut prendre pour le rapport de ces changemens le rapport de $n+1$ à 1. Avec les réfractions de Bradley on trouve $e=0{,}001942$ en parties du rayon de la terre (2690); avec celles de Bouguer 0,001548, ce qui fait 6342 & 5065 toiſes; M. Bouguer trouvoit 5158 toiſes, fondé en partie ſur les réfractions horizontales obſervées à différentes hauteurs, & en partie ſur une hypothèſe qui revenoit à peu-près à la force conſtante que nous employons actuellement.

Réfraction à différentes hauteurs.

2219. On peut trouver par ces formules la réfraction pour un lieu ſitué à une élévation quelconque, & pour des objets ſitués même au-deſſous de l'horizon, pourvu qu'on ait déterminé m & n pour le lieu propoſé. La valeur de n eſt la même à quelle hauteur que l'on ſoit; car c'eſt le nombre 6 par lequel ſe multiplie la réfraction pour corriger la diſtance au zénit (2210), or cette loi, qui vient de la nature de la réfraction eſt la même dans toute la hauteur de l'atmoſphère, puiſque la force eſt conſtante. Pour trouver la valeur de m qui dépend de la hauteur de l'atmoſphère, on ſe rappellera que $e=\frac{(n+1)(1-m)}{nm}$ (2218), donc $m=\frac{n+1}{n+1+en}=1-\frac{en}{n+1}$ en faiſant la diviſion ſuivant les règles ordinaires, & négligeant les puiſſances ſupérieures de e à cauſe de la petiteſſe de cette hauteur e de l'atmoſphère.

Par exemple, les obſervations de M. Bouguer donnent $n=6{,}524$, & la hauteur totale de l'atmoſphère 5055 toiſes; ainſi à 2388 toiſes de hauteur la diſtance au ſommet ou la valeur de e qui eſt la hauteur de l'atmoſphère dans ce cas-là, $=2667=0{,}008166$, d'où l'on conclut $m=1-\frac{en}{n+1}=0{,}9992919=\text{cof. } nr$ (2210), dans le cas de la réfraction horizontale; on a donc $nr=2^\circ\ 9'\ 24''$ & $r=19'\ 50''$. Or cette réfraction fut obſervée par M. Bouguer en différens temps de $19'\ 34''$, de $19'\ 35''$ & de $20'\ 17''$; enſorte que cette règle de théorie

donne une réfraction qui tombe fort bien entre celles que donne l'obſervation.

2220. Pour une hauteur p au-deſſus de l'horizon; ſi l'on appelle q cette hauteur augmentée d'un certain angle (2212), on a cof. $q = m$ cof. p & $r = \frac{q-p}{n}$, d'où il eſt aiſé de conclure la réfraction; par exemple, pour 7° on trouve 3′ 55″; par l'obſervation elle étoit de 3′ 24″ ou de 3′ 51″.

Au-deſſous de l'horizon.

Pour le cas où l'objet paroiſſoit au-deſſous de l'horizon rationel, de 1° 17′, p étant négatif, on trouve 34′ 53″, tandis que par obſervation M. Bouguer trouvoit 34′ 47″; l'augmentation eſt rapide au-deſſous de l'horizon, parce que l'on a la ſomme des deux angles p & q, au lieu qu'au deſſus de l'horizon l'on n'avoit que leur différence. Nous parlerons bientôt de ces réfractions terreſtres (2251).

2221. La valeur de $m = \text{cof. } nr = 1 - \frac{en}{n+1}$ (2219) ſert à prouver ce qu'avoit remarqué M. Bouguer, que la réfraction horizontale à différentes hauteurs eſt comme la racine de la diſtance au ſommet de l'atmoſphère; car $\frac{en}{n+1} = 1 - \text{cof. } nr = \text{ſin. verſe } nr = \frac{1}{2} n^2 r^2$ (3316); donc $r^2 = \frac{2e}{n(n+1)}$; donc r eſt comme la racine de e.

Réfraction ſur les montagnes.

Ainſi pour avoir la réfraction horizontale à un degré quelconque de hauteur au-deſſus du niveau de la mer, on ôte cette hauteur de celle de l'atmoſphère (5158 toiſes ſuivant M. Bouguer), & la réfraction horizontale eſt comme la racine du reſte, qui eſt la hauteur reſtante de l'atmoſphère au-deſſus du lieu de l'obſervation.

C'eſt ainſi que le P. Boſcovich a déduit toutes les règles & toutes les formules qu'on avoit données juſqu'ici pour la réfraction, d'une théorie auſſi ſimple qu'elle eſt élégante & féconde; on trouvera de plus grands détails dans le mémoire qu'il a compoſé ſur cette matiere, & qui eſt deſtiné à paroître dans un des volumes des *Mémoires préſentés à l'académie*.

Du changement de la Réfraction produit par les variations de l'atmoſphère.

2222. La denſité de l'air eſt la cauſe immédiate de la réfraction ; il étoit donc naturel de croire que la réfraction diminueroit lorſque la denſité de l'air deviendroit moindre, ſoit par l'expanſion que produit la chaleur, ſoit par les cauſes qui en diminuent le poids ; les aſtronomes ont en effet reconnu dans les réfractions, deux ſortes de variétés très ſenſibles, dont l'une dépend de la chaleur de l'air, & l'autre de ſon poids ; elles ſont indiquées par le thermomètre (129), (a) & par le baromètre, inſtrument que je ſuppoſe connu, & dont j'ai parlé fort au long dans la *Connoiſſ. des mouv. céleſtes de* 1765.

2223. Tycho-Brahé en donnant ſa table des réfractions reconnut bien qu'elles étoient ſujettes à des variations, (*Progymn. pag.* 79, 104) ; mais M. Caſſini & M. Picard furent les premiers qui meſurèrent avec quelque préciſion le changement & l'inégalité des réfractions. M. Picard reconnut par les hauteurs méridiennes du ſoleil en 1669, que les réfractions étoient plus grandes en hiver qu'en été, & la nuit plus grandes que le jour. (*Hiſt. céleſt. pag.* 19). Suivant les obſervations rapportées à la fin de ſon voyage d'Uranibourg, (*pag.* 41), il trouva la réfraction horizontale de 33′ 2″ par le premier bord du ſoleil, & 32′ 37″ par le ſecond bord ; enſorte que dans le petit intervalle de temps que le ſoleil emploie à ſe lever, la réfraction diminue de 25″ par la préſence du ſoleil. Il ajoute qu'étant au Mont-Valérien & ayant pointé un quart-de-cercle vers

M. Picard obſerve l'inégalité des réfractions.

(a) Θερμὸς, *calidus*, Μέτρον, *menſura*, Βάρος, *pondus*. Le baromètre n'eſt qu'un tube vide d'air à ſa partie ſupérieure, & dans lequel une colonne de vif-argent ſe tient élevée par la preſſion de l'air d'environ 28 pouces, cette hauteur diminue quand l'air devient plus léger (2270). M. Bouguer l'a vu à 15 pouces 11 lignes à une hauteur de 2484 toiſes. (*Mém. acad.* 1753, *pag.* 516).

le ſommet des Tours de Notre-Dame de Paris, il trouva leur abaiſſement de 20′; mais le ſoleil ne fut pas plutôt levé que l'abaiſſement fut de 22′; les vapeurs s'étoient élevées par la préſence du ſoleil, & le milieu entre Paris & le Mont-Valérien étoit devenu plus égal, au lieu qu'avant le lever du ſoleil Paris étoit dans un air plus denſe que le Mont-Valérien.

Changement du jour à la nuit.

2224. Ce changement de la réfraction a été obſervé de même en Amérique; M. Bouguer a obſervé que les réfractions de la nuit y ſont plus grandes que celles du jour, de $\frac{1}{6}$ ou $\frac{1}{7}$. (*Mém. acad.* 1749, *pag.* 105). Avant le lever du ſoleil le froid eſt plus grand, l'atmoſphère plus condenſée doit avoir perdu le plus de ſa hauteur, au moins par ſa partie inférieure; ſi l'atmoſphère ſe condenſoit par-tout proportionnellement d'un ſeptième de ſon volume le changement de réfraction ne ſeroit que de $\frac{1}{14}$, c'eſt-à-dire, la moitié moindre, comme le démontre M. Bouguer; mais les variations ſe font principalement dans la partie inférieure & vont en effet à un ſeptième, tandis qu'elles ſont inſenſibles dans la partie ſupérieure de l'atmoſphère (2254).

C'eſt ſurtout dans la partie inférieure de l'atmoſphère.

2225. M. Halley remarqua à l'occaſion des hauteurs méridiennes de Sirius obſervées à Paris en 1714 & 1715, qu'il devoit y avoir 8″ de différence en divers temps de l'année ſur la réfraction qui convient à cette hauteur, (*Phil. tranſ.* n°. 364). En effet, la hauteur du baromètre qui marque la peſanteur de l'air, varie d'environ deux pouces ſur vingt-huit, ou d'un quatorzième: les réfractions ſont proportionnelles à la denſité du milieu, comme il eſt démontré par les expériences de Haukſbée faites ſur un air condenſé au double & au triple; ainſi les réfractions doivent changer auſſi d'un quatorzième, & puiſqu'à la hauteur de Sirius qui eſt de 25°, la réfraction eſt, ſuivant M. Halley, de 1′ 55′, il doit y avoir des différences de 8″ ſuivant les temps & les peſanteurs de l'air: nous en parlerons ci-après (2237).

Haukſbée prouve qu'il doit avoir lieu.

Effet de la chaleur.

2226. M. le Monnier en 1738 & 1739, fit un grand nombre d'obſervations ſur les réfractions des

étoiles circompolaires ; elles ſont rapportées au commencement de l'Hiſtoire céleſte, qu'il a publiée en 1741. Il employa pour obſerver la réfraction, les étoiles qui paſſent aux environs du zénit de Paris, telles que la Chèvre, la Claire de Perſée, & la dernière de la grande Ourſe, il déterminoit leur diſtance au zénit avec le grand ſecteur de 9 pieds, qui avoit ſervi en Laponie pour la figure de la terre (2380), & il obſervoit enſuite leur hauteur ſous le pole avec un quart-de-cercle de trois pieds de rayon. Ainſi, le 24 Septembre 1738 l'étoile α de la Chèvre obſervée à 48° 51′ de latitude, parut à 3° 9′ 24″ $\frac{1}{2}$ du zénit, l'obſervation étant réduite au premier Juillet 1738 ; la vraie diſtance de la Chèvre au pole étoit donc de 44° 18′ 24″ $\frac{1}{2}$, & ſa hauteur inférieure devoit être de 4° 32′ 35″ $\frac{1}{2}$, mais le 14 Juillet cette hauteur méridienne parut de 4° 42′ 23″ ; ainſi la réfraction étoit de 9′ 47″ $\frac{1}{2}$ à cette hauteur, tandis que, ſuivant la table de M. Caſſini, elle devoit être de 11′ 7″. Le thermomètre qui avoit monté à 23°, vers les trois heures, étoit encore ſur les neuf heures du ſoir à 18°, ainſi la réfraction étoit plus petite de 1′ 20″ que ſuivant la table de M. Caſſini. Le 5 Août on la trouva de 9′ 20″ ſeulement, le baromètre étoit à 27 pouces $\frac{1}{2}$.

Au mois de Février 1739, la diſtance de la Chèvre au zénit, obſervée avec le ſecteur, étoit de 3° 9′ 9″, & par conſéquent ſa hauteur méridienne ſous le pole devoit être de 4° 32′ 51″ ; cependant le 4 Février au matin, le thermomètre étant à 5°, la hauteur apparente inférieure fut déterminée de 4° 43′ 22″, la réfraction étoit donc de 10′ 31″, plus grande de 71″ qu'elle n'avoit été le 5 Août 1738.

2227. Le 27 Février 1740, le thermomètre étant à 10° au-deſſous de la congélation, & la vraie hauteur de la Chèvre devant être de 4° 33′ 2″, à la même latitude 48° 51′, cette hauteur parut de 4° 44′ 15″ ; ainſi la réfraction à cette hauteur étoit de 11′ 13″ ; l'obſervation du 26 donnoit 11′ 18″ ; ainſi M. le Monnier établit par ces deux obſervations la réfraction dans le plus

grand froid à Paris, lorſque le thermomètre eſt à 10° au-deſſous de la congélation, de 11′ 15″ à 4° 44′ ¼ de hauteur apparente, tandis qu'elle a été obſervée de 9′ 20″ à 24° au-deſſus de la congélation; la différence eſt à raiſon de 2′ pour 36° du thermomètre. Le baromètre étoit à 28 pouces.

Différence de 2′ pour 36° du thermomètre.

2228. M. le Chevalier de Louville, à Carré, près d'Orléans; M. le Docteur Bévis, à Newington, près de Londres, avoient fait auſſi de ſemblables obſervations, & M. le Monnier en avoit déduit les réfractions, mais il ne les a point publiées. (*Hiſt. céleſt. pag.* xxxjii).

2229. Les changemens de la réfraction horizontale pourroient peut-être ſe reconnoître par la ſeule obſervation des amplitudes; M. le Monnier remarque, par exemple, que de la hauteur de Chatillon, près Paris, où eſt bâti l'obſervatoire de M. le Prince de Croy, l'on peut appercevoir le lever & le coucher de la lyre, & qu'une ſeule minute de variation dans la réfraction horizontale en produit 29 dans la diſtance apparente des verticaux du lever & du coucher; ce ſeroit peut-être un moyen d'obſerver les variations relatives au thermomètre & au baromètre, avec aſſez de préciſion. (*Mém. acad.* 1766, *pag.* 611). Mais il y a trop peu de beaux jours à Paris, pour qu'on puiſſe eſpérer beaucoup d'une pareille méthode.

2230. De ces différences de réfraction en différentes ſaiſons de l'année, on eſt porté à conclure que les différens climats de la terre doivent auſſi éprouver des réfractions différentes; on avoit cru que dans le nord les réfractions augmentoient conſidérablement. (*Mém. acad.* 1700, *pag.* 37); elles alloient même juſqu'à un degré par les obſervations de Bilberg & de Spole, Mathématiciens de Charles XI, Roi de Suède; mais probablement il s'étoit gliſſé quelque erreur dans leur obſervation.

L'examen des réfractions dans le nord étoit un des objets que ſe propoſerent les Académiciens qui allerent en Suède en 1736, & voici ce que M. le Monnier en rapporte.

2231.

2231. Le 5 Janvier 1737, à Tornea ſur les confins de la Laponie où nos Académiciens étoient allé meſurer la baſe qui devoit ſervir à leurs triangles, le thermomètre marquoit 31° au-deſſous de la glace à 11^h du matin, un peu avant le lever du ſoleil; le même jour la réfraction fut déterminée par l'obſervation du ſoleil à midi de 20′ 3″ à la hauteur de 2° 9′ $\frac{1}{2}$, ce qui étoit conforme à la table de M. Caſſini.

Le 7, la réfraction fut trouvée d'une minute plus grande que ſuivant la table, ou de 20′ 10″ à la hauteur de 2° 24′ $\frac{1}{2}$, mais quelquefois on la trouva d'une minute plus petite, ſur-tout quand le thermomètre étoit aux environs de la congélation; enfin *l'on fut obligé de conclure que les réfractions étoient les mêmes au cercle polaire qu'à Paris*, parce qu'elles furent trouvées aſſez ſouvent d'accord avec la table de M. Caſſini, principalement dans les plus grands froids. (*Hiſt. céleſt. pag.* XII.). Réfractions égales dans le Nord.

2232. M. de la Caille étant en Afrique, ſe propoſa auſſi d'examiner ſi les réfractions étoient égales au Cap & à Paris; pour cela, il choiſit deux étoiles telles que γ du Sagittaire, & β du Cocher; la premiere paſſe à 4° du zénit du Cap & à 79° de celui de Paris; la ſeconde paſſe à 4° du zénit de Paris, & à 79° de celui du Cap; ſi la diſtance de ces deux étoiles ne paroît pas la même au Cap & à Paris, c'eſt-à-dire, ſi la réfraction accourcit plus leur diſtance à Paris qu'au Cap, c'eſt une preuve que la réfraction eſt plus forte à Paris, & M. de la Caille trouva en effet 7″ ſur 5′ 12″, c'eſt-à-dire, un 44e de plus à Paris. Ayant formé ainſi 47 comparaiſons de différentes étoiles priſes deux à deux; il n'y en eut que 7 qui indiquèrent une réfraction plus petite à Paris, toutes les autres la donnèrent plus grande; il y en eut qui donnèrent même un ſeizième de plus, mais la quantité moyenne entre toutes eſt un quarantième. (*Mém. acad.* 1755, *pag.* 562).

2233. Cette différence paroît à M. de la Caille aſſez petite pour lui faire tirer cette concluſion définitive, « que l'on peut, ſans craindre des erreurs ſen- Et dans toute la Zone Tempérée.

» ſibles, ſe ſervir dans toute l'étendue des zones tem-» pérées d'une même table de réfractions, quand même » un obſervateur la trouveroit un peu en défaut par des » obſervations faites près de ſon horizon, parce qu'on » doit attribuer l'erreur apparente à la réfraction ter-» reſtre & aux autres circonſtances locales ».

Dans la Zone Torride.

2234. Pour déterminer les réfractions dans la Zone Torride, M. Bouguer fit au Pérou différentes obſervations dont on trouve le réſultat dans les mémoires de 1739; il deſcendit encore en 1740, dans une Iſle de la riviere des Emeraudes, nommée alors l'Iſle de l'Inca, & qui a été appellée depuis ce temps-là l'Iſle de l'Obſervatoire; & il y détermina les réfractions horizontales depuis 1 juſqu'à 7°: la table qu'il dreſſa fait voir que les réfractions y ſont plus petites environ d'une ſeptième partie qu'elles ne ſont en Europe; cette table eſt dans les mémoires de 1739; la réfraction horizontale y eſt de 27′; à 6° de hauteur elle eſt de 7′ 4″, & à 45° de 44″. M. Bouguer a donné enſuite une table de réfraction pour Quito, qui eſt plus élevé au-deſſus du niveau de la mer. (*Mém. acad.* 1749), & je l'ai inſérée dans la *Connoiſſ. des mouv. céleſt. pour* 1765.

Diminution des Réfractions lorſqu'on s'éleve.

2235. M. Romer étoit perſuadé que ſur des lieux élevés les réfractions devoient être plus grandes, (*Horrebow Atrium Aſtron. pag.* 6 *&* 83), & on le croyoit aſſez généralement avant le voyage du Pérou. Pour décider cette queſtion, M. Bouguer obſerva au mois de Décembre 1738 la réfraction à Chimboraço 2388 toiſes au-deſſus du niveau de la mer, il n'y trouva la réfraction horizontale que de $19' \frac{1}{4}$ (*Mém. acad.* 1749, *pag.* 79 *&* 82); à la croix de Pitchincha qui eſt à 2044 toiſes il la trouva de 20′ 48″; à Quito, qui eſt élevé de 1479 toiſes, de 22′ 50″; enfin au niveau de la mer de 27′. Ces obſervations, jointes à la théorie (2219), lui firent établir cette règle générale: ſi l'on prend l'excès de de 5158 toiſes ſur l'élévation des lieux par rapport au niveau de la mer, les réfractions y ſont comme les racines de ces excès. Ainſi la racine carrée de 5158

eſt à 27′, réfraction horizontale au niveau de la mer dans la Zone Torride, comme la racine carrée de l'excès de 5158 toiſes ſur la hauteur du poſte propoſé ſera à la réfraction horizontale. Nous en avons fait voir la raiſon (2221). La quantité de 5158 toiſes eſt la hauteur au-deſſus de laquelle la matiere réfractive ne produit plus d'effet ſenſible, du moins dans la Zone Torride.

Changement de Réfraction relatif au baromètre.

2236. Ayant reconnu que les réfractions étoient plus petites le jour que la nuit; plus petites l'été que l'hyver, & plus petites dans la Zone Torride que dans les Zones Tempérées; il étoit naturel de chercher combien, dans le même pays, il devoit y avoir de différence lorſque l'air y étoit plus ou moins denſe, plus ou moins peſant; par exemple, on prend pour terme moyen de la peſanteur de l'air, le cas où il ſoutient le mercure dans le baromètre à 28 pouces de hauteur meſure de Paris; mais cette élévation change à Paris depuis 26 pouces 3 lignes, juſqu'à 28 pouces 9 lignes, quoique ces extrêmes ſoient très-rares, & la réfraction doit changer à proportion (2225).

2237. Si l'on établit les réfractions moyennes pour 28 pouces, on devra les trouver plus petites d'une 28e partie quand le Mercure deſcendra d'un pouce, c'eſt-à-dire, quand le poids de l'air aura diminué d'un 28e; ſur le ſommet de Pitchincha, le mercure n'alloit qu'à 15 pouces 11 lignes, auſſi la réfraction y étoit-elle très-petite. Il en ſera de même de tous les autres cas: la variation de la réfraction ſera toujours à la réfraction moyenne, comme le changement du baromètre eſt à ſa hauteur moyenne 28 pouces (2225).

2238. Cette règle adoptée d'abord par M. Halley (2225), confirmée enſuite par M. Euler dans les calculs qu'il a donnés ſur le changement des réfractions, (*Mém. de Berlin* 1754, *pag.* 168), a été ſuivie par M. Mayer & par M. de la Caille; & les obſervations du baromètre que M. de l'Iſle a faites chaque jour à Paris pendant pluſieurs années, ont ſervi à réduire les réfractions obſer-

vées par M. de la Caille, à leur quantité moyenne; toutes les fois que dans le temps des obſervations le baromètre différoit de 28 pouces. Ces réfractions ainſi corrigées ſe ſont trouvées d'une régularité qui prouve la bonté de cette règle, & M. de la Caille a fait en conſéquence une table (2240), où l'on voit quelle fraction ou quelle partie de réfraction il faut ajouter à la moyenne, ou en ôter, pour avoir la réfraction actuelle & apparente quand le mercure eſt au-deſſus ou au-deſſous de 28 pouces; cette quantité eſt, par exemple, de $\frac{1}{14}$ de la réfraction moyenne, quand le baromètre eſt à 26 pouces; parce que 2 pouces ſont $\frac{1}{14}$ de 28; c'eſt ſur ce principe qu'on a dreſſé la table du changement des réfractions, ou des denſités de l'air pour chaque hauteur du thermomètre & du baromètre, qui eſt à la ſuite de nos tables. On en trouve auſſi une dans les tables de M. Mayer, publiée à Londres en 1770, avec laquelle il étoit perſuadé qu'on pouvoit repréſenter les réfractions dans tous les pays de la terre.

Changement relatif au thermomètre.

2239. Les changemens que la chaleur produit dans les réfractions, ont été déterminés par obſervation. M. de la Caille a trouvé que les refractions diminuent d'une vingt-ſeptième partie, quand le mercure change de 10 degrés ſur le thermomètre de M. de Reaumur (129); il prend pour réfraction moyenne celle qui a lieu, quand le thermomètre eſt à la température moyenne des caves de l'Obſervatoire, c'eſt-à-dire, à 10° ſur le thermomètre de M. de Réaumur, 134 de M. de l'Iſle, & $54\frac{1}{2}$ de Farenheit.

M. Mayer le trouve par obſervation.

M. Mayer, qui depuis pluſieurs années obſervoit à à Gottingen, avec un excellent quart-de-cercle mural de ſix pieds de rayon, conſtruit à Londres par Bird, avoit communiqué à M. de la Caille pluſieurs obſervations faites pour déterminer les réfractions; il trouvoit que la réfraction moyenne changeoit de $\frac{1}{11}$, ſoit pour 15 lignes de variation dans le baromètre, ſoit pour 10° de changement dans le thermomètre, en prenant pour réfraction moyenne, celle qui répond à 28 pouces du

baromètre, & à 0° du thermomètre, c'eſt-à-dire, à la premiere congélation. Cette proportion avoit lieu, ſelon lui, depuis 10° de hauteur juſqu'au zénit, & il étoit perſuadé que la réfraction étoit la même ſur toute la ſurface de la terre, ſans autre variation que celle du thermomètre & du baromètre.

2240. M. de la Caille, d'après la formule de M. Mayer, dreſſa deux tables fort amples des variations, qui répondent aux différentes hauteurs du thermomètre & du baromètre, il corrigea au moyen de ces deux tables toutes ſes obſervations des étoiles faites à Paris depuis 7° de hauteur juſqu'à 36, & au Cap, depuis $5°\frac{2}{3}$ de hauteur juſqu'à 30; il trouva en général que ces équations rétabliſſoient aſſez bien les inégalités des diſtances apparentes d'une même étoile au zénit, obſervées en différentes ſaiſons & en différens états de l'atmoſphère. Cependant la correction qui répondoit aux variations du thermomètre lui parut un peu trop grande; & après pluſieurs eſſais, il jugea qu'il falloit la faire égale tout au plus à $\frac{1}{27}$ des réfractions moyennes qui conviennent à 10° du thermomètre. Ayant conſtaté cette valeur, il réduiſit en une ſeule table à double entrée les deux corrections, & il les employa à réduire toutes ſes hauteurs obſervées, à une température moyenne. L'exactitude de cette table fut conſtatée par le réſultat de 243 comparaiſons différentes corrigées d'après les équations qu'elle indique, la moitié de ces obſervations ne diffèrent que de 2″ du réſultat qu'on devoit avoir, & il n'y en a pas un quart où la différence ſoit de plus de 6″; on trouvera cette table dans mon *Expoſition du calcul aſtronomique*, pag. 252, & dans l'édition Françoiſe que j'ai donnée en 1759 des tables de Halley pour les planètes. M. de la Caille a repréſenté toutes ſes obſervations d'une maniere très-ſatisfaiſante, au moyen de cette table; en effet les diſtances entre le parallèle du Cap & ceux de Paris, de Greenwich, de Berlin, de Bologne & de Gottingen, corrigées par la ſeule table des réfractions moyennes, paroiſſoient toujours

M. de la Caille diminue cette quantité.

Table des denſités de l'air.

plus petites lorſqu'il comparoit des obſervations faites dans les temps froids, & plus grande dans les autres: de 243 comparaiſons que M. de la Caille a faites entre le Cap & Paris, il n'y en a que 7 qui donnent 10″ de plus que 82° 46′ 42″ diſtance vraie des parallèles de Paris & du Cap, & 3 qui donnent 10″ de moins; il y a 198 comparaiſons qui ne s'en écartent pas de plus de 6″, & 119 qui la donnent à 2″ près.

2241. M. Bonne ayant fait enſuite des expériences & des calculs ſur ces denſités de l'air & comparé beaucoup d'obſervations avec une très-grande ſagacité, a fait une autre table du changement de la réfraction ou des denſités de l'air; il ſuppoſe la réfraction moyenne pour 10° & pour 28 pouces égale à 1, & en changeant la température, pour la même hauteur du baromètre, c'eſt-à-dire 28 pouces, il trouve pour 30° de chaleur 0,920, & pour 8° de froid 1,085. La table qu'il a dreſſée en conſéquence eſt à la fin de nos tables aſtronomiques, elle eſt fondée ſur ce que la denſité de l'air exprimée dans la table eſt égale au volume de l'air à la température, multiplié par la hauteur actuelle du baromètre, diviſé par le volume qui répond à la chaleur actuelle, multiplié par la hauteur moyenne du baromètre.

2242. Pour réduire cette formule en table, il faut ſuppoſer le volume de l'air au tempéré égal à 229 parties (a); pour avoir enſuite le volume qui répond à la chaleur actuelle, on y ajoutera autant d'unités qu'il y aura de degrés au-deſſus de la température, ou bien

(a) Ce nombre 229 exprime le volume total de l'air au tempéré, en ſuppoſant que le changement total ſoit de 90 parties, comme dans un thermomètre à Mercure qu'on fait paſſer de la glace à l'eau bouillante; M. Bonne a déterminé ce nombre 229 en faiſant ſoutenir une goutte de Mercure par l'air d'un thermomètre, mis à la glace & à l'eau bouillante; le nombre de lignes cubes de l'eſpace que la goutte de Mercure a parcouru, eſt à 90, comme le nombre de lignes cubes, compris dans la boule & le tube au-deſſous de la congélation, eſt à 229, & il a trouvé le même réſultat par les calculs faits d'après les obſervations de M. Mayer, de M. de la Caille & de M. de Luc; c'eſt une choſe aſſez ſinguliere obſervée par M. Bonne que les volumes de l'air, à la glace & à l'eau bouillante, ſont entr'eux comme le côté d'un carré eſt à ſa diagonale.

l'on en ôtera autant d'unités qu'il y aura de degrés au-deſſous de la même température ; par exemple, pour 30° du thermomètre on ajoutera 20, & l'on aura 249, volume répondant à la chaleur actuelle de 30° ; pour 8° au-deſſous de la congélation, on ôtera 8 & l'on aura 211. Ainſi la formule pour 30° & 27 pouces du baromètre eſt $\frac{225}{336} \times \frac{324}{249} = 0{,}887$, tel eſt le fondement de la table que j'ai adoptée.

Effet de la Réfraction ſur la hauteur du pole à Paris.

2243. L'INCERTITUDE que l'on a ſur la hauteur du pole à Paris vient de l'incertitude de la réfraction à 49° de hauteur ; c'eſt donc ici le lieu de parler de cette hauteur du pole & de la réfraction qui y convient. La latitude du milieu de Paris, qui eſt de 48° 51′ 22″, étoit marquée de 48° 30′ dans la Géographie de Ptolomée (II. 8.), de 48° 40′ dans Oroncé Finé, qui vivoit en 1528, dans Fernel ſon contemporain, dans Merſenne, Bourdin, Alleaume ; elle eſt de 48° 49′ dans Viete, (*Reſponſorum*, *L. II.*), de 48° 50′ dans le Comte de Pagan, Morin & Duret ; de 48° 51′ dans Boulliaud ; de 48° 52′ dans Midorge & Gaſſendi, en 1625 ; de 48° 54′ dans Roberval & Henrion. (*Coſmo. pag.* 328) ; de 48° 55′ dans la même Coſmographie, *pag.* 325, c'étoit en 1614. M. Petit, Intendant des Fortifications, la trouva en 1652 par les hauteurs méridiennes du ſoleil de 48° 53′ 10″, & en 1654 de 48° 52′ 41″. MM. Roberval & Buot en 1667, 48° 53′ au Jardin de la Bibliothèque du Roi. Ce ne fut qu'à l'époque de l'application des lunettes aux quart-de-cercles qu'on eut de la préciſion & de la certitude ſur cet article fondamental de l'aſtronomie ; la hauteur du ſoleil au ſolſtice d'été, le 21 Juin 1667, priſe à l'endroit déſigné pour le bâtiment de l'Obſervatoire Royal, fut trouvée de 64° 41′ quantité trop grande de près de 2′ ; ce ne fut qu'à

la fin de l'été que ſe fit cette découverte importante pour la perfection des quarts-de-cercle. Il faut obſerver auſſi que nous ne ſavons pas à quel endroit de Paris quelques-unes de ces obſervations furent faites, & que depuis la Porte Montmartre, vers laquelle M. Picard obſervoit en 1766, juſqu'à l'Obſervatoire Royal, il y a plus de 2000 toiſes de différence en latitude.

Hauteur du pole conſtante.

La hauteur du pole eſt conſtante, c'eſt une vérité reçue de tous les aſtronomes; M. Manfredi avoit cru reconnoître une variation dans celle de Bologne, par la comparaiſon des ſolſtices d'hiver & d'été obſervés à la méridienne de S. Petrone depuis 80 ans, (*De gnomone Bonon.* cap. 16); mais je ſuis perſuadé qu'il faut attribuer à des circonſtanees locales, les différences qu'il a trouvées.

2244. La hauteur apparente du pole en 1667, fut obſervée à Paris par M. Picard, au Jardin de la Bibliothèque du Roi, de 48° 53′; d'où il réſulte qu'à l'Obſervatoire Royal, la hauteur apparente du pole étoit de 48° 51′ 10″; on ne comptoit pas beaucoup alors ſur la différence de la hauteur vraie à la hauteur apparente, quoique M. Caſſini l'eût indiquée; ſi l'on en ôte 53″, on aura pour la hauteur vraie 48° 50′ 17″ par les obſervations de 1667.

M. de la Hire obſerva dans la ſuite la hauteur apparente 48° 51′ 2″; & comme il augmentoit la réfraction & diminuoit la parallaxe du ſoleil, il trouva la vraie hauteur 48° 49′ 58″; mais M. le Monnier a fait voir, (*Hiſt. céleſt. pag.* XIX), que le quart-de-cercle de 32 pouces de rayon, dont M. Picard & M. de la Hire ſe ſervirent, n'étoit pas auſſi exact que ces aſtronomes le croyoient, & qu'il ne falloit pas compter ſur cette détermination à quelques ſecondes près.

Suivant M. de Louville (*Mém. acad.* 1721), la hauteur apparente du pole à l'Obſervatoire étoit 48° 50′ 58″, il en ôte 50″ pour la réfraction, ce qui donne la hauteur vraie 48° 50′ 8″.

M. Maraldi (*Mém. acad.* 1733), trouve 48° 50′ 12″;

&

& M. le Monnier y ajoute 2″ de plus, à cauſe de la réfraction, (*Mém. acad.* 1739), ce qui donne 48° 50′ 14″.

M. le Monnier par des obſervations de l'étoile polaire, faites en 1738, trouva la hauteur apparente du pole 48° 51′ 4″, il en conclut la hauteur vraie 48° 50′ 14″, (*Mém. acad.* 1739, *pag.* 220). Par d'autres obſervations faites en 1740, il jugea la hauteur apparente du pole à l'obſervatoire royal 48° 51′ 9″, & la hauteur vraie 48° 50′ 15″, la réfraction étant de 54″ lorſque le thermomètre étoit à 3° au-deſſous de la congélation, (*Hiſt. céleſt. pag.* XXXVII).

M. Caſſini de Thury au moyen d'un quart-de-cercle de 6 pieds de rayon, qui venoit d'être conſtruit pour l'obſervatoire, trouva la hauteur du pole en 1742, de 48° 50′ 12″ & de 48° 50′ 9″, en employant les deux lunettes différentes, & en ſuppoſant la réfraction de 52″ à la hauteur du pole; s'il avoit ſuppoſé la réfraction de 58″, comme M. de la Caille, il n'auroit trouvé par ſes obſervations que 48° 50′ 5″, (*Mém. acad.* 1744).

2245. Enfin, M. l'Abbé de la Caille après un nouveau travail ſur les réfractions, fait avec deux ſecteurs différens de 6 pieds de rayons, vérifiés une multitude de fois & avec les ſoins les plus ſcrupuleux, a jugé par un très-grand nombre d'obſervations, que la réfraction à la hauteur du pole de Paris étoit de 58″2, & la vraie hauteur du pole à l'obſervatoire royal de Paris 48° 50′ 14″, (*Mém. acad.* 1755, *pag.* 569). Vraie latit. à Paris 48° 50′ 14″.

Ainſi M. de la Caille avec une réfraction plus grande de 6″ que M. Caſſini ne la ſuppoſoit, (ce qui devoit diminuer la hauteur du pole), a trouvé cependant encore 4″ de plus pour la hauteur du pole, ainſi il y a 10″ de différence entre ces obſervations; au reſte ces différences ſont aſſez petites pour prouver que la hauteur du pole ne varie point dans un même lieu; c'eſt-à-dire, que le mouvement diurne de la terre ſe fait toujours ſenſiblement ſur le même axe, & autour des mêmes

points. Cette hauteur du pole de 48° 50′ 14″ eſt celle dont j'ai coutume de me ſervir.

Autres effets de la Réfraction.

Sur les diamètres.

2246. Lorsque le bord inférieur du ſoleil ou de la lune paroît à l'horizon, ſi la grandeur réelle du diamètre de l'aſtre eſt de 30′, la réfraction étant plus petite d'environ 4′ 21″ à 30′ de hauteur apparente qu'elle n'eſt à l'horizon, le bord ſupérieur du ſoleil étant beaucoup moins élevé par la réfraction que le bord inférieur, le diamètre vertical paroîtra plus court que le diamètre horizontal; voilà pourquoi le ſoleil paroît ovale quand il ſe leve ou qu'il ſe couche; M. de Mairan a vu le ſoleil ſenſiblement elliptique, même à 10° de hauteur ſur l'horizon, le 28 Juin 1733, (*Mém. acad.* 1733, *pag.* 329).

Cet effet des réfractions ne fut pas inconnu aux anciens: Diodore de Sicile parle avec étonnement d'un pays où le ſoleil ne paroît point rond, mais un peu applati; il paroît que ce fait étoit emprunté d'Agatharchides, qui avoit auſſi parlé d'un pays où le jour ne duroit que trois heures; le paſſage entier mérite d'être lu.

Cet accourciſſement du diamètre vertical a lieu proportionellement ſur tous les diamètres inclinés, du ſoleil & de la lune; or les aſtronomes faiſant un uſage continuel de ces diamètres obſervés dans tous les ſens, il eſt important d'en tenir compte dans le calcul; j'en ai donné une table dans mon *Expoſition du calcul aſtronomique*, & on la trouvera encore parmi les tables qui ſont à la fin du premier volume de cet ouvrage. T. LXXXIII.

Pour en expoſer la conſtruction, je ſuppoſe d'abord que la figure du diamètre du ſoleil eſt ſenſiblement elliptique par l'effet de la réfraction; cela eſt vrai du moins au-delà de 3 ou 4° de hauteur; car la réfraction étant alors uniforme, l'accourciſſement de la réfraction eſt proportionel à la quantité des cordes verticales du

diſque ſolaire qui ſont affectées de la réfraction ; c'eſt-à-dire, qu'une corde de 15′ eſt accourcie moitié moins que celle de 30′ ; or quand on diminue proportionellement toutes les ordonnées d'un cercle, on a celles d'une ellipſe (3256).

Dans une ellipſe qui eſt peu excentrique les diminutions des rayons, en s'éloignant du grand axe, ſont ſenſiblement comme les carrés des ſinus des diſtances au ſommet (2680) ; ainſi quand on a obſervé un diamètre incliné, par exemple, le diamètre de la lune dans le ſens des cornes, l'accourciſſement diminue comme le carré du coſinus de l'angle que fait la ligne des cornes avec la verticale.

Par exemple, la lune en quadrature ayant été obſervée avec un micromètre, on a trouvé ſon diamètre de 33′ 10″ dans la direction de la ligne des cornes, & l'on a eſtimé que cette ligne faiſoit avec la ligne horizontale un angle de 30°, la lune ayant 20° de hauteur ; on trouve dans la table au-deſſous de 20°, & vis-à-vis de 30°, 1″,0, mais comme le diamètre eſt de 33′ au lieu de 30′ que ſuppoſe la table, il faut augmenter cette correction proportionellement, ou de 0″ 1, & l'on aura 1″ 1, pour l'accourciſſement cherché.

Si l'on vouloit avoir cet accourciſſement pour le cas où la hauteur de la lune eſt moindre que 2°, il faudroit le calculer plus rigoureuſement, mais il eſt bien rare qu'on en ait beſoin dans ce cas-là.

Sur les diſtances.

2247. On doit corriger de la même maniere les diſtances meſurées ſur le diſque du ſoleil entre le bord & une tache ou une planète, telle que Mercure & Vénus ; cette correction eſt alors proportionnelle à la diſtance meſurée ; la table ne donne ſa valeur que pour une diſtance égale au diamètre dans le ſens où l'on a meſuré.

2248. La maniere de corriger les grandes diſtances obſervées entre deux aſtres & de les dégager de l'effet des réfractions, ſera expliquée dans le XXIVe livre, à l'occaſion de l'uſage qu'on en fait pour trouver les longitudes en mer (3982).

Sur les éclipſes.

2249. C'eſt auſſi par l'effet des réfractions qu'il arrive qu'on a vu la lune éclipſée, tandis que le ſoleil étoit encore ſur l'horizon, Pline raconte le fait (II. 13), auſſi-bien que Cléomèdes (II. 6); mais celui-ci regardoit la choſe comme impoſſible; nous l'avons vu arriver à Paris le 19 Juillet 1750 : le ſoleil & la lune, quoique réellement oppoſés, étoient rapprochés d'un degré par l'effet des deux réfractions.

Des Réfractions terreſtres ; & des accidens de Réfraction.

2250. Les réfractions terrestres ſont celles qui ont lieu entre deux points de la terre, tels que *M* & *L*, (*fig.* 141); ſi l'on ſuppoſe l'obſervateur en *M* meſurant la hauteur d'une montagne en *L*, le rayon *LGM* en s'approchant de la terre en *G*, & s'en éloignant en *M*, prend une courbure conſidérable, ce qui fait paroître l'objet *L* hors de ſa véritable place, & ſur le rayon *MGF*.

Fig. 141.

Cas où les aſtres paroiſſent plus bas que l'horizon.

2251. La réfraction terreſtre ſe joint quelquefois à la réfraction aſtronomique, parce qu'il y a des cas où l'obſervateur étant fort élevé voit les aſtres au-deſſous de la ligne horizontale : la différence peut devenir extrêmement conſidérable. M. Bouguer étant à Chimboraço 2388 toiſes au-deſſus du niveau de la mer, & obſervant le ſoleil à l'horizon lorſqu'il ſe couchoit, la réfraction horizontale étoit de 19′ 45″; mais le ſoleil étant parvenu à 1° de dépreſſion apparente, la réfraction étoit déja de 30′, & même de 34′ 47″ à 1° 17′ de dépreſſion apparente, par l'effet de la réfraction terreſtre; (*Mém. acad.* 1749, *pag.* 79); nous en avons donné la démonſtration (2220).

2252. Soit *M*, l'obſervateur ſur le ſommet d'une haute montagne; *MH* la ligne du niveau appparent ou de l'horizon rationel & aſtronomique; *S* le ſoleil, dont le rayon *SRLM* ſe courbe en entrant dans l'atmoſphère

en *R*, & arrive à l'œil *M*, en ſe confondant avec la tangente *FGM*; la dépreſſion apparente du ſoleil eſt l'angle *HMF*; la partie la plus baſſe *MGL* du rayon ſolaire eſt égale de part & d'autre du point *G*, qui eſt le plus près de la ſurface de la terre *T*; l'inclinaiſon en *L* eſt la même qu'en *M*, ſi l'on ſuppoſe le point *L* auſſi élevé que le point *M* au-deſſus de la terre. Si donc on ſuppoſe l'angle *MCL* de deux degrés, l'angle *HML* d'un degré, l'obſervateur en *L* verroit l'aſtre *S* un degré au-deſſus de l'horizon, au lieu de le voir un degré au-deſſous, & la courbure de la partie *RL* du rayon ſeroit la réfraction aſtronomique pour un degré d'élévation apparente; mais la ſeconde courbure de *L* en *M* eſt plus conſidérable, c'eſt une réfraction terreſtre, qui ajoutée à la réfraction aſtronomique pour un degré de hauteur apparente, forme la réfraction pour un degré de dépreſſion apparente; & cette même réfraction terreſtre eſt celle qu'on éprouveroit, ſi du point *M* on obſervoit la hauteur apparente de l'objet terreſtre *L*: cette réfraction eſt à peu-près la ſeptième partie de l'arc de la terre compris entre *M* & *L*, ou de l'angle *MCL* décrit par le rayon, pendant ſon trajet dans l'atmoſphère (2205); quelquefois M. Bouguer l'a ſuppoſée d'un neuvième, (*Mém. acad.* 1749, *pag.* 101); mais en ſuppoſant un ſeptième, il s'enſuit que ſur une diſtance de 950 toiſes ou d'une minute, cette réfraction ſeroit de $8'' \frac{1}{2}$; ainſi l'on doit retrancher de chaque hauteur obſervée, ou ajouter à chaque dépreſſion la moitié de cette réfraction, ou $\frac{1}{14}$ de l'intervalle des deux ſtations. Il y a ſur cette matiere une petite diſſertation de M. Mayer intitulée : *Programma de refractionibus objectorum terreſtrium*, (Gotting. 1751), & un ouvrage de M. Lambert intitulé : *Les propriétés remarquables de la route de la lumière par les airs, & en général par pluſieurs milieux réfringens, ſphériques & concentriques, avec la ſolution des problêmes qui y ont du rapport, comme ſont les réfractions aſtronomiques & terreſtres, & ce qui en dépend*, par J. H. Lambert, à la Haye, chez Nicolas Van-Daalen 1759,

Fig. 141.

Quantité de la Réfraction terreſtre.

116 pages *in*-8°. Il y traite de la réfraction à différentes hauteurs, de la réfraction terreſtre, des hauteurs des montagnes, meſurées par le moyen du baromètre, ou par des triangles, de la correction des hauteurs des objets terreſtres que M. Caſſini avoit déterminées dans le livre de la figure de la terre; il prouve que la réfraction terreſtre eſt $\frac{1}{14}$ de la courbure de la terre, le rayon oſculateur de la courbe de la lumière étant 7 fois le rayon de la terre.

2253. C'eſt ainſi que le P. Boſcovich corrige les hauteurs des ſignaux dans ſa meſure du degré en Italie. Le ſignal placé au ſommet de Carpegna, vu de l'extrémité occidentale de la baſe de Rimini, étoit à 87° 53′ du zénit, & cette extrémité vue du ſignal de Carpegna, étoit à 92° 24′ 10″ du zénit; la ſomme de ces arcs eſt de 180° 17′ 10″ au lieu de 19′ 11″ que l'excès auroit été, à raiſon de la diſtance, en négligeant l'effet de la réfraction. (*De litteraria expeditione, &c. pag.* 162). La hauteur de chaque objet étoit augmentée de plus d'une minute par la réfraction, auſſi le P. Boſcovich ſuppoſe 87° 54′ 0″ & 92° 25′ 11″ pour les diſtances de chacun des objets par rapport au zénit.

Irrégularités des réfractions horiz.

2254. Les changemens réguliers, qui peuvent ſe meſurer & ſe prédire par le moyen du thermomètre (2239) & du baromètre (2237), ne ſont pas les ſeuls qu'on apperçoive dans les réfractions : il y a des changemens irréguliers qu'on ne ſauroit calculer, & qui viennent principalement de la partie inférieure de l'atmoſphère (2223). M. de Mairan avoit déja remarqué (*Mém. acad.* 1721), que plus la couche des vapeurs denſes eſt près de la ſurface de la terre, plus les réfractions en ſont augmentées; M. Bouguer a fait voir auſſi (*Mém. acad.* 1749, *pag.* 108), que les changemens de réfractions ne viennent pas d'un changement de l'atmoſphère entière, mais ſeulement de la partie la plus baſſe : voici comme il le prouve. Lorſqu'on eſt ſur le ſommet de Pitchincha où le baromètre n'a que 16 pouces de hauteur, la couche d'air qu'on a au-deſſous de ſoi, ou la

colonne d'air qui s'étend depuis le niveau de la mer juſqu'à la hauteur de la montagne équivaut à 12 pouces de mercure, car les deux enſemble produiſent une hauteur de 28 pouces; ſi toute la maſſe de l'air ſe dilatoit alors de $\frac{1}{48}$ ſeulement, il y auroit $\frac{1}{48}$ de la colonne inférieure qui s'éleveroit ſur Pitchincha, le poids de la colonne ſupérieure y augmenteroit, & le baromètre y monteroit de 3 lignes, car $\frac{1}{48}$ de 12 pouces fait trois lignes; cependant l'obſervation a prouvé qu'il n'y a point de pareil changement du baromètre ſur les hautes montagnes, & que le mercure y varie à peine d'une ligne; c'eſt une preuve que les différences d'un ſixième obſervées dans la réfraction au-deſſous de ces montagnes, comme à Quito, entre le jour & la nuit, ne viennent que du changement de l'air qui s'eſt fait au-deſſous du ſommet; ce changement d'une ligne dans le baromètre qui a lieu ſur les montagnes, ne peut produire que $\frac{1}{144}$ de différence dans la réfraction, puiſqu'il ne prouve que $\frac{1}{144}$ de dilatation dans l'atmoſphère (2237).

Les réfractions ſont ſur-tout inégales quand il vient un filet de vent froid au travers d'une maſſe d'air échauffé, ou quand il arrive de ces cauſes météorologiques qui rompent les colonnes de l'air & font baiſſer le baromètre quelquefois de deux pouces. (*Anciens mémoires de l'académie, tom. II, pag.* 87).

2255. On apperçoit à Paris que les réfractions voiſines de l'horizon ſont ſenſiblement affectées par les vapeurs & les fumées qui s'élèvent de deſſus la ville, ſituée au nord de l'obſervatoire royal. Les vapeurs & l'humidité de l'air influent beaucoup ſur les réfractions, de même que la ſituation des lieux plus ou moins élevés, le voiſinage des villes, des montagnes, des fôrêts, des rivieres, ou des pleines arides; auſſi M. de la Caille étoit perſuadé qu'un aſtronome ne ſauroit jamais avoir près de l'horizon des réfractions purement céleſtes, c'eſt-à-dire, de la nature de celles qui ſe font à 20° de hauteur ou au-deſſus; les ſeules circonſtances locales

produiſent des différences ſi conſidérables dans les réfractions horizontales, qu'il n'a pas même voulu inſérer dans ſa table de réfractions celles qui ont lieu au-deſſous de 6°.

Différences dans l'eſpace de 24 heures.

A différentes heures du jour ces réfractions ſont différentes : on voit des côtes de Gènes & de Provence, les montagnes de l'Iſle de Corſe, à certaines heures du jour ; mais à d'autres heures ces montagnes paroiſſent ſe plonger dans la mer, ſans qu'on puiſſe attribuer cette différence à autre choſe qu'aux réfractions terreſtres, (*Mém. acad.* 1722, *pag.* 348). Le P. Laval à Marſeille trouvoit l'abaiſſement apparent de l'horizon, tantôt de 11′ 46″, & tantôt de 14′ 30″, tandis que l'inclinaiſon véritable du rayon direct qui raſoit la ſurface de la mer devoit être de 13′ 14″, (*Mém. acad.* 1707, *pag.* 195). On trouvera ſur cette matière des obſervations curieuſes dans le Traité de M. de Luc ſur les baromètres & les thermomètres, qui eſt actuellement ſous preſſe à Genève, en 1770.

Tremblement de lumière.

2256. Je dois placer ici un fait aſſez ſingulier, & qui a quelque rapport avec les accidens de réfraction ; M. de la Caille éprouvoit quelquefois au Cap de Bonne-Eſpérance, des ondulations de lumière qui faiſoient trembler les aſtres dans ſa lunette au point de ne pouvoir pas obſerver ; dans ces circonſtances, il ne diſtinguoit pas même les taches de la lune, quoique le ciel fût très-ſerein ; & le demi-diamètre de la lune enflé par cette ondulation paroiſſoit de 3 à 4″ plus grand que dans les autres temps. Nous obſervons en France que le vent de ſud-eſt, lorſqu'il eſt un peu fort, produit quelque choſe de ſemblable, quoique d'une manière beaucoup moins ſenſible qu'au Cap de Bonne-Eſpérance.

Diminution de la lumière.

2257. Les rayons en traverſant obliquement l'atmoſphère ſe diſperſent, enſorte que l'intenſité de la lumière du ſoleil lorſqu'il eſt à l'horizon, eſt 1354 fois moindre que lorſqu'il eſt au zénit, ſuivant les expériences de M. Bouguer : voyez le livre intitulé : *Traité d'Optique ſur la gradation de la lumière*, par M. Bouguer,

à Paris chez Delatour 1760 *in*-4°, & un autre livre qui eſt auſſi très-bon, ſur la même matière : *J. H. Lambert Photometria, ſive de menſura & gradibus luminis, colorum & umbræ ; Auguſtæ Vindelicorum* 1760, 547 *pag. in*-8°. On ſent aſſez que les rayons qui ſe préſentent obliquement à l'entrée de l'atmoſphère doivent être en effet les plus faciles à réfléchir ; chacun a éprouvé par les ricochets d'une pierre jettée ſur la ſurface de l'eau, que plus le choc d'un corps eſt oblique, plus il ſe réfléchit aiſément.

2258. Ce n'eſt pas tant l'atmoſphère que les vapeurs dont elle eſt chargée, qui produiſent l'affoibliſſement de la lumière du ſoleil : M. de Mairan examine cette matière fort au long dans les mémoires de 1719 & 1721, & il conclud que ſi l'atmoſphère toute pure interceptoit à midi dans le ſolſtice d'hiver, ſeulement la cinquième partie de la lumière qui parvient juſqu'à nous dans le ſolſtice d'été, le ſoleil nous ſeroit toujours caché dès qu'il approcheroit de l'horizon, à peu-près comme il l'eſt dans les jours ſombres, ce qui eſt contraire à l'expérience ; il eſt donc certain, continue M. de Mairan, que lorſque la lumière du ſoleil nous paroît ſenſiblement plus foible en hiver qu'en été, cet affoibliſſement doit preſque toujours être attribué aux vapeurs dont la partie inférieure de l'atmoſphère eſt chargée, plutôt qu'à l'atmoſphère proprement dite, quoique traverſée beaucoup plus obliquement.

2259. L'atmoſphère eſt chargée continuellement d'exhalaiſons, de vapeurs, de nuages aqueux ou de feux électriques ; delà naiſſent une multitude de météores, & ſur-tout ces feux que les enfans prennent pour de véritables étoiles, mais qui ne ſont que des exhalaiſons légères, dont la lumière ne dure qu'un inſtant. Etoiles volantes.

Des Crépuscules.

2260. Le crépuscule ou la lumière crépuſculaire qu'on apperçoit vers l'horizon après que le ſoleil eſt

couché, de même que l'aurore qui nous annonce ſon lever, ſont encore des effets ſemblables à celui de la réfraction; c'eſt l'atmoſphère qui réfléchit & qui diſperſe les rayons du ſoleil, enſorte qu'il en parvient juſqu'à nos yeux une partie aſſez forte pour nous empêcher de diſtinguer les aſtres, quoique le ſoleil ſoit au-deſſous de l'horizon.

Arc d'émerſion.

2261. L'ARC D'ÉMERSION d'un aſtre eſt la quantité dont le ſoleil eſt abaiſſé ſous l'horizon dans un vertical, lorſque l'on commence à appercevoir cet aſtre à la vue ſimple. On eſtime ordinairement les arcs d'émerſion de 5° pour Vénus, quoique dans certains temps il ſoit abſolument nul (1197), de 10° pour Mercure & Jupiter, de 11 à 12° pour Mars, Saturne, & les étoiles de première grandeur (218). Cependant Sirius ſe voit en plein jour, dans les pays méridionaux; M. de la Nux l'a vu ſouvent à l'Iſle de Bourbon; *Canopus* eſt une étoile auſſi grande en apparence que Sirius, du moins dans une belle nuit; mais ſa lumière eſt un peu moins blanche, ou un peu plus terne, & on ne la voit pas auſſi facilement dans le crépuſcule. L'arc d'émerſion, ſuivant Ptolomée, eſt de 14° pour les étoiles de troiſième grandeur, (*Riccioli Almag. nov. I.* 659); enfin il eſt d'environ 18° pour les plus petites étoiles, puiſqu'on ne les apperçoit diſtinctement à la vue ſimple que quand le ſoleil eſt abaiſſé de 18°: c'eſt ce qu'on appelle l'abaiſſement du cercle crépulculaire.

Abaiſſement du cercle crépuſculaire.

2262. Cet abaiſſement de 18° eſt ce qui doit décider de la durée du crépuſcule, mais il varie ſans doute ſuivant les temps & les lieux: on peut voir dans le P. Riccioli, (*Almag. nov. I, pag.* 39), une table de toutes les opinions qu'il y a eu ſur la durée des crépuſcules.

2263. Rothman, (ſuivant Tycho), avoit trouvé que le crépuſcule ne finiſſoit complètement que quand le ſoleil étoit deſcendu de 24° ſous l'horizon; ſuivant Nonius dans ſon traité des crépuſcules, c'étoit 16°; ſuivant M. Caſſini 15°; ſuivant le P. Riccioli, c'eſt dans

les équinoxes 16° le matin, 20 ½ le ſoir; dans le ſolſtice d'été 21° 25′ le matin, dans le ſolſtice d'hiver 17° 25′ le matin; il y a apparence que cela varie ſuivant les temps & les lieux; M. de la Caille étant en mer l'a trouvé de 16° 38′ & de 17° 13′, (*Mém. de l'acad.* 1751, *pag.* 454); mais la plupart des aſtronomes prennent 18° pour l'abaiſſement du cercle crépuſculaire.

2264. LA DURÉE DU CRÉPUSCULE eſt donc le temps que le ſoleil emploie à s'abaiſſer de 18°; cette durée varie tous les jours; on trouve dans les œuvres du P. Clavius, (*Tom. III*, *pag.* 275), une table de la durée du crépuſcule depuis 35° juſqu'à 61° de latitude, & pour chaque longitude du ſoleil de trois en trois degrés; on y voit qu'elle varie ſous la latitude de 35° depuis 1^h 28′ juſqu'à 1^h 52′, & ſous celle de 45° depuis 1^h 42′ juſqu'à 2^h 39′; l'inégalité eſt encore plus grande quand on avance vers les poles. Durée du crépuſcule.

2265. Le crépuſcule le plus long de tous arrive toujours au ſolſtice d'été, mais le plus court n'arrive pas au ſolſtice d'hiver; il y a un terme moyen, où ſa durée eſt la moindre, & c'eſt la matière d'un problême *De maximis & minimis*, qui coûta de la peine à M. Bernoulli, & dont la ſolution eſt rapportée dans *l'analyſe des inf. pet.* art. 61 : en voici une ſolution de M. Euler qui eſt plus facile & plus complète; dans laquelle nous donnerons auſſi la durée du plus court crépuſcule. Du plus court crépuſcule.

2266. *TROUVER la déclinaiſon du ſoleil au temps du plus court crépuſcule ſous une latitude donnée, & la durée du crépuſcule le même jour* : ſoit *HO l'horizon*, (*fig.* 35), *CHZPOD* le méridien, *CD* le cercle crépuſculaire abaiſſé de 18° ſous l'horizon (2263), *Z* le zénit du lieu donné, *P* le pole boréal, *FNGM* le parallèle que décrit le ſoleil au temps du plus court crépuſcule, & dont il s'agit de connoître la déclinaiſon, ou la diſtance *PM* au pole; *NM* l'arc du même parallèle qui répond à l'angle horaire *NPM* & qui meſure la durée du plus court crépuſcule. On tirera un autre cercle *TR* parallèle à l'équateur, infiniment proche du parallèle *NM*, *Planche III. Fig.* 35.

Fig. 35. & ſuivant la nature du *Minimum*, ces deux arcs ſeront égaux; parce que le changement ou la différentielle d'une quantité devient zéro, quand cette quantité eſt la plus petite ou la plus grande. Ainſi l'on aura $TR=NM$; mais $TR=FG$ à cauſe du paralléliſme des arcs FG & TR; FT & GR; donc $FN=GM$. De plus $FT=GR$ à cauſe du paralléliſme des deux cercles FG, TR; donc les triangles rectangles FTN, GRM ſont égaux, donc l'angle RMG eſt égal à l'angle TNF. L'angle ZMR & l angle PMG ſont droits, donc l'angle RMG eſt égal à l'angle PMZ. Par la même raiſon $TNF=PNZ$; donc l'angle PNZ égal à l'angle PMZ. Si l'on prend $MQ=90^\circ$ & qu'on tire l'arc PQ, l'on aura le triangle ſphérique PQM égal au triangle ZNP, puiſque $ZN=MQ$, $PN=PM$, & l'angle N égal à l'angle M; donc on aura $PQ=PZ$.

2267. Dans le triangle ZQP l'on a par la trigonométrie (3716) $\text{cof. } ZQP=\frac{\text{cof. } ZP-\text{cof. } QP \text{ cof. } ZQ}{\text{ſin. } QP \text{ ſin. } ZQ}$ $=\frac{\text{cof. } ZP\,(1-\text{cof. } ZQ)}{\text{ſin. } ZP \text{ ſin. } ZQ}$ (parce que $ZP=QP$) $=\frac{\text{cot. } ZP\,(1-\text{cof. } ZQ)}{\text{ſin. } ZQ}$; donc pour ſon ſupplément dont le coſinus eſt négatif (3605), on aura $\frac{-\text{cot. } ZP\,(1-\text{cof. } ZQ)}{\text{ſin. } ZQ}$ $=\text{cof. } PQM$.

Dans le triangle PQM on a par la trigonométrie (3719) $\text{cof. } PM=\text{ſin. } PQ \text{ ſin. } QM \text{ cof. } Q+\text{cof. } PQ \text{ cof. } QM$; mais le ſecond terme eſt nul, puiſque $QM=90^\circ$; de plus $\text{ſin. } QM=1$ donc $\text{cof. } PM=\text{ſin. } PQ \text{ cof. } PQM$ $=\frac{-\text{cot. } ZP\,(1-\text{cof. } ZQ)\text{ ſin. } ZP}{\text{ſin. } ZQ}=\frac{-\text{cof. } ZP\,(1-\text{cof. } ZQ)}{\text{ſin. } ZQ}$; & mettant à la place de $\frac{1-\text{cof. } ZQ}{2}$ ſa valeur $\text{ſin. } \frac{1}{2}\text{ ſin. } QZ$ (3626), on aura $\frac{1}{2}\text{ cof. } PM=\frac{-\text{cof. } ZP \text{ ſin. } \frac{1}{2}ZQ \text{ ſin. } \frac{1}{2}ZQ}{\text{ſin. } ZQ}$. Le dénominateur $\text{ſin. } ZQ=2\text{ ſin. } \frac{1}{2}ZQ \text{ cof. } \frac{1}{2}ZQ$ (3625); ſubſtituant cette valeur dans le dénominateur de l'expreſſion précédente, elle devient $\frac{-\text{cof. } ZP \text{ ſin. } \frac{1}{2}ZQ}{2\text{ cof. } \frac{1}{2}ZQ}=\frac{-\text{cof. } ZP \text{ tang. } \frac{1}{2}ZQ}{2}$ $=\frac{1}{2}\text{ cof. } PM$. Donc $-\text{cof. } PM=\text{cof. } ZP \text{ tang. } \frac{1}{2}ZQ$

d'où l'on tire cette proportion : *Le ſinus total eſt au ſinus de la latitude du lieu donné* (cof. PZ), *comme la tangente de* 9° ($\frac{1}{2}$ ZQ) *eſt au ſinus de la déclinaiſon du ſoleil.* Le ſigne moins indique une déclinaiſon auſtrale.

2268. Pour trouver la durée du plus court crépuſcule, on conſidère que les triangles PQM, ZNP étant égaux (2266), l'angle $QPM = ZPN$; donc $ZPQ = MPN$; or dans le triangle ZPQ, dont les trois côtés ſont donnés, on a pour l'angle P, 2 ſin. $\frac{1}{2} P^2 = \frac{\text{cof.}(PQ - PZ) - \text{cof. } ZQ}{\text{ſin. } PQ \text{ ſin. } PZ}$ (3743) $= \frac{1 - \text{cof. } ZQ}{\text{ſin. } PZ^2}$, parce que $PQ = PZ$; donc ſin. $\frac{1}{2} P^2 = \frac{\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\text{cof. } ZQ}{\text{ſin. } PZ^2} = \frac{\text{ſin. } \frac{1}{2} ZQ^2}{\text{ſin. } PZ^2}$; donc ſin. $\frac{1}{2} P = \frac{\text{ſin. } \frac{1}{2} ZQ}{\text{ſin. } PZ}$; d'où l'on tire cette proportion ; *Le coſinus de la latitude du lieu* (ſin. PZ), *eſt au ſinus de* 9° (ſin. $\frac{1}{2}$ ZQ), *comme le rayon eſt au ſinus de la moitié de l'angle* ZPQ ou NPM, *qui convertie en temps donne la durée du plus court crépuſcule.*

Formule pour le plus court crépuſcule.

Formule pour ſa durée.

2269. Par le moyen de ces deux proportions, on trouve que le plus court crépuſcule arrive à Paris quand le ſoleil a 6° 51′ de déclinaiſon auſtrale, ce qui alieu vers le 2 Mars & le 10 Octobre, & que ſa durée eſt de 1^h 47′. Mais le plus court crépuſcule qui puiſſe avoir lieu ſur la terre eſt ſous l'équateur, au temps de l'équinoxe, & il eſt de 1^h 12′.

La figure du crépuſcule eſt une hyperbole, qui eſt un peu altérée par la réfraction, (*Mém.* 1713, *pag.* 60), on voit en mer dans la Zone Torride cette courbe aſſez bien terminée lorſque le crépuſcule eſt près de finir, au rapport de M. de la Caille.

2270. LA HAUTEUR DE L'ATMOSPHÈRE peut ſe déduire de l'abaiſſement du cercle crépuſculaire ; Képler en fit l'eſſai, & M. de la Hire, (*Mém. acad.* 1713, *pag.* 54), perfectionna cette méthode ; ſoit C le centre de la terre, *fig.* 139, ABD un arc la circonférence de la terre que je ſuppoſe de 18°, BG la hauteur de l'atmoſphère, DG le rayon du ſoleil quand il eſt à 18° au deſſous de l'horizon, c'eſt le premier rayon qui commence

Fig. 139.

Fig. 139. à être réfléchi vers l'obſervateur placé en *A*, par la partie ſupérieure *G* de l'atmoſphère.

Dans le triangle *AGC* rectangle en *A*, on connoît l'angle *ACG* qui eſt de 9°, & le rayon de la terre *CA* que Képler ſuppoſoit de 904 milles d'Allemagne; on trouvera *CG* de 914 milles, donc l'excès *BG* eſt de 10 milles; ſi l'on évalue chaque mille, à 3800 toiſes, on aura 38 milles toiſes pour la hauteur de l'atmoſphère, du moins ſuivant cette méthode, employée à la façon de Képler. Quoique Képler trouvât 10 milles pour la hauteur de l'atmoſphère par la méthode des crépuſcules, cependant il n'eſtimoit cette hauteur que d'un demi-mille, ou environ 2000 toiſes, il attribuoit le crépuſcule, ſoit aux différentes réflexions & réfractions des rayons au-dedans de l'atmoſphère, ſoit à l'atmoſphère du ſoleil (845).

Hauteur de l'atmoſphère.

M. de la Hire ne trouve que 34585 toiſes au lieu de 38000, en faiſant entrer dans ſon calcul la réfraction du rayon *DG*, & la différence de hauteur entre le bord & le centre du ſoleil, (*Mém. acad.* 1713, *p.* 59).

M. Mariotte dans ſon eſſai de la nature de l'air, en employant les expériences ſur la condenſation de l'air, trouve l'atmoſphère encore un peu moindre que M. de la Hire.

Si l'on ſuppoſe que la hauteur de l'atmoſphère dans les éclipſes de lune produit une ombre qui ſoit la 60e partie de celle de la terre, comme pluſieurs aſtronomes l'ont dit (1776), on aura 54488 toiſes pour la hauteur de l'atmoſphère.

Si l'on prend pour atmoſphére la partie de l'air où la réfraction de la lumière eſt ſenſible, on ne trouve que 5158 toiſes de hauteur, ſuivant M. Bouguer (2218).

Quand on ne prend que la hauteur où le poids de l'air & ſon action ſur le baromètre ſont ſenſibles, on ne trouve qu'environ 4200 toiſes pour la hauteur de l'atmoſphère ou plus exactement 25275 pieds, ſuivant les expériences de M. de Luc. Ce nombre de pieds diviſé par la hauteur du baromètre en lignes, donne au quotient le nombre de pieds dont il faut monter ou deſcendre

pour faire changer d'une ligne la hauteur du baromètre, en ſuppoſant toutes fois que l'air ſoit à la température, ou à 10° du thermomètre (129), on prendroit 27096 pieds ſi le thermomètre étoit à 25°. (*Connoiſſ. des mouv. céleſt.* 1765, *pag.* 220).

Des Atmoſphères des Planètes.

2271. NOUS avons parlé de l'atmoſphère du ſoleil à l'occaſion de la matière zodiacale (845), & de celle de la lune à l'occaſion de l'inflexion (1992); nous ajouterons ſeulement que le P. Boſcovich, dans une diſſertation imprimée à Rome en 1753, *De Lunæ atmoſphæra*, a fait voir que la lune pourroit avoir une atmoſphère auſſi denſe que de l'eau, ſans qu'il fût poſſible de nous en appercevoir, & que cette atmoſphère pourroit bien être la cauſe qui empêche de diſtinguer les montagnes ſur le bord de la lune, tandis qu'on les voit diſtinctement ſur ſon diſque. On peut voir auſſi ce que dit le P. Friſi dans ſa diſſertation de *Atmoſphæra cœleſtium corporum*, qui remporta le prix de l'académie en 1758, & qu'il a fait imprimer à Lucques en 1759, dans le premier volume de ſes diſſertations. Au reſte, il eſt impoſſible de dire quelque choſe de certain ſur cette matière.

2272. Les paſſages de Vénus & de mercure ſur le ſoleil devroient nous faire appercevoir les atmoſphères de ces deux planètes, s'il y en avoit, comme quelques aſtronomes l'ont cru; cependant j'ai vu Mercure en 1753, & Vénus en 1761, ſans aucune apparence d'anneau lumineux; mais je ne dois pas diſſimuler que d'autres aſtronomes ont parlé pluſieurs fois de ces anneaux; on en vit un à Montpellier dans le paſſage de Mercure en 1736, & l'on aſſure même que cet anneau continua de paroître ſix à ſept ſecondes après que Mercure fut totalement ſorti de deſſus le diſque du ſoleil. M. de Fouchy, M. le Monnier, M. Chappe, M. Wargentin ont aſſuré qu'ils avoient vu cet anneau autour de

Anneau lumineux.

Vénus, (*Mém. acad.* 1761, *pag.* 365), ce qui formeroit un préjugé pour le ſyſtême des atmoſphères des planètes, ſi cet anneau ne pouvoit s'expliquer par des cauſes purement optiques.

M. Caſſini, (*Obſervations aſtron. pag.* 42 & 45), en comparant entre elles diverſes obſervations de Mars, lorſque cette planète étoit fort près de la moyenne des 3 ♓ dans l'eau du verſeau, trouva des différences très-irrégulieres; il crut qu'elles pouvoient être cauſées par quelque réfraction extraordinaire, faite dans l'atmoſphère de Mars; il trouva les mêmes irrégularités par l'obſervation de Cayenne; le jour de la conjonction de Mars à la moyenne ♓, l'intervalle entre cette étoile & celle qui la précède parut ſenſiblement augmenté, car les jours précédens la différence du paſſage de ces deux étoiles étoit de 2′ 8″ de temps à Cayenne, comme on l'obſerva toujours à Paris, & le jour de la conjonction, il parut de 2′ 14″, ce qui ſemble s'accorder à ce que M. Caſſini avoit imaginé que le rayon viſuel qui alloit à l'étoile après la conjonction avec Mars, rencontrant obliquement ſon atmoſphère y pouvoit être rompu, de ſorte qu'il faiſoit paroître l'étoile trop orientale en augmentant ſa diſtance par rapport à Mars qui avoit paſſé à l'occident de l'étoile.

M. Caſſini attribuoit à la même cauſe la trop grande vîteſſe dans la ſéparation de Mars & de l'étoile, qu'il trouvoit par la comparaiſon des obſervations de M. Picard & de M. Romer. Un autre phénomène ſemblable, c'eſt que la parallaxe déduite de la comparaiſon de la dernière obſervation de M. Picard avec celle de M. Richer, parut inſenſible, tandis qu'elle paroiſſoit trop grande, vers le temps de la conjonction, à cauſe d'une trop grande vîteſſe dans la ſéparation de Mars avec l'étoile fixe ſuivante: il attribuoit une partie ſeulement de la différence à la parallaxe, & l'autre à la réfraction produite dans l'atmoſphère de Mars. M. Caſſini, en rapportant ſes doutes ſur cette matière, avertit les obſerveurs d'y prendre garde dans les occaſions ſemblables,

pour

pour avoir la confirmation ou la réfutation de cette idée par des obſervations plus déciſives.

2273. LA DIFFRACTION ou inflexion des rayons dont parle M. Newton dans le 3ᵉ livre de ſon optique, eſt le changement de direction que des rayons éprouvent en paſſant près d'un corps ſolide qui les attire par ſa maſſe ou les repouſſe par une eſpèce de réflexion : on a eſſayé quelquefois d'expliquer, par cette diffraction, divers phénomènes que d'autres expliquent par les réfractions des atmoſphères, ou par l'irradiation & l'aberration des rayons qui bordent les corps lumineux (1991, 2272), de même que les bandes lumineuſes des ombres, obſervées par le P. Grimaldi, & par M. de l'Iſle, (*Mémoires pour ſervir à l'hiſtoire & au progrès de l'aſtronomie*, à Péterſbourg 1738, *in*-4°).

LIVRE TREIZIEME.

DES INSTRUMENS D'ASTRONOMIE.

Les fondemens eſſentiels de l'aſtronomie & les calculs des principaux phénomènes ont rempli la majeure partie de cet ouvrage ; il eſt temps d'y joindre le détail & la pratique des obſervations : cette branche de l'aſtronomie n'avoit été traitée par aucun aſtronome, c'eſt ce qui m'a obligé à lui donner ici une certaine étendue.

2274. Le plus ancien inſtrument d'aſtronomie dont on ait fait uſage, eſt le Gnomon ou ſtyle droit avec lequel on meſuroit les ombres du ſoleil, nous en parlerons bientôt en détail (2281). On employa enſuite les cercles diviſés en degrés (23, 304), auxquels on rapportoit les arcs des cercles céleſtes ; le plus célèbre de ces inſtrumens eſt ce qu'on appelle les *Armilles d'Alexandrie*, avec leſquelles Timocharès (345) obſerva la déclinaiſon de l'épi de la Vierge ; elles avoient une demi-aune de diamètre, (*Proclus Hyp. aſtr.* c. 2.) Flamſteed penſe que, comme l'aune des anciens pouvoit être la longueur des bras étendus, ces armilles devoient avoir trois pieds de diamètre, (*Flamſt. proleg. pag.* 19,21,30) ; il en eſt parlé dans l'Almageſte III. 2. Je crois que leur préciſion pouvoit aller à 10′.

2275. Ptolomée ſe ſervit pour déterminer la parallaxe de la lune d'un inſtrument qu'on a appellé *Triquetrum* ou *Règles parallactiques* (a), dont le rayon étoit de 4 coudées ou de 6 pieds, il en donne la decription dans ſon Almageſte, (Lib. V. cap. 12, *pag.* 113), la *figure* 196 repréſente les 3 règles. *Fig.* 196.

(a) Copernic & Tycho écrivent *parallatiques*, mais Ptolomée écrivoit παραλλακτικὸν, il s'en ſervoit pour les parallaxes ; c'eſt la machine que nous décrirons ci-après (2400), qu'on doit appeller parallatique, parce qu'elle ſuit le parallèle des aſtres.

Sur un côté de la règle *AO* l'on voit à angles droits deux petites planchettes carrées *L* & *O* parallèles entre elles, dont chacune a au milieu un petit trou, celui de l'œil eſt le plus petit, & celui qui eſt en *L* eſt aſſez grand pour que la lune puiſſe y paroître toute entière; la règle *AO* étoit ajuſtée par une charnière ſur la règle verticale *AF*, & elle tournoit librement autour du point *A*; la règle *GD* ſervoit à régler le mouvement de *AO*; ſur les lignes *AG* & *AO* étoient marquées 60 parties égales qui formoient le rayon, tandis que *GD* étoit la corde de l'angle *GAO*, en ſuppoſant que le triangle *GAD* fût toujours iſocelles. Le long de la règle verticale *AF*, il y avoit un fil à plomb paſſant par deux trous *B* & *C* qui ſervoit à rendre la règle *AF* exactement perpendiculaire à l'horizon.

Aſtrolabe.

Ptolomée décrit encore dans ſon Almageſte, (Liv. V. cap. 1, *pag.* 100), un autre inſtrument qu'il appelle *Aſtrolabe*; & qu'il employoit pour obſerver les diſtances de la lune au ſoleil : il y avoit deux cercles exactement tournés, placés l'un dans l'autre à angles droits, l'un deſtiné à repréſenter l'écliptique, & l'autre le colure des ſolſtices ſur lequel on marquoit les poles de l'équateur; un troiſième cercle tournoit autour des poles de l'écliptique ſur deux cylindres qui y étoient fixés, & ſervoit à marquer les longitudes; un quatrième cercle au-dedans des trois autres portoit deux trous ou deux pinules, qui ſervoient à regarder la lune ou un autre aſtre & à meſurer ſa longitude & ſa latitude. Cet inſtrument ne diffère de celui de Tycho, que nous décrirons ci-après (2279), que par une plus grande perfection dans ce dernier.

Inſtrumens des Arabes.

2276. Les Arabes ne ſe ſervirent point des armilles, mais ſeulement des règles parallactiques de Ptolomée, ils y ajoutèrent des quarts-de-cercles d'un plus grand rayon & des ſextans, comme on le voit par un écrit du Docteur Bernard ſur l'obliquité de l'écliptique déterminée par les Arabes, (*Phil. tranſ.* n° 163); il raconta à Flamſteed qu'il avoit vu un écrit d'un ancien Arabe ſur

la comparaiſon des inſtrumens de ſon temps avec ceux des anciens, pour prouver que les obſervations des Arabes étoient plus exactes que celles des Grecs, il ſeroit bien à deſirer que ce petit ouvrage fût traduit, (*Flamſt. Proleg. pag.* 20 *&* 26).

De Waltherus.

2277. Après les obſervations Arabes, on trouve celles de Waltherus, qui ſe ſervit d'abord des règles parallactiques, & du rayon ou bâton aſtronomique, *Baculus aſtronomicus*, qui étoit à peu-près de la même nature, enſuite d'une armille à la façon de Ptolomée. Les erreurs de ſes obſervations alloient quelquefois à 10′, ainſi que dans celles de Copernic; Régiomontanus dans ſon livre *de Torqueto*, parle de pluſieurs autres eſpèces d'inſtrumens, dont le détail ſeroit trop long. Le *Torquetum* avoit une table horizontale, une autre parallèle à l'équateur, & une 3e dans le plan de l'écliptique, avec un cercle de latitude mobile.

2278. Copernic fut enſuite le plus célèbre obſervateur du 16e ſiècle, mais nous voyons qu'il n'employa pas d'autres inſtrumens que ceux de Ptolomée (2275); ſon aſtrolabe eſt décrit dans ſon livre de *Revolutionibus*, Lib. II. cap. 14, & ſon inſtrument parallatique, Lib. IV. cap. 15. De ſon aveu il pouvoit y avoir 10′ d'erreur dans ſes obſervations.

De Tycho.

2279. Tycho-Brahé fut le premier qui fit conſtruire des inſtrumens ſur leſquels on diſtinguoit, non-ſeulement les minutes, mais quelquefois les ſecondes de dix en dix, comme on le voit dans l'ouvrage où il en donne la deſcription, (*Aſtronomiæ inſtauratæ mecanica*), dans ſon hiſtoire céleſte, dans les mémoires de l'académie pour 1763, où M. Jeaurat a donné les figures de ceux qui étoient les plus remarquables, beaucoup mieux gravées que dans le livre de Tycho, enfin dans l'hiſtoire céleſte de Flamſteed, *Tom. III, pag.* 46.

Tycho rendant compte dans ſes Progymnaſmes des obſervations qu'il avoit faites pour l'établiſſement des principaux points de l'aſtronomie, donne la deſcription des deux inſtrumens dont il s'étoit le plus ſervi, ſur-

tout pour meſurer les diſtances des étoiles & leurs différences d'aſcenſions droites; le premier de ces deux inſtrumens eſt un ſextant dont le rayon avoit 4 coudées ou environ 6 pieds, & il en avoit trois de la même conſtruction, (*Progymn. pag.* 247, *Aſtronomiæ inſt. mecanica, pag.* 53).

Le ſecond inſtrument que Tycho décrit dans ces deux ouvrages, comme un des inſtrumens dont il faiſoit le plus d'uſage, eſt celui qu'il appelle ARMILLES ÉQUATORIENNES, elles ſont repréſentées dans la *fig.* 195; le cercle extérieur *NZH* repréſente le méridien, & il eſt ſuppoſé placé en effet dans le plan du méridien, enſorte que le point *N* regarde directement le midi, & que le point *N* ſoit au nord; ce cercle étoit de cuivre, poli & diviſé de minute en minute, les autres cercles étoient couverts de lames de cuivre. Autour de l'axe *PA* tournent les deux cercles *FI* & *QN*; le cercle *FI* n'eſt point diviſé, parce qu'il ne ſert qu'à ſoutenir & porter l'équateur *NMR* qui eſt mobile; l'axe *PA* eſt de cuivre, & porte un cylindre *D* au centre de cette ſphère. Les pinnules *R* & *N* qui ſont ſur l'équateur ſont de cuivre, elles ſervent à meſurer les diſtances des aſtres au méridien ou les angles horaires, & les différences d'aſcenſion droite. On a même cet avantage avec un équateur mobile, que lorſqu'on met un aſtre ſur le degré d'aſcenſion droite qui lui convient, on voit dans le méridien même l'aſcenſion droite du milieu du ciel (1011), dont les aſtronomes ont ſouvent beſoin; d'où l'on conclut l'heure qu'il eſt, quand on ſait l'aſcenſion droite du ſoleil. *Fig.* 195.

Le cercle intérieur *VQC* eſt un cercle de déclinaiſon ou un méridien qui tourne autour de l'axe *PA*, & dont le plan eſt toujours perpendiculaire à celui de l'équateur *RMN*; on dirige ce méridien mobile vers l'aſtre dont on veut meſurer la déclinaiſon, & au moyen des pinnules *Q* & *C* & du cylindre *D*, qui eſt au centre de l'inſtrument, porté ſur l'axe même, on s'aligne vers

l'étoile dont la déclinaiſon ſe trouve marquée par la pinnule.

Toute cette machine étoit placée ſur un pied de cuivre, très-ſolide, qu'il faut concevoir au-deſſous de *T*, & que je n'ai pas repréſenté, parce qu'il n'eſt pas eſſentiel à la nature de l'inſtrument ; le fil à-plomb *ZT* étoit un fil de cuivre très-délié chargé d'un poids *T*, qui ſervoit à placer l'inſtrument une fois pour toutes, ou à vérifier de temps à autres ſa poſition. On imite, pour ainſi dire, ces armilles dans la conſtruction de l'*Anneau aſtronomique*, dont on peut voir la deſcription dans le traité des inſtrumens de mathématiques, par *Bion*.

Cet inſtrument eſt celui dont Tycho faiſoit le plus d'uſage, car toutes les fois qu'il avoit obſervé les diſtances des planètes aux étoiles avec le ſextant, il meſuroit ordinairement leur déclinaiſon, & le temps vrai de l'obſervation avec ces armilles équatoriennes, en meſurant la diſtance de quelque belle étoile au méridien le long de l'équateur. On meſuroit auſſi quelquefois la hauteur & l'azimut pour avoir le temps vrai, avec d'autres inſtrumens. Souvent Tycho, à la ſuite des diſtances d'une planète aux étoiles, donne auſſi l'aſcenſion droite de la planète conclue de ſa diſtance au méridien par les armilles équatoriennes.

Tels ſont les deux principaux inſtrumens de la nombreuſe collection de Tycho, & ceux qu'il décrit par préférence dans ſes Progymnaſmes ; leur préciſion alloit à peu-près à une minute.

Inſtrumens d'Hévélius.

2280. Les inſtrumens dont ſe ſervit Hévélius dans le dernier ſiècle, étoient auſſi remarquables par leur grandeur & leur exactitude ; il en a décrit 12 principaux dans ſon Organographie, (*Mach. cœleſt. pars* 1), parmi leſquels on remarque un ſextant de cuivre, de plus de ſix pieds de rayon, avec lequel il meſura ce nombre prodigieux de diſtances qu'on trouve dans le grand ouvrage intitulé : *Mach. cœleſtis* ; on peut eſtimer à 15″ ou

20″ les erreurs probables de ſes obſervations. Il ſemble même que Flamſteed les regarde comme encore plus petites, (*Flamſt. Proleg. pag.* 100).

Des Gnomons ou Méridiennes.

2281. On appelle Gnomon (72) une hauteur perpendiculaire priſe au-deſſus d'une méridienne horizontale ; on meſure ſur la méridienne ou la longueur de l'ombre, ou la diſtance entre l'image lumineuſe du ſoleil & la verticale qui marque le pied du ſtyle ; l'on a dans les deux cas la tangente de la diſtance du ſoleil au zénit ; la hauteur du ſtyle étant priſe pour le rayon.

L'obſervation des hauteurs méridiennes du ſoleil (70), ou de la longueur des ombres a dû être une des premieres méthodes employées pour meſurer l'année, & le retour des ſaiſons ; cette méthode paroît avoir été fort en uſage chez les Egyptiens, les Chinois & les Péruviens, voyez M. Goguet, (II. 250), l'hiſtoire de l'aſtronomie Chinoiſe, (*Tom. I, pag.* 3. *Tom. II, pag.* 5, 8 & 21). Les Gnomons ont été les premiers inſtrumens aſtronomiques qu'on ait imaginés, parce que la nature les indiquoit pour ainſi dire aux hommes : les montagnes, les arbres, les édifices ſont autant de Gnomons naturels qui ont fait naître l'idée des Gnomons artificiels qu'on a employés preſque par-tout. Tels furent probablement l'horloge d'Achaz, (Voyez M. Goguet), les Gnomons des Caldéens (261), de Pythéas à Marſeille (341), & d'Ératoſthènes (2628).

Sous l'empire d'Auguſte un Mathématicien nommé *Manlius*, profita d'un obéliſque que ce Prince avoit fait élever dans le champ de Mars, pour en faire un Gnomon ; Pline dit qu'il avoit 116 $\frac{1}{4}$ pieds, (105 $\frac{1}{4}$ de France), & qu'il marquoit les mouvemens du ſoleil. (*Pl. lib.* 36. *cap.* 9, 10 & 11). Cet obéliſque ſe voit encore à Rome, quoique abattu & fracaſſé ; j'en ai parlé dans le IVe volume de mon *Voyage en Italie*, & l'on peut voir pluſieurs belles

diſſertations ſur cette matière dans l'ouvrage de M. Bandini, *Dell' obeliſco di Ceſare Auguſto*, &c. à Rome 1750, *in-folio*.

Cocheou-King en fit un de 40 pieds à Pékin, vers l'an 1278 (418); Ulug-Beg vers 1430 ſe ſervit à Samarkand d'un Gnomon qui avoit 165 pieds de hauteur (396). Cet uſage des Gnomons a été ſi naturel & ſi général qu'on en a trouvé des veſtiges, même au Pérou: *Garcilaſo de la Vega, commentarios reales de los incas* 1723, *Tom. I, Lib. 2. cap. 22, pag. 61.*

Paul Toſcanella qui mourut en 1482, éleva à Florence l'un des plus fameux Gnomons que l'on ait vu, il a 277 $\frac{1}{2}$ pieds de hauteur, & c'eſt le plus grand qui exiſte. Le P. Ximenez premier mathématicien du grand Duc de Toſcane, l'a rétabli, & en a donné une ample & belle deſcription: *Del vecchio e nuovo Gnomone Fiorentino* &c. 1757, *in-4°*.

Gaſſendi voulant obſerver en 1636, la hauteur ſolſticiale du ſoleil, comme il l'avoit promis à Wendelinus, forma dans le college de l'Oratoire à Marſeille, un Gnomon de 51 pieds 8 pouces 4 lignes de hauteur (*Gaſſ. op. Tom. V, pag. 525*), avec lequel il obſerva la hauteur ſolſticiale du bord ſupérieur du ſoleil 70° 25′ 59″. Le Gnomon du P. Henri à Breſlaw avoit 35 pieds, comme je le trouve dans les manuſcrits de M. de l'Iſle.

2282. Ignace *Dante*, Dominicain, enſuite Evêque d'Alatri, conſtruiſit un Gnomon de 67 pieds de haut en 1575 ou 1576, dans l'Egliſe de Saint Pétrone, patron de Bologne (460); M. Caſſini le rétablit en 1655, & en 1695 (554), & lui donna 83 $\frac{1}{2}$ pieds de hauteur; c'eſt cette méridienne de Saint Petrone de Bologne, qui a été la plus célèbre & la plus utile de toutes. On en trouve la deſcription dans deux ouvrages, l'un de M. Caſſini, l'autre de M. Manfredi, avec les obſervations qui y ont été faites en très-grand nombre: j'en ai parlé dans le ſecond volume du *Voyage d'un François en Italie*, publié en 1769.

Méridienne de S. Petrone.

M. Picard

M. Picard en 1669 commença la méridienne qui eſt dans la grande ſalle de l'Obſervatoire royal de Paris, dont le Gnomon à 31 pieds; M. Caſſini l'a refaite long-temps après, & elle a été ornée de marbres avec des diviſions & des figures pour chaque ſigne.

La méridienne des Chartreux de Rome aux Thermes de Dioclétien eſt la plus ornée que je connoiſſe; il y a deux Gnomons, l'un de $62\frac{1}{2}$ pieds de hauteur au midi, l'autre de 75 pieds du côté du nord; cet ouvrage fut conſtruit par M. Bianchini en 1701. Voyez ſa diſſertation de *Nummo & Gnomone clementino*, à la ſuite de ſon livre de *Kalendario & cyclo Cæſaris*, *Romæ* 1703 *in-folio*; le livre publié par Manfredi, à Vérone en 1737: *Franciſci Blanchini aſtronomicæ obſervationes*; & mon Voyage en Italie, *Tom. III. pag.* 484, édition de Paris 1769.

De S. Sulpice de Paris.

La méridienne de S. Sulpice de Paris fut entrepriſe en 1727 par M. Sully, Horloger; M. le Monnier l'a refaite en grand, avec ſoin & avec magnificence, (*Mém. acad.* 1743, *pag.* 361), & il s'en eſt ſervi chaque année pour obſerver l'obliquité de l'écliptique; les objections que j'ai faites contre le réſultat de ces obſervations ſe trouvent dans les *Mémoires de l'académie* pour 1762.

Des Lunettes Aſtronomiques.

2283. L'INVENTION des lunettes d'approche devenue ſi utile à l'aſtronomie, fut faite vers l'an 1609 par hazard en Hollande; mais Molyneux dans ſa Dioptrique obſerve que Roger Bacon, mort en 1292, en avoit donné quelque idée, & Képler dans une diſſertation imprimée en 1611, obſervoit que J. B. Porta, Napolitain, en avoit parlé avant la fin du dernier ſiècle d'une manière aſſez poſitive. (Voyez l'*Optique de Smith*).

Galilée dans le *Nuncius Sydereus*, publié au mois de Mars 1610, *pag.* 9, raconte qu'environ dix mois auparavant, le bruit s'étoit répandu qu'un certain Hollandois avoit fait une lunette, par le moyen de laquelle

les objets éloignés paroiſſoient fort proches ; on en racontoit pluſieurs effets ſinguliers, que quelques perſonnes révoquoient en doute. Quelques jours après un gentilhomme François, nommé Jacques *Badovere*, lui ayant écrit de Paris la même choſe, il ſe mit à en chercher la raiſon, & à méditer ſur les moyens de faire un pareil inſtrument, par le moyen des loix de la réfraction ; il y parvint bientôt. Il mit aux deux extrémités d'un tube de plomb, deux verres, plans d'un côté & ſphériques de l'autre, mais dont l'un avoit un côté convexe, & l'autre un côté concave ; alors approchant l'œil du verre plan concave, il vit les objets trois fois plus près qu'à la vue ſimple, il continua à Padoue de conſtruire des lunettes plus longues ; & nous avons au dépôt de l'académie l'objectif avec lequel il découvrit peu après les ſatellites de Jupiter (2880).

Objectif & oculaire.

2284. Les lunettes dont ſe ſervent aujourd'hui les aſtronomes, ſont formées de deux verres convexes, dont l'un tourné du côté de l'objet s'appelle l'*objectif*, & l'autre vers lequel on place l'œil s'appelle l'*oculaire* ; je ſuppoſerai comme des choſes connues pluſieurs propoſitions que l'on trouvera démontrées dans les livres d'Optique (a) déja cités (2162) ; je ne rapporterai donc ici que les principes les plus ſimples pour mettre ſur la voie le Lecteur qui ne voudra pas recourir à d'autres livres.

Effet des Lunettes.

Fig. 142.

2285. Les rayons *SA*, *SA* (*fig.* 142) qui viennent d'un point lumineux, par exemple, d'une étoile, ſont parallèles entr'eux à cauſe de la grande diſtance (1743) ; ils ſe réuniſſent en un foyer *F*, & y forment l'image du point lumineux ; ces rayons après s'être réunis au point *F* s'écartent & vont tomber ſur l'oculaire *GG*, duquel ils ſortent parallèles pour entrer dans l'œil placé en *O*.

(a) Optique vient de ὄπτομαι, *video* ; Catoptrique vient de κάτοπτρον, *ſpeculum*, parce que c'eſt la connoiſſance des rayons réfléchis ; Dioptrique vient de διόπτομαι, *je vois au travers*, parce qu'elle traite des réfractions ; la Dioptrique s'appelle auſſi *anaclaſtique*, du mot κλάω, *frango*.

Un œil bien conſtitué, c'eſt-à-dire, qui n'eſt ni myope ni preſbyte, voit diſtinctement un objet lorſque les rayons qui vont de l'objet à l'œil y arrivent parallèlement entr'eux, & il voit l'objet ſur l'axe optique *CF* ou ſur la ligne qui paſſe par l'objet, par le centre de l'objectif, & par le point *F* du foyer où tous les rayons étoient raſſemblés avant que d'arriver à l'oculaire. *Fig.* 142. Axe Optique.

2286. Si l'on conſidère deux points lumineux, par exemple, les deux extrémités *S* & *L* d'un objet (*fig.* 143), on aura deux axes *SAF* & *LAG*; le point *S* envoie une infinité de rayons parallèles entr'eux, qui vont tous ſe réunir en un point *F* pour arriver enſuite à l'œil parallèles entr'eux, & c'eſt ainſi que l'œil apperçoit diſtinctement l'image de cet objet au point *F* (2285); de même le point *L* envoie une infinité de rayons qui couvrant toute la ſurface de l'objectif, vont enſuite ſe réunir au foyer *G*, ſur l'axe *LAG*, & font voir diſtinctement le point *L*; l'angle que ces rayons *SAF* & *LAG* font entr'eux après avoir traverſé l'oculaire, lorſqu'ils arrivent à l'œil, eſt plus grand que celui des rayons directs; & l'on démontre dans les livres d'Optique que la grandeur apparente d'un objet eſt multipliée autant de fois que le foyer de l'objectif contient celui de l'oculaire; ainſi une lunette de 18 pieds de foyer, avec un oculaire de 2 pouces de foyer, groſſit un objet 108 fois, parce que deux pouces ſont contenus 108 fois dans 18 pieds; avec une ſemblable lunette on voit les objets comme on les verroit s'ils étoient 108 fois plus près de nous qu'ils ne ſont réellement. A l'égard des Téleſcopes, voyez l'art. 2410. *Fig.* 143. Combien groſſiſſent les lunettes.

2287. La grandeur de l'image *GF* répond à un angle *GAF* égal à l'angle *SAL* qui meſure le diamètre de l'objet; ainſi pour qu'un objet qui a 32′ de diamètre puiſſe ſe voir dans une lunette, il faut que l'ouverture de l'oculaire ſoit aſſez grande pour que le demi-diamètre *BF* de cette ouverture ſouſtende un angle de 16′ au centre *A* de l'objectif; c'eſt cette ouverture de l'oculaire, ou

plutôt celle du *Diaphragme* (a), ou du cercle de carton qu'on place au foyer *F* d'une lunette, qui décide ſeule du *champ* de la lunette, c'eſt-à-dire, de la grandeur de l'objet qu'on peut y appercevoir.

Champ de la lunette.

2288. On donne 10 à 12 lignes d'ouverture au diaphragme d'une lunette de 5 pieds dont l'oculaire auroit 2 pouces de foyer; on doit conſulter là-deſſus l'expérience; car il eſt permis d'augmenter cette ouverture tant qu'on ne voit ni couleurs ni confuſion ſur les bords du champ de la lunette; mais plus une lunette groſſit, plus le champ diminue, parce qu'un oculaire d'un court foyer ne peut pas avoir une grande ouverture: un oculaire de 2 pouces de foyer ne ſauroit avoir que deux pouces d'ouverture tout au plus.

La lumière dépend de l'ouverture de l'objectif.

2289. L'ouverture de l'objectif ou la largeur *CD* qu'on y réſerve pour introduire les rayons, décide ſeule de la quantité de lumière qu'on aura dans la lunette, & de la clarté avec laquelle on y verra les objets; c'eſt-là le principal avantage d'une grande lunette ſur une petite; le verre *CD* pouvant admettre une plus grande quantité de lumière, on peut la diſperſer par le moyen d'un oculaire qui groſſiſſe beaucoup, ſans qu'elle ſoit trop affoiblie.

Il ſeroit donc très-utile d'augmenter cette ouverture pour augmenter la lumière des objets; cependant on donne à peine deux pouces & demi d'ouverture à une lunette de 18 pieds; parce que la figure ſphérique de nos verres ne réunit pas exactement les rayons en un ſeul point; cette *aberration* provenant de la ſphéricité eſt d'autant plus forte que l'ouverture eſt plus grande; les objets deviennent confus & mal terminés quand on augmente l'ouverture aſſez pour rendre cette aberration ſenſible, & c'eſt là un des principaux inconvéniens des lunettes aſtronomiques (1395).

Aberrations qui viennent de la ſphéricité.

2290. Dans des verres qui ſeroient parfaitement ſphériques l'aberration des rayons ou la confuſion qui en

(a) Διὰ *inter*, φράγμα *vallum ſeparatio.*

réſulte, ſeroit comme le cube des longueurs focales. (*Opt. de Smith*). D'après cette règle, M. Huygens avoit donné une table des ouvertures qui convenoient à chaque lunette, ſuivant la longueur du foyer de l'objectif: voici un extrait de cette table pour des lunettes de 3, 6, 9 & 18 pieds de foyer, qui ſont les longueurs les plus employées dans l'uſage de l'aſtronomie; ces nombres ſont exprimés en pouces & dixièmes de pouces; la dernière colonne exprime la longueur des foyers d'oculaires, que M. Huygens conſeilloit pour ces différentes lunettes.

Tables des ouvertures & des foyers d'oculaires.

Foyer.	Ouverture.	Oculaire.
pieds	*pou.*	*pou.*
3	0, 97	1,07
6	1, 37	1,50
9	1, 67	1,83
18	2, 42	2,60

2291. M. le Gentil après avoir fait pluſieurs expériences ſur les lunettes, & ſur le degré de netteté que procurent des ouvertures & des foyers différens, & ayant employé les nombres indiqués dans l'Optique de Newton, (*Liv. I. prop.* 7), a dreſſé une table pour des lunettes de différentes longueurs; en voici l'extrait pour les longueurs les plus ordinaires, qui ſont de 3, 6, 9 & 18 pieds; les ouvertures des objectifs & les foyers des oculaires ſont exprimés en lignes & dixièmes de lignes, (*Mém. ac.* 1755, *p.* 462).

Foyer.	Ouverture.	Oculaire.
pieds	*lig.*	*lig.*
3	6, 7	16, 9
6	9, 7	24, 1
9	12, 0	29, 0
18	16, 7	41, 0

2292. On ne doit conſulter que l'expérience pour régler les ouvertures, les oculaires, & les diaphragmes des lunettes; parce que tout cela peut varier ſuivant la perfection de l'objectif, & l'uſage qu'on ſe propoſe d'en faire. Avec un excellent objectif de 15 pieds, on peut employer un oculaire qui n'aura qu'un pouce & demi, pour voir un objet fort lumineux, parce que l'image étant parfaite on peut la regarder avec une loupe qui la groſſiſſe beaucoup, ſans qu'elle paroiſſe obſcure ni mal terminée; mais il y faudra peut-être un

Tout cela varie beaucoup.

oculaire de 3 pouces, ſi l'objectif eſt d'une qualité médiocre ou ſi l'objet a peu de lumière.

Différences des lunettes de jour à celles de nuit.

2293. Il faudroit quand on obſerve pendant le jour employer des oculaires plus foibles ou d'un plus long foyer que la nuit, à cauſe de la grande lumière des objets environnans qui frappe & éblouit les yeux, rétrécit la prunelle, & rend l'œil moins ſenſible aux impreſſions d'une lumière trop foible. Lorſqu'on ne veut que raſſembler une très-grande lumière ſans s'occuper de rendre les objets bien terminés, on rend l'ouverture de l'objectif extrêmement grande, & le foyer de l'oculaire un peu long ; c'eſt-là tout le ſecret des *lunettes de nuit* avec leſquelles on parvient à découvrir des comètes dans le ciel, & des vaiſſeaux ſur mer pendant la nuit.

Avantages de deux oculaires

2294. Deux oculaires plans convexes, qui ſeroient, par exemple, de 3 pouces & de 1 pouce $\frac{1}{2}$ pour une lunette de 12 pieds, font ſouvent beaucoup mieux qu'un ſeul oculaire, ils procurent une plus grande ouverture de l'oculaire, & les aſtronomes trouvent de l'avantage dans cette méthode ; on eſt même obligé d'y avoir recours lorſqu'on veut employer des oculaires d'un court foyer, & faire groſſir conſidérablement une lunette (2304).

Lunettes à ſix verres convexes.

2295. Les lunettes aſtronomiques ſont compoſées de deux verres ſeulement, mais elles ont l'inconvénient de renverſer les objets ; les lunettes ordinaires dont on ſe ſert ſur terre ſont conpoſées de quatre verres ; mais on en fait quelquefois, ſur-tout pour la Marine, qui ſont à ſix verres convexes ; elles ont le champ plus grand d'environ une moitié que les lunettes à quatre verres, & elles ſont moins ſujettes aux Iris : voyez M. Euler dans les mélanges de l'académie de Turin, *Tom. III*, & dans les mémoires de Berlin, *Tom. XIII.*

2296. Dans la diſpoſition de ces lunettes, on obſerve de ne pas mettre les oculaires l'un au foyer de l'autre, on y verroit les taches & les pouſſières noires qui nuiſent à la netteté de l'image, au lieu que quel-

ques lignes d'écartement ſuffiſent pour empêcher qu'on ne diſtingue ces corps étrangers ſur la ſurface d'un oculaire.

Du travail des verres.

2297. Je n'entrerai pas dans le détail de la manière de travailler & de polir les verres avec le ſable, & enſuite le tripoli ou la potée d'étain. Cet art auſſi bien que celui de faire les inſtrumens d'aſtronomie, fera la matière d'une ample deſcription que M. l'Abbé de Rochon ſe propoſe de publier à la ſuite des Arts que l'académie a déjà donnés (*Nov.* 1770) : en attendant l'on peut conſulter Smith, Huygens, Molineux, le Pere d'Orléans. Hévélius cite un auteur nommé *Hieronymus Syrturus* qui avoit fort bien écrit ſur cette matière; il y en a un autre nommé *Arshout*; M. Paſſemant en a dit quelque choſe dans ſa *conſtruction d'un téleſcope*, imprimée en 1738, & M. l'Abbé de Rochon dans ſes opuſcules.

Des Lunettes Achromatiques ([a]).

Inconvéniens des couleurs dans les lunettes.

2298. Un des plus grands obſtacles qu'on ait trouvé juſqu'ici à la perfection des lunettes, eſt l'inégale réfrangibilité des rayons de différentes couleurs; il n'y a preſque pas de lunette ordinaire dans laquelle on ne voie ſur les bords pluſieurs cercles colorés produits par les oculaires; les aſtres lorſqu'ils ſont fort lumineux y paroiſſent également bordés des mêmes couleurs; cette différente réfrangibilité des rayons fait que le foyer des lunettes eſt incertain & variable; que la parallaxe optique des micromètres eſt ſujette à changer (2599); que les objets ſont mal terminés & qu'on ne peut donner aux objectifs qu'une très-petite ouverture.

Idées de MM. Newton, Euler & Dollond.

Ces inconvéniens avoient fait deſirer un moyen de

([a]) Χρῶμα, *color*; précédé d'un α privatif veut dire, *ſans couleur*. Cependant les lunettes ainſi appellées n'ôtent pas les couleurs qu'on apperçoit ordinairement dans les lunettes & qui viennent des oculaires, mais elles ôtent la confuſion de rayons qui a lieu au foyer des objectifs. Voyez le P. Boſcovich, *Diſſertatio* I, pag. 48.

réunir les rayons de différente eſpèce à un même foyer, & l'on y a réuſſi en grande partie. M. Euler en 1747 examina ſi l'on ne pourroit point y parvenir par un moyen que Newton avoit indiqué dans ſon optique pour corriger l'erreur de la ſphéricité; il s'agiſſoit de faire des objectifs compoſés de deux couches de verre dont l'intervalle fût rempli d'eau. (*Mém. de Berlin, Tom. III, pag.* 274). M. de Maupertuis fit faire à Paris divers eſſais d'après la théorie de M. Euler; mais ils n'eurent pas le ſuccès que cet illuſtre auteur avoit eſpéré. Dollond célèbre Opticien de Londres, voulut d'abord réfuter M. Euler qui avoit attaqué la loi de réfraction donnée par Newton dans cette théorie des couleurs; mais M. Klingenſtierna ayant convaincu Dollond de l'erreur de Newton, (*Mém. acad.* 1757, *pag.* 524); celui-ci trouva en 1759 une méthode qui a très-bien réuſſi pour former des lunettes achromatiques : j'ai ouï dire à Londres en 1763 à pluſieurs perſonnes qu'un nommé Hall avoit eu, il y a bien des années, la même idée; mais Dollond le pere eſt du moins le premier qui nous ait fait jouir de cette belle invention & qui l'ait portée à un certain degré de perfection. (*Mém. acad.* 1756, *pag.* 380).

2299. Hévélius avoit obſervé depuis long-temps que le cryſtal de roche avoit une réfraction plus grande que le verre de Veniſe, (*Selen. pag.* 9); mais ce qu'on n'avoit pas obſervé, c'eſt que la diſperſion des couleurs priſmatiques dans différens verres étoit fort différente, lors même qu'on ſuppoſoit un égal degré pour la réfraction moyenne, c'eſt-à-dire, pour celle des rayons verds, qui tiennent le milieu entre les extrêmes ou entre les violets & les rouges. Il y a des matières qui diſperſent deux fois plus que d'autres les rayons colorés, & qui augmentent beaucoup la longueur du ſpectre coloré ſous un même degré de réfraction moyenne; enſorte qu'on peut faire varier leurs angles réfringens juſqu'à obtenir un ſpectre coloré de même grandeur, une égale ſéparation des rayons extrêmes, ſans que la réfraction moyenne ſoit égale.

2300.

2300. M. Dollond forma des priſmes, ou de petits angles réfringens, premiérement avec un verre jaunâtre ou couleur de paille, appellé communément à Londres *verre de Veniſe*, 2°, avec le verre d'Angleterre, connu ſous le nom de *Crown-glaſſ*(a), dont on fait les vîtres à Londres, 3°, avec le cryſtal blanc, dont on fait à Londres les verres & les carafes, appellé *Flint-glaſſ*(b); il trouva des priſmes de Crown-glaſſ & de Flint-glaſſ, qui produiſoient dans les couleurs une égale divergence de rayons, ou une égale étendue dans le ſpectre coloré, quoique la réfraction moyenne fût inégale; d'où il étoit aiſé de conclure qu'un objectif compoſé de ces deux matières, réunies d'une manière convenable, n'auroit plus cette aberration de rayons qui produiſoit la confuſion des images. Matières des objectifs achromatiques.

Si l'on nomme 1 le ſinus de l'angle de réfraction, on a le ſinus de l'angle d'incidence dans le Crown-glaſſ 1,5412 pour les rayons rouges, 1,5598 pour les rayons violets, ſuivant les expériences de M. Jeaurat; tandis que dans le Flint-glaſſ on a 1,6092 & 1,6384; ainſi le rapport des diſperſions eſt de 1 à 1,57 ou de 200 à 314, mais ſuivant M. Dollond, c'eſt de 200 à 300, & ſuivant M. l'Abbé de Rochon de 200 à 320; il y a apparence que cela varie un peu, même dans une ſeule eſpèce de verre.

2301. Ce neſt pas ordinairement le poids des matières qui rend la réfraction plus forte; car l'eſprit de térébenthine a preſque autant de réfraction que le verre, quoiqu'il peſe beaucoup moins; le tiſſu intérieur des parties y contribue certainement beaucoup; mais nous obſervons en général que le verre le plus peſant, eſt celui qui diſperſe le plus les rayons colorés, & qui produit le ſpectre le plus alongé. En effet, le *Flint-glaſſ* donne trois pouces de couleurs, là où nos glaces

(a) C'eſt-à-dire, *Verre en couronne*, parce qu'on le travaille en rond par le moyen de la force centrifuge.

(b) *Flint* ſignifie *petit cailloux* ou *ſilex*; c'eſt la matière qui le compoſe jointe avec un tiers de plomb.

ordinaires ne donneroient que deux pouces, enſorte que la diſperſion du cryſtal d'Angleterre eſt $\frac{3}{4}$ de celle de notre verre; & d'un autre côté, l'on trouve en peſant ces matières dans l'air & dans l'eau, que le Flint-glaſſ peſe un tiers de plus que notre verre commun.

Eſſais ſur des verres de différens poids.

2302. Cet excès de peſanteur prouve bien qu'il entre beaucoup de plomb dans le verre dont la diſperſion eſt ſi forte, auſſi m'a-t-on aſſuré en Angleterre qu'il entroit en minium un tiers du poids total de la matière du *Flint-glaſſ*; & M. Paſſemant eſt parvenu à faire des échantillons, qui donnoient la même diſperſion, en faiſant fondre ſix onces de ſablon, quatre de potaſſe, cinq de minium, & huit grains de manganeſe (qui eſt, pour ainſi dire, le ſavon des Verreries), pour éclaircir la matière. Il eſt même parvenu à faire un verre, dont la diſperſion étoit double de celle de nos glaces, & qui peſoit 1570 grains le pouce cube, en faiſant fondre deux onces de ſable, $3\frac{1}{2}$ de minium, une once de potaſſe & un gros de ſalpêtre. Les morceaux de compoſition de verre qui nous viennent d'Allemagne, & que les Bijoutiers, & ſur-tout M. Straſſ, employent pour imiter les diamans, réuſſiſſent à merveille pour nos lunettes, parce qu'ils contiennent beaucoup de minium; ils ont une qualité diſtractive double de celle du verre commun; mais il eſt bien rare d'en trouver qui ſoit ſans ondes; M. Bouriot a reconnu que le pouce cube peſe 1440 grains, quelquefois même juſqu'à 1600; le Straſſ qu'on fait en France 1306, le Flint-glaſſ 1202, les glaces d'Angleterre 1005, le verre ordinaire de France 940, le verre de Bohême 774; enſorte qu'on pourroit faire des lunettes achromatiques avec le verre de France & celui de Bohême. D'ailleurs M. Zeiher à Péterſbourg a trouvé qu'avec une certaine quantité d'alkali, on diminue la réfraction moyenne du verre, ſans preſque rien changer à la diſperſion ou à l'étendue du ſpectre coloré, (*M. d'Alembert, opuſc. Tom. III, pag.* 404). M. Bévis m'a dit qu'il avoit fait faire à Londres des eſſais de verre avec beaucoup de borax, & que la réfrangibilité étoit

auſſi grande que celle du cryſtal blanc d'Angleterre ; tout cela fait voir qu'avec du temps & des expériences, on pourra varier & perfectionner beaucoup la compoſition de ces lunettes.

2303. M. Clairaut a donné une théorie très-détaillée des lunettes achromatiques (2308), dans laquelle on trouve un grand nombre de combinaiſons différentes pour le choix des foyers, & la quantité des courbures propres à corriger tout à la fois & la réfrangibilité, & les aberrations de ſphéricité, c'eſt-à-dire celles que la figure circulaire produit. D'après ces formules, M. Anthéaulme, connu par ſon habileté dans la Phyſique & dans les Arts, fit au mois de Septembre 1763 un très-bon objectif achromatique de ſept pieds ; le premier que l'on ait fait de cette force ; il produit beaucoup plus d'effet que la lunette de 34 pieds qui eſt à l'Obſervatoire, il a 34 lignes d'ouverture, & peut porter un oculaire de 3 lignes. M. Anthéaulme a centré ſes verres, en faiſant porter ſur leur ſurface une des extrémités d'un niveau très-parfait (2399), & faiſant tourner le verre entre trois entailles, où il tournoit ſans changer de ſituation ; la moindre inégalité d'épaiſſeur faiſoit varier le niveau. Il l'a travaillé dans une forme qui n'étoit pas parfaite ; mais y ayant enſuite collé du papier fort épais, & appliquant le verre deſſus, il a vu les endroits où le papier étoit trop comprimé ; il les a uſé avec la pierre-ponce, & il s'eſt procuré par-là un baſſin de papier, très-exactement ſphérique. Je vais rapporter ici les dimenſions de cet objectif ; étant déja conſacrées par un entier ſuccès, elles pourront ſervir de modèle à d'autres artiſtes.

Objectif de M. Anthéaulme.

2304. La partie *ABH* (*fig.* 144), qui eſt tournée du côté de l'œil, eſt de la matière la plus légère, de verre commun ou de Crown-glaſſ. Sa courbure extérieure *AB* a 7 pieds $\frac{1}{2}$ ou 90 pouces de rayon ; la ſurface intérieure *AHB* a 18 pouces de rayon ; le verre *CEGD* qui eſt de la matière la plus peſante a le rayon de ſa concavité *CD* de 17 $\frac{1}{4}$ pouces, ou 1 pied 5 pouces 3 lig.

Dimenſions de cette lunette achromatique.

Fig. 144.

& ce ménisque a le rayon de la convexité *EG*, qui doit être tournée du côté de l'objet, de 7 pieds 6 pouces 8 lign. Ces deux matières différentes sont séparées l'une de l'autre sur les bords, par l'intervalle d'une carte à jouer, & forment par leur assemblage un objectif composé, qui a sept pieds de foyer. On est obligé d'employer pour cette lunette deux oculaires, afin d'avoir un champ plus considérable, malgré la force amplificative (2294): le grand oculaire, qui est le plus près de l'objectif a 18 lignes de foyer; le rayon de sa convexité tournée vers l'objectif est de 11 lignes $\frac{6}{10}$, celui de la convexité tournée du côté de l'œil est 7 pouces 1 ligne $\frac{2}{10}$; le petit oculaire a 5 lignes de foyer; c'est un *ménisque*, c'est-à-dire, qu'il est convexe du côté de l'objet, & concave du côté de l'œil; la convexité a 2 ligne $\frac{1}{4}$ de rayon; la concavité a 8 lignes: ce petit oculaire est placé à 9 lignes du premier, ou à la moitié seulement de la distance de son foyer. Le premier oculaire a 9 lignes d'ouverture, le second en a deux; mais le premier contribue sur-tout à l'étendue du champ de la lunette, & le second a sa force amplificative (2286).

Règle très-simple.

2305. Parmi les différentes formules que M. Clairaut a trouvées propres à former des objectifs achromatiques, il y en a une qui est fort simple, puisqu'elle ne consiste qu'à rendre le rayon des deux courbures intérieures, égal à un cinquième du rayon des deux courbures extérieures. Si *AB* (*fig.* 144) est un arc de 10 pieds de rayon aussi-bien que l'arc *EG*, & que les arcs intérieurs *CD* ayent deux pieds de rayon, la partie *ABH* étant de verre commun plus léger, on aura un objectif achromatique de 10 pieds de foyer, (*Mém.* 1757, *pag.* 532); cependant les dimensions rapportées ci-dessus (2304) paroissent donner encore plus de perfection.

2306. M. l'Abbé Bouriot a exécuté des lunettes achromatiques avec beaucoup d'intelligence & d'adresse, une entr'autres qui a 6 pieds 3 pouces de foyer, & peut grossir jusqu'à 120 fois; le Flint-glass qui est en dehors a une surface convexe du côté de l'objet, & une concave

du côté des oculaires ; les ſurfaces extérieures ont 5 pieds 3 pouces de rayon ; les ſurfaces intérieures 14 pouces ; l'ouverture eſt de 28 lignes. Il emploie deux oculaires, le plus grand a 18 lignes de foyer, le plus petit 6 lignes, & celui-ci eſt placé aux deux tiers du foyer du grand oculaire, ou à 12 lignes de diſtance, ils ſont tous les deux plans convexes ; la ſurface plane eſt tournée du côté de l'œil ; le premier oculaire a 10 lignes d'ouverture, le ſecond 5 lignes, & l'œilleton, ou l'ouverture à laquelle on applique l'œil, a 3 lignes de diamètre. M. de l'Etang, autre amateur, en a fait auſſi d'excellentes.

Lunettes de Dollond.

2307. Les lunettes les plus ſingulières que l'on ait faites, ſont celles que M. Dollond exécute depuis 1765 ; la mienne a environ 43 pouces de foyer avec 40 lignes d'ouverture, elle force plus que les lunettes ordinaires de 20 pieds ; l'objectif eſt compoſé de trois verres, dont un eſt de Flint-glaſſ concave des deux côtés, placé entre deux lentilles bi-convexes de verre commun ; les ſix rayons à commencer par celui de la ſurface extérieure ſont de 315, 450, 235, 315, 320 & 320 lignes. Ces lunettes deviendront encore meilleures lorſqu'on y emploiera trois ſortes de verres, au lieu de deux, qui à la rigueur ne réuniſſent que deux ſortes de rayons. (Voyez le P. Boſcovich, *Diſſert. II*, *pag.* 101).

2308. On peut voir ſur la théorie des lunettes achromatiques, M. Clairaut, (*Mém. acad.* 1756, *pag.* 380 ; 1757, *pag.* 524 ; 1762, *pag.* 578. M. Euler, (*Mém. acad.* 1765, *pag.* 555, *Mémoires de Berlin*, *Tom. XXII*, *pag.* 119. M. d'Alembert, Opuſcules mathématiques, d'abord dans le *Tom. III*, publié en 1764, & enſuite dans le *Tom. IV*. M. Klingenſtierna, dans une pièce qui a remporté le prix de l'académie de Péterſbourg en 1762. M. de Rochon, dans ſes Opuſcules, publiés en 1768, *in*-8°. Le P. Boſcovich, dans les cinq Diſſertations Latines qu'il a publiées à Vienne en 1767, *in*-4°. Le P. Pézenas dans la nouvelle édition de l'Optique de Smith, qu'il a donnée à Avignon en 1767. M. Duval

le Roy, dans celle qu'il a donnée à Breſt la même année.

Révolution arrivée en 1667, dans les inſtrumens.

2309. L'établiſſement de l'Académie Royale des Sciences de Paris, en 1666, forma une époque mémorable dans les Sciences, mais ſur-tout dans celle des obſervations aſtronomiques; juſqu'alors Boulliaud & Gaſſendi, nos meilleurs obſervateurs, s'étoient contentés de faire des obſervations à l'eſtime, & avec des inſtrumens groſſiers. Pour voir combien il y avoit juſqu'alors d'inexactitude dans les obſervations, il ne faut que jetter les yeux ſur les variétés qu'il y a eu dans la latitude de Paris, déterminée en divers temps (2243). Auzout ſe plaignoit beaucoup de l'imperfection des inſtrumens, & ſouhaitoit ardemment de les perfectionner. Nous voyons qu'en 1664, dans une Epître au Roi, il lui diſoit: *Mais*, SIRE, *c'eſt un malheur qu'il n'y a pas un inſtrument à Paris, ni, que je ſache, dans tout votre Royaume auquel je vouluſſe m'aſſurer pour prendre préciſément la hauteur du pole*; il auroit pu ajouter qu'il n'y en avoit pas plus en Angleterre, en Italie, &c.

Louis XIV, ſecondé par les ſoins du grand Colbert, ne tarda pas à y remédier; l'académie des Sciences fut établie; on jetta les fondemens de l'Obſervatoire royal; on raſſembla les aſtronomes François; on en appella du dehors, & l'on fit conſtruire les meilleurs inſtrumens. Les ſoins du Miniſtère furent heureuſement ſecondés par l'habileté des aſtronomes. Auzout & Picard imaginèrent en 1667 de placer la lunette ſur le quart-de-cercle (2312), au lieu des pinnules dont Tycho-Brahé ſe ſervoit.

Uſage des lunettes ſur le quart-de-cercle.

2310. On trouve dans l'hiſtoire céleſte de M. le Monnier, *pag.* 2 & 11, l'extrait d'un mémoire lu à l'académie par M. Picard, au mois de Décembre 1667; il rapporte des hauteurs méridiennes du ſoleil, obſervées au mois d'Octobre 1767, dans le Jardin de la Bibliothèque du Roi, avec un quart-de-cercle de 9 pieds 7 pouc. de rayon, & avec un ſextant de 6 pieds, dans leſquels il y avoit des verres au lieu de pinnules; ce ſont les premières obſervations où l'on ait appliqué des lunettes aux quarts-

de-cercle, & cette idée doit être regardée comme une de celles qui ont changé la face de l'aſtronomie ; on la verra employée dans tous les inſtrumens que nous allons décrire.

DESCRIPTION DU QUART-DE-CERCLE MOBILE.

2311. Le quart-de-cercle mobile eſt de tous les inſtrumens d'Aſtronomie, celui dont l'uſage eſt le plus ancien, le plus général, le plus indiſpenſable, le plus commode : c'eſt pourquoi je commencerai par celui-là ; on a déja vu la manière dont il faut concevoir l'uſage du quart-de-cercle pour meſurer des hauteurs (23) : il ne s'agit plus que des détails de l'inſtrument, porté à ſa dernière perfection.

Je ſuppoſe un quart-de-cercle de trois pieds de rayon, *CBA* (*Fig.* 149). Le limbe qui forme la circonférence *ADB* eſt aſſemblé avec le centre *C* par trois règles de fer *CA*, *CD*, *CB*, de deux pouces de large, fortifiées chacune par-derrière d'une règle de champ qui en empêche la flexion. Vers le centre de gravité *X* de la maſſe entière du quart-de-cercle, eſt fixé un axe ou cylindre de deux pouces de diamètre ſur 5 à 6 pouces de long, perpendiculairement au plan de l'inſtrument ; ce cylindre entre dans une douille, c'eſt-à-dire, dans un cylindre creux *E* repréſenté ſéparément en *EE* (*Fig.* 153) ; cette pièce qu'on appelle *le genou*, eſt compoſée non-ſeulement d'une douille horizontale *EE*, mais d'un autre cylindre *e*, fondu tout d'une pièce avec la douille, & que l'on place verticalement en *n* ſur le pied de l'inſtrument. Pour empêcher que le quart-de-cercle ne ſorte de ſa place, on applique derrière la douille ou le canon *E* (*Fig.* 149) une plaque de fer qui recouvre le tout ; cette plaque eſt arrêtée par une forte vis, qui pénétre dans l'axe du quart-de-cercle, & qui tourne avec lui, ſans lui permettre de ſortir de la douille.

Planche XVIII. Fig. 149. Axe. *Fig.* 153. Genou. *Fig.* 149.

Par le moyen de ce genou, le quart-de-cercle peut

Fig. 149. tourner verticalement & horizontalement ; il tourne verticalement, c'eſt-à-dire, ſans changer de vertical, lorſque le genou *EF* reſtant immobile, l'axe du quart-de-cercle tourne dans la douille à frottement dur ; il tourne horizontalement en ſe dirigeant ſucceſſivement vers tous les points de l'horizon, lorſqu'on fait tourner ſur ſon pied l'arbre *F* du genou. Il y a des vis de preſſion au-deſſus de la douille horizontale *E*, & à côté de la douille verticale *F*, comme on le voit au-deſſus de *p*, avec leſquelles on preſſe le canon dans ſa douille lorſqu'on veut fixer le quart-de-cercle à une hauteur donnée, ou dans un vertical déterminé.

Vis de preſſion.

Lunette. 2312. Vers l'un des rayons *CB* du quart-de-cercle on fixe une lunette *GM*; elle paſſe dans une douille de cuivre, fixée en *G* par des rebords ou empattemens, où paſſent de fortes vis qui l'aſſujétiſſent inébranlablement ſur la carcaſſe de l'inſtrument; à l'autre extrémité *M* eſt la boîte du micromètre, fixée auſſi par des empattemens. A l'égard du tuyau qui s'étend de *G* en *M*, il n'importe de quelle manière il ſoit fait, ce n'eſt que pour donner de l'obſcurité dans la lunette; on le fait ordinairement de cuivre, il ſuffit qu'il ait 15 à 16 lignes de diamètre pour un quar-de-cercle de trois pieds, à moins que la lunette ne ſoit achromatique ; la ſolidité en eſt indifférente ; mais celle des deux pièces *G*, *M*, qui portent les verres, eſt eſſentielle, parce que leur ſolidité aſſure celle de l'axe optique de la lunette, qui doit être exactement parallèle au plan de l'inſtrument (2569), & au premier rayon qui paſſe par le point de 90°. Nous expliquerons la maniere de lui donner préciſément cette ſituation (2555).

Suſpenſion du fil. 2313. Au centre *C* de l'inſtrument, eſt un cylindre de cuivre exactement tourné, qui porte à ſon centre un point très-délicat & très-fin. Dans ce point, on place la pointe d'une aiguille, ſur laquelle on fait paſſer la boucle du fil à plomb ; on voit ſéparément en Fig. 150. *AA* (*Fig.* 150) le cylindre, ainſi que l'aiguille placée au centre, qui y eſt ſupportée par une pièce d'acier *a* recourbée,

recourbée, & percée d'un trou, au travers duquel paſſe l'aiguille pour aller ſe loger au centre du cylindre. Quand elle y eſt bien placée, on a ſoin de la ſerrer dans le trou de la pièce *a* avec une vis de preſſion qui paroît au-deſſus de *a*. Autour de l'aiguille *a*, l'on fait une boucle avec un cheveu, un fil de pite, ou un fil d'argent très-fin; à cette boucle placée tout contre le cylindre du centre, on ſuſpend le fil-à-plomb chargé d'un poids que l'on voit en *q* (*Fig.* 149); ce fil marque ſur la diviſion du limbe le degré de la hauteur à laquelle eſt dirigée la lunette *MG*. L'extrémité du cylindre *AA* (*Fig.* 150), qui porte le point du centre & la pointe de l'aiguille, doit être un peu arrondie ou convexe, pour que le fil n'y éprouve pas un trop grand frottement (2386). On peut auſſi mettre à la place de l'aiguille *a* une vis qui ſe termine en une pointe très-fine, & qui tourne dans la pièce *a*, comme dans une eſpèce de pont. *Fig.* 150.

2314. Autour du cylindre qui porte le centre du quart-de-cercle, il y a une plaque de cuivre plus large, ronde, fixée ſur la charpente de l'inſtrument. Sur cette pièce eſt ſuſpendu le *garde-filet* *C H* (*Fig.* 149); c'eſt une longue boîte de cuivre, mince, ſoutenue vers le centre, autour duquel elle tourne pour ſe mettre toujours d'à-plomb, & contenir le fil ou le cheveu qui pend du centre pour marquer la diviſion. Ce garde-filet a une longue porte qui ſe ferme avec deux petits crochets, pour garantir mieux le fil de l'agitation de l'air; on la voit ouverte ſur la gauche; à la partie inférieure *H* eſt une boîte plus large. Il y a des aſtronomes qui y placent un vaſe d'eau où trempe le poids du fil à-plomb, afin que la réſiſtance diminue les oſcillations & en abrege la durée; j'ai toujours craint qu'elle ne diminuât auſſi la liberté du poids, & je n'en ai jamais fait uſage: j'ai reconnu par expérience qu'on peut fixer le plomb en le touchant légérement du bout du doigt, & quand ſes oſcillations ſont très-petites, on peut les *Fig.* 149. Garde-filet.

Fig. 149, 151 & 152. anéantir en les contrariant à propos par un petit tour de la vis, qui fait faire une oſcillation oppoſée, & arrête ſubitement le fil à-plomb : on a bientôt acquis cette habitude quand on obſerve ſouvent. La boîte inférieure a une porte *Z* où eſt attaché un microſcope & une lampe à deux meches ; la lampe ſert à éclairer le limbe & le fil à-plomb, pour voir ſur quelle diviſion il répond ; le microſcope ſert à groſſir les points, pour mettre facilement & exactement le fil du quart-de-cercle ſur le point que l'on veut (2578).

Verge de rappel.

2315. La verge de conduite ou *Verge de rappel* *LKI* eſt une addition très-utile que M. de Fouchy a introduite pour mettre le fil ſur tel point du limbe que l'on veut ; on la voit repréſentée ſéparément en *IL* (*Fig.* 151 & 152), avec tous ſes détails ; mais il faut ſuppoſer que la partie *L Fig.* 152, eſt placée au-deſſus & ſur le prolongement de la partie *I* (*Fig.* 151). La tringle a trois pieds de long, ſept lignes de large & cinq d'épaiſſeur ; elle eſt logée par ſes deux bouts dans deux boîtes de cuivre *I*, *L*. Quand elle eſt arrêtée en *I* (*Fig.* 149), au moyen de la vis de preſſion *c qui* l'empêche de gliſſer dans la boîte *I*, alors l'extrémité inférieure ſert de point d'appui : en tournant l'écrou qui eſt en *B*, l'on fait monter la boîte *L*, qui eſt fixée par une pièce ou mâchoire *r*, derrière le quart-de-cercle, à la règle de champ du limbe, par le moyen d'une cheville qui traverſe & la mâchoire & la règle de champ ; en faiſant mouvoir ainſi la boîte *L*, on fait avancer le quart-de-cercle.

2316. La manière dont l'écrou *B* eſt tenu ſur la boîte *L*, paroît aſſez dans la *Fig.* 152. Cette boîte eſt évidée par en haut ; à ſa baſe ſupérieure eſt pratiquée une rainure dans laquelle tourne un écrou, qui y eſt retenu par le moyen d'un collet, ou qui eſt ſeulement rivé par-deſſous au dedans de la boîte. Cet écrou, qui tient néceſſairement à la boîte, avance quand on le tourne ſur la vis *B* qui eſt à l'extrémité de la verge, parce que

celle-ci eſt fixée par ſon autre extrémité ; l'écrou fait avancer auſſi le quart-de-cercle qui eſt obligé de ſuivre la boîte *L*.

Pour produire ce mouvement avec plus d'exactitude, M. Canivet s'y prend de la manière ſuivante ; à l'extrémité de la boîte *L*, eſt ſoudée une plaque de cuivre d'environ deux lignes d'épaiſſeur, ronde, dans l'épaiſſeur de laquelle on pratique une rainure circulaire de demi-ligne de profondeur : cette rainure reçoit la baſe de l'écrou qui tourne dans la rainure ; la baſe de l'écrou eſt recouverte par deux demi-cercles d'une ligne d'épaiſſeur qui embraſſent l'écrou, auquel on fait, ſi l'on veut, une rainure circulaire pour que les deux demi-cercles s'y engagent mieux. Ces demi-cercles ſont attachés à la plaque ſupérieure de la boîte *L*, chacun avec deux vis ; ils empêchent l'écrou de ſortir de la rainure de la boîte, ſans empêcher qu'il n'y tourne librement. La vis qui termine la verge de conduite paſſe au travers de l'écrou. Un écrou à tête ronde, qui a un grenetis *R* (*Fig.* 167), c'eſt-à-dire, qui eſt légérement dentelé ſur les bords, eſt plus fort que n'eſt un écrou à oreille, tel que je l'ai repréſenté en *B*, & en *m*. *Fig.* 167.

A l'extrémité inférieure *I* de la verge de rappel, on a pratiqué un ſemblable mouvement, pour que l'obſervateur qui eſt occupé à regarder le fil à-plomb, puiſſe faire tourner le quart-de-cercle d'une petite quantité, & le mettre exactement ſur celui des points de la diviſion qui approche le plus de la hauteur de l'aſtre qu'on ſe propoſe d'obſerver. Pour cet effet, la boîte *I* (*Fig.* 151), *Fig.* 151. eſt fixée ſur une pièce de fer ou de cuivre, coudée *f*, qui paſſe dans une autre boîte *g*, & ſe termine par une autre vis *m*, qui eſt priſe dans un écrou, arrêté par un collet ſur la baſe de la boîte *g* dans laquelle il tourne librement ; en faiſant tourner l'écrou *m*, on fait avancer la vis, la pièce *f* & la boîte *I*, dans laquelle eſt ſerrée la verge de rappel, par une vis de preſſion *c* : cette verge eſt obligée d'avancer & de faire mouvoir avec elle le quart-de-cercle.

La boîte *g m* auſſi bien que la boîte *B L* doivent être mobiles autour d'un axe pour ſe prêter aux différentes inclinaiſons de la verge de rappel; & la boîte *g* eſt montée ſur un collet *N* (*Fig.* 149), qui embraſſe le pied du quart-de-cercle, qui y tourne librement, & qu'on peut arrêter par une vis de preſſion, pour fixer le quart-de-cercle dans un vertical déterminé; mais cette vis de preſſion n'eſt pas abſolument néceſſaire.

Fig. 149.

Arbre du pied.

2317. Le montant *O N* ou pied du quart-de-cercle eſt un arbre de fer de deux pouces de diamètre ſur 3 pieds & demi de hauteur, il ſe termine par un carré, qui paſſe au travers des barres *P*, *P*, qui ſont les traverſes du pied. Dans ce carré l'on paſſe une clavette au-deſſous de *Q*; auſſi-tôt que les quatre arcs-boutans *R* ont été mis en place, on ſerre cette clavette *Q* à coups de marteau, cela fait deſcendre l'arbre *NO* ſur les arcs-boutans, & forme un aſſemblage ferme & invariable de l'arbre avec ſes arcs-boutans *R* & ſes traverſes *PP*. Le pied *O N* doit être aſſez long pour que le limbe *DA* ſoit à 2 pieds de terre, ou même $2\frac{1}{2}$ pour la commodité des Obſervateurs.

Arcs-boutans.

Vis & coquilles du pied.

2318. Pour caler l'inſtrument, on employe les 4 vis que l'on voit aux extrémités *P*, *P*, des traverſes du pied; elles ſont de cuivre, & ont un pouce de diamètre; elles ſervent à ſoutenir le pied de l'inſtrument, à l'incliner, à rendre ſon arbre *ON* exactement vertical, de manière qu'on puiſſe faire tourner le quart-de-cercle ſur ſon pied ſans que le plan ceſſe d'être vertical, du moins ſenſiblement. Ces vis portent ſur des coquilles de fer, que M. le Cardinal de Luynes employa le premier, vers 1745, & qui ſervent par leur frottement à empêcher que le quart-de-cercle ne change de place quand on tourne la vis.

Cercle azimutal.

2319. Le cercle azimutal *p h*, a 6 pouces de diamètre; il eſt fixé à une douille de cuivre qui eſt attachée ſur le pied de l'inſtrument; le canon *F* du genou porte à ſon extrémité inférieure une alidade *k*, qui

tourne avec le quart-de-cercle, tandis que la plaque azimutale eſt fixe; l'alidade marque par ſon mouvement le degré d'azimut, ou le point de l'horizon auquel le plan eſt dirigé.

L'uſage de ce petit cercle azimutal, ne s'étend pas juſqu'à obſerver l'azimut avec préciſion, comme Tycho le faiſoit autrefois; on a banni ce genre d'obſervations comme trop difficile à bien faire : cependant j'ai vu à Avignon, un quart-de-cercle fait ſous les yeux du Pere Morand, dont l'axe exactement tourné portoit à ſa partie inférieure, & entre les pieds du quart-de-cercle un grand cercle azimutal, avec lequel on pouvoit très-bien obſerver l'azimut; cela eſt ſouvent commode & utile, mais exige des vérifications particulières.

2320. Le limbe *ADB* du quart-de-cercle eſt la pièce la plus eſſentielle, il a deux pouces de large, ſon épaiſſeur qui eſt de quatre lignes eſt formée de deux lames, une de fer & l'autre de cuivre; il eſt important que le limbe de cuivre ſoit bien dreſſé, & que toutes ſes parties ſoient dans un ſeul & même plan (1119) avec le point du centre. Pour parvenir à cette opération difficile, on ſe ſert d'une règle qu'on fait tourner autour d'un grand axe, & l'on voit ſi malgré ſon mouvement l'extrémité de la règle eſt toujours également proche du limbe dans tous ſes points. On peut auſſi reconnoître ſi le limbe d'un inſtrument eſt dans un ſeul & unique plan, en établiſſant un canal plein d'eau qui parte du centre, & touche la circonférence; on y place une eſpèce de petite barque, dont le mat eſt un fil de fer recourbé, & qui touchant preſque le centre & le limbe indique par ſa diſtance en divers points ſi tous ſont dans le même plan; c'eſt ainſi que l'on nivelle les grandes méridiennes des gnomons. C'eſt un uſage trop répandu juſqu'ici, de former le limbe d'un quart-de-cercle avec du cuivre, tandis que l'aſſemblage eſt de fer; le cuivre ſe dilate plus par la chaleur, & cela peut changer l'arc de 90°. Il eſt vrai qu'on remédie preſque entiérement à cet inconvénient par la force des rivets, ou

Limbe qui porte les diviſions.

des clous qui attachent le cuivre ſur le fer, car M. Bouguer ayant expoſé un quart-de-cercle à une très-grande chaleur, ne trouva pas dans les angles de différence ſenſible (*Fig. de la Terr. pag.* 184); cependant on feroit encore mieux de n'employer que du cuivre dans la conſtruction toute entière de l'inſtrument; cela ſe pratique depuis long temps en Angleterre, quoique la dépenſe ſoit un peu plus conſidérable, & M. Canivet en a fait pluſieurs à Paris, de la même façon.

La manière de diviſer un inſtrument eſt un objet qui devroit peut être nous occuper ici, mais l'ouvrage de M. le Duc de Chaulnes, & celui de M. Bird, publié en Angleterre, contiennent ſur ce ſujet des détails auxquels nous ne pouvons que renvoyer.

Diviſions. C'eſt ſur le limbe *ADB* que l'on place les diviſions, quelquefois par tranſverſales (2336); mais plus ſouvent avec de ſimples points, comme on le voit dans la *Fig.* 149; lorſque la lunette a un micromètre, comme on le voit en *M*, on n'a beſoin que d'avoir des points de dix en dix minutes. Nous parlerons de la manière de vérifier ces diviſions, (2562 & ſuiv.).

Méthode Angloiſe. 2321. En Angleterre tous les quarts-de-cercles mobiles ont une alidade ou lunette mobile, comme dans la *fig.* 155, avec un vernier (2343); enſorte que le limbe du quart-de-cercle ne change point, & que la lunette ſeule tourne autour du centre, comme dans un mural. On ſe contente d'employer un fil à-plomb, qui pend ſur le dernier point de la diviſion, ou du moins qui eſt parallèle au rayon vertical de 90°; quelquefois même on n'y emploie que le niveau (2398), dont l'uſage eſt plus commode que celui du fil à-plomb, ſans être moins exact quand le niveau eſt bienfait.

Pièce du double genou. *Fig.* 153. 2322. Le double genou repréſenté en *ST*, (*fig.* 153), ne ſert que pour mettre le plan de l'inſtrument dans une ſituation horizontale. La partie *e* du premier genou étant toujours verticale, & la partie *EE* toujours horizontale; le cylindre *T* entre dans le canon *EE*, où il tourne à frottement; l'axe *V* qui porte le quart-de-

cercle, & qui eſt vertical quand le plan eſt dans une ſituation horizontale, entre dans la douille *S*; par ce moyen on donne au plan toutes les inclinaiſons néceſſaires (2583). Voyez les vérifications & les uſages du quart-de-cercle, art. 2550 & ſuiv.

Sextant de Flamſteed pour meſurer les diſtances.

2323. PEU de temps après la perfection des inſtrumens à Paris (2310), Flamſteed entreprit d'obſerver en Angleterre, avec la même préciſion; vers la fin de 1671, il commençoit à meſurer des diſtances dans le Ciel avec des lunettes de 7 & de 15 pieds, à *Derby*; & il reconnut ſouvent que les tables de la lune, & les catalogues d'étoiles dont on ſe ſervoit alors étoient défectueux; les poſitions des étoiles marquées dans le catalogue de Tycho, s'écartoient ſouvent de 3, 4, ou 5′, & les lieux de la lune de 15 à 20′ de l'obſervation. Ce fut alors que le Chevalier MOOR, qui étoit à la tête de l'Artillerie, qui aimoit les Siences, & en particulier Flamſteed, lui fournit des inſtrumens, & détermina Charles II à faire bâtir l'Obſervatoire devenu ſi célèbre, de GRÉENWICH près de Londres, où Flamſteed entra au mois d'Août 1676. (*Hiſt. céleſt. Prolég. pag.* 103).

Généroſité du Chevalier Moor.

Au défaut d'un quart-de-cercle mural que Flamſteed ne put d'abord ſe procurer, il s'occupa pendant les douze premières années à meſurer les diſtances des étoiles entre elles & les diſtances des planètes aux étoiles, avec un ſextant que le Chevalier Moor lui avoit donné; je vais le décrire ici pour faire connoître la manière dont les premières obſervations d'Angleterre ont été faites dans le dernier ſiècle, & le degré d'exactitude qu'on doit attendre de ces obſervations, qui ſeront toujours fort utiles pour les recherches des aſtronomes.

2324. Le ſextant *CDB* (*fig.* 148) a 6 pieds 9 pouces $\frac{1}{4}$ de rayon meſure d'Angleterre (6 pieds 4 pouces 2 lignes meſure de Paris); il eſt diviſé de 5 en 5′. Vers

Structure du Sextant. *Fig.* 148.

Fig. 148. le centre de gravité, par lequel cet inſtrument eſt ſoutenu, l'on voit une plaque *A* de 9 pouces de large, & d'un pouce & demi d'épaiſſeur, de laquelle partent 10 lames de fer, qui aſſemblent les rayons *CB* & *CD*, avec le limbe *BD* de l'inſtrument. Le rayon *CB* porte 7 barreaux de fer *E*, *E*, d'environ 7 pouces, aux extrémités deſquels eſt une règle *ET*, où ſont portés les verres de la lunette fixe; par ce moyen l'eſpace *BT* eſt ſuffiſant pour que deux obſervateurs puiſſent regarder à la fois par les deux lunettes lorſqu'elles approchent du paralléliſme, ce qui arrive dans la meſure des petits angles.

Diviſions du limbe. Le limbe *BD* eſt de fer, il a un pouce & demi de large, & il eſt couvert d'une lame de cuivre beaucoup plus large, qui a un quart de pouce d'épaiſſeur; le bord extérieur eſt denté, ou plutôt ſtrié comme une vis, & il y a 17 filets dans un pouce; les révolutions, ou les valeurs de ces filets, ou ſtries, ſe comptent ſur des cercles tracés ſur le limbe de cuivre, tout près du bord; mais comme le ſextant eſt vu par-deſſous dans la *figure* 148, je n'ai pu y repréſenter les diviſions. Il y a encore ſur le limbe de cuivre des cercles diviſés en degrés, & de 5 en 5′, les diagonales ſont éloignées entre-elles de 5′, & la largeur du limbe eſt diviſée en 5 parties ſur le bord d'un carré de cuivre, qui ſert d'index ou de ligne de foi, à peu-près comme dans la *figure* 145, & qui accompagne la lunette mobile; ces parties qui valent une minute chacune, ſont encore ſubdiviſées en ſix parties ſenſibles qui donnent 10″.

Manière de l'incliner. L'alidade, ou lunette mobile *CO*, qui tourne autour du centre *C* de l'inſtrument, porte une lunette à deux verres convexes, & au foyer commun deux fils à angles droits, pour la diriger exactement à l'étoile. On voit ſur le revers de l'inſtrument entre le limbe & le rayon *CD*, une barre de fer *NN*, placée de champ, ſur laquelle eſt ajuſté le demi-cercle denté *NFF*. Les extrémités de la barre *NN* ſont cylindriques, & reçues en *NN* dans deux colliers de cuivre, comme des pivots dans leurs trous, pour que le plan du Secteur puiſſe

s'incliner

s'incliner en tournant autour de l'axe *NN*. Cet axe *NN* eſt parallèle à la lunette fixe *TE*, par ſon moyen on tourne le ſectant ſans que la lunette fixe *EE* quitte l'étoile à laquelle elle étoit dirigée, & de manière que la lunette mobile *OC*, puiſſe parvenir dans la poſition néceſſaire pour l'autre aſtre.

Une barre de fer *GG* perpendiculaire à la barre *NN*, & fixée également ſur le plan du Secteur, porte un autre demi-cercle denté, *H*, dont le plan eſt perpendiculaire à celui du grand demi-cercle *FF*, & qui eſt plus petit & plus mince. Sur ce demi-cercle, & dans l'endroit où il touche le grand demi-cercle *NF*, il y a une vis ſans fin avec un manche, qui ſert à incliner le plan de l'inſtrument pour lui faire faire un angle quelconque, avec le plan du grand demi-cercle *FF*, qui eſt toujours dans le plan d'un cercle de déclinaiſon.

Mouvement parallatique du Sextant.

2325. L'axe *AQX* ſur lequel tourne l'inſtrument eſt de fer, & a 3 pouces de diamètre, il eſt arrondi & conique à l'extrémité *X*, où il tourne dans un cone de cuivre; mais ſa partie ſupérieure eſt écarrie & fendue pour recevoir le demi-cercle *FF*, dont le centre répond à l'extrémité *A* de l'axe. La circonférence de ce demi-cercle engrene dans un pignon en *I*, & ce pignon engrene dans une autre roue qui eſt conduite par une manivelle *M* & une vis ſans fin, ce qui donne le mouvement à toute la machine, afin que la lunette fixe *ET* puiſſe ſe placer dans un parallèle quelconque : car elle ſeroit toujours dans le plan de l'équateur ſi elle reſtoit perpendiculaire à l'axe *AX*. Un peu au-deſſous du milieu de l'arbre eſt une boîte *Q* de cuivre, qui eſt à l'extrémité d'un fort montant de chêne ; l'axe y eſt ſupporté & contenu dans le plan du méridien, de manière à ſe diriger toujours vers le pole du monde.

Les deux demi-cercles *F* & *H* ſervent à placer l'inſtrument dans le plan de deux aſtres pour en meſurer la diſtance ; on commence par diriger la lunette fixe *ET* vers l'un des deux aſtres, par le moyen du ſeul

demi-cercle *FF*, après quoi ſans quitter l'étoile on peut faire tourner le plan de l'inſtrument par le demi-cercle *H*, de manière que la lunette mobile *CO* étant placée ſur quelque point du limbe ſoit dirigée vers l'autre aſtre.

Il y a actuellement à l'Obſervatoire Royal de Greenwich un très-beau quart-de-cercle mobile de trois pieds de rayon qui s'incline en tout ſens par le moyen de deux axes & de deux demi-cercles dentés, à peu-près comme le ſextant que je viens de décrire.

Il avoit demandé un mural.

2326. Avant que ce ſextant mobile fût conſtruit, Flamſteed avoit demandé qu'on fît faire un quart-de-cercle mural pour meſurer les hauteurs méridiennes des étoiles, & on le lui avoit promis; mais un des membres de la Société Royale ayant voulu le faire conſtruire à ſa manière, il ſe trouva hors d'état de ſervir, & Flamſteed ſe tourna du côté de l'obſervation des diſtances; dans le même temps qu'à l'Obſervatoire royal de Paris on obſervoit les hauteurs méridiennes, comme on le peut voir dans l'hiſtoire céleſte.

2327. Flamſteed eſſaya d'obſerver des hauteurs méridiennes avec le ſextant que nous avons décrit; mais comme cela étoit fort difficile, il fit conſtruire à ſes frais en 1683 un inſtrument du même rayon, qu'il diviſa lui-même, & dont il ſe ſervit pluſieurs années.

Mural fait par Abraham Sharp.

En 1688, Abraham Sharp fut choiſi pour aider Flamſteed dans ſes obſervations; c'étoit un homme très-adroit, en même temps qu'il étoit fort inſtruit dans les Mathématiques; il fit lui-même un arc mural de 69 pouces $\frac{1}{2}$ de rayon, (5 pieds, 5 pouces de Paris); avec lequel Flamſteed fit enſuite pendant 30 ans les obſervations qui ont ſervi à dreſſer le fameux Catalogue Britannique, & il commença le 19 Septembre 1689, (*Prolegom. pag.* 111). Cet inſtrument étoit ſi bien fait que les Artiſtes même l'admiroient; mais comme les muraux qui ſe font aujourd'hui ſont encore plus parfaits, je me contenterai de les décrire.

Deſcription du Quart-de-Cercle mural.

2328. Tycho-Brahé qui avoit beaucoup perfectionné le quart-de-cercle fut le premier qui imagina le quart-de-cercle MURAL, c'eſt-à-dire, celui dont le plan eſt fixé contre un mur, & dont l'alidade parcourt le plan du méridien, pour obſerver les paſſages & meſurer les hauteurs méridiennes; il donna à cet inſtrument le nom de *Quadrans Tychonicus*, (*Aſtron. Inſt. Mecan. pag.* 21) en qualité d'inventeur, & il s'en ſervit beaucoup pour déterminer la théorie du ſoleil; c'eſt véritablement l'inſtrument le plus commode & celui avec lequel on peut faire en peu de temps le plus grand nombre de bonnes obſervations.

Le mural que l'on voit dans la *fig.* 155 fut fait à Londres en 1742 par Jonathas Siſſon, ſous la direction de M. Graham; M. le Monnier s'en ſervit à Paris juſqu'en 1751 qu'il fut tranſporté à Berlin, pour mes obſervations (*Hiſt. de l'acad. de Berlin, T. VI, an.* 1750, *pag.* 255. *Smith Optique art.* 853). *Fig.* 155.

2329. Ce mural eſt entièrement de cuivre, il a environ 5 pieds de rayon, le chaſſis en eſt formé par des règles plates de cuivre fortifiées par des règles de champ. Les rayons *HB*, *HA* étant diviſés chacun en quatre parties égales ſervent à trouver les points *D* & *E* par leſquels le quart-de-cercle eſt ſuſpendu librement ſur des appuis ou ſupports de fer, qui font ſaillie ſur le nud du mur. Mural de cuivre de 5 pieds.

L'un des ſupports *E* eſt repréſenté ſéparément en *e* à côté du quart-de-cercle; il eſt mobile au moyen d'une tringle *EF* ou *ef* qui paſſe dans un écrou, pour rétablir l'inſtrument dans ſa ſituation, lorſqu'on voit qu'il en eſt un peu dérangé; cela ſe reconnoît par le moyen du fil perpendiculaire *HA* qui doit toujours répondre ſur le même point *A* du limbe, & qu'on a ſoin d'examiner avec un microſcope à chaque obſervation. Suſpendu librement.

Pour empêcher la vacillation d'une auſſi grande machi-

Fig. 155. ne on a placé derrière le limbe 4 oreilles de cuivre avec de doubles équerres I, K, l, K; il y en a d'autres le long du rayon HA & du rayon HB; chacune de ces équerres porte deux vis entre leſquelles on arrête les oreilles qui ſont fixées derrière le quart-de-cercle.

Ces équerres ſont ſcellées dans le mur ou dans la pierre qui porte l'inſtrument, & le contiennent dans le plan du méridien, ſans s'oppoſer à la dilatation ou à la contraction des règles de cuivre dont eſt compoſé le mural; cette liberté qu'a l'inſtrument de s'étendre en tout ſens, fait que la dilatation cauſée par la chaleur, ne change rien aux angles qu'on meſure par ce moyen (2320).

Contre poids de la lunette. 2330. Au-deſſus de la pierre qui porte l'inſtrument & à la même hauteur que le centre, on place horizontalement un axe PO, qui eſt perpendiculaire au plan du quart-de-cercle & qui paſſeroit par le centre c s'il étoit prolongé. Cet axe tourne ſur deux pivots P; ſur cet axe eſt fixée à angles droits une autre branche ON chargée à ſon extrémité d'un poids N, capable de faire équilibre avec la peſanteur de la lunette LM; tandis que l'axe par ſon extrémité voiſine du quart-de-cercle conduit le chaſſis de bois PRM qui tient à la lunette en M. Le contre-poids diſpenſe l'Obſervateur de ſoutenir le poids de la lunette quand il s'agit de l'élever, & empêche qu'elle ne charge & ne fatigue le limbe de l'inſtrument.

2331. L'extrémité inférieure V de la lunette eſt garnie de deux petites roulettes qui prennent le limbe du quart-de-cercle des deux côtés; la lunette ne touche preſque le limbe que par ces deux roulettes qui en rendent le mouvement ſi doux, qu'en lui donnant de la main un aſſez petit mouvement, la lunette parcourt toute ſeule une grande partie du limbe du quart-de-cercle, emportée par le contre-poids N (2330).

233.. Lorſqu'on veut arrêter la lunette à une certaine hauteur, on ſe ſert d'une main de cuivre T qui embraſſe le limbe, & qui fait reſſort par deſſous; elle

ſe fixe par une vis de preſſion qui la ſerre ſur le limbe; alors en tournant la vis de rappel on fait avancer la lunette juſqu'à ce que l'aſtre dont on obſerve la hauteur ſoit ſur le fil horizontal de la lunette; on voit alors ſur une plaque *X* qui tient à la lunette, & qui porte un vernier (2343), le nombre de degrés & de minutes & même les quarts-de-minutes, le reſte s'eſtime facilement à 2 ou 3″ près (2345).

Inſtrumens faits par M. Bird & Canivet.

2333. M. Bird, célebre artiſte de Londres, a fait trois quarts-de-cercle de 8 pieds de rayon, pour Greenwich, Paris & Péterſbourg, & deux de 6 pieds pour Gottingen & pour Cadix; ils ſont d'une ſi grande perfection que le gouvernement d'Angleterre a acheté ſa méthode, & l'a publiée en 1767 (*The method of dividing, &c. London by John Nourſe*, 1767, *in*-4°). Dans quelques uns de ces quarts-de-cercle on a deux diviſions par lignes (2345), avec une diviſion par points entre les deux autres, & l'alidade qui eſt en *X* (*fig.* 155) eſt percée vers le milieu pour qu'on ait la facilité d'y tendre un fil qui ſe place ſur les points. Après qu'on a obſervé une étoile on emploie le micromètre extérieur pour trouver le chemin qu'il faut faire faire à la lunette pour qu'elle parvienne ſur le point, & l'on ajoute cette quantité à celle qui eſt indiquée par le point, pour avoir la hauteur de l'étoile. M. Siſſon a fait auſſi à Londres pluſieurs muraux; M. Canivet, ingénieur pour les inſtrumens de Mathématiques à Paris, a fait un mural de 6 pieds pour l'obſervatoire de Milan, & pluſieurs ſextans de 6 pieds de rayon pour différens Obſervatoires de l'Europe; mais ce ſont des inſtrumens mobiles (2559), à deux lunettes, faits ſur le principe du quart-de-cercle de la *figure* 149.

Des différentes diviſions du Quart-de-Cercle.

2334. Il y a quatre méthodes pour ſubdiviſer dans un quart-de-cercle l'intervalle d'une diviſion à l'autre, qui eſt ordinairement de 5 ou de 10′: 1°, le

micromètre ; 2°, la vis extérieure ; 3°, les tranverſales avec une alidade diviſée ; 4°, la diviſion de Vernier.

Le micromètre d'un quart-de-cercle mural eſt le même que pour un quart-de-cercle mobile, & nous en donnerons la deſcription (2366) ; on l'a employé en France dans quatre quarts-de-cercles muraux, dont trois ſont à l'Obſervatoire royal & un dans la maiſon de M. de Fouchy, rue des Poſtes ; ce dernier y fut placé dans le temps que M. Godin & M. de Fouchy y obſervoient enſemble.

Uſage de la vis extérieure.

2335. La vis extérieure a été employée en Angleterre dans les muraux de 8 pieds & dans les grands ſecteurs ſemblables à celui de l'art. 2381. La vis *T* (*fig.* 155), deſtinée à mouvoir la lunette porte un petit cercle ou cadran de laiton diviſé, qui eſt fixé ſur la *vis*, & qui tourne avec elle. Il y a un index qui eſt placé à frottement dur ſur la monture & qui ne tourne point avec le cadran & avec la vis ; quand on a obſervé la hauteur d'une étoile en la mettant exactement ſur le fil de la lunette, & qu'on veut ſavoir le nombre de ſecondes qui y répond, on place l'index ſur le *chiffre* zéro ou ſur le commencement de la diviſion du cadran ; l'on fait tourner la vis avec ſon cadran juſqu'à ce que l'alidade *X* ou le Vernier tombe exactement ſur un des points de la diviſion, & le nombre de ſecondes qui a paſſé ſur le cadran, en le faiſant ainſi mouvoir, s'ajoute avec les degrés & minutes qui répondent au point de la diviſion ; ſi les pas de la vis ne ſont pas tels qu'un tour faſſe exactement une minute, on diviſe le cadran en conſéquence des filets de la vis.

Fig. 155.

Tranſverſales.

2336. La diviſion par tranſverſales droites eſt fort ancienne, elle tire ſon origine de l'échelle géométrique dont on ignore l'auteur ; Tycho-Brahé nous apprend qu'avant lui on s'en ſervoit pour diviſer les flèches, arbalêtes, ou bâtons de Jacob. Thomas Digges, (*Alæ ſeu Scalæ mathem.* 1573), l'attribue à un nommé Cantzler ; Tycho qui en parla pour la première fois dans ſon Traité ſur la comète de 1577, dit qu'il la tenoit d'un

habile Profeſſeur de Leipſick, nommé Homélius, qui l'employoit dans ſon échelle géométrique. Tycho s'en ſervit dans preſque tous ſes inſtrumens, mais en 1672, il ne l'avoit pas encore employée.

2337. Quand aux tranſverſales circulaires Hévélius attribuoit cette invention à Benoît *Hedræus*, auteur Suédois qui la donna en 1643, dans un livre intitulé : *Nova & accurata aſtrolabii geometrici ſtructura*, imprimé à Leyde ; mais Morin dans ſon livre intitulé : *Longitudinum cœleſtium atque terreſtrium ſcientia*, imprimé dès 1634, l'avoit attribué à Jean Ferrier, artiſte induſtrieux, on ne ſait pas ſi c'eſt le même dont parle Clavius dans la préface d'un petit Traité qui eſt à la fin des huit livres de ſa Gnomonique ; celui-ci étoit Eſpagnol, & avoit imaginé une méthode nouvelle & très-ingénieuſe pour tracer les cadrans ſolaires.

2338. Quoi qu'il en ſoit, la méthode des tranſverſales s'emploie encore dans quelques muraux, & dans les quarts-de-cercles mobiles lorſqu'on n'a ni alidade ni micromètre. Soit *ALDE* (*fig.* 145), une portion du limbe d'un quart-de-cercle ; *AL* une portion du rayon, ou de l'alidade qui porte la lunette du mural ; *LB* un arc de 5′ qu'il s'agit de diviſer de 10 en 10″, c'eſt-à-dire, en 30 parties ; on voit aſſez qu'en diviſant la diagonale ou tranſverſale *AB* en 30 parties, à commencer du point *A*, l'alidade *AL* tombera ſur la première diviſion lorſque le point *L* aura parcouru la trentième partie de l'arc *LB* ou 10″, & ainſi des autres. *Fig.* 145.

2339. Ce que nous diſons de l'alidade *AL* ſe doit dire du fil à-plomb dans un quart-de-cercle mobile ; ce fil qui tombe d'abord ſur 4° 0′, c'eſt-à-dire, ſur les points *A* & *L*, en ſuppoſant le quart-de-cercle dirigé à 4° de hauteur, coupera la tranſverſale *AB* ſur le milieu *H* de ſa hauteur quand le fil à-plomb *AL* ſera ſur le milieu de l'arc *LB* ou *AC* ; c'eſt ainſi qu'on ſubſtitue les diviſions d'une ligne *AB* qui a deux pouces de long, à celles d'une petite ligne *LB*, qui à cauſe de ſon extrême petiteſſe, ne pourroit ſe diviſer facilement.

Des cercles concentriques.

2340. La hauteur *AB* devant être divisée en parties égales aussi bien que tous les rayons, tels que *ED*, &c. on se sert dans les quarts-de-cercles mobiles de plusieurs cercles concentriques & parallèles à *CE* & à *BD*; mais dans les muraux il est bien plus commode de ne diviser que la seule alidade *AL*, comme on le voit dans la *fig.* 145; elle peut être divisée sur sa hauteur en 30 parties, ce qui est très-facile en lui donnant 15 à 20 lignes de hauteur, ainsi qu'au limbe du quart-de-cercle; les transversales *AB* de l'instrument étant tirées de 5 en 5′, l'alidade *AL* en parcourant l'espace *LB* de 5′, rencontrera la transversale *AB* successivement dans les points marquées 1, 2, 3, 4; lorsqu'elle sera au point 1, elle aura fait une minute ou un cinquième de l'espace qu'il y a de *L* en *B*, & ainsi des autres minutes; on voit même que chaque intervalle d'une minute étant divisé en 6 parties égales sur l'alidade, on pourra appercevoir si l'alidade *AL* au lieu de rencontrer la transversale *AB* au point 1, ne la rencontre qu'à un sixième de l'intervalle qu'il y a depuis *A* jusqu'en 1, & si elle est à $\frac{1}{30}$ de l'intervalle qu'il y a de *A* en *C*.

Inégalités des transversales.

2341. Les transversales *AB* à la rigueur ne doivent pas être divisées en parties égales, parce que *AC* est plus petit que *LB*, étant une partie d'un cercle de moindre rayon; cette inégalité est insensible dans la pratique; car si le point *H* de la ligne *AB* est celui qui répond à la moitié de *LB*, la partie *AH* doit être plus petite que *HB* d'une quantité égale seulement à la moitié de *AB* multipliée par $\frac{LB-AC}{LB+AC}$, ce qui seroit aisé à démontrer.

Division de Nonnius, ou de Vernier.

2342. La division qui est aujourd'hui la plus employée est appellée dans plusieurs auteurs *division de Nonnius*, quoique Nonnius n'en soit pas tout-à-fait l'auteur; mais il en avoit imaginé une autre qui eut beaucoup de célébrité, & qui pouvoit conduire à celle que nous avons aujourd'hui. Voyez son traité *de Crepusculis*, imprimé en 1542. Le véritable auteur de la nôtre dans son

ſon état actuel fut Pierre VERNIER, Châtelain de Dornans en Franche-Comté, qui la publia dans un petit Ouvrage imprimé à Bruxelles en 1631, intitulé : *La conſtruction, l'uſage & les propriétés du cadran nouveau.* Voyez une diſſertation du P. Pézenas qui renferme beaucoup de choſes curieuſes ſur les inſtrumens de mathématiques. (*Mémoires rédigés à l'Obſervatoire de Marſeille, année* 1755, ſeconde Partie, *pag.* 8 *& ſuiv.*), & les notes de Benjamin Robins ſur l'Optique de Smith ; je crois donc qu'il eſt juſte de rétablir le véritable auteur dans ſes droits, & d'appeller *Vernier* au lieu de Nonnius, la pièce qui forme la diviſion dont il s'agit.

Explication du Vernier.

2343. Le VERNIER eſt une pièce de cuivre *CDAB* (*fig.* 156), (c'eſt la petite portion *X* de la *figure* 155 repréſentée ſéparément) ; on voit que la longueur *CD* du Vernier eſt diviſée en 20 parties égales ; mais elle eſt placée ſous une portion du limbe qui contient 21 diviſions, c'eſt-à dire, qu'on a pris la longueur de 21 diviſions du quart-de-cercle, & qu'on a diviſé cette longueur en 20 parties ſeulement ; ainſi la première diviſion de la pièce de Vernier qui eſt marquée 15, en commençant au point *D*, eſt un peu en arrière ou à la gauche de la première diviſion du limbe, & cela de la vingtième partie d'une des diviſions du limbe, ce qui fait 15″. La ſeconde diviſion du Vernier eſt à gauche de la ſeconde diviſion du limbe, & cela du double de la première différence ou de 30″, & ainſi de ſuite, juſqu'à la 20e & dernière diviſion à gauche de la pièce du Vernier, ou les 20 différences étant accumulées, chacune de la vingtième partie d'une diviſion du limbe, cette diviſion ſe trouve exactement d'accord avec la 21e ligne du limbe du quart-de-cercle. *Fig.* 156.

2344. Il faudra donc pouſſer l'alidade d'une vingtième partie de diviſion ou de 15″ à droite, pour faire concourir la ſeconde diviſion du Vernier avec une des diviſions du limbe ; de même en la pouſſant de deux vingtièmes ou de 30″, il faudra regarder la ſeconde diviſion de l'alidade, & ce ſera celle qui concourra avec

une diviſion du limbe. Ainſi l'on jugera que le commencement *D* du Vernier qui eſt toujours l'index ou la ligne de foi a avancé de 2 diviſions ou de 30″ à droite, quand on verra que c'eſt la ſeconde diviſion marquée 30 ſur le Vernier, qui correſpond exactement à une des lignes du quart-de-cercle.

Utilité de cette méthode.

2345. Par le moyen d'un Vernier fait avec ſoin, l'on diſtingue aiſément un centième de ligne; & ſur le limbe d'un quart-de-cercle de 5 pieds diviſé de 5 en 5′ l'on voit immédiatement 15″, l'on eſtime enſuite juſqu'à 2 ou 3″, à la vue; cette méthode eſt aujourd'hui généralement adoptée, comme la plus parfaite de toutes, & on l'emploie en Angleterre, même pour les quarts-de-cercles mobiles, à la place du micromètre dont on ſe ſert en France (2366).

Fig. 156.

J'ai placé à côté du quart-de-cercle & dans ſa grandeur naturelle (*fig.* 156), la plaque de cuivre qui eſt portée par la lunette. Cette plaque de cuivre porte deux verniers; la ligne ſupérieure *CD* diviſe les cinq minutes en 20 parties, c'eſt-à-dire, de 15 en 15″; la ligne inférieure *AB* répond aux parties d'une autre diviſion qui n'eſt pas de 90°, mais de 96 parties pour le quart-de-cercle; elle a été quelquefois employée en Angleterre à cauſe de la facilité des ſubdiviſions. Chacune des 96 portions du quart-de-cercle vaut 56′ 15″ de la diviſion ordinaire; elle eſt diviſée ſur le limbe en 16 parties, & l'arc de Vernier *AB* occupant 25 de ces diviſions & étant diviſé lui-même en 24, donne immédiatement des parties dont la valeur eſt de 8″ 47‴ $\frac{1}{2}$. De cette manière on peut facilement conſtruire une table de réduction qui ſerve à trouver par le moyen de cette ſeconde diviſion les degrés, minutes & ſecondes, comptés à la manière ordinaire, & avoir une même hauteur de deux manières différentes, ce qui fait une excellente vérification des diviſions du quart-de-cercle, & des hauteurs eſtimées ſur le vernier.

Diviſion en 96 parties.

DESCRIPTION DU MICROMETRE.

2346. LE MICROMÈTRE (a) eſt un inſtrument compoſé de pluſieurs fils placés au foyer d'une lunette, pour meſurer par leur intervalle la grandeur de l'image qu'on y apperçoit ; il y a pluſieurs ſortes de micromètres que je décrirai ſéparément, en commençant par les plus ſimples.

2347. La première idée du micromètre fut donnée par M. Huygens en 1659 (*Syſtema Saturnium*, *pag.* 82). Après avoir parlé des diamètres des planètes qu'il avoit obſervés, il dit que Riccioli avoit trouvé le diamètre de Vénus trois fois plus grand que lui ; & pour juſtifier ſa détermination, il rend compte de la manière dont il s'y eſt pris pour meſurer les diamètres des planètes : voici à peu-près ce qu'il en dit.

Invention du Micromètre.

2348. « Dans les lunettes formées de deux verres » convexes il y a un endroit où l'on peut placer un » objet auſſi petit & auſſi fin qu'on voudra ; il y paroî- » tra très-diſtinct, très-bien terminé..... Si à ce foyer » l'on place d'abord un anneau dont l'ouverture ſoit un » peu plus petite que celle de l'oculaire, on verra par » cet anneau tout le champ de la lunette, c'eſt-à-dire, » tout l'eſpace circulaire qu'on apperçoit dans le ciel en » regardant par cette lunette, & cet eſpace ſera ter- » miné par une circonférence exacte dont le diamètre » eſt facile à meſurer. L'horloge oſcillatoire que nous » avons imaginée depuis peu eſt très-propre à cet effet ; » on ſait qu'il paſſe un degré de la ſphère en 4 mi- » nutes de temps, ou une minute en 4 ſecondes de temps ; » ſi donc une étoile a employé 69″ à parcourir le champ » de la lunette, on ſera sûr que cette lunette occupe » $17' \frac{1}{4}$, & telle eſt celle dont nous nous ſervons. On » prendra alors une ou deux petites plaques ou lames

(a) Μικρὸς, *parvus*, parce qu'il ſert à meſurer de petits angles qui ne paſſent guère un degré.

» dont la largeur aille en diminuant; on percera le tube » de la lunette de chaque côté à l'endroit dont nous » avons parlé, pour y placer les petites lames en tra- » vers (a). Lorſque l'on voudra meſurer le diamètre d'une » planète on examinera quelle largeur doit avoir cette » lame pour cacher entiérement la planète, & cette lar- » geur étant comparée au diamètre entier de l'ouver- » ture de l'anneau, par le moyen d'un compas très-fin, » fera connoître le diamètre de la planète en minutes & » en ſecondes ».

2349. Ainſi le micromètre de M. Huygens ne conſiſtoit qu'en une petite lame qu'il faiſoit gliſſer ſur le diaphragme, ou petit anneau qui circonſcrit l'ouverture; cette lame cachoit par ſa largeur l'image qu'on vouloit meſurer, & en donnoit ainſi le diamètre. M. Auzout imagina le premier en 1666 de renfermer l'image entre deux fils qu'on rapprochoit l'un de l'autre; les premières obſervations faites avec ce nouvel inſtrument furent imprimées en Angleterre même. (*Phil. Tranſ. n°.* 21), M. Townley écrivit enſuite qu'il avoit trouvé une ſemblable invention dans les papiers de M. Gaſcoigne: (*Phil. Tranſ. n°.* 25), & M. Bevis aſſure qu'il en a trouvé la preuve dans une lettre écrite par M. Gaſcoigne en 1641, dont l'original étoit dans la Bibliothéque de Milord Maclesfield. Quoi qu'il en ſoit de l'inventeur ſecret que nous oppoſe l'Angleterre, il eſt sûr que M. Auzout inventa, & qu'il connut le mérite de l'invention; il en fit uſage, il la publia, & en enrichit l'aſtronomie.

M. Auzout imagine les fils mobiles.

2350. Avant que de donner la deſcription des micromètres, il faut parler des *réticules*, qui ſont l'eſpèce la plus ſimple de micromètres; il y en a deux ſortes principales : ſçavoir, le réticule de 45°, & le réticule rhomboïde. Le champ d'une lunette ſimple, tel que le cercle *ACBE* (*fig.* 138), eſt ordinairement garni d'un chaſſis, dans lequel il y a quatre cheveux, ou 4 fils tendus. Le fil *AB* eſt deſtiné à repréſenter le parallèle

Réticule de 45°.

Fig. 138.

(a) *Virgulæ*; petites lames de cuivre, ou d'une autre matière.

à l'équateur ou la direction du mouvement diurne des aſtres ; le fil horaire *CE*, qui lui eſt perpendiculaire, repréſente un méridien ou cercle de déclinaiſon ; & les fils obliques *NO*, *LM*, ſont des angles de 45° avec les deux premiers. *Fig.* 138.

2351. Lorſqu'on veut meſurer la différence d'aſcenſion droite, entre deux aſtres, pour connoître la poſition d'une planète par le moyen de celle d'une étoile, on incline le fil *AB*, de manière que le premier des deux aſtres le ſuive & le parcoure exactement ; & l'on obſerve l'heure, la minute, & la ſeconde où l'aſtre paſſe au centre *P*, ou à l'interſection des fils. Quand le ſecond aſtre vient à traverſer la lunette à ſon tour, il décrit une autre ligne *VFDGR*, parallèle à *APB* ; on compte l'inſtant où il arrive en *D*, c'eſt-à-dire, ſur le même cercle de déclinaiſon *CDPE*, où l'on a obſervé le premier aſtre en *P*, & la différence des temps donne celle des aſcenſions droites (2505). Différence d'aſcenſion droite.

2352. Pour trouver la différence de déclinaiſon, des deux aſtres ou la perpendiculaire *PD*, compriſe entre *AB* & *VR*, on compte le moment où le ſecond aſtre paſſe en *F* & en *G* ; l'intervalle de temps converti en degrés, & multiplié par le coſinus de la déclinaiſon de l'aſtre (892) donne l'arc *FDG*, dont la moitié *FD* eſt égale à *DP*, à cauſe de l'angle *FPD* ſuppoſé de 45° (2507). Différence de déclinaiſon.

2353. M. Bradley a ſubſtitué le réticule rhomboïde au réticule de 45°, & c'eſt aujourd'hui le plus uſité parmi les Aſtronomes. Le réticule de 45° a deux inconvéniens que M. Bradley a voulu éviter ; c'eſt 1°. de rendre inutile une partie du champ de la lunette ; ſavoir, les deux ſegmens *NCL*, *MEO*, qui ſe trouvent en haut & en bas ; 2°. d'embarraſſer conſidérablement le centre de la lunette par l'interſection de pluſieurs fils, l'aſtre peut y paſſer quelquefois ſans être apperçu. Réticule rhomboïde.

Le réticule de M. Bradley eſt formé d'un rhombe *BEDF* (*fig.* 147), tel que l'une des diagonales ſoit *Fig.* 147.

Fig. 147. double de l'autre. Pour le tracer, nous ſuppoſerons un carré *AGHC*, dont les côtés *AC* & *GH* ſoient diviſés chacun en deux parties égales, en *D* & en *B*. Du point *B*, l'on tire aux angles *A* & *C* les lignes *BA*, *BC*, & du point *D* aux angles *G* & *H*, les lignes *DG*, *DH*; ces quatre lignes formeront par leurs interſections le rhombe *BEDF*; *EF* eſt la moitié de *AC*, & par conſéquent la moitié de *BD*; ſi en quelque endroit de ce réticule on tire une ligne *ef* parallèle à la baſe *EF*, la perpendiculaire *Bd* ſera égale à la baſe *ef*, comme *BD* eſt égale à *AC*, c'eſt-à-dire, que la largeur d'une partie de ce rhombe eſt toujours égale à la hauteur.

Propriété de ce réticule.

2354. Lorſqu'on veut comparer avec ce réticule une planète à une étoile, on fait enſorte que le premier des deux aſtres parcoure dans ſon mouvement diurne l'eſpace *EF*; & comme l'on connoît la valeur du réticule en degrés & en minutes, on ſait combien le point *B* eſt éloigné du milieu du fil *EF*, ou du centre de la lunette. Le ſecond aſtre venant à traverſer auſſi la lunette, on compte exactement le temps qu'il a employé à paſſer de *e* en *f*, on convertit le temps en degrés, minutes & ſecondes : on diminue ces degrés, en les multipliant par le coſinus de la déclinaiſon de cet aſtre (892), & l'on a la grandeur de *ef*, ou *Bd*, & par conſéquent *Md*, qui eſt la différence en déclinaiſon des deux aſtres. (Voyez *l'exemple art.* 2518).

2355. Ce réticule ſert à comparer les planètes, & les comètes aux étoiles fixes, qui ont à peu-près la même déclinaiſon, ou bien à comparer les petites étoiles, dont on veut dreſſer un Catalogue, à quelque étoile principale, qui eſt à peu-près ſur leur parallèle. M. de la Caille, qui s'en eſt ſervi au Cap de Bonne-Eſpérance en 1751, pour dreſſer un Catalogue de près de dix mille étoiles dans la partie auſtrale du Ciel, l'avoit fixé dans la lunette d'un quart-de-cercle; on peut également le placer dans une lunette méridienne (2391), ou dans une lunette parallatique (2407).

2356. Pour pouvoir diſtinguer dans l'obſcurité ſi l'étoile a paſſé au-deſſus ou au-deſſous de la ligne *EF* du milieu, on a l'attention de conſerver une largeur conſidérable à la partie *ELB* du réticule, tandis que les trois autres côtés ſont les plus minces & les plus évidés qu'il ſoit poſſible; lorſque l'étoile, après s'être cachée derrière une des lames du réticule, reparoît auſſitôt de l'autre côté, l'on eſt aſſuré qu'elle eſt dans la partie inférieure *EDF*; mais s'il s'écoule pluſieurs ſecondes ſans qu'on l'apperçoive, on juge qu'elle eſt dans le ſegment ſupérieur *EB*, dont la lame eſt beaucoup plus large que les autres; M. de la Caille étoit même dans l'uſage de réſerver pleine toute la partie *BLE*, qui eſt ombrée ou teintée dans la figure. *Fig.* 147.

Toutes les lignes ponctuées *GA*, *GH*, ne ſont que des lignes auxiliaires & acceſſoires, que l'on trace ſur une platine ronde de cuivre deſtinée à former le réticule; & lorſqu'il eſt tracé, l'on abat toutes les parties inutiles, on ne conſerve qu'un anneau circulaire *BLDK*, de la grandeur du champ de la lunette, ou de l'ouverture qu'on veut donner à l'oculaire, & la partie rhomboïde *BEDF*; celle-ci ne fait avec cet anneau circulaire *BLDK* qu'une ſeule pièce, qui ſe place au foyer commun des deux verres. On y met, ſi l'on veut, deux fils *BD*, *LK*, quoiqu'à la rigueur on puiſſe très-bien s'en paſſer.

2357. M. Romer imagina dans le dernier ſiècle une eſpèce de micromètre propre à obſerver les éclipſes, c'eſt-à-dire, à diviſer en 12 parties égales les diamètres du ſoleil & de la lune, malgré leurs changemens (*Hiſt. acad. pag.* 145). Cette lunette, dit M. Horrebow, eſt compoſée de deux objectifs qu'on peut éloigner l'un de l'autre : *Elongato objectivo interiori à cratula* (a), *& contrahendo tubum videbitur filaris cratulæ quadratum eſſe auctius.* (Horrebow *Baſis aſtron. pag.* 88). On trouve dans le même livre de M. Horrebow, la deſcription de pluſieurs inſtrumens de M. Romer, & en particulier de Micromètre de M. Romer.

(a) *Cratula*, c'eſt la boîte qui contient le réticule.

la lunette double, *Tubus reciprocus*, (*Ib. pag.* 97); on peut l'employer à corriger les diviſions des inſtrumens, à obſerver les équinoxes, & à trouver deux points qui ſoient oppoſés, & en ligne droite avec l'axe d'une lunette, comme M. de la Condamine l'a remarqué; on le peut faire avec la lunette d'épreuve (2503); au reſte, les bornes de ce livre n'admettent que la deſcription des inſtruments les plus uſités.

Micromètre ſimple à grande vis.

2358. Les micromètres ſont de deux ſortes : le micromètre qu'on applique à une lunette mobile de 7 à 8 pieds pour meſurer des diamètres, ou des différences d'aſcenſion droite & de déclinaiſon, eſt plus ſimple que celui du quart-de-cercle : je commencerai donc par le premier ; je décrirai le micromètre dont je me ſers depuis 1753, il eſt preſque ſemblable à celui qui avoit été décrit en 1738 dans l'Optique de Smith *art.* 877 : c'eſt la meilleure conſtruction que je connoiſſe.

Fig. 157.

Le micromètre eſt repréſenté dans les *figures* 157 & 158, vu des deux faces; *AB fig.* 157, eſt une platine de 8 pouces de longueur, ſur environ quatre pouces de large. *CD* eſt une vis de 5 pouces de long, ſur 4 lignes $\frac{1}{2}$ de diamètre, qui porte 48 filets ſur chaque pouce; c'eſt la partie eſſentielle du micromètre. Cette vis *CD* paſſe dans un écrou *EF* d'environ trois pouces de long, & dans le milieu on réſerve une moitié d'écrou *G*, qui fait reſſort contre la vis, pour en diminuer le jeu, & pour la nettoyer. L'écrou *EF* porte le chaſſis mobile *HIKL*, qui a deux pouces 8 lignes de large, & autant de hauteur; il eſt contenu & guidé par le côté *IK*, dans une couliſſe formée par une règle de cuivre *AN*, qui recouvre la platine du micromètre.

La vis eſt la partie eſſentielle.

Chaſſis du curſeur.

2359. A l'extrémité du chaſſis *HIKL*, on place une petite lame *mn*, fixée ſur le chaſſis, avec deux vis, & qui porte deux petits bras, pour tendre le fil mobile ou le curſeur. Sur l'extrémité des deux petits bras, il y a deux autres pièces *K* & *L*, de 3 lignes de large ſur 2 lignes de hauteur, qui ſerrent les extré-

mités



Digitized by Google

Digitized by Google

mités du fil; les deux pièces *mn* portent le curſeur dans des entailles très-fines, faites à leur extrémité & ſur leur épaiſſeur, afin que le fil *K L* puiſſe venir s'appliquer immédiatement contre le fil fixe *PO*. Le curſeur *K L* eſt à l'extrémité du chaſſis mobile, il raſe la platine du micromètre; car dans ce micromètre, les fils ne paſſent point l'un devant l'autre, comme dans celui du quart-de-cercle (2375); ils ſont ſeulement dans un ſimple contact, quand l'index marque zéro, & commence la numération. Le fil fixe *OP* eſt auſſi porté ſur une petite lame *QR*, dont les deux bras ont à leur dernière extrémité & ſur leur épaiſſeur, une très-petite rainure, pour recevoir ſeulement l'épaiſſeur du fil d'argent qui eſt $\frac{1}{160}$ de pouce; de cette manière le fil fixe regarde préciſément le fil mobile, & peut en être touché immédiatement, ſans qu'il y ait aucun jour entre deux.

Quant on veut placer les fils ſur le micromètre, on déviſſe la lame *n m*; on la courbe tant ſoit peu, on ſerre la vis *L* qui preſſe le fil; la lame ſe redreſſe enſuite par ſon élaſticité, & opère une tenſion ſuffiſante dans le fil. Il en eſt de même du fil fixe *O P*.

Attentions pour la vis.

2360. La vis *CD* eſt une pièce très-difficile à faire, on exige que ſon diamètre ſoit très-gros pour qu'elle ne ſe fauſſe pas en la taraudant, que les filets ſoient très-fins pour qu'ils ſoient plus égaux. Un ſeul taraud ne ſuffit pas pour avoir une excellente vis; il faut pour bien corriger les inégalités des pas de vis, qu'un taraud ſerve à faire un écrou, ou des couſſinets de filière: ces couſſinets formeront un ſecond écrou, cet écrou formera d'autre couſſinets; par ce progrès, les inégalités des pas de vis vont toujours en diminuant, & le diamètre de la vis groſſit de plus en plus. Quand la vis eſt faite, on doit la vérifier encore (2535), pour en connoître juſqu'aux moindres inégalités.

2361. Cette vis *C D* eſt reçue en *E* ſur la pointe d'une groſſe vis, qui paſſe au travers du taſſau *E*, &

qui contient la vis *CD* dans une ſituation toujours conſtante. La grande vis *CD* eſt reçue par ſa partie ſupérieure dans un collet de cuivre, fixé à l'angle de la platine, la tête de la vis paſſe au travers de la boîte *c d*, qui renferme la cadrature, & porte carrément une aiguille *S*, & un bouton *b*, ou roſette en grenetis, qui ſert à faire tourner la vis.

Cadrature pour compter les tours de vis.

2362. La boîte *c d* contient une cadrature compoſée de 3 roues & de 3 pignons, pour faire marquer les tours de vis que l'on voit au travers de l'ouverture *e* faite ſur la boîte. La grande vis porte un pignon de 16, qui engrène dans une roue de 40 dents, laquelle a un pouce de diamètre, & porte ſur un pivot fixé dans le fond de la boîte. Cette roue de 40, porte un pignon de 10, qui engrène dans une roue de 50, portée également ſur un pivot, fixé dans le fond de la boîte; cette roue de 50 porte un autre pignon de 10, celui-ci conduit une roue de 80, qui eſt dans le milieu du cadran, & au travers de laquelle paſſe la tête de la vis. Sur cette roue de 80, eſt fixé un cadran qui a 2 $\frac{1}{4}$ pouces de diamètre, dont la circonférence eſt diviſée en 100 parties, & dont les chiffres paroiſſent au travers de l'ouverture *e* pour marquer les tours de vis; ce cadran ne fait qu'un tour, tandis que la vis en fait 100.

2363. Cette manière de marquer les tours de vis eſt plus commode que celle de la *fig.* 159 (2367); car lorſque les pas de vis ſont très-fins, comme d'un quart-de-ligne, il eſt difficile de les voir facilement, au lieu que ſur le cadran chaque diviſion eſt très-ſenſible, & le ſeroit encore davantage, ſi au lieu de diviſer le cadran en 100, on le diviſoit ſeulement en 50 parties, en lui donnant la 50e partie du mouvement de la vis : il ſuffiroit pour cela de réduire à 40 dents, la roue de 80.

Mouvemens d'inclinaiſon.

2364. Le micromètre entier, c'eſt-à-dire, la vis *CD*, les fils, & la boîte *d c* ſont portés ſur une platine,

à laquelle on ménage un petit mouvement d'inclinaiſon (a), repréſenté dans la *fig.* 158. Le micromètre y paroît dans l'autre ſens, c'eſt-à-dire, par le côté de la platine fixe qui doit tenir au tuyau de la lunette, & qui regarde l'objectif; *AB* & *CD* ſont deux plaques repliées, dont les ailes gliſſent dans les couliſſes du porte-micromètre (*fig.* 194), pour ſoutenir le micromètre; *EPF* eſt une pièce en demi-cercle, dont le centre *G* eſt à l'interſection des fils fixes. Ce demi-cercle eſt fixé par des vis *E* & *F* ſur la platine mobile du micromètre; mais il a un rebord qui s'applique ſur la platine fixe pour la contenir par ſon frottement; il empêche auſſi que la platine mobile ne deſcende vers *K*, tandis qu'une pièce *H* empêche qu'elle ne s'élève, au moyen de la vis *H*, qui paſſe au travers d'une longue rainure pratiquée dans la platine fixe *CDBA*, mais recouverte par la pièce *H*; cette rainure laiſſe à la platine mobile tout ſon mouvement latéral, la vis ne fait que paſſer au travers de la platine fixe pour entrer dans la platine mobile qui eſt au-delà. *Fig.* 158.

La vis ſans fin *ON*, portée ſur la platine mobile, engrène dans une pièce dentée *L*, qui eſt portée ſur la platine fixe; & tandis que cette partie *L* eſt immobile ſur la lunette, la vis *NO* incline le micromètre de quelques degrés. La partie dentée étant de 16 à 17 lignes, elle donne environ 18° de mouvement, c'eſt-à-dire, 9° de chaque côté; & cela eſt plus que ſuffiſant pour faire parcourir exactement à un aſtre le fil du micromètre, quand on s'apperçoit que la direction du fil s'écarte de celle du parallèle.

2365. Ce micromètre ſe conſerve dans une boîte, & lorſqu'on veut en faire uſage, on le place dans le porte-oculaire (*fig.* 194). Le bout du tuyau *AA* entre dans le tube de la lunette; il porte une plaque de cuivre *BB*, qui a deux couliſſes *BC*, *BC*, dans leſquelles s'en- Porte-tuyau de l'oculaire. *Fig.* 194.

(a) J'ai vu à Londres, entre les mains de M. le Docteur Bévis, un très-ancien micromètre d'Hévélius, qui avoit un pareil mouvement d'inclinaiſon.

gagent les deux rebords, ou les ailes des plaques repliées, qu'on a vues ſur le micromètre en *AB* & *CD*, *fig.* 158 : elles y entrent à frottement dur, pour que le micromètre ne gliſſe pas. Le tube conique *O* (*fig.* 194), eſt celui qui porte l'oculaire; il ſe termine par un petit œilleton *E*, c'eſt-à-dire, un petit trou auquel on applique l'œil, lequel doit entrer en *E*, dans un petit hémiſphère concave. Ce tube *O* porte le verre oculaire, qui y eſt logé & recouvert ſur les bords par une vis circulaire, & ce tube eſt viſſé ſur la traverſe *DD*, qui a dans le milieu une ouverture circulaire. Cette traverſe *DD* porte deux petites règles de cuivre, qui gliſſent dans deux couliſſes *CD*, *CD*, afin qu'en plaçant des oculaires de différens foyers, on puiſſe toujours mettre le tube *O* de l'oculaire à la diſtance convenable par rapport aux fils du micromètre; les différentes vues des obſervateurs, qui peuvent regarder dans une même lunette, exigeroient ſeules cette attention, de rendre mobile le tuyau des oculaires.

Les uſages du micromètre ſeront expliqués dans le livre XIV, art. 2519 & ſuiv.

Micromètre du quart-de-cercle.

2366. Après avoir décrit le plus ſimple & le plus parfait de tous les micromètres, je paſſe à la deſcription de ceux qu'on applique aux quarts-de-cercles, & aux ſecteurs aſtronomiques (2380), du moins ſuivant la méthode Françoiſe. Cette méthode imaginée en 1714, par M. le Chevalier de Louville, a été perfectionnée ſucceſſivement par différens aſtronomes de l'académie. Le micromètre que je vais décrire fait partie d'un ſextant de 6 pieds, dont M. de la Caille ſe ſervoit avant moi, & avec lequel ce grand aſtronome a fait pendant dix ans ſes meilleures obſervations.

Boîte du micromètre. *Planche XXI. Fig.* 159.

Le micromètre eſt repréſenté ſéparément en *AB* (*fig.* 159), avec toutes ſes parties extérieures; la boîte porte deux bouts de tubes *C* & *D*, l'un du côté de l'œil *O*, l'autre du côté de la lunette. Le premier a 3 pouces $\frac{1}{4}$, il ſert à recevoir le tuyau de l'oculaire; cette alonge du micromètre ſe termine par un rebord *EF*, ou platine

carrée, dont les quatre oreilles ſont percées, & ſe fixent ſur le micromètre, avec quatre vis aux coins de cette embaſe ; le bout de tuyau *D* a 2 pouces $\frac{1}{2}$ ſeulement de longueur, plus ou moins ; il eſt deſtiné à entrer dans la lunette du ſextant pour l'aſſujétir derrière le limbe ; il tient à la boîte du micromètre, auſſi bien que l'autre bout de tube, par une embaſe & par quatre vis ; il a un pouce & demi de diamètre ; c'eſt l'ouverture qu'exige une lunette ordinaire de ſix pieds ; mais elle ſeroit plus conſidérable ſi l'on employoit une lunette achromatique (2298), & j'eſpère qu'on le fera, quand ces lunettes ſeront devenues plus communes. *Fig.* 159.

2367. La boîte du micromètre a 5 pouces 5 lignes de hauteur de *G* en *H*, 2 pouces 4 lignes de largeur, & 1 pouce 3 lignes d'épaiſſeur *HH* : elle ſe termine en haut & en bas par deux petites boîtes *GP* & *HH*, qui embraſſent de tout côté le haut & le bas de la boîte principale, & qui y ſont fixées par des vis : on voit une de ces vis en *B*. La partie du haut, où le deſſus du micromètre eſt repréſentée ſéparément en *V* dans la *fig.* 162, à côté du cadran *R* (*fig.* 161), que l'on attache ſur cette boîte. Le fond du micromètre eſt la pièce ſur laquelle portent les reſſorts (2378).

Index.

On voit en *I* la plaque de l'index, qui porte vers ſon milieu une pointe, un trait, une fleur-de-lys, ou un index pour marquer l'élévation du fil mobile. Cette plaque tient au moyen d'une vis, ſur le chaſſis intérieur & mobile (2378) ; elle monte & deſcend avec lui, & l'on voit une rainure ſur le côté *MI* de la boîte, où la plaque de l'index a la liberté de ſe mouvoir.

Diviſions pour les tours de vis.

A côté de la plaque d'index *I*, on voit une autre plaque *KK*, fixée en dehors ſur le côté de la boîte par deux vis ; elle porte des diviſions, qui ſont de la même grandeur que les filets de la grande vis intérieure du micromètre, par exemple de 35 ſur un eſpace de dix lignes ; & l'index *I* qui monte & deſcend vis-à-vis de ces diviſions, y fait voir le nombre des tours de vis. Les trous de cette plaque *KK* doivent avoir un peu plus

de diamètre que les vis qui y entrent, afin qu'on puiſſe donner du jeu à cette plaque, & faire correſpondre exactement le milieu des diviſions avec le concours des fils.

2368. On voit en *L* un trou, dans lequel on paſſe une clef pour incliner le fil fixe du micromètre (2377), & le rendre parallèle à l'horizon; on voit en *M* un autre trou par lequel on incline le fil mobile, pour le rendre parallèle au fil fixe (2378); & au-deſſus de la boîte en *N*, il y en a un troiſième, par lequel on élève le fil fixe, ou on l'abaiſſe (2376).

Cadran des diviſions.

2369. La boîte du micromètre eſt ſurmontée d'un cadran ou cercle de deux pouces & demi de diamètre, diviſé en 100 parties, pour marquer les centièmes parties d'un tour de vis, au moyen de l'aiguille qui tourne avec la grande vis du micromètre; le cadran eſt repréſenté ſéparément dans la *fig.* 161 en *R*, on y voit des trous en *S* pour la grande vis, en *T* pour la vis qui élève le chaſſis fixe, & en *t t* pour les vis qui attachent le cadran ſur le haut de la boîte. L'aiguille qui paroît ſur le cadran dans la *figure* 159 a la facilité de ſe mouvoir par un frottement dur ſur l'arbre de la vis, afin qu'on puiſſe la mettre ſur le commencement de la diviſion quand les fils ſont exactement d'accord; mais pour qu'enſuite elle ſoit obligée de tourner avec la vis, on l'affermit contre la tête de cette grande vis par une autre petite vis de preſſion que l'on voit en *H* (*fig.* 166); le frottement entretient ainſi le collet *G* de l'aiguille aſſujéti ſur la grande vis.

Fig. 161.

Fig. 166.

Au-deſſus de la boîte en *A* on voit une roſette ou tête de cuivre en grenetis, qui entre carrément ſur l'arbre de la grande vis & ſert à la faire tourner; cette roſette eſt contenue ſur l'arbre par une petite vis qui ſe voit au-deſſus & qui l'empêche de ſortir; la roſette eſt repréſentée ſéparément en *R* dans la *fig.* 167 au-deſſus de l'aiguille.

Fig. 167.

2370. La boîte du micromètre qui eſt deſtinée à s'attacher derrière le limbe d'un ſextant ou d'un quart-de-cercle, ſe termine en avant & en arrière par deux

rebords ou plaques de 6 à 7 lignes de large, on en voit une en *PP* (*fig.* 159); elle eſt percée de deux trous dans leſquels entrent les vis qui aſſujétiſſent ſur l'inſtrument l'aſſemblage total du micromètre; on voit encore ces deux rebords en *DD fig.* 160. *Fig.* 159.

On voit en *Q* à 2 pouces environ du milieu de la boîte la trace de l'oculaire, porté dans un tuyau mobile qui entre dans le tube *C* du micromètre.

2371. La boîte du micromètre eſt deſtinée à contenir les deux fils qui doivent meſurer les intervalles céleſtes, le fil fixe & le fil mobile ou curſeur; ils ſont portés ſur deux chaſſis différens, & pour cet effet, l'épaiſſeur intérieure de la boîte eſt diviſée en deux parties ou deux loges par des languettes latérales qui occupent toute ſa hauteur, & dont on voit la coupe en *E*, *E*, (*fig.* 160). Cette figure contient le plan du micromètre, & de ſa boîte qui eſt découverte par le haut; *AA* eſt le tube qui entre dans la lunette, *BB* celui qui reçoit le porte-oculaire, *CC* le tube de l'oculaire qui gliſſe dans le tube *BB* pour mettre l'oculaire à la diſtance convenable des fils; *DD* ſont les deux rebords ou plaques de 6 à 7 lignes de large au travers deſquelles paſſent des vis pour attacher le micromètre au ſextant (2370); *EE* ſont les deux languettes intérieures qui diviſent en deux parties l'épaiſſeur *FG* de la boîte; la partie *F* de la capacité du micromètre qui eſt du côté de l'objectif reçoit le chaſſis fixe, & la partie *G* qui eſt vers l'oculaire, eſt pour le chaſſis du curſeur; *Q* marque la place de l'oculaire, *ffff* ſont les vis qui tiennent les bouts de tubes fixés ſur la boîte du micromètre par leurs embaſes (2366). *Fig.* 160.

2372. Au fond de cette boîte on place un quadruple reſſort qui repouſſe continuellement en haut le chaſſis du curſeur, & empêche le jeu de la vis. Pour former la pièce du reſſort double on prend une plaque de cuivre *HH* (*fig.* 164), de 26 lignes de long ſur 5 lignes de large, pour remplir exactement la largeur & l'épaiſſeur d'une des loges de la boîte (2371); elle porte ſur chacune de ſes faces deux reſſorts *HR* qui Reſſort quadruple. *Fig.* 164.

ſe croiſent ſans ſe toucher; chaque reſſort eſt rivé par ſa baſe ſur la plaque *HH*, & l'autre l'extrémité eſt arrondie à l'extérieur pour ſoutenir & élever le chaſſis, ſans que le frottement en ſoit dur & difficile; cette extrémité de chaque reſſort s'élargit en *R* en forme de cuilleron pour occuper la largeur entière de la couliſſe, afin d'éviter le jeu ou le balottement de ces reſſorts; il en eſt de même des deux reſſorts inférieurs qui portent ſur le fond de la boîte, ils ſont creuſés en cuillerons & leur convexité ſeule porte ſur une plaque d'acier qui tapiſſe le fond de la loge.

M. Canivet eſt dans l'uſage d'égaliſer ces 4 reſſorts par le moyen d'un poids qu'on leur fait ſupporter horizontalement, & l'on affoiblit celui des deux reſſorts qui en réſiſtant trop d'un côté, feroit prendre une direction oblique au chaſſis du micromètre; par ce moyen le reſſort pouſſe le chaſſis de bas en haut toujours verticalement.

2373. Il faut que ces reſſorts ſoient doux & plians; & l'on ne doit jamais faire parcourir au curſeur que quelques minutes; car le P. Liesganig croit avoir obſervé qu'il faut plus de parties de la vis pour un même nombre de ſecondes, quand le reſſort eſt parvenu à ſa plus forte tenſion qu'il n'en faut vers l'endroit de ſon relâchement, à cauſe de la trop grande réſiſtance: il ſe contente de mettre ſur une des faces du chaſſis mobile deux reſſorts qui faſſent un frottement latéral toujours uniforme dans la boîte, & il ne met point de reſſorts au-deſſous, à cauſe de l'inconvénient que je viens d'expoſer.

Chaſſis du fil fixe. *Fig.* 163.

2374. Le chaſſis qui porte le fil fixe du micromètre eſt repréſenté en *AA* (*fig.* 163); il a 4 pouces 4 lignes de hauteur de *A* en *B*, 2 pouces 1 ligne $\frac{1}{2}$ de largeur *AA*; il porte par en bas un reſſort courbé *CDC* qui s'appuyant ſur un reſſort ſemblable *CEC* mis au fond de la boîte du micromètre, repouſſe continuellement ce chaſſis vers le haut, tandis que la partie ſupérieure du chaſſis eſt retenue en *f* ou par le cadran ſeul,

Fig. 157.



Fig. 158.



Digitized by Google

ſeul, ou par une plaque en équerre fixée ſur la boîte du micromètre, & qui ſe replie ſur la baſe de la vis pour empêcher qu'elle ne s'élève & ne ſorte par l'action du reſſort *CDC* qui la repouſſe vers le haut. Cette vis *fg* paſſe dans une eſpèce d'équerre *h* qui tient ſur le chaſſis avec un étoteau & une vis.

La vis ſupérieure *fg* ſert à élever ou abaiſſer d'une petite quantité le chaſſis fixe & par conſéquent le fil horizontal fixe *HH*, lorſque par la vérification du quart-de-cercle (2552), on a trouvé que l'axe de la lunette ne fait pas un angle droit avec le rayon du commencement de la diviſion. C'eſt pour cela que nous avons fait remarquer un trou *N* (*fig.* 159), au-deſſus du cadran (2368). *Fig.* 159.

2375. Vers le milieu du chaſſis on voit le réticule; c'eſt un anneau de cuivre dont le diamètre extérieur *RR* eſt de 2 pouces, l'ouverture *HH* de 14 lignes, & qui porte deux fils à angles droits, un fil horizontal *HH*, & un fil vertical *VV*. Cet anneau de cuivre qui porte les fils, a une épaiſſeur aſſez conſidérable pour paſſer au-delà de la ſurface du chaſſis fixe *AABB*, afin que ces fils ſoient placés tout près du chaſſis mobile qui porte le curſeur; il ne doit y avoir qu'un intervalle ſuffiſant pour que le curſeur n'accroche pas le fil fixe en paſſant près de lui; & pour cet effet, les fils doivent être preſque noyés dans les rainures où ils ſont placés. Réticule fixe.

Le fil vertical *VV* eſt placé à la ſurface de l'anneau la plus voiſine de l'oculaire (c'eſt le côté oppoſé a celui que montre la figure); il paſſe par les trous *u u* pour être ſerré par ſes extrémités ſous les pièces de cuivre *F* & *G* qui ſont elles-mêmes ſerrées avec des vis contre le cercle du réticule; c'eſt la preſſion de ces vis qui tient le fil tendu: à l'égard du fil horizontal *H H* il paſſe auſſi par les trous *K* & *L*, & ſes extrémités ſont repriſes & arrêtées ſous les mêmes pièces de cuivre qui ſont ſerrées avec d'autres vis en *O* & en *P*; mais on a une attention de plus à l'égard du fil horizontal qui eſt le plus

Manière de tendre le fil.

important dans un micromètre ; il faut que ce fil ſoit tendu très-exactement & d'une maniere invariable ; pour cela on le fait paſſer auſſi par le trou *i* d'une autre pièce de cuivre *QL* fixée en *Q* & qui fait reſſort par ſon extrémité ; le fil ayant paſſé ſur ce reſſort eſt arrêté en *P*, & le reſſort qui tend à s'élever au-deſſus du chaſſis, retire le fil & le maintient toujours tendu.

2376. Le réticule entier *RR* a la liberté de tourner un peu ſur la plaque du chaſſis fixe ; il eſt retenu ſeulement par deux pièces *dd* qui appuient ſur le réticule ſans l'empêcher de tourner ; on peut y ſubſtituer deux vis qui traverſeroient l'épaiſſeur de l'anneau vers *dd* dans des trous allongés ; il eſt auſſi contenu par un écrou *e* qui appuie ſur ſa partie inférieure ; mais en même temps cet écrou *e* porte un étoteau ou une cheville de cuivre qui entre dans une petite rainure faite de haut en bas ſur le bord du réticule ; l'écrou *e* eſt mis en mouvement par la vis *ST* qui eſt tangente au réticule, & il oblige le réticule à tourner de quelques lignes. C'eſt ainſi qu'on redreſſe le fil *HH*, s'il ſe trouve n'être pas bien horizontal, ce qui doit ſe vérifier avec ſoin (2550).

2377. La vis *ST* tangente du réticule eſt arrêtée par ſon pied en *T* dans une baſe ou eſpèce de crapaudine ſur laquelle elle tourne ; & par ſa tête en *S* au moyen d'une embaſe *c* qui eſt arrêtée contre la paroi *AB* du grand chaſſis, renforcée dans cet endroit d'une petite épaiſſeur de cuivre. Quand le chaſſis eſt dans la boîte du micromètre & qu'on veut incliner le réticule par le moyen de cette vis *ST*, on paſſe une clef ou un carré de fer par un trou marqué *L* dans la *fig.* 159, ſur le côté de la boîte du micromètre & qui répond à la tête de cette vis dans laquelle il y a un trou carré pour y introduire la clef (2368).

Chaſſis du curſeur. *Fig.* 165.

2378. Le chaſſis mobile, ou le chaſſis du curſeur ſe voit de grandeur naturelle dans la *fig.* 165. Il eſt percé à jour, parce qu'il ne porte qu'un fil deſtiné à monter & à deſcendre, & qu'il ne doit point embar-

raſſer l'ouverture du réticule de la *fig.* 163. Le chaſſis du curſeur à 3 pouces $\frac{1}{4}$ de hauteur de *C* en *D*, 2 pouces 2 lignes de largeur de *D* en *E*, 15 lignes d'ouverture de *H* en *K*, & 5 lignes d'épaiſſeur; le deſſus eſt renforcé par un groupe *mn*, qui eſt une pièce ſoudée ſous le chaſſis, & qui a 3 lignes d'épaiſſeur, pour recevoir la grande vis *VS* du micromètre, deſtinée à mouvoir le curſeur: cette vis a une embaſe *f* qui l'empêche de ſortir de la boîte, une partie arrondie *F* qui reçoit l'index repréſenté dans la *fig.* 166, & une tête carrée *V*, qui reçoit la roſette *R* de la *fig.* 167, pour mouvoir le curſeur. Le chaſſis du curſeur eſt encore garni par en-bas d'une ſemelle ou plaque d'acier poli *ED* ſur laquelle agiſſent les reſſorts de la *fig.* 164, afin qu'ils ne ſe gripent pas ſur le cuivre; le bas de la boîte eſt également tapiſſé d'une ſemelle d'acier poli ſur laquelle portent les reſſorts. Au dedans du grand chaſſis *CDE* il y a un autre chaſſis *MNOP* qui porte le curſeur, & qu'on incline un peu lorſqu'il eſt néceſſaire, pour rendre le curſeur horizontal & parallèle au fil fixe (2550); ce chaſſis intérieur & mobile tourne autour d'une vis *Q*; il eſt continuellement pouſſé vers la gauche par un reſſort coudé *PM*, qui appuie contre une goupille, ou ſur une pièce de cuivre *p* fixée ſur le chaſſis mobile; il porte ſur la gauche un écrou *N* qui eſt mobile dans ſon trou ou ſur ſon axe; une vis *sr* qui paſſe dans cet écrou, repouſſe le chaſſis vers la droite pour incliner le curſeur *HK*; cette vis a une embaſe qui l'arrête contre la paroi *CD* du chaſſis; pour la faire jouer on ſe ſert d'une clef qui paſſe dans un trou, dont nous avons parlé (2368), ce trou eſt à côté de la boîte du micromètre en *M* (*fig.* 159). Il faut qu'il y ait auſſi une vis *p* qui aſſujétiſſe le ſecond chaſſis ſur le premier, ſans l'empêcher de tourner par l'effet de la vis *sr*. Fig. 165.

2379. Le fil horizontal *HK* eſt porté ſur deux petites plaques qui font une épaiſſeur au chaſſis intérieur *MNOP*, & qui font ſaillie d'une ou de deux lignes du côté de l'objectif, (nous regardons ce chaſſis

mobile par le côté de l'oculaire), pour aller joindre de plus près les fils du réticule qui ſont auſſi ſaillie du côté de l'oculaire (2375) : par ce moyen le curſeur gliſſe très-près de la ſurface des fils fixes, quoique les chaſſis qui les portent, ſoient ſéparés par des languettes aſſez épaiſſes (2371). Les deux extrémités du curſeur *HK* paſſent dans des trous *a* & *b* du chaſſis, pour venir s'arrêter ſous les pièces de cuivre ſerrées par des vis *a* & *u* ; mais l'une des extrémités du fil paſſe en *t* dans le trou d'une pièce de cuivre qui fait reſſort, & de-là va paſſer ſous la pièce *u* où elle eſt arrêtée, tandis que le reſſort *t* élève ſans ceſſe la boucle *b t u*, & exerce ſur le fil une tenſion qui lui eſt néceſſaire : nous l'avons déja remarqué (2375), en parlant du fil horizontal fixe de la *fig.* 163 ; mais tout cela ſuppoſe que l'on emploie des fils d'argent ; car ſi l'on emploie des fils de ſoye pris ſur les cocons, il ſuffit de les tendre avec de la cire.

Fils de ſoie ou d'argent.

Le chaſſis mobile eſt auſſi percé ſur le côté de trois petits trous, pour recevoir les vis qui tiennent la pièce de l'index repréſentée en *I* (*fig.* 159).

On verra les vérifications & l'uſage du micromètre que nous venons de décrire, dans le Livre ſuivant (2550 *& ſuiv.*).

Description d'un grand Secteur.

2380. Les obſervations exactes & ſcrupuleuſes qui ont été faites depuis 1725, pour l'aberration & pour la figure de la terre (2651), exigeoient des inſtrumens qui puſſent faire diſtinguer une ſeconde avec certitude, c'eſt-à-dire, des inſtrumens de 10 ou 12 pieds de rayon ; & comme ces obſervations ſe font toujours à 3 ou 4 degrés du zénit tout au plus, on n'a beſoin dans ces ſortes d'inſtrumens que d'un très-petit arc, c'eſt pourquoi on les appelle *Secteurs*.

Des plus grands ſecteurs qu'on ait fait.

Le premier ſecteur qui ait été fait de la grandeur & de la bonté néceſſaires pour des obſervations auſſi déli-

cates, eſt celui que M. Graham fit en 1725, pour M. Molyneux, (2792) : il fut ſuivi bientôt après d'un autre pour M. Bradley, avec lequel ce grand aſtronome découvrit l'aberration & la nutation ; ce ſecteur eſt à l'Obſervatoire de Greenwich. En 1735, M. Graham en fit faire un autre pour la meſure de la terre en Laponie, M. de Maupertuis en a donné la deſcription en 1740, dans ſon Livre intitulé : *Degré du Méridien* entre Paris & Amiens. Ce ſecteur eſt actuellement dans l'Obſervatoire de M. le Monnier à Paris.

2381. Entre les différens ſecteurs qui ont été conſtruits, celui dont M. de la Condamine nous donne la deſcription, (*Meſure des trois prem. deg.* 1751, *pag.* 110), eſt des plus ſimples, il a ſervi pour une des plus grandes opérations qu'on ait jamais faites avec un pareil inſtrument ; cela me ſuffit pour le préférer à celui qui eſt décrit dans le Livre de M. de Maupertuis : dans ce dernier on trouve plus d'art, un plus grand nombre de pièces, peut-être plus de commodités pour les obſervateurs, mais puiſque l'on peut s'en paſſer, ce que nous allons dire eſt ſuffiſant pour les beſoins de l'aſtronomie. On peut conſulter encore à ce ſujet les ouvrages ſur la figure de la terre de M. Bouguer, & de M. Caſſini, celui du P. Boſcovich, imprimé à Rome en 1755, & à Paris en 1770, & celui du P. Liesganig, imprimé à Vienne en 1770.

Auteurs qui en ont parlé.

2382. Le ſecteur que l'on voit dans la *fig.* 168, eſt compoſé de trois pièces principales, aſſemblées étroitement l'une avec l'autre ; ſavoir, un grand rayon vertical, un limbe placé horizontalement au bas de ce rayon, & une pièce qui ſert à la ſuſpenſion, en même temps qu'elle porte le centre de l'inſtrument. Le limbe ou l'arc du ſecteur eſt une règle de cuivre *AB*, qui a 2 pieds, ſur un pouce & demi de hauteur & 3 lignes d'épaiſſeur ; elle eſt appliquée avec des clous de cuivre ſur une bande de fer, garnie &. fortifiée par derrière d'une règle de champ *ab* ; on peut ſe diſpenſer de donner au limbe une courbure circulaire, pourvu que ſa

Planche XXII. Fig. 168.

Limbe du ſecteur.

Fig. 168. largeur du haut en bas ſoit ſuffiſante pour contenir la courbure d'un arc de cercle de 7 à 8 degrés.

Ce limbe du ſecteur eſt attaché par le milieu avec des tenons & des vis, ſur l'extrémité inférieure *C* d'une règle plate *CD* de 12 pieds de long, large de 3 pouces; épaiſſe de 2 lignes; la figure eſt briſée dans le milieu, & l'on doit ſuppléer d'imagination une longueur trois fois auſſi grande que celle de la planche, pour que toutes les parties de la figure ſoient proportionnées. La règle *CD* eſt de 2 pièces, chacune de plus de ſix pieds, qui ſont unies l'une ſur l'autre dans une longueur de quelques pouces, avec des tenons ou eſpèces de pieds carrés, fixés ſur l'une des barres, & qui paſſent au travers de l'autre pour recevoir par derrière des clavettes chaſſées à coups de marteau. Cette règle de fer qui forme le rayon de l'inſtrument, a par derrière une autre règle de champ, c'eſt-à-dire, qui lui eſt perpendiculairement adoſſée, & unie par pluſieurs équerres de fer, pour en prévenir la flexion qui eſt d'une très-grande conſéquence (2597).

Suſpenſion du ſecteur.

2383. La barre de fer qui forme le rayon s'élargit vers le haut, & reçoit ſur ſa face antérieure, limée en retraite, c'eſt-à-dire, diminuée d'épaiſſeur, une pièce de cuivre *EFG*, qui y eſt appliquée avec trois fortes vis que l'on voit en *e*; cette pièce de cuivre eſt percée vers *E* d'un trou rond, diſpoſé pour recevoir un cylindre de cuivre, tourné avec ſoin, & qui ſert de centre à l'inſtrument; il eſt ſemblable à celui de la *fig.* 150.

La tête *G* de la pièce de ſuſpenſion eſt arrondie en forme de globe, & porte dans un collier de fer attaché à une forte poutre au plancher de l'obſervatoire, de manière cependant que la lunette du ſecteur n'en ſoit pas embarraſſée au zénit; ce collier peut être mis à l'extrémité d'une potence de fer, ou traverſer d'une poutre à l'autre; il porte l'inſtrument, en lui conſervant la liberté de ſe mouvoir en *G*, comme le graphomètre d'un arpenteur tourne ſur ſon genou.

2384. La règle de fer ſur laquelle le limbe *AB*

eſt rivé, porte à ſa partie inférieure deux oreilles, ou pièces en ſaillie *M M*, comme des tenons plats qui ſervent à retenir le ſecteur dans une ſituation fixe, & non pas à le porter; ces deux oreilles ſont reçues librement dans les raînures ou couliſſes de deux taſſeaux de fer *m m*, enchâſſés dans un fort madrier de bois *O O*; & lorſque cette pièce de bois eſt à peu-près dans la ſituation convenable, on peut, avec les vis qui ſont dans les taſſeaux, faire avancer tant ſoit peu le limbe de l'inſtrument, & l'arrêter ſur le point qui eſt néceſſaire pour obſerver une étoile donnée.

Le madrier ou la poutre *O O* doit avoir un mouvement du nord au ſud, pour qu'on puiſſe changer la direction de la lunette, & l'incliner à 4 degrés de chaque côté du zénit; mais lorſqu'elle eſt à la place néceſſaire pour une obſervation, elle doit être arrêtée avec des crampons de fer *R S*, *B S*, en forme d'étriers ou d'équerres doubles, ſur un banc ou établi *Q Q* fixé en terre, ou arrêté d'une manière inébranlable.

Chacun de ces étriers *R S*, *B S*, a trois vis, une par-deſſus en *r*, pour comprimer & arrêter la pièce de bois *O O*, les deux autres devant & derrière, pour la mouvoir en avant & en arrière, afin de bien caler l'inſtrument, & le mettre dans le méridien (2598) : on voit en *S S* les vis de régie qui ſont à la partie antérieure de chacun des deux étriers.

La lunette *T V* du ſecteur eſt attachée derrière le limbe, parallèlement au rayon *D C*; elle eſt embraſſée par des fourchettes de fer *X X*, rivées ſur le rayon *D C*; au bas de la lunette eſt le micromètre *V*, ſemblable à celui dont on vient de voir la deſcription (2366 *& ſuiv.*).

Sur le limbe *A B*, M. de la Condamine avoit fait tracer en 1739 un arc, dont le centre étoit en *E*, & ſur cet arc on avoit porté une ouverture de compas égale à la dix-ſeptième partie du rayon, ce qui faiſoit 3° 22′ 15″, parce qu'on n'avoit beſoin que d'obſerver l'étoile ι d'Orion qui étoit à 1° 40′ ½ du zénit de Tar- Diviſion du limbe.

qui. En prenant de la même manière d'autres parties aliquotes du rayon comme un vingtième, &c. ſuivant les arcs qu'on vouloit obſerver dans le Ciel, on faiſoit la même choſe qu'avec un inſtrument qui eût été bien diviſé en minutes; l'opération étoit plus facile & plus exacte; mais le limbe *AB* doit être diviſé en minutes, lorſqu'on en a la facilité; cela eſt plus commode pour obſerver en général différentes étoiles.

Suſpenſion du fil à-plomb.

2385. C'eſt une choſe très-eſſentielle & très-délicate que la ſuſpenſion du fil dans un ſecteur, tel que nous venons de le décrire: la ſuſpenſion qui ſe fait avec une boucle qui paſſe ſur une aiguille (*fig.* 150), eſt la plus ſimple, mais il eſt dangereux que le frottement du fil ſur l'aiguille, ou contre le cylindre du centre, ne gêne la liberté du fil à-plomb; on en a vu des exemples fâcheux dans des obſervations importantes, comme dans celles qui furent faites en 1761, à Sainte Hélene.

Dans le ſecteur de M. Bradley qui eſt à l'obſervatoire de Gréenwich, il y a une plaque au centre, dans laquelle eſt une légere entaille, & le fil à-plomb ſe loge dans l'entaille qui eſt le centre même de la diviſion; mais il eſt à craindre qu'un tel centre ne ſoit ſujet à varier; & que cette entaille faite dans une plaque très-mince, ne ſoit pas conſtamment & exactement à ſa véritable place; & cela eſt difficile à vérifier, quand on n'a pas un point dans lequel on puiſſe placer une des pointes du compas. Il eſt auſſi dangereux que le fil à-plomb ne ſoit gêné dans cette entaille, & qu'il n'y prenne une courbure, qui cauſeroit de l'erreur dans la meſure des angles.

Méthode la plus exacte.

2386. La meilleure ſuſpenſion pour le fil d'un ſecteur eſt celle où le fil ne touche point au centre, mais où le centre tourne, ſans ceſſer de répondre au fil; c'eſt ainſi que M. Bird l'a pratiquée dans un très-beau ſecteur que j'ai vu à Londres en 1763, deſtiné pour les obſervations qui devoient régler les limites du Maryland & de la Penſilvanie; dans ce ſecteur de M. Bird, la

pièce

Fig. 100.



Fig. 101.

Fig. 102.

Fig. 104.



Fig. 105.

Fig. 106.

Fig. 107.



Digitized by Google

pièce de ſuſpenſion *S* (*fig.* 170) reſtant immobile, le limbe & le corps entier du ſecteur tournent ſur un axe qui forme le centre; on voit en *A*, l'un des pivots de cet axe; au centre de ce pivot eſt un point qui eſt le centre même de la diviſion du limbe du ſecteur; ce pivot tourne ſur des couſſinets *BB*, à peu-près comme une lunette méridienne (2389); le fil à-plomb *SP* eſt ſuſpendu en *S*, où il eſt ſerré ſous une vis de preſſion, & il paſſe ſur le centre *A*, dont il eſt extrêmement proche, ſans le toucher; l'inſtrument tourne ſur ſon pivot, ſans que le centre *A* ceſſe de répondre au fil à-plomb, & l'on a ſoin d'examiner avec un microſcope, à chaque obſervation, ſi le fil répond exactement au centre. La pièce de cuivre qui porte le fil en *S*, eſt mobile dans une couliſſe, au moyen d'une vis *V* qui ſert à conduire le fil vis-à-vis du centre *A*, ſi l'on apperçoit qu'il n'y réponde pas exactement.

La vérification d'un ſecteur ſe fait comme celle du quart-de-cercle (2556), les uſages en ſeront expliqués, art. 2596 & ſuiv., & les avantages que l'on en a retirés, art. 2652 & 2792.

DESCRIPTION DE LA LUNETTE MÉRIDIENNE.

2387. La néceſſité où ſont les aſtronomes d'obſerver ſans ceſſe les différences d'aſcenſion droite entre les planètes & les étoiles, leur a fait chercher un inſtrument qui pût être placé bien exactement dans le méridien; le quart-de-cercle mural (2328), quelque ſoin qu'on prenne à le dreſſer exactement, ne ſauroit avoir un plan aſſez régulier & aſſez parfait, pour que la lunette décrive le méridien à 2″ près, depuis le zénit juſqu'à l'horizon; pour obtenir cette préciſion dans les paſſages au méridien, il faut recourir à une lunette montée ſur un axe qui ſoit tourné avec grand ſoin; c'eſt ce que nous appellons Lunette méridienne, ou inſtrument des paſſages.

M. Romer en fut le premier Auteur.

2388. Le premier dont on ait parlé, ce me ſemble, eſt celui de M. Romer, (Horrebow, *Baſis aſtronomiæ*, 1735, *pag.* 49). Romer s'étoit fait en 1689, à ſon retour en Dannemarck, un obſervatoire, dans lequel il avoit placé pluſieurs inſtrumens, & entr'autres, une lunette fixée à angles droits ſur un axe de 5 pieds de long & d'un pouce de diamètre; il y avoit un arc pour indiquer les hauteurs, & un poids qui ſoutenoit le milieu de l'axe pour empêcher la flexion (2396). Halley fit faire dans la ſuite un pareil inſtrument, que l'on conſerve encore dans un petit cabinet qui donne ſur la terraſſe de l'obſervatoire royal de Gréenwich; mais Graham, vers l'an 1735, en ayant fait conſtruire de plus parfaits, M. le Monnier en donna la deſcription dans ſon hiſtoire céleſte en 1741. Celui que je vais décrire, & *dont je* me ſers habituellement, avoit été conſtruit en 1760, pour M. de la Caille, qui s'en eſt ſervi pendant deux ans. Il y en a un à l'obſervatoire de Gréenwich, qui eſt beaucoup plus conſidérable, mais celui que je vais décrire eſt d'une exactitude ſuffiſante.

Dimenſions de l'inſtrument. *Planc. XXIII. Fig.* 174.

2389. L'axe *AB* (*fig.* 174), a 2 pieds & demi de long, la lunette *CD* a 4 pieds de long ſur 18 lignes de diamètre. Les deux pivots *A* & *B*, ſur leſquels tourne l'axe, ſont deux cylindres de 9 lignes de diamètre ſur autant de longueur; ils ſont formés d'une compoſition de cuivre & d'étain, plus dure que les métaux naturels, & moins ſujette à être rongée par le frottement & par la rouille; l'axe eſt formé de deux cones de cuivre *AE*; *FB*, qui ont chacun 13 pouces de longueur, & dont le diamètre décroît depuis 28 lignes juſqu'à 11 lignes, c'eſt-à-dire, que près des pivots l'axe n'a que 11 lignes de diamètre. Ces deux cones ſont aſſemblés à vis & ſoudés dans un noyau ou forte pièce de cuivre *G*, qui a deux pouces & demi de large & trois pouces de long, cette pièce eſt percée pour laiſſer paſſer la lunette au travers.

2390. Le dé ou la maſſe *G* de forme à peu-près cubique, ſert de noyau à toute la machine; non-ſeulement elle aſſemble les deux cones *AE*, *BP* qui compo-

ſent l'axe, elle tient encore les deux porte-lunettes ou les deux canons *S*, *T*, de 15 à 16 pouces, dont chacun a une baſe carrée, fixée par 4 vis ſur le dé; ces canons ſont fendus de deux côtés ſur un eſpace de 8 pouces, pour laiſſer paſſer plus aiſément le tuyau de la lunette; mais lorſque le tuyau eſt entré, on reſſerre l'extrémité de chacun des porte-lunettes avec un braſſelet ou collier de cuivre, qui ſe ſerre par des vis en *K* & en *H*. Ces porte-lunettes ſervent à empêcher que la lunette ne vacille dans le dé, & qu'elle ne ſe courbe ſur ſa longueur. *Fig.* 174.

2391. Si la lunette n'étoit pas bien en équilibre ſur le milieu de ſon axe, enſorte qu'elle fût plus peſante par une extrémité que par l'autre, on deſſerreroit les vis des porte-lunettes, & on repouſſeroit le tuyau vers le côté trop léger: de même, ſi le fil vertical de la lunette ſe trouvoit un peu oblique à la verticale, on ſeroit obligé de deſſerrer les vis & de tourner un peu le tuyau, juſqu'à ce que le fil fût exactement vertical.

On place dans cette lunette, au foyer des deux verres, un réticule compoſé de deux fils qui ſe croiſent à angles droits, ou bien un réticule de 45° (2350), ou enfin un réticule rhomboïde (2353); celui-ci eſt le plus commode en pluſieurs occaſions.

Pour diriger la lunette méridienne à la hauteur donnée où l'on veut obſerver un aſtre, on a fixé un demi-cercle *AN* ſur l'un des ſupports; ce demi-cercle a 8 pouces & demi de diamètre, & il eſt diviſé en degrés; l'alidade *O* fixée ſur l'axe *MQ*, ſe termine par un vernier qui ſous-diviſe le degré en douze parties, & nous fait diſtinguer cinq minutes; cette alidade eſt ſerrée ſur l'axe par une vis de preſſion, que l'on peut lâcher, ſi l'on eſt obligé de mettre cette alidade plus exactement ſur la diviſion.

2392. Les couſſinets ou ſupports, dans leſquels tourne l'axe de la lunette, ſont quelquefois compoſés de deux plans, quelquefois circulaires, ainſi que les pivots; ils ſont faits d'une compoſition d'étain & d'an- Supports de l'axe.

Fig. 174. timoine, plus douce que celle des pivots; on y met une goutte d'huile, ou un peu de ſuif, pour adoucir le frottement.

On obſerve de donner à l'un des ſupports *B* un petit mouvement du haut en bas, dans une couliſſe, au moyen d'une vis *V* qui peut élever & abaiſſer la pièce où porte le pivot de l'axe, afin de placer cet axe dans une ſituation parfaitement horizontale, & de l'y ramener lorſqu'il a pu s'en écarter par le mouvement des bois ou des murs qui portent l'inſtrument.

Mouvement vertical. Fig. 172. On voit ſéparément dans la *fig.* 172, le mouvement vertical du couſſinet; la vis *VR* paſſe dans un écrou *T* qui eſt fixé au ſupport; elle paſſe dans un collet *X* qui eſt percé cylindriquement de la groſſeur de la vis; ſous le collet *X* il y a une baſe fixée à la vis, & qui oblige le collet *X* de monter avec la vis. Pour obliger le collet *X* de deſcendre auſſi avec la vis, il y a un canon de cuivre chauſſé carrément ſur la tige de la vis, dont la baſe s'appuie ſur *X*, & qui eſt arrêté en *V* au-deſſus de la tige par une vis de preſſion qui entre dans la tige.

Le collet *X* eſt fixé ſur une pièce de cuivre qui gliſſe de haut en bas, dans la grande pièce du ſupport où elle eſt logée, le long d'une rainure en queue d'aronde; c'eſt-à-dire, dont les deux faces ſont entaillées en ſens contraire; cette pièce de cuivre porte le couſſinet de métal qui eſt engagé fixement dans une autre rainure faite dans cette pièce de cuivre qui porte le collet *X* du ſupport.

Mouvement horizontal. 2393. Il faut auſſi qu'un des ſupports ait la facilité de ſe mouvoir horizontalement d'une petite quantité, en Fig. 173. avant ou en arrière, comme on le voit dans la *fig.* 173, où l'on voit la baſe d'un des pivots placée horizontalement. La vis horizontale *A* eſt deſtinée à ramener la lunette dans le plan du méridien; car elle s'en écarte ſouvent par l'action de la chaleur ſur les pièces de maçonnerie ou de charpente qui portent la machine (2609): mais pour ne pas nuire à l'immobilité que doivent avoir les ſupports, on a recours à la pratique ſuivante : on

compoſe la baſe du ſupport de deux plaques, dont l'une peut gliſſer horizontalement ſur l'autre ; la plaque horizontale mobile *F*, dont le plan eſt *FG*, eſt arrêtée ſur l'autre par quatre vis qui paſſent dans des trous ovales, enſorte qu'elle ait la liberté d'avancer ou de reculer d'une ligne, lorſqu'on lâche les 4 vis de chaque côté, mais en même temps qu'elle puiſſe être aſſujétie & fixée, en reſſerrant les vis qui la tiennent ſur la plaque immobile *BCDE* ; celle-ci eſt ſcellée en plomb, ou arrêtée fixement dans la baſe de pierre ou de fer qui porte tout l'inſtrument ; un reſſort placé en *F* repouſſe ſans ceſſe la platine *FG*, pour l'appliquer contre la tête de la vis *AG*, qui ſert à la repouſſer en arrière lorſque cela eſt néceſſaire : à la place du reſſort *F* on peut mettre en *F* une vis oppoſée à la vis *A*, & qui pouſſe dans une direction contraire ; alors on eſt obligé de faire jouer à la fois les deux vis *G* & *F*, pour rétablir l'inſtrument dans le méridien : il ne faut faire ce changement que dans le cas où il eſt devenu néceſſaire par une variation de 5 à 6″ de temps ; car ſi le changement eſt plus petit, il vaut mieux le calculer, & en tenir compte dans les obſervations (2610).

Lorſqu'on place l'inſtrument dans le méridien pour la première fois, il faut que les deux ſupports *P* & *R*, (*fig.* 174) ſoient aſſemblés par une règle de fer, qui ſera fixée par des vis à l'un & à l'autre ; & quand l'on aura un mouvement un peu conſidérable à donner au ſupport mobile *P*, il faudra y remettre la règle de fer, pour que les deux ſupports marchent enſemble, & ſoient toujours perpendiculaires à l'axe. *Fig.* 174.

2394. Pour pouvoir fixer la lunette à une hauteur invariable pendant la durée d'une obſervation, on emploie quelquefois une vis de preſſion avec un collet qui embraſſe l'axe près d'un de ſes ſupports, mais tout ce qui peut forcer l'axe étant d'une conſéquence dangereuſe, j'aime mieux la méthode ſuivante. Au-deſſous de l'axe de la lunette méridienne, on place un autre axe ou rouleau qui peut n'être qu'en bois, & qui tient

ſur un chaſſis horizontal que l'on peut avancer ou reculer ; on met perpendiculairement à ce rouleau une verge ou tringle de bois qui vient joindre la lunette près des oculaires où elle entre dans un carré fixé ſur la lunette ; on peut la contenir dans le carré avec une vis de preſſion ; où bien on fera ſeulement repoſer la lunette ſur l'extrémité de la tringle de bois ; & cette tringle ſera mobile dans le rouleau de bois, & pourra s'y arrêter par une vis de preſſion.

Trappe dans le méridien.

La partie d'un obſervatoire qui répond au-deſſus de la lunette méridienne doit être ouverte dans le ſens du méridien, & l'ouverture fermée par une trappe. Afin d'ouvrir aiſément cette trappe, elle peut être ſoutenue par une tringle dont l'extrémité inférieure porte ſur un levier, fort près du point d'appui autour duquel ce levier tourne dans la muraille ; ce levier *le* étant relevé & accroché contre le mur, la tringle s'élève & tient la trappe *t* ouverte ; on en aura une idée dans la Planche XXIII, au-deſſus de la lunette.

Machine pour éclairer les fils.

2395. On ajoute quelquefois à la lunette méridienne une machine pour éclairer les fils ; c'eſt un collet de bois qui environne l'axe vers *Q* ou *F* ſans y toucher, & qui eſt porté par un bras de fer qui part de terre ou du mur voiſin ; autour de ce collet tourne un autre cercle ou collet de bois qui porte un bras aſſez long pour atteindre l'objectif *C* de la lunette ; à l'extrémité de ce bras on met une lanterne, & l'on adapte à l'extrémité de la lunette un carton ou une plaque de cuivre, blanchie, qui réfléchiſſe la lumière ſur l'objectif ; le carton doit être percé d'un trou ſuffiſant pour admettre les rayons de lumière & s'incliner à volonté pour donner à l'objectif plus ou moins de lumière.

Méthode pour diminuer le frottement des pivots.

2396. Lorſqu'une lunette méridienne n'a que 4 pieds & l'axe $2\frac{1}{2}$, comme dans la deſcription précédente, le poids n'eſt pas conſidérable, il n'y a pas d'inconvénient ſenſible dans le frottement des pivots ſur leurs couſſinets. Mais dans un grand inſtrument tel que celui de l'obſervatoire de Gréenwich dont la lunette a près

de 8 pieds; le poids, le frottement & l'uſure méritent une attention : on ſuſpend l'axe en *M* & en *Q* vers le milieu des deux bras, par des crochets de bois qui portent l'axe de l'inſtrument; chacun de ces crochets eſt attaché ſupérieurement à l'extrémité d'un levier mobile dont l'autre extrémité eſt chargée d'un poids, ces deux poids ne font pas tout à fait équilibre avec l'inſtrument, mais quelques onces de plus ſuffiroient pour le tenir en l'air; par ce moyen les pivots ne portent ſur leurs couſſinets qu'avec une force de quelques onces, & ces parties délicates qu'il importe de conſerver avec ſoin dans toute leur intégrité ne ſont expoſées preſque à aucun frottement; M. Bradley qui a employé cet artifice à l'imitation de M. Romer (2388), l'a appliqué même à l'inſtrument de M. Halley qui ſe conſerve à Gréenwich.

2397. Quand on veut faire ſervir une lunette méridienne en voyage, on place la pièce de fer où tiennent les ſupports ſur un axe vertical; cet axe tourne en bas dans une crapaudine, & en haut dans un collet mobile, qui donne la facilité de le placer; on en trouvera la figure dans l'hiſtoire céleſte de M. le Monnier.

Niveau pour vérifier l'inſtrument.

2398. La néceſſité de rendre l'axe de la lunette méridienne exactement horizontal, exige que nous parlions ici du niveau qu'on emploie à cet uſage. On peut ſe ſervir d'un fil à-plomb ſuſpendu en *C* (*fig.* 174), à une petite tête de cuivre fixée au haut de la lunette, on fait tomber le fil vis-à-vis d'un point placé au bas de la lunette, ſur une autre petite tête de cuivre en *L*. On peut auſſi employer un niveau formé par un fil à-plomb avec 2 pieds qu'on place ſur les pivots *A* & *B*; mais ſi l'on conſidère qu'un cheveu, qui eſt à peu-près la 35e. partie d'une ligne, occupe 8″ ſur un rayon de 5 pieds : on verra qu'il eſt bien difficile de placer un axe à 3 ou 4″ près, avec le fil à-plomb.

Fig. 174.

Niveau à bulle d'air.

Le niveau à bulle d'air, repréſenté dans la *fig* 175 eſt un inſtrument plus commode & qui peut être plus exact; mais il eſt auſſi très-difficile à bien faire. La

Fig. 175.

règle de bois *BA* eſt deſtinée à s'appuyer ſur les pivots de l'inſtrument ; pour cela les pieds *B* & *A* ſont garnis de cuivre, arrondis comme les tourillons de l'axe, pour s'y appuyer. Un tube de cuivre *FE*, qui renferme un tube de verre, eſt retenu en *D* & en *C* dans deux pièces de cuivre, dont l'une fait charnière en *D* tandis que l'autre *C* eſt percée pour introduire une vis qui entre dans la règle inférieure ; la tête de la vis quand on la tourne, fait baiſſer la partie *C* du niveau, tandis qu'un reſſort placé deſſous le tube tend à l'élever, & l'applique ſans ceſſe contre la tête de la vis.

Difficultés à les bien faire.

2399. Dans les niveaux à bulle d'air, plus la bulle eſt longue, plus elle eſt ſenſible, & plus ſon mouvement eſt prompt. M. Chezy a obſervé dans un niveau fait par Langlois, que la bulle changeoit de longueur lorſqu'il faiſoit plus ou moins chaud, & que ſa marche devenoit différente, à cauſe des irrégularités intérieures du tube ; il a cherché les moyens de dreſſer la ſurface intérieure du tube ; il y a réuſſi avec un cylindre de verre, dreſſé & arrondi dans un demi-cylindre de cuivre ; il fait tourner ce cylindre de verre dans le tube qui doit ſervir de niveau, avec de l'émeril très-fin qui ait emploié une minute à deſcendre dans l'eau, de trois pouces de hauteur. M. Chezy emploie de l'émeril de plus en plus fin, & quand le tube eſt adouci il colle du papier ſur le cylindre de verre, & avec du tripoli il achève de polir l'intérieur du tube. Par ce moyen il eſt parvenu à faire un niveau d'un pied, dont la bulle d'air a 9 pouces & un tiers, & parcourt uniformément une ligne pour chaque ſeconde d'inclinaiſon, il l'auroit fait encore plus ſenſible s'il eût voulu ; mais il a mieux aimé ne lui donner que ce degré de ſenſibilité. Il travaille ſes tubes avec un cylindre de verre plus court que le tube ; & c'eſt ce qui donne une courbure longitudinale à l'intérieur du tube, parce qu'alors le tube eſt plus uſé vers le milieu que vers les bords. (*Mém. préſentés à l'acad. Tom. V, pag.* 254).

Niveau d'une extrême ſenſibilité.

Pour être sûr qu'un niveau eſt bien ſenſible & qu'il eſt



Fig. 168.

Fig. 170.



eſt bien régulier, on place le tube, auſſi-tôt qu'il eſt rempli, ſur des ſupports fixés dans une règle que l'on peut incliner par le moyen d'une vis, dont la régularité ſoit éprouvée (2360); on fait tourner la vis lentement & par degrés égaux, & l'on voit ſi la marche de la bulle eſt uniforme, ſi elle ne va point d'un mouvement accéléré & par ſoubreſauts; quand le tube eſt inégal, on le tourne ſur différens points de ſa ſurface, & l'on choiſit le côté le plus régulier : c'eſt tout ce qu'on peut faire de mieux lorſqu'on eſt forcé d'employer de mauvais tubes.

Il importe que l'éther qu'on emploie dans les niveaux, ſoit très-bien rectifié, ſans cela il eſt ſujet à deux inconvéniens, que j'ai remarqués de même que M. Chezy : premiérement, quand on agite le tube, l'éther ſe diviſe en pluſieurs bulles qui ne ſe réuniſſent enſuite que difficilement : ſecondement, l'éther ſe décompoſe avec le temps, & produit de très-petites gouttes d'une ſubſtance huileuſe qui s'attachent au tube, & arrêtent la marche de la bulle : ces inconvéniens me feroient choiſir l'eſprit-de-vin par préférence à l'éther. Voyez l'uſage & les vérifications du niveau (2615).

DESCRIPTION DE LA LUNETTE PARALLATIQUE.

2400. La Lunette parallatique, appellée auſſi *Machine parallatique*, eſt deſtinée à ſuivre le parallèle d'un aſtre, ou ſon mouvement diurne d'orient en occident, en décrivant le même *parallèle*; lorſque l'aſtre eſt placé une fois ſur le fil de la lunette, il le décrit ſans s'en écarter, & à quelque heure du jour qu'on dirige la lunette vers l'aſtre, on voit toujours celui-ci parcourir le fil de la lunette. Pour remplir cet objet, il ne s'agit que de placer la lunette ſur un axe qui ſoit parallèle à l'axe du monde, & qui tourne ſur lui-même dans le ſens & dans la poſition du globe de la terre; lorſque cet axe tourne, il emporte avec lui la lunette,

& par ce moyen il accompagne l'aſtre dans ſon mouvement qui ſe fait autour du même axe. La plus ancienne que je connoiſſe, eſt celle que décrivoit en 1626 le Pere Scheiner (*Roſa Urſina*, *pag.* 347); il l'appelle *Inſtrumentum Telioſcopicum*, & en attribue l'invention au Pere Gruenberger; elle fut d'un très-grand uſage pour obſerver les taches du ſoleil; M. Caſſini le pere s'en ſervit beaucoup; M. Caſſini le fils la perfectionna, & en donna la deſcription dans les *Mémoires de* 1721, *pag.* 18.

Ancienneté de cette machine.

Cet inſtrument s'appelle *parallatique*, parce qu'il eſt deſtiné à ſuivre le parallèle d'un aſtre, & non point parallactique, car ce dernier nom eſt conſacré à l'inſtrument dont ſe ſervit Ptolomée pour obſerver les parallaxes (2275). Je vais décrire une lunette parallatique, de la grandeur & de la forme la plus uſitée aujourd'hui parmi les aſtronomes de Paris, avec tous les détails néceſſaires pour qu'on puiſſe l'exécuter ailleurs; mais on peut bien en faire de plus grandes, & il n'y a point de Charpentier qui ne fît une machine parallatique de 6 pieds de haut, dont on ſe ſerviroit avec avantage pour porter une lunette de dix pieds avec ſon micromètre.

Fig. 176.

2401. Le pied eſt formé de 3 pièces de bois; d'abord un montant *AB* placé verticalement, d'environ 2 pieds de haut, 2 pouces & demi de largeur & 18 lignes d'épaiſſeur, eſt aſſemblé d'équerre avec une traverſe *DE*, de 22 pouces de long ſur 2 pouces & demi de largeur & 15 lignes d'épaiſſeur; cet aſſemblage eſt maintenu par deux arcs-boutans *FE*, *FD*, de 15 à 16 pouces de long ſur 15 lignes d'écarriſſage.

Une autre pièce *BK*, eſt encore aſſemblée d'équerre à tenon & à mortaiſe, dans la traverſe *DE*, & maintenue par un autre arc-boutant qui va de *G* en *H*, mais qui eſt maſqué dans la figure par la pièce *FE*; la partie *BKN* a 20 pouces de long ſur 10 lignes d'écarriſſage. Cet aſſemblage compoſé des trois pièces *AB*, *BK*, *DE*, avec leurs arcs-boutans, forme le pied de la machine;

la règle *BKN* eſt deſtinée à être miſe le long d'une ligne méridienne. *Fig.* 176.

L'axe *CYS* eſt la partie eſſentielle de l'inſtrument ; il fait avec la baſe *BKN* un angle égal à la hauteur du pole ; l'extrémité ſupérieure *A* de la règle verticale *BA* porte un couſſinet en forme de demi-cylindre concave, de cuivre, incliné dans la direction de l'axe, pour recevoir le collet *Y* qui eſt logé dans la concavité de ce couſſinet ; le collet *Y* de l'axe eſt recouvert d'un autre demi-cylindre de cuivre qui l'embraſſe exactement ; celui-ci porte deux oreilles que l'on fixe par 4 vis ſur les oreilles du couſſinet inférieur ; ces deux gouttières ou demi-cylindres de cuivre forment un collet de deux ou trois pouces de long, dans lequel l'axe tourne à frottement. Il importe que cette partie ſoit bien faite, que le frottement ſoit doux, que les pièces ne grippent point & que la lunette ne faſſe point de ſoubreſauts, comme cela arriveroit ſi tout étoit en bois ; il faut que le frottement ſoit aſſez fort pour que la lunette reſte en place ſans tourner autour de l'axe, ou par ſon poids ou par les petits coups de vent. A l'autre extrémité de l'axe il y a une crapaudine *C* ou concavité hémiſphérique pour recevoir le pivot de l'axe, qui ſe termine ordinairement par une tétine, ou eſpèce de petite boule, de matière dure, qui tourne facilement.

2402. Au-delà du collet *Y*, par lequel l'axe repoſe ſur le montant *BA*, ce même axe porte deux renforts ou platines de cuivre, qui ſont comme une mâchoire, de 3 pouces de long, pour recevoir & ſerrer le demi-cercle *VZ* qui doit ſervir de charnière, en même temps qu'il repréſentera le cercle horaire. Le centre *S* du demi-cercle *VZ* eſt traverſé par un axe ou petit cylindre de cuivre, portant une roſette qui en fait la tête ou la baſe, & dont l'autre extrémité ſe termine en vis ; on ſerre cette vis par un écrou, en mettant une platine entre deux, pour fixer le demi-cercle, & l'arrêter entre les deux plaques ou mâchoires qui terminent l'axe *CS* de la machine ; à meſure qu'on ſerre cette vis les deux

Cercle de déclinaiſon.

plaques de la mâchoire ſont pouſſées en ſens contraire entre les deux roſettes, & contre le plan du demi-cercle, ce qui ſert à le fixer plus ou moins fortement ſuivant le beſoin. On peut auſſi rendre le cylindre du centre plus court que l'épaiſſeur des mâchoires, en lui laiſſant un quart de ligne de tirage; alors on introduit une vis dans ſon extrémité, la tête de la vis ſert de roſette, & preſſe le centre contre la mâchoire. Pour que la roſette ne ſe déviſſe pas, on ajuſte un pied ou une goupille contre la tête de l'axe *S*, pour entrer dans la mâchoire. Le diamètre *VT* du demi-cercle entre dans une couliſſe de cuivre, où il eſt pris par deux vis *T* & *V*, & cette couliſſe forme par-deſſus une gouttière de cuivre de 8 pouces, qui eſt fixée par 4 vis ſur la gouttière de bois *LL* qui doit recevoir la lunette; cette gouttière eſt taillée en-dedans en forme d'angle droit, pour admettre les lunettes de différentes groſſeurs, dont les tuyaux ſont carrés.

On diviſe en degrés le demi-cercle *TZV* qui n'a que deux pouces un quart de rayon; mais on place vis-à-vis de ſa diviſion un arc *Z* qui forme un vernier; il embraſſe 11° du demi-cercle & il eſt diviſé en 12 parties (2344), de ſorte qu'on apperçoit aiſément les minutes de cinq en cinq; le demi-cercle *TZV* eſt évidé ou creuſé circulairement en forme de rainure à jour, comme on le voit en *Z*, pour avoir la liberté de tourner, malgré la vis de preſſion, qui traverſe ſon plan pour l'arrêter entre les pièces de la mâchoire.

Cercle équatorial.

2403. L'extrémité inférieure de l'axe *YC*, avant que d'être reçue dans la règle *BK*, traverſe par le centre un cercle *OC*, de trois pouces de rayon, deſtiné à repréſenter l'équateur, & à marquer l'aſcenſion droite de l'étoile qu'on obſerve. Ce cercle équinoxial eſt de cuivre, ſon plan eſt perpendiculaire à l'axe; il eſt ſoutenu en *K* ſur les deux côtés de la règle *BK*, par deux ſupports de cuivre coudés, qui tiennent avec des vis ſur la règle *BK*, & ſur leſquels le cercle eſt arrêté par ſix vis; ces ſupports ont deux empattemens chacun, pour

ſe viſſer ſur la règle *NB*, & trois empattemens pour s'appliquer contre le plan de l'équateur, & le contenir exactement.

On diviſe ce petit cercle équinoxial en degrés; mais on y marque les heures à la place des degrés, c'eſt-à-dire qu'on met 0^h à la partie ſupérieure du cercle; on met 1 heure à 15° de-là, tant à droite qu'à gauche, 2^h à 30°, &c. ainſi le temps y eſt marqué de 4 en 4 minutes; mais au moyen d'un vernier qui eſt ſur l'alidade *CO*, on y apperçoit aiſément un tiers de minute, c'eſt-à-dire, 20″ de temps. Pour cet effet, on prend ſur l'alidade une portion de cercle, qui embraſſe 11 diviſions de l'équateur, & l'on diviſe cet arc en douze parties; cela forme un vernier (2344) qui marque les 20″.

Quand la lunette parallatique eſt dirigée dans le méridien, l'index de l'alidade *O* répond à la partie ſupérieure du cercle inférieur qui repréſente l'équateur, & marque zéro pour l'angle horaire, ou pour la diſtance au méridien, parce qu'il marque le point ou l'équateur repréſenté par le cercle *C* eſt coupé par le méridien du lieu; mais ſi l'on fait faire un quart-de-tour à l'axe *CY*, & par conſéquent à la lunette, l'index *O* marquera 6 heures ſur le même cercle; il en eſt ainſi des autres angles horaires. Ce cercle équatorial eſt fort commode pour trouver les aſtres dans le crépuſcule, & même pendant le jour (2622). Meſure des angles horaires.

2404. Sur la règle *DE*, l'on ajoute auſſi deux pièces de bois *EN*, *DN*, en retour d'équerre, de cinq pouces de long, qui ſervent à empêcher le déverſement de la machine. Ces deux alonges ſont traverſées par des vis *N*, *N*, qui ſont néceſſaires pour *caler* la machine, c'eſt-à-dire, pour remettre la règle *AB* dans une poſition exactement verticale; on eſt obligé d'appliquer auſſi pour le même effet une troiſième vis à caler, à l'extrémité méridionale de la règle *BKN*, pour redreſſer la machine du nord au ſud, quand l'axe eſt trop ou trop peu incliné, & ne ſe dirige pas à la hauteur du pole; les deux autres vis ne ſervent qu'à Vis à caler.

redreſſer l'axe d'orient en occident, pour qu'il ſoit exactement dans le plan du méridien. Ces vis doivent ſe terminer en pointes, ou porter ſur des coquilles, pour que la machine ne charie pas quand on les tourne.

Niveaux à bulle d'air.

2405. On ajoute quelquefois deux niveaux à bulle d'air *P*, *Q* (2398); le premier ſert à reconnoître ſi la règle qui doit être verticale *AB*, n'incline point vers l'orient, ou vers l'occident. Le niveau *Q* ſert à reconnoître & à corriger l'inclinaiſon qu'elle pourroit avoir du nord au ſud; mais on y ſupplée facilement avec un niveau ordinaire en forme d'équerre, qui porte un fil à-plomb, & qu'on préſente ſur les deux règles *DE* & *BK*, lorſqu'on veut diſpoſer une lunette parallatique; on ſuppoſe que ces règles ſont bien d'équerre avec la pièce verticale *AB*.

Placer la machine ſous d'autres latitudes.

2406. La règle *BK* étant placée ſur une méridienne, & *AB* étant exactement verticale; ſi l'angle *ACB* eſt parfaitement égal à la hauteur du pole; par exemple, de 48° 50′ pour Paris, l'axe *CY* ſe trouve dirigé vers le pole du monde, & repréſente l'axe de la terre. Delà il ſuit que ſi l'on tranſportoit cette machine à 25 lieues de Paris, du côté du nord, il faudroit relever d'un degré l'axe *CY*, c'eſt-à-dire, éloigner la règle *AB* de la verticale du côté du midi. Pour ſe ménager cette facilité, on adapte au bas de la règle *AB* un arc de cuivre *R*, de quelques degrés; on place en haut une petite pièce de cuivre *r*, de laquelle pend un fil à-plomb ſur les diviſions de l'arc *R*; enſorte que le point de ſuſpenſion de ce fil ſoit en même temps le centre de ces diviſions); lorſque ce fil à-plomb marque zéro ſur l'arc *R*, la règle *AB* lui eſt parallèle, & ſe trouve être verticale; mais il marque 1 ou 2 degrés, lorſque la règle *AB* eſt inclinée de la même quantité: alors l'axe *AC* eſt diſpoſé pour une latitude différente. Le niveau *Q* ne peut ſervir dans ce cas-là; mais le fil à-plomb *r R* en tient lieu.

2407. Quelquefois une vis *I*, engrène dans les dentelures du demi-cercle *TZV*, qui pour lors eſt taraudé,

ou ſtrié ſur ſa circonférence ; cette vis ſert à donner un petit mouvement lent à la lunette *LL* ; mais on ſe paſſe aiſement de cette vis. La règle *LX* ſert à maintenir la lunette dans la ſituation qu'elle doit avoir par rapport à l'axe ; & la vis que l'on voit au milieu de la mâchoire *S* ſur le demi-cercle *VZ*, ſert auſſi à preſſer le demi-cercle entre les deux pièces de la mâchoire *S*, pour fixer la lunette quand elle eſt miſe ſur un certain degré de déclinaiſon.

On place enſuite une lunette de 4 à 5 pieds ſur la machine que nous venons de décrire ; on aſſujettit cette lunette ſur la gouttière *LL*, avec des brides ou colliers. Le tuyau eſt de bois, ordinairement carré, terminé aux deux extrémités par des frètes de cuivre, ou boîtes carrées, qui aſſemblent & fortifient les pièces de bois, & qui portent les verres. Quand la lunette eſt perpendiculaire à l'axe *SYC*, elle décrit un cercle perpendiculaire à l'axe du monde, c'eſt-à-dire, l'équateur ; ainſi dans ce cas-là on ſuivroit un aſtre qui ſeroit dans l'équateur, avec la lunette arrêtée à angles droits ſur ſon axe *SC*. Si l'aſtre eſt plus près du pole boréal, ou qu'il ait, par exemple, 30° de déclinaiſon boréale, on incline la lunette en la faiſant tourner ſur ſon centre *S*, juſqu'à ce qu'elle ſe dirige à 60° du pole, ou qu'elle faſſe avec *SC* un angle de 60° du côté de *L* ; ainſi de quelque côté que tourne l'axe avec ſa lunette, celle-ci étant toujours à 30° de l'équateur, ou à 60° du pole, décrira néceſſairement le parallèle d'une étoile qui auroit 30° de déclinaiſon ; alors le demi-cercle marquera en *Z* 30°, de la même manière qu'il marquoit zéro dans le cas où la lunette étoit perpendiculaire à ſon axe, & qu'elle ſe dirigeoit dans l'équateur. Les vérifications & l'uſage de la lunette parallatique ſe trouveront dans le Livre ſuivant (2618). Uſage.

DESCRIPTION DU TELESCOPE.

2408. Le Télescope (a) eſt un inſtrument compoſé de deux miroirs de métal & d'un oculaire à réfraction, diſpoſés pour bien voir les objets éloignés. Quoiqu'en Latin le mot de *Teleſcopium* s'applique également aux lunettes d'approche, ſa ſignification eſt bornée en François aux inſtrumens à réflexion, ou aux lunettes catoptriques. La première invention du téleſcope eſt de Jacques Gregori, (*Opt. promota, Londini*, 1663). Newton perfectionna cette invention, pluſieurs années après, comme on le voit dans ſon optique.

Planche XXV. Fig. 177. Un miroir concave *RR*, (*fig.* 177), dont la courbure fait partie d'une ſphère de 4 pieds de rayon, a ſon foyer *F*, éloigné de 2 pieds de la ſurface du miroir; les rayons parallèles *SR*, *SR*, qui arrivent d'un aſtre ou d'un point lumineux, ſont réfléchis de *R* en *F*, & ils ſe réuniſſent au point *F*; au-delà de ce point de réunion ils vont en divergeant; on les reçoit ſur un petit miroir concave *HH* de 3 pouces de foyer, dont le foyer *G* ſoit éloigné du foyer *F* d'une quantité qui ſe trouve par cette proportion: le foyer du grand miroir eſt à celui du petit, comme ce dernier eſt à l'intervalle *FG* qu'il doit y avoir entre les deux miroirs: dans notre exemple on dira, 24 pouces ſont à 3, comme 3 ſont à $\frac{1}{8}$ de pouce, qui eſt l'intervalle *FG*: dans cet état les rayons tombant en *H* ſur le petit miroir, vont ſe réunir au point *C*, où eſt placé le foyer de l'oculaire *D*; en ſuppoſant qu'il n'y ait qu'un ſeul oculaire. Ces rayons partant du point *C*, traverſent l'oculaire *D*, & arrivent à l'œil *O* parallèles entre eux; c'eſt ce qui eſt néceſſaire à un œil bien conſtitué pour voir diſtinctement un point lumineux. Dans les téleſcopes ordinaires, il y a deux oculaires dont le premier reçoit les rayons du petit miroir avant leur réunion, & les raſſemble au foyer *C* du ſecond oculaire.

Effet du Téleſcope Grégorien.

(a) Τῆλε, *procul*, σκοπέω, *video*.

2409.



Fig. 176.

Digitized by Google

2409. Dans les téleſcopes Newtoniens le petit miroir *HH* eſt un miroir plan, incliné de 45° & qui réfléchit les rayons à l'œil placé ſur le côté du téleſcope; on voit le miroir en *M* (*fig.* 183), & l'oculaire dans le tube *O L*. Téleſcopes Newtoniens. *Fig.* 183.

2410. La quantité dont le téleſcope groſſit, eſt exprimée par le carré du foyer du grand miroir, diviſé par le produit des foyers du petit miroir & de l'oculaire; ainſi dans l'exemple précédent ſi l'on ſuppoſe en *D* un oculaire de 2 pouces de foyer, on diviſera le carré de 24 par le produit de 3 & de 2, l'on aura 96; & ce téleſcope groſſira 96 fois le diamètre de l'objet, le fera paroître ſous un angle 96 fois plus grand qu'à l'œil nud, ou de la grandeur dont on le verroit s'il étoit 96 fois plus près de nous; s'il y a deux oculaires il faut une formule plus compliquée pour calculer l'amplification. Combien groſſiſſent les Téleſcopes Grégoriens.

Dans le téleſcope Newtonien on diviſe ſimplement le foyer du grand miroir par le foyer de l'oculaire, comme dans les lunettes ordinaires (2286), & l'on a la force amplificative.

2411. On ſe ſert ordinairement de deux oculaires dans un téleſcope, pour être en état d'avoir plus d'ouverture; l'oculaire qui eſt du côté de l'objet, eſt large & d'un plus long foyer, il raſſemble dans un plus petit eſpace les rayons venus de divers points de l'objet, tandis que ceux qui viennent d'un ſeul & même point de l'objet, ſont raſſemblés en un point au foyer d'un ſecond oculaire plus petit, qui les transforme en autant de faiſceaux de rayons parallèles entre eux qu'il y a de points dans l'objet: quand aux rayons venus de divers points, le petit oculaire fait converger ces divers faiſceaux ſous un plus grand angle, d'ou réſulte l'amplification ou le groſſiſſement. On choiſit pour oculaire un ménifque, ou un verre concave du côté de l'œil, & convexe du côté de l'objet, parce que les rayons qui paſſent ſur ſes bords, ſont moins obliques à ſa ſurface, qu'ils ne le ſeroient dans une lentille biconvexe. Des deux oculaires.

Champ du Téleſcope.

2412. Pour connoître le champ d'un téleſcope Newtonien, ou l'étendue de l'objet qu'il embraſſe, il faut ſavoir combien la largeur du petit miroir occupe de minutes de degré par rapport au milieu du grand miroir, & l'on dira pour cet effet. La diſtance du grand miroir au petit, eſt à la largeur du petit miroir, comme le rayon eſt à la tangente de l'angle qui exprime le champ du téleſcope. Je ſuppoſe que l'ouverture des oculaires n'eſt pas moindre que la largeur du petit miroir, car cela reſtreindroit le champ, c'eſt ce qui arrive dans les téleſcopes Grégoriens, le trou du grand miroir ne pouvant être fort large, le champ du téleſcope eſt limité par les oculaires.

Téleſcope monté. *Fig.* 178.

2413. Le téleſcope Grégorien eſt repréſenté avec ſa monture & ſon pied dans la *fig.* 178; *ABCD* eſt un tuyau de cuivre ou de bois, *AB* la place du grand miroir, *CD* l'ouverture qui reçoit les rayons; *E* la place du petit miroir qui eſt au-dedans du tube; *EFG* la tringle qui ſert à rapprocher le petit miroir du grand pour mettre le téleſcope à l'uſage de ceux qui ont la vue baſſe; *P* le tuyau des oculaires qui entre à vis dans la baſe *AB* du grand tuyau; *O* la place de l'œil. *HH* eſt une pièce de cuivre qui eſt repréſentée ſéparément en *h h* (*fig.* 182); elle ſe termine par deux rainures dans leſquelles paſſent des vis qui la fixent ſur le tuyau du téleſcope; cette pièce porte une petite boule de cuivre *I* qui eſt ſerrée dans la concavité *KK* du genou (*fig.* 178), recouverte d'une calotte de cuivre qui eſt ſeulement percée pour laiſſer paſſer & mouvoir la tige *I*; cette calotte eſt ſerrée par trois vis dont deux paroiſſent en *K* & donnent un frottement dur à la boule qui porte le téleſcope. La tige du pied ſe termine en bas par une vis *N* que l'on ſerre en-deſſous, au moyen d'un écrou, ou que l'on viſſe dans la baſe *LL* du pied. Sur cette baſe il y a 3 pieds *LM*, *LM*, qui tournent à charnière pour pouvoir ſe rapprocher de la tige *N*, & ſe placer commodément dans une boîte. On verra dans la figure 188 une monture plus com-

poſée pour le pied d'un téleſcope (2417).

2414. Le petit miroir du téleſcope eſt repréſenté ſéparément en *Q* (*fig.* 181), porté à l'extrémité d'une tige de cuivre, pour le faire mouvoir quand on veut ajuſter le téleſcope pour des vues courtes, ou pour des objets plus voiſins; cette tige paſſe dans un écrou, auquel tient une pièce de cuivre *SR* qui s'applique contre la paroi intérieure du téleſcope où elle gliſſe dans une rainure ou couliſſe faite en queue d'aronde; elle reçoit ſon mouvement par la tringle extérieure *EFG* (*fig.* 178) au moyen d'un écrou qui ſort du tuyau vers le point *E* (*fig.* 178), & que l'on voit encore mieux en *G* (*fig.* 184). Cet écrou paſſe au travers de la pièce *SR* *fig.* 181, & au-dedans du téleſcope, il ſe termine par un collet dans lequel on fait paſſer une pince *X* qui l'empêche de quitter le trou de la pièce *SR*. *Fig.* 178, 181 & 184.

Dans les téleſcopes qui portent un micromètre objectif (2434), on eſt obligé d'avoir en *E* une diviſion de vernier (2343) pour reconnoître facilement & en tout temps la ſituation du petit miroir; cette diviſion eſt repréſentée dans la figure 184, de la grandeur convenable à un téleſcope d'un pied. *AB* eſt une pièce de cuivre fixée à l'extérieur du tuyau, à l'endroit où répond le petit miroir; elle eſt diviſée ſur un eſpace de deux pouces, en vingtièmes de pouce; pour ſubdiviſer ces 20es. de pouce chacune en 25 parties, on a pris 24 diviſions ſur *AB* qu'on a partagées en 25, comme on le voit de *C* en *D* ſur une pièce de cuivre qui ſe meut avec le petit miroir, par le moyen de l'écrou *G* qui paſſe au travers du tuyau & de la plaque qui porte le petit miroir, pour l'obliger de monter & de deſcendre quand la tringle tourne dans ſon écrou. *HI* marque une rainure pratiquée dans le tube du téleſcope pour le mouvement de l'écrou *G*. Afin d'empêcher que cet écrou ne vacille, on le fait paſſer au travers d'une pièce *KL* qui recouvre la largeur de la rainure, & ſur laquelle eſt fixé par deux vis le vernier *CD*. Dans les petits téleſcopes à la main, on produit le mouve- Diviſions du vernier dans le téleſcope.

ment par une pièce en ſpirale qui ſe voit dans la figure 179.

2415. Le grand miroir du téleſcope eſt contenu dans la culaſſe du tuyau par un couvercle de cuivre viſſé, & par une pièce de cuivre *T* (*fig.* 180), triangulaire & un peu convexe, qui fait reſſort ſur le miroir ſans le gêner dans ſa ſituation ; quelquefois auſſi l'on fixe dans l'intérieur du couvercle, 3 petits reſſorts qui preſſent le miroir quand on ferme le tuyau ; autrefois on y mettoit des vis de preſſion qui paſſoient au travers du couvercle ; mais on a reconnu que ces vis pouvoient quelquefois forcer le miroir, lui faire prendre une ſituation gênée, & rendre les objets confus.

Œilleton. 2416. A l'extrémité du tuyau des oculaires on place un petit œilleton, ou une pièce concave, dans laquelle ſe loge le globe de l'œil, percée au centre d'un très-petit trou ; cet œilleton empêche que l'œil ne reçoive les rayons extérieurs, & l'oblige de ſe placer toujours ſur l'axe du téleſcope où la viſion eſt plus diſtincte : on voit en *OL* (*fig.* 183) le tube des oculaires ſur un téleſcope Newtonien avec ſon œilleton ; on y voit auſſi la vis *V* qui fait mouvoir le petit miroir *M* (2414).

Téleſcope Newtonien. *Fig.* 183.

Autre pied plus compoſé pour les grands Téleſcope.

2417. Dans les téleſcopes de 3 à 4 pieds l'on pratique ſouvent une autre eſpèce de pied ou de ſupport deſtiné à leur donner des mouvemens doux & réglés par le moyen des vis de rappel ; on en voit le deſſein dans la *fig.* 188. *RR* eſt un demi-cercle de cuivre fixé ſur le tuyau du téleſcope par 4 bras perpendiculaires au plan du demi-cercle, qui reçoivent chacun une vis pour les fixer contre le tuyau ; ce demi-cercle tourne ſur un axe *X*, & il eſt reçu dans l'épaiſſeur d'un mâchoire double *XZ* qui forme une charnière, après quoi elle ſe termine par une tige qui deſcend juſques dans celle du pied, c'eſt-à-dire, de *X* en *Y* ; la baſe *ef* eſt d'une ſeule pièce avec la tige *XZ*. Le demi-cercle *RR* eſt garni ſur l'épaiſſeur de ſa circonférence de filets égaux à ceux de la vis *V*, qui engrene dans cette circonférence & l'oblige à tourner lentement, ce qui fait

Pl. XXVII. Fig. 188.

mouvoir verticalement le téleſcope, pour ſuivre les aſtres qui montent ou qui deſcendent. *Fig.* 188.

2418. Outre le mouvement lent que cette vis *V* procure au demi-cercle *RR* & par conſéquent au téleſcope, on eſt maître de donner un mouvement prompt au téleſcope en faiſant déſengrener la vis *V*; pour cela on deſſerre la vis *a*, on l'élève au-deſſus de ſon point d'appui *e*; cette vis demeurant ainſi ſans action, le chaſſis *c b d* qui porte l'autre vis *V* n'eſt plus preſſé contre le demi-cercle; & parce que le même chaſſis n'eſt plus ſoutenu alors que par une charnière portée par la baſe *ef*, & dans laquelle il tourne à frottement dur, on l'abaiſſe facilement avec la main; la vis *V* ſe trouve ainſi totalement déſengrenée, & le téleſcope en état de tourner à la main auſſi promptement que l'on veut. Mouvement lent ou prompt.

2419. Pour pouvoir donner au téleſcope un mouvement horizontal, on ſe ſert d'un autre canon qui entre dans le pied *Y* du téleſcope & qui porte une baſe *ghk*: ce canon intérieur reçoit la tige *XZ* dont nous avons parlé, & il eſt reçu lui-même dans le pied de l'inſtrument, où on l'arrête par le moyen d'une vis de preſſion *m*. L'extrémité de la baſe *k h g* porte un écrou cylindrique *g* mobile autour d'un axe; au travers de l'écrou paſſe une vis de rappel *g f* fixée en *f* dans un petit cylindre qui tourne ſur la pièce *e f* à cauſe des différentes inclinaiſons de la vis *g f*. Cette vis de rappel en tournant dans l'écrou *g* oblige l'extrémité *f* de la pièce *ef*, de ſe rapprocher du point *g* en tournant dans le canon intérieur de la pièce *g h k*, & celle-ci eſt arrêtée & immobile dans le pied *Y* du téleſcope par la vis *m*, lorſqu'on veut donner le mouvement lent par le moyen de la vis *g f*. Si l'on veut donner un mouvement prompt à tout le téleſcope horizontalement, on lâche la vis de preſſion *m*, alors le canon de la pièce *g h k* tourne librement dans le pied *Y*, & emporte avec lui le pivot ou la tige *XZ* liée à ce canon par la vis *f g*, & par conſéquent obligée d'en ſuivre les mouvemens. Mouvement horizontal.

2420. Le ſieur Navarre a exécuté des téleſcopes où l'on peut donner le mouvement prompt par un ſimple cercle qui eſt à frottement dur, & le mouvement lent par le moyen d'une vis, mais cela n'eſt guère pratiquable dans de grands téleſcopes.

Dimenſions d'un Téleſcope de 2 pieds de foyer.

2421. Les téleſcopes de 32 pouces de longueur qui ſont ceux dont on fait le plus d'uſage, ont le foyer du grand miroir de deux pieds, le diamètre 5 pouces; le foyer du petit miroir concave 3 pouces, ou 1 pouce $\frac{1}{2}$, ſuivant que l'on veut faire groſſir plus ou moins; le diamètre du petit miroir, qui eſt égal au diamètre du trou fait dans le grand miroir, a ordinairement un pouce; le tuyau des oculaires en renferme deux, l'un de 4 pouces & l'autre de 2 pouces de foyer, placés à 3 pouces l'un de l'autre; mais quand on veut groſſir davantage les objets on a un plus fort équipage ou un tuyau de rechange, dont les deux oculaires ſont de 3 pouces, & de 14 lignes de foyer, placés à 2 pouces l'un de l'autre; l'œil ſe place environ à 6 lignes du dernier oculaire.

Equipages plus ou moins forts.

Dimenſions de Short.

2422. On verra dans la table ci jointe les ouvertures que le célèbre Short donnoit en 1763 à ſes téleſcopes, depuis qu'il étoit parvenu à leur donner une forme aſſez approchante de la parabole, pour que les aberrations fuſſent inſenſibles malgré ces grandes ouvertures; ces dimenſions ſont en pouces & en centièmes de pouces, meſure d'Angleterre (a); la troiſième colonne de cette table fait voir quel foyer Short avoit coutume de donner aux petits miroirs de ſes téleſcopes Grégoriens. Le téleſcope de 144 pouces, ou 12 pieds de

Foyer du Miroir.	Ouverture du grand Miroir.	Foyer du petit Miroir.
pouces.	*pouces.*	*pouces.*
12	3, 30	1 & 2
24	5, 57	2 & $4\frac{1}{2}$
36	7, 70	$2\frac{1}{2}$ & 6
48	9, 50	3 & 7
144	21, 50	$4\frac{1}{2}$ & 12

Téleſcope de 12 pieds.

(a) Le pied d'Angleterre eſt à celui de France à peu-près comme 15 eſt à 16, plus exactement comme 4000 eſt à 4263. (*Phil. tranſ.* 1768, *pag.* 326).

foyer, n'a jamais été exécuté qu'une fois ; ce téleſcope le plus grand & le meilleur qui ait jamais été fait, étoit en 1763 à Londres à l'hôtel de Malboroug, mais il étoit démonté, & perſonne n'en faiſoit uſage. Depuis la mort de ce célèbre artiſte, la conſtruction des téleſcope eſt un peu négligée.

2423. Un téleſcope Grégorien peut ſe mettre ſous la forme Newtonnienne (2409), en y ſubſtituant un petit miroir plan, & faiſant au tuyau une ouverture latérale ; alors on voit les objets plus clairs, parce qu'on diminue la diſperſion des rayons qui ſe fait ſur le petit miroir ; mais le téleſcope groſſit moins (2410).

Il eſt inutile de faire groſſir un téleſcope.

2424. La force du petit miroir & des oculaires d'un téleſcope conſiſte à groſſir les objets, mais la partie eſſentielle du téleſcope conſiſte dans la quantité de rayons que reçoit le grand miroir, ainſi c'eſt l'ouverture du téleſcope qui décide principalement de ſa force & de ſa perfection, d'où il ſuit que plus on augmentera les ouvertures, plus on perfectionnera le téleſcope (2431). Il eſt inutile de faire groſſir beaucoup un téleſcope ; celui de 7 à 8 pieds qui pourroit groſſir mille fois en y mettant un petit miroir & des oculaires d'un court foyer, fait mieux, donne plus de diſtinction & de clarté quand on ſe contente de le faire groſſir 100 fois.

Téleſcope de Caſſegrain. *Fig.* 177.

2425. Quelquefois on emploie un petit miroir convexe au lieu du miroir concave *HH* (*fig.* 177), & c'eſt ce qu'on appelle téleſcope de *Caſſegrain* ; on met le petit miroir *HH* plus près de l'œil que n'eſt le foyer *F* du grand miroir ; les rayons réfléchis *RF* atteignent le petit miroir avant leur réunion ; ils ſont réfléchis & deviennent convergens ; on les arrête avant leur réunion par le grand oculaire placé en *D* ; les rayons qui arrivent à cet oculaire en convergeant ſe réuniſſent (avant que d'être à ſon foyer) en un point *E*, où l'on place le foyer du petit ménifque ou du dernier oculaire, enſorte que les rayons en ſortent parallèles pour arriver à l'œil.

Force de cette eſpèce de téleſcope.

Les téleſcopes dont le petit miroir eſt convexe ont

Fig. 177. l'avantage ſur les téleſcopes Grégoriens d'être plus courts du double du foyer du petit miroir; dans un téleſcope de 3 pieds de foyer, dont l'ouverture eſt de 6 pouces $\frac{1}{2}$, la convexité du petit miroir peut être de $3^{p}\frac{1}{4}$ de rayon, & il groſſira 173 fois (Smith *tom. II, pag.* 151, édit. du P. Pézenas) : dans un téleſcope Grégorien de même foyer, le petit miroir auroit $3\frac{1}{2}$ de foyer, & le téleſcope groſſiroit 165 fois : un téleſcope de 15 $\frac{1}{2}$ pouces de foyer dont le petit miroir eſt convexe, groſſit 92 fois, & un téleſcope de 5 pieds, environ 243 fois.

2426. Pour juger de la bonté d'un téleſcope on y met un oculaire d'un très-court foyer, c'eſt à-dire, on le force, autant qu'il eſt poſſible, pourvu qu'on voie diſtinctement la lune, Saturne & Jupiter, & qu'on leur trouve aſſez de lumière lorſque l'air eſt pur & tranquille; on cherche alors par expérience (2427) combien le téleſcope amplifie ou groſſit les objets; & l'on voit par-là s'il approche beaucoup de la perfection des bons téleſcopes que nous avons cités (2421, 2425).

Si pluſieurs téleſcopes de même ſorte ont à peu-près la même longueur, ou s'ils ſont de différentes eſpèces & qu'ils groſſiſſent également, on jugera de l'avantage qu'ils peuvent avoir l'un ſur l'autre en liſant la même écriture avec les différens téleſcopes. On voit dans l'Optique de Smith qu'avec les téleſcopes de 4 pouces de foyer on voyoit les ſatellites de Jupiter, & on liſoit les Tranſactions Philoſophiques dont le caractère eſt le même que celui de cet ouvrage, à 125 pieds de diſtance; on les liſoit à 160 pieds avec 6 pouces, à 220 avec 9 pouces, à 500 pieds avec 15 pouces; & M. Maclaurin aſſure qu'on avoit vu pluſieurs fois les 5 ſatellites de Saturne enſemble, avec ce téleſcope de 15 pouces de foyer, comme M. Caſſini les avoit vus quelquefois avec une lunette de 17 pieds.

A quelle diſtance on doit lire avec des téleſcopes.

2427. Le moyen dont Hauksbée ſe ſervoit pour déterminer par expérience la force amplificative de ſon téleſcope, & qu'il éprouva conjointement avec Folkes,

Expérience pour l'amplification d'un téleſcope.

&

Fig. 177.





Fig. 180.



Fig. 181.



Fig. 182.

Fig. 184.



Digitized by Google

& Jurin, eſt rapporté dans Smith, & il ſuffit réellement pour ces ſortes d'expériences. Ayant placé un cercle de papier d'un pouce de diamètre à la diſtance de 2674 pouces de l'oculaire dans la direction du téleſcope, on tire 2 lignes parallèles ſur un papier à un pied d'intervalle l'une de l'autre, on place ces 2 lignes à côté du téleſcope, on les regarde à la fois des deux yeux, un œil dans le téleſcope & l'autre en dehors, on fait rapprocher peu-à-peu les deux lignes de l'œil juſqu'à ce qu'elles paroiſſent toucher les deux bords du cercle d'un pouce, c'eſt-à dire, que les 12 pouces vus à l'œil nud, paroiſſent de la même grandeur qu'un pouce vu dans le téleſcope; & dans cet état l'on meſure la diſtance des deux parallèles à l'œil; ſi elle ſe trouve de 142 pouces ſeulement, l'angle viſuel du téleſcope eſt réellement augmenté dans le rapport compoſé de 12 à 1, & de 2674 à 142, c'eſt-à-dire, 226 fois, c'eſt ainſi que Hauksbée reconnut que ſon téleſcope de $3\frac{1}{4}$ pieds de foyer augmentoit 226 fois le diamètre des objets.

2428. M. Pound raconte (*Phil. tranſ.* n°. 378), qu'il avoit comparé conjointement avec M. Bradley un téleſcope de M. Halley, dont le foyer n'avoit pas 5 pieds $\frac{1}{4}$, avec le fameux objectif d'Huygens, qui avoit 123 pieds de foyer; ils trouverent que le téleſcope groſſiſſoit autant de fois & rendoit les objets auſſi diſtincts, quoiqu'ils ne fuſſent pas auſſi clairs & auſſi lumineux que dans la lunette; ils attribuoient cette différence en partie à l'ouverture qui étoit plus petite dans le téleſcope que dans la lunette d'Huygens, & en partie à certaines petites taches du miroir qui n'avoient pu ſe polir auſſi bien que le reſte. Malgré cette différence de lumière dans les objets, ils voyoient avec le téleſcope tout ce qu'ils avoient vu avec la lunette d'Huygens. Comparaiſon avec la lunette de 123 pieds.

2429. Le téleſcope qui avoit été travaillé par *Hauksbée*, quoiqu'il eût 3 pieds $\frac{1}{4}$ de foyer, groſſiſſoit 226 fois, & par conſéquent différoit peu de celui de

Halley, quoique celui-ci eût près de 5 pieds $\frac{1}{4}$ de foyer; en employant l'oculaire qui le faiſoit groſſir 226 fois, on voyoit avec une clarté parfaite les plus petites taches de la lune dans ſon premier croiſſant, les bandes de Jupiter & le trait noir de l'anneau de Saturne : pour voir ce dernier objet on lui donnoit une ouverture de 3 pouces $\frac{1}{2}$ ou 4 pouces; mais lorſque le temps étoit obſcur il falloit, pour mieux voir les objets terreſtres, laiſſer à découvert la ſurface entière du miroir qui avoit quatre pouces $\frac{1}{2}$ de diamètre meſure d'Angleterre.

2430. Dans un miroir exactement ſphérique il n'y a que les rayons voiſins du centre qui ſe réuniſſent exactement à un même foyer, les rayons des bords s'en écartent ſenſiblement ; c'eſt ce qui fait qu'un miroir de 2 pieds de foyer ne peut pas avoir plus *de 5 $\frac{1}{2}$ pouces* de diamètre. Short eſt celui qui eſt parvenu à donner à ſes téleſcopes la plus grande ouverture (2422) ; mais la figure de ſes miroirs ne doit pas être ſphérique ; ils ne ſupporteroient pas des ouvertures auſſi larges, ils auroient des aberrations & une confuſion trop ſenſibles.

2431. Il eſt poſſible d'étendre cet art beaucoup plus loin, il n'eſt pas encore à ſa perfection, & probablement la force des téleſcopes augmentera de plus en plus ; ſi jamais l'induſtrie des artiſtes, la curioſité des ſavans, & la puiſſance des Souverains vont aſſez loin pour faire entreprendre un téleſcope qui ait quelques pieds de diamètre & qu'on y réuſſiſſe, nous verrons peut-être dans le ciel des choſes toutes nouvelles.

Polémoſcope. 2432. On peut regarder comme une dépendance du téleſcope le *polémoſcope* d'Hévélius, (*Selenog. pag.* 28); c'eſt un inſtrument qui a deux réflexions & deux réfractions, il ſert à obſerver les objets ſitués derrière l'obſervateur ou de côté ; on en applique quelquefois à des inſtrumens d'aſtronomie pour obſerver au zénit d'une manière plus commode, comme on emploie des miroirs plans dans l'octant des marins, pour faire toucher en

apparence les images des deux objets dont on obſerve la diſtance (2458).

Héliométre ou Micrométre objectif.

2433. L'HÉLIOMÈTRE ou micromètre objectif eſt une des plus belles inventions modernes, & des plus utiles pour l'aſtronomie, auſſi bien que celle des verres achromatiques ; on n'auroit pas cru il y a 30 ans qu'il reſtoit à trouver deux choſes auſſi curieuſes & auſſi importantes, & qu'on les trouveroit ſitôt. M. Bouguer eſt le premier qui nous ait appris la manière de faire un micromètre objectif, (*Mém. acad.* 1748, *pag.* 11). Il l'appella HÉLIOMÈTRE ou ASTROMÈTRE, parce que cet inſtrument lui ſervit d'abord à meſurer exactement le diamètre du ſoleil.

2434. On voit dans la *fig.* 186 un héliomètre monté ſur un bout de tuyau *A* qui fait l'extrémité d'une lunette de 18 pieds, dont je me ſers depuis 1753 ; *B* eſt un des deux objectifs de 18 pieds de foyer, il eſt logé dans une feuillure circulaire de cuivre, collé avec du maſtic & recouvert par deux têtes de vis *C* & *D* ; le verre mobile *E* qui eſt égal à l'autre, de même ouverture & de même foyer, eſt porté dans un chaſſis *FGHI* mobile entre deux couliſſes *K* & *K*, formées en queue d'aronde ; ce chaſſis eſt taraudé en *L* & reçoit une vis *NMLO* dont la tête eſt arrêtée en *M* ſur la platine fixe. Lorſqu'on tourne la tête de la vis par le moyen de la roſette *N*, le chaſſis qui porte le verre *E* eſt obligé de s'approcher du verre dormant *B*, ou de remonter vers *L* juſqu'à ce qu'il rencontre l'extrémité de la vis en *O* ; c'eſt le terme de ſon plus grand écartement. Le chaſſis mobile porte ſur le côté en *I* un trait de burin qui ſert d'index, & qui marque ſur une petite échelle *P* les tours de la vis, & l'écartement des deux objectifs. *Pl. XXVI. Fig. 186.*

Le chaſſis mobile eſt évidé entre *L* & *O* pour qu'il ſoit plus léger ; mais afin que la vis ne ſe rouille pas à

Fig. 186. l'humidité de l'air, on la recouvre d'une plaque de cuivre qui tient avec deux vis ſur les couliſſes K, K ; on doit auſſi recouvrir l'intervalle EB qui eſt entre les deux verres avec un papier noir ou un morceau de drap, pour empêcher l'introduction des rayons, qui ne paſſeroient point au travers des objectifs.

2435. L'effet du micromètre objectif conſiſte à donner deux lunettes dans un ſeul tuyau & avec un ſeul oculaire ; le cercle RRR marque la largeur du tuyau de la lunette vers l'objectif, ce tuyau va en diminuant vers l'oculaire, où l'on peut le rétrecir à volonté ; car l'on n'a pas beſoin d'avoir un grand champ dans cette ſorte de lunette.

Fig. 185. On voit dans la *fig.* 185 un cercle AAA qui repréſente le champ de la lunette ou le cercle viſible au foyer commun des deux objectifs & de l'oculaire ; ST *eſt un* cercle qui repréſente l'image du ſoleil formée par l'un des objectifs de l'héliomètre ; RV eſt l'image que donne l'autre objectif. Quand on veut meſurer le diamètre du ſoleil on approche les deux verres juſqu'à ce que les deux images ſe touchent en un point T ; & l'écartement des deux objectifs, évalué en ſecondes (2532), donne la diſtance des deux centres C & B, c'eſt-à-dire, le diamètre du ſoleil ; cet écartement des objectifs eſt toujours égal au diamètre de l'image qui ſe forme à leur foyer.

Lorſqu'un héliomètre eſt fort long il ſeroit très-utile de pouvoir approcher ou éloigner les objectifs l'un de l'autre, ſans ceſſer de regarder dans la lunette ; cela ſe peut faire avec une tringle qui ſe termineroit par un pignon & qui engrèneroit dans une roue de champ fixée ſur la tête de la vis ; j'en ai donné la figure dans les *Mém. de l'acad.* 1754, *pag.* 597.

Avantages de l'héliomètre. 2436. L'invention de M. Bouguer a trois avantages conſidérables ſur les micromètres ordinaires (2358) ; il donne un moyen d'obſerver le diamètre d'un aſtre malgré le mouvement diurne ; en effet, un aſtre qui eſt ſur les fils d'un micromètre n'y reſte qu'un inſtant, & il

faudroit pouvoir obſerver les deux bords & les deux fils à la fois, ce qui eſt très-difficile, au lieu qu'avec l'héliomètre quand les deux images ſe touchent, elles reſtent toujours en contact, quel que ſoit le mouvement de la ſphère, celui de la lunette, ou de l'œil, & l'on a tout le temps de vérifier & de conſtater l'exactitude de la meſure. Les micromètres ordinaires ne peuvent s'appliquer à de grandes lunettes pour meſurer les diamètres du ſoleil ou de la lune, parce que le champ de ces lunettes ne peut contenir 30′ de diamètre; mais le micromètre objectif meſure les aſtres lors même que le champ de la lunette n'en contient qu'une petite partie. Enfin les micromètres nous font voir les deux bords du ſoleil ou de la lune ſur les bords de la lunette, au lieu que le micromètre objectif nous les donne toujours au centre & ſur l'axe même de la lunette, où l'on peut faire toucher les deux images. On verra la vérification & l'uſage de cet héliomètre avec ceux des micromètres ordinaires, 2519 & ſuiv.

Héliomètre appliqué au Téleſcope.

2437. L'INVENTION de l'héliomètre faite par M. Bouguer, fut appliquée en Angleterre aux téleſcopes, comme je le ſus par une lettre de Short à Don Georges Juan, écrite au mois de Janvier 1754; mais ce fut d'une manière un peu différente; elle conſiſte à partager un objectif en deux parties égales, que l'on fait mouvoir en ſens contraire, & que l'on place à l'extrémité d'un téleſcope; Short & Dollond furent les premiers qui en firent conſtruire, & ils en attribuèrent la première invention à Savery; Short aſſure que cette invention avoit été dépoſée en 1743 à la ſociété royale, (*Philoſ. tranſ. tom.* 48. *Mémoires de Marſeille année* 1755); mais du moins cette invention ne fut répandue & employée en Angleterre qu'après M. Bouguer, à peu-près comme il étoit arrivé à l'occaſion du micromètre de M. Auzout (2349).

Deux moitiés d'objectif. *Fig.* 187.

2438. Les demi-cercles *ABC*, *DEF* (*fig.* 187), répréſentent les deux moitiés de l'objectif, qui ſe meuvent parallèlement, le long de la ligne *AF*; le ſegment *ABC* eſt fixé ſur une platine de cuivre *AGHI*, & le ſegment *DEF* ſur une autre platine *KLMN*; ces deux platines ſe terminent chacune par une crémaillere *HI* & *MN* dont les dentures ſe regardent : un pignon fixé vers *P*, ſous un coq à l'extrémité de la monture de l'héliomètre ou de la platine qui lui ſert de baſe, engrène dans les deux crémailleres, en ſorte que l'une montant l'autre eſt forcée de deſcendre, pour qu'elles ayent des mouvemens égaux, en ſens contraire, & que les centres des deux portions d'objectifs ſoient toujours l'un & l'autre à même diſtance de l'axe du téleſcope. On fait tourner le pignon *P* par le moyen d'une tringle *Q* (*fig.* 188).

2439. Les deux platines *AGH*, *KLM* qui portent les verres, gliſſent ſur une platine fixe & plus grande *OSSQQRRO*, qui forme l'aſſemblage de la pièce entière & qui s'adapte au téleſcope; cette platine du fond porte deux couliſſes *RR*, *SS*, entre leſquelles ſe meuvent les deux platines mobiles; ces deux couliſſes doivent être parfaitement parallèles à la ligne *AF* ſur laquelle ſe meuvent les deux verres. Afin que les centres des verres ſoient toujours maintenus ſur cette même ligne *AF*, le coq ou la chappe de cuivre *TT* fixée ſur la grande platine, & qui porte le pignon *P*, reçoit auſſi les crémailleres des deux platines & les aſſujétit contre le pignon, pour empêcher qu'elles ne s'écartent l'une de l'autre. Le mouvement ſe communique aux deux crémailleres par le moyen du pignon qui eſt en *P*. Les deux crémailleres tiennent aux platines des verres, & ont le même mouvement; c'eſt pourquoi les diviſions qu'on y voit marquent le mouvement des verres; la règle *Y* eſt diviſée en pouces & dixièmes de pouces Anglois; chaque trait qu'on voit ſur le bord de cette règle marque un vingtième de pouce, la règle *X* doit occuper 24 diviſions de la règle *Y*,

Meſure de leur diſtance.

ce être diviſée en 25 parties, ſuivant la méthode de Vernier (2343), par ce moyen elle ſubdiviſe en 25 parties chaque vingtième de pouce, c'eſt-à-dire; qu'elle donne en cinq centièmes parties de pouce, la diſtance d'un verre à l'autre.

2440. L'arc de Vernier *X*, eſt attaché ſur l'une des platines mobiles *XAGHI* par deux vis *g g*, qui paſſent dans des ouvertures ovales, pour avoir la facilité de faire concourir & coincider les diviſions, quand les verres ſont bien d'accord & ne donnent qu'une ſeule image de l'objet; mais ces vis *gg* doivent être ſerrées dans l'uſage ordinaire du micromètre objectif. Le vernier porte auſſi une oreille *h*, perpendiculaire à ſon plan, qui ſert d'écrou à la vis *V*; celle-ci tourne dans une oreille *k*, fixée à la platine mobile & qui arrête le collet de la vis, de ſorte que quand la vis tourne, l'écrou *h* eſt obligé de ſe mouvoir & entraîne avec lui l'arc de Vernier, lorſqu'on eſt obligé de lui donner un petit mouvement pour accorder l'index avec la réunion des images (2455).

Lorſque les deux ſegmens de verre concourent enſemble pour ne former qu'un ſeul verre, un ſeul centre, une ſeule image, ils ſont compris l'un & l'autre dans la circonférence *LaBGf*, qui déſigne l'ouverture du téleſcope, & celle de la grande platine fixe *OOQQ*, ſur laquelle gliſſent les deux platines des verres. Quand les deux verres ſont éloignés du centre du téleſcope, comme on le voit dans la figure, il n'y a plus qu'une portion *CBa*, *DEf*, de chaque verre qui réponde à l'ouverture du téleſcope, & par laquelle on puiſſe voir les objets; ce ſont ces deux parties de chaque demi-cercle qu'on a teinté plus fortement dans la figure, pour indiquer l'obſcurité de l'intérieur du tuyau; le reſte des verres, c'eſt-à-dire, les ſegmens *ABa* & *FEf* portent ſur le cuivre de la grande platine & ne peuvent ſervir à la viſion.

2441. Les verres ſont arrêtés ſur leurs platines, chacun par trois petites équerres doubles, de cuivre, Comment on aſſujétit les verres.

où il y a des vis & un reſſort à chacune : une des vis de chaque équerre telle que *a*, ſert à la fixer ſur la platine ; la ſeconde *c*, ſert à contenir le verre horizontalement, la troiſième *d* à preſſer ſur le verre pour l'aſſujétir ſur la platine ; les vis qui retiennent les verres horizontalement, c'eſt-à-dire, parallèlement à la platine, telles que *e e*, buttent contre des reſſorts tels que *m m* qui entourent la circonférence des verres & les retiennent par leur épaiſſeur ; ces reſſorts font une preſſion modérée & conſtante, qui ne gêne point les verres. Les équerres *A* & *F*, n'ont point de vis pour preſſer horizontalement, parce qu'il ſuffit que les verres ſoient preſſés d'un côté par les équerres *C* & *D*, qui ont chacune dans leur montant une vis horizontale ou parallèle aux platines, & qui preſſe auſſi contre des reſſorts, comme les vis des équerres *B* & *E*.

2442. Les verres ſont appuyés le long de leur diamètre ou de la ligne *YF* contre de petites lames de cuivre miſes de champ & ſoudées ſur le bord intérieur de chacune des platines mobiles ; pour que cette épaiſſeur de deux petites lames, ne forme pas une diſtance entre les centres des deux verres, on peut les uſer chacun de l'épaiſſeur d'une de ces lames, afin qu'étant l'un vis-à-vis de l'autre, quoique ſéparés par l'épaiſſeur des deux lames ils ne faſſent qu'un ſeul objectif : il eſt vrai qu'une petite partie de cet objectif eſt interceptée le long du diamètre, mais les objets ne ſont pas moins viſibles & moins diſtincts.

Héliomètre monté. *Pl. XXVII. Fig.* 188.

2443. Le téleſcope garni de ſon micromètre objectif, eſt repréſenté dans la *fig.* 188 ; *AB* eſt le tuyau du téleſcope, *CD* eſt la platine fixe du micromètre (2439), vue par deſſous ; *EE* eſt un *chercheur* ou une petite lunette qui a un grand champ & qui eſt deſtinée à trouver plus facilement les objets que l'on veut obſerver ; *F* eſt le tuyau des oculaires, *G* la vis qui ſert à changer la diſtance du petit miroir ſuivant la vue de l'obſervateur ou la diſtance de l'objet (2414) ; *HH* eſt la circonférence de l'extrémité du tube du téleſcope, qui

Fig. 186.



Fig. 187.



Digitized by Google

qui eſt dentée pour procurer le mouvement de rotation du micromètre. La platine du micromètre porte un collet circulaire ou un bout de tuyau qui eſt ſoudé de champ, & que l'on inſère dans l'extrémité *B* du téleſcope; ce collet répond exactement à l'ouverture circulaire *fLaG* de la *fig.* 187 : il y a un autre collet *H* qui embraſſe le tuyau du téleſcope à quelques lignes de ſon extrémité, il y eſt fixé par des vis & il porte un cercle, ou eſpèce de roue dont une partie eſt dentée & le reſte ſolide; cette roue ſert à retenir le micromètre par le moyen de trois crochets comme *L*, *K*, qui ſont fixés à la grande platine du micromètre & viennent reprendre pardeſſous la roue dentée en tournant librement ſur ſa circonférence; il y a deux de ces crochets qui comme *L*, ſont arrêtés par leur baſe à la platine du micromètre, chacun au moyen d'une vis *M*, qui paſſe dans la platine du micromètre, & par leur rebord *N* viennent embraſſer la roue dentée qui eſt fixée au tube du téleſcope.

2444. Le troiſième crochet en double équerre que l'on voit en *K*, eſt plus compoſé parce qu'il ſert au mouvement de rotation que doit avoir le micromètre; il renferme une petite roue ou pignon, dont un pivot eſt arrêté dans la platine du micromètre, l'autre pivot ſe termine par une tige d'acier taillée carrément, qui paſſe hors de la chappe ou du tenon, ſur laquelle on place une clef *O*, dont le trou carré s'engage ſur la tige & qui ſert à faire tourner la petite roue au moyen d'une tringle *PQ*. Mouvement de rotation.

2445. La chape qui eſt repréſentée en *K* dans la *fig.* 188, ſe voit ſéparément en *R* (*fig.* 189). La partie *S* eſt celle qui tient à la platine du micromètre; la partie *R* contient le pignon, & la tige *T* eſt celle où l'on place la clef; la clef briſée qui ſert à donner le mouvement eſt auſſi exprimée à part dans la *fig.* 190; c'eſt une eſpèce de charnière double formée par deux axes qui ſe croiſent à angles droits & qui ſont mobiles chacun ſur ſes pivots; c'eſt ainſi que l'on ſuſpend

les bouſſoles pour leur donner la liberté de ſe mouvoir en tout ſens, & c'eſt ce qu'on appelle lampe de cardan. Le premier de ces deux axes AX, ſert à faire tourner le micromètre, & l'autre axe qui lui eſt perpendiculaire ſert au mouvement de la clef & de la tige qui s'étend juſqu'à la portée de la main de l'obſervateur. Lorſqu'on tourne la clef & qu'on fait tourner le pignon contenu dans la chappe R (*fig.* 189), la roue dentée VX, étant arrêtée ſur le téleſcope & ne pouvant avoir aucun mouvement, le pignon eſt obligé de changer de place en roulant ſur la circonférence VX, & il fait tourner la platine entière du micromètre ſur laquelle le pignon eſt fixé; par ce moyen l'on place la ligne des centres ſur laquelle ſe meuvent les deux verres, dans la direction de l'objet que l'on veut meſurer, à quelle inclinaiſon que ce ſoit, par exemple, pour meſurer la diſtance de Vénus au bord du ſoleil, qui en eſt le plus proche (2131).

fig. 189.

Meſure de l'inclinaiſon. *fig.* 189.

2446. Pour connoître l'inclinaiſon que donne au micromètre le mouvement du pignon R (*fig.* 189), ſur la circonférence dentée VX, le bord de l'équerre ſe termine en bizeau & porte un trait qui ſert d'index & marque ſur les diviſions de la circonférence VX les degrés d'inclinaiſon; on marque zéro ſur cette circonférence quand la platine eſt ſituée verticalement & que les deux verres ont leurs centres ſur une ligne perpendiculaire à l'horizon; car alors les diſtances que l'on meſure avec ce micromètre ſont des portions du vertical; au contraire on marque 90° ſur la roue dentée lorſque les deux règles mobiles ſont ſituées horizontalement ou font avec le vertical un angle droit; car alors les lignes qu'on meſure avec le micromètre ſont parallèles à l'horizon; on eſt obligé de connoître cette inclinaiſon quand on meſure les diamètres de la lune, parce que la ligne des cornes eſt plus ou moins inclinée à l'horizon, ce qui produit une réfraction plus ou moins grande ſur le diamètre de la lune (2246).

2447. Le téleſcope que nous venons de décrire

avec ſon micromètre objectif, eſt celui que le P. Pezenas fit faire à Londres vers 1755, pour l'obſervatoire de la marine à Marſeille ; il a deux pieds de foyer & l'objectif en a 40 ; nous allons en décrire un autre de Dollond, qui n'a qu'un pied de foyer, & dont la ſtructure eſt un peu différente, il eſt de 1760 ; nous abrégerons la deſcription, dont on doit avoir une idée par celle qui précède.

Héliomètre d'un pied. *Fig.* 193.

Le micromètre objectif que Dollond avoit coutume d'appliquer à ſes téleſcopes d'un pied eſt repréſenté dans la *fig.* 193, il eſt vu dans une ſituation renverſée ; ce qui fait qu'on ne diſtingue pas les deux platines mobiles. Le cercle *AB* a 2 pouces 5 lignes de diamètre, meſure de Paris, & les verres *C*, *D*, 1 pouce 11 lignes d'ouverture lorſqu'ils ſont réunis. Le cercle de cuivre *ES* a 4 lig. de hauteur pour s'ajuſter dans le tuyau du téleſcope, & la platine fixe du micromètre eſt arrêtée par pluſieurs vis ſur ce bout de tuyau qui s'ajuſte au téleſcope.

Les deux vis *G*, *H*, ſont à 14 lignes de diſtance l'une de l'autre, elles ont 18 lignes de longueur & 3 lignes de diamètre, & elles portent 42 pas ou filets ſur chaque pouce. Ces vis ſont appuyées par leur baſe ſur deux pointes *I* & *K*, fixées dans des tenons qui tiennent ſur la plaque fixe du micromètre : elles paſſent enſuite dans des écrous *L*, *M*, mobiles, qui conduiſent chacun une des deux platines mobiles du micromètre au travers d'une longue ouverture pratiquée dans la platine fixe pour laiſſer paſſer les écrous ; ces deux vis tournent à contre-ſens pour qu'un des écrous puiſſe monter pendant que l'autre deſcend.

2448. Chaque tour de vis eſt diviſé en 35 parties par le moyen de l'aiguille qui tourne ſur le cadran *N* & qui eſt fixée carrément ſur la tête d'une des vis *X*. Au-dedans de la boîte *OP*, chaque vis porte une roue dentée de 54 dents ; ces roues ont 13 lig. de diamètre, elles engrènent l'une dans l'autre, afin qu'une vis ne puiſſe tourner ſans l'autre, & que les deux mouvemens ſoient contraires, mais égaux.

Pour pouvoir faire marquer les tours de vis ſur le cadran Q, tandis que l'aiguille N diviſe chaque tour en 35 parties, la tige de la vis HX porte un pignon de 14 qui engrène dans une roue de 35, portée ſur un pont entre les deux vis; cette roue de renvoi porte un pignon de 5, & engrène dans une roue de 50 dont on voit une portion en Q, par une ouverture de la boîte; cette roue fait un tour quand l'aiguille N en fait 25; & comme la roue qui paroît en Q a ſa circonférence diviſée en 25 parties, chacune marque un tour des vis G & H: chaque écrou L, M, eſt précédé par une lame en forme de petit écrou plus mince, qui ſert à nettoyer la vis, & à diminuer le jeu, en faiſant reſſort contre les pas de la vis.

2449. Lorſque les verres CD ſont d'accord dans le centre de l'ouverture AB, l'une des *platines mobiles* qui porte le verre C, tombe ſur l'extrémité V de la platine fixe, & l'autre en eſt éloignée de 13 lignes; mais à meſure qu'on éloigne les verres, la platine du verre C remonte, comme l'indique la ligne ponctuée RS, & la platine du verre D deſcend pour concourir avec le bord TV de la platine fixe.

Les vis G & H que nous avons repréſentées à découvert, pour en faire voir la ſituation & le jeu, ſont recouvertes chacune par une petite boîte de cuivre repréſentée ſéparément en X (*fig.* 191), qui tient avec pluſieurs vis ſur le tenon I ou K, & ſur la boîte OP qui renferme la cadrature. *Fig.* 191.

Dimenſions de cet héliomètre.

2450. Le grand miroir du téleſcope a 8 pouces $\frac{2}{3}$ de foyer, 2 pouces $\frac{1}{3}$ d'ouverture, & un trou de 9 lig.; le petit miroir a 9 lignes de diamètre, 18 lignes de foyer, il eſt à 10 pouces $\frac{1}{4}$ du grand miroir, quand on regarde ſans héliomètre, & 5 lignes plus près quand le micromètre y eſt. L'oculaire a 3 pouces 7 lignes de foyer, il eſt placé 9 lignes en-deçà de la ſurface du grand miroir, du côté de l'œil; le diaphragme eſt placé 17 lignes plus loin, il a 6 lignes d'ouverture; le petit oculaire qui a 9 lig. de foyer, eſt à 2 pouces $\frac{1}{3}$ de l'autre oculaire,

il a 7 lignes d'ouverture ; les deux oculaires enſemble équivalent à un ſeul qui auroit ſix lignes de foyer. L'équipage le plus fort a deux oculaires de 2 pouces 4 lig. & de 10 lig. $\frac{1}{2}$ de foyer, à 25 lig. l'un de l'autre ; ils équivalent enſemble à un oculaire de 3 lig. de foyer. L'œilleton eſt à 9 lig. du dernier oculaire dans l'équipage le plus foible, & a 6 lig. dans l'équipage le plus fort. L'objectif qui ſert de micromètre, a 10 ou 12 pieds de foyer environ.

2451. L'objectif que l'on applique au téleſcope, & qui en forme le micromètre, détermine ſeul la valeur des angles que l'on meſure, par la diſtance des deux moitiés d'objectif comparée à la longueur focale de cet objectif ; il eſt vrai que les miroirs accourciſſent cette longueur du foyer, puiſqu'un objectif de 40 pieds ſe réduit à un téleſcope de 2 pieds ; mais les miroirs ne font qu'abréger le chemin que les rayons ont à faire pour ſe réunir, ſans changer l'angle que les rayons font entre eux ; ainſi l'écartement des deux moitiés d'objecjectif ſera exactement le même pour meſurer le diamètre du ſoleil, que ſi ces vêrres étoient employés à former un ſimple héliomètre en forme de lunette ordinaire (2435). (*Mém. de Marſeille* 1755, *pag.* 93).

2452. En effet les miroirs du téleſcope, auſſi bien que les oculaires d'une lunette ordinaire, contribuent à groſſir, à étendre les images, mais ils ne changent rien à la meſure des angles compris entre les différentes parties de l'objet ; on a vu (2435) que dans l'héliomètre ſimple l'écartement des objectifs, néceſſaire pour meſurer le diamètre du ſoleil, eſt égal à l'eſpace même qu'occupe au foyer du verre le diamètre du ſoleil : quelque nombre d'oculaires qu'on applique à ce foyer pour rendre les rayons plus convergens, on ne change point cet eſpace abſolu, on le voit ſeulement ſous un plus grand angle ; il en eſt de même de ceux qu'on applique au téleſcope ; les deux rayons venus parallèlement par les centres des objectifs, détermineront encore l'angle ſous lequel doit paroître la diſtance

de ces deux rayons ; les miroirs & les oculaires ne feront qu'en dilater les différentes parties, ſans en changer l'angle viſuel.

2453. De-là vient l'avantage d'appliquer à l'héliomètre un objectif d'un très-long foyer ; les images y ſont plus grandes, plus diſtinctes, plus lumineuſes, & par conſéquent plus aiſées à meſurer exactement ; la diſtance des objectifs étant plus grande, ils auront plus d'eſpace à parcourir pour meſurer les angles ; un cinq centième de pouce qui eſt à peu-près la plus petite quantité dont on puiſſe s'aſſurer ſur une diviſion, ne répond qu'à $51'''$ avec un objectif de 40 pieds (2447).

Méthode pour eſſayer des verres.

2454. Comme il eſt extrêmement difficile d'employer, de faire mouvoir & d'eſſayer une lunette de 40 pieds, M. Short ſe ſervoit d'un téleſcope ; en effet les objectifs étant adaptés à un téleſcope qui en raccourcit le foyer, on juge de la bonté du verre par la netteté avec laquelle on voit l'objet, & l'on eſtime la longueur de ſon foyer par la quantité dont il faut rapprocher le petit miroir du grand, pour voir diſtinctement, lorſque l'objectif y eſt adapté.

Attentions néceſſaires.

2455. Pour reconnoître ſi les deux moitiés d'objectif ſont bien diſpoſées ſur leurs platines, ſi elles ſont bien dans le même plan, ſi elles ne ſont ni trop éloignées ni trop voiſines de l'axe du mouvement ; il faut voir ſi quand elles ſont réunies en un ſeul objectif elles forment une ſeule image, ſans aucune duplicité ni confuſion ; pour cela on regarde une petite étoile ; les deux verres étant d'abord écartés, on la voit auſſitôt double ; mais en rapprochant les deux verres, les deux étoiles doivent ſe réunir en une ſeule, qui eſt exactement de même grandeur que chacune des deux étoiles que l'on voyoit auparavant ; ſi on les apperçoit paſſer l'une à côté de l'autre ſans ſe toucher ou ſans ſe confondre parfaitement, on en conclud que les verres ont beſoin d'être un peu changés par le moyen des vis de preſſion : on verra par diverſes épreuves, s'il faut les ſerrer ou les relacher, les éloigner ou les rapprocher ;

peut-être ſera-t-on obligé d'uſer les verres pour pouvoir les approcher l'un de l'autre, ou d'augmenter l'épaiſſeur des lames qui les ſéparent pour écarter leurs centres, ce qui ſeroit néceſſaire ſi l'on avoit trouvé que les images ſe croiſent & ſe débordent, enſorte que l'image rendue par le verre ſupérieur, ſoit plus baſſe que celle du verre inférieur; mais avant que de recourir à ces remèdes qui ſont plus difficiles, il faudra s'aſſurer parfaitement que la duplicité d'image ne vient pas du plan dans lequel ſont les verres, car on pourroit la corriger en lâchant les vis de preſſion, ou en éloignant de la platine un des côtés du verre, par l'épaiſſeur d'un papier ou d'un corps encore plus mince.

Parallaxe optique.

2456. Le plus grand inconvénient du micromètre objectif dans le téleſcope, eſt la parallaxe optique des objets que l'on regarde : je ſuppoſe que les deux images du ſoleil ſe touchent parfaitement lorſqu'elles ſont au milieu du champ, & ſur l'axe même du téleſcope; les deux bords ſe quitteront lorſque le ſoleil s'éloignera du milieu, ou que l'œil de l'obſervateur changera, parce que le rayon viſuel paſſera entre les deux images; quelquefois même il arrive que ſans changer la ſituation de l'œil ni de l'objet, on voit les deux bords de l'objet ſe mordre & ſe quitter alternativement. Pour éviter, autant qu'il eſt poſſible, le danger de cette parallaxe, il faut avoir une croiſée de fils au foyer des verres, & n'obſerver le contact des objets que quand on les voit ſur cette croiſée, c'eſt-à-dire, au milieu du champ du téleſcope; il faut auſſi mettre à l'extrémité du tuyau des oculaires un *œilleton* ou un très-petit trou qui aſſujétiſſe tellement l'œil au même point, qu'on ne puiſſe jamais voir l'objet obliquement.

Le réticule & l'œilleton y remédient.

2457. Il arrive auſſi par l'effet de la chaleur ſur le tuyau que le diamètre du ſoleil paroît plus grand le ſoir que le matin, & l'on eſt obligé alors de rapprocher le petit miroir du grand pour rendre les images plus nettes, & retrouver dans le diamètre du ſoleil les mêmes parties. Ainſi le même nombre de parties ne

vaut pas toujours le même nombre de ſecondes, & il faut tenir compte de cette différence dans les comparaiſons que l'on fait entre le diamètre du ſoleil & les autres quantités meſurées, ou ne comparer entre elles que des meſures faites à un même degré de chaleur. *Mém. préſentés à l'acad.* V. 375.

2458. J'aurois ſouhaité de parler ici des inſtrumens propres à obſerver ſur mer, & ſur-tout de l'octant à réflexion; mais ce livre n'eſt déja que trop long: voyez le Traité de Navigation de M. Bouguer, édition de M. de la Caille, l'Optique de Smith, & le P. Pezenas, (*Mém. de Math. & de Phyſ. redigés à l'obſervatoire de Marſeille année* 1755, *première partie*; *à Avignon*).

DES HORLOGES ASTRONOMIQUES.

2459. Pour connoître le temps vrai d'une obſervation (960), l'on n'avoit autrefois d'autre moyen que d'obſerver la hauteur du ſoleil ou d'une étoile (1030). Ce fut vers l'an 1300 que commença l'uſage des horloges à roues dentées, (voyez *le Traité d'Horlogerie* de M. le Paute, 1755 *in*-4°. chez Samſon); mais ce ne fut que deux ſiècles après qu'elles furent aſſez communes pour être employées par des aſtronomes.

2460. Dans les obſervations de Waltherus faites vers l'an 1500 & publiées par Schoner en 1544, on lit, (*pag.* 50) que l'horloge dont il ſe ſervoit étoit très bien réglée, que d'un midi à l'autre elle ſe retrouvoit parfaitement d'accord avec le ſoleil, & que les temps marqués ſur l'horloge étoient preſque les mêmes que ceux qu'on tiroit du calcul. Je crois qu'il ne faut entendre ceci que de la préciſion d'environ une minute.

Tycho-Brahé avoit 4 horloges qui marquoient les minutes & les ſecondes de temps; la plus groſſe n'avoit que trois roues; dont la première & la plus grande avoit 3 pieds de diamètre, & 1200 dents; on ſe ſervoit toujours de deux horloges à la fois. Hévélius employa auſſi les meilleures horloges de ſon temps; mais

ces



Fig. 103.



Fig. 101.



by Google

Digitized by Google

ces machines étoient bien imparfaites avant que M. Huygens eût imaginé en 1656 d'y appliquer le ſeul régulateur fixe qu'il y ait dans la nature ; je veux dire les oſcillations du pendule, (voyez *Horologium oſcillatorium* 1673, *& le Traité d'Horlogerie de M.* Lepaute, *pag.* 273).

2461. Je n'entrerai pas ici dans le détail de la conſtruction des horloges à pendule (a), il faut en voir la deſcription dans les Traités d'horlogerie de M. Thiouſt, du Pere Alexandre, de M. Lepaute, de M. Berthoud. Je dirai ſeulement que pour avoir une bonne horloge à ſecondes, la plus ſimple de toutes, on peut ſe contenter de 4 roues, de 120, 100, 60, 30 dents, & de 3 pignons de 10 ailes chacun. L'échappement de Graham eſt celui que je conſeillerois, parce qu'il a la propriété de conſerver l'huile : encore eſt-il néceſſaire de lui en donner tous les trois ans, ou à peu-près.

2462. LES VERGES DE PENDULE qui ne ſont compoſées que d'une ſimple règle de fer, s'allongent d'environ un cinquième de ligne pour 30 degrés du thermomètre, en ſorte qu'étant réglées en été elles peuvent avancer en hiver de 20″ par jour ; il eſt donc important pour un aſtronome d'avoir une verge de pendule qui ſoit compoſée de manière à corriger cette dilatation des métaux ; on trouvera pluſieurs méthodes pour cet effet dans les livres que je viens de citer ; voici celle que Harriſon imagina dès 1726 & qui eſt ſans contredit la plus ſûre de toutes celles qui ont été propoſées. M. Graham l'exécuta en 1740 pour Milord Maclefield : toutes les horloges de l'obſervatoire royal d'Angleterre & des meilleurs aſtronomes de Londres, ſont compoſées ſur ce principe ; M. Lepaute, Horloger

Compoſition du pendule.

(a) Bien des perſonnes les appellent ſimplement des *Pendules*, en prenant la partie pour le tout ; mais le pendule n'eſt que le régulateur de l'horloge, (*fig.* 197) ; & les aſtronomes plus exacts dans l'uſage des termes, diſent ſouvent une *Horloge à pendule*, & non pas ſimplement une *Pendule*.

du Roi, & M. Berthoud, à Paris, en ont fait pour un grand nombre d'aſtronomes & de curieux; elles réuſſiſſent de la manière la plus complette (2465).

Dimenſions du pendule compoſé. Fig. 197.

2463. Le pendule compoſé de 9 verges eſt repréſenté dans la figure 197, ou il eſt ſuppoſé coupé par le milieu à cauſe de ſa trop grande hauteur; le reſſort de ſuſpenſion *SR* a 27 lignes depuis la goupille *R* juſqu'à la goupille *S*; mais le point où eſt ſerré le reſſort dans une pince de la cage du mouvement eſt 5 lignes $\frac{1}{2}$ plus bas que la goupille *R*. La traverſe *AA* étant de cuivre & les verges de fer *AB* arrêtées chacune par un écrou au-deſſus de la traverſe de cuivre, il y a 5 lignes $\frac{1}{2}$ de cuivre depuis la goupille *S* juſqu'au deſſus de la traverſe *AA*. De-là il ſe trouve 33 pouces 2 lignes de fer juſqu'au bas de la traverſe inférieure de cuivre *BB* où les verges de fer ſont *également arrêtées*; le chaſſis extérieur *AABB* eſt ſuſpendu au reſſort *BS*. Les verges de cuivre 1, 1, ſont aſſemblées en *DD* par une traverſe de cuivre qui porte ſimplement ſur la première traverſe *BB*; depuis le deſſous de la traverſe inférieure de cuivre *BB* juſqu'au ſommet des verges de cuivre, 1, 1, il y a 32 pouces 3 lignes; c'eſt ſur le ſommet ou à l'extrémité ſupérieure de ces premières verges qu'eſt appuié le deſſous de la traverſe de cuivre *FF* qui aſſemble le ſecond chaſſis de fer; le ſommet de ces verges n'eſt point arrêté dans la traverſe, il eſt reçu ſeulement dans deux petites concavités pratiquées dans ſon épaiſſeur. Les 2 verges de fer marquées 2, 2, ſont viſſées & goupillées dans la traverſe *FF*, de même que dans la traverſe inférieure de cuivre *OO*. A compter du deſſous de cette traverſe *FF* il y a 31 pouces 7 lignes de fer juſqu'au milieu de la traverſe inférieure *OO* où elles ſont goupillées pour former avec la traverſe ſupérieure un ſecond chaſſis, au dedans du premier. Depuis le milieu de l'épaiſſeur de la traverſe inférieure *OO* juſqu'au milieu de la troiſième traverſe ſupérieure *GG* qui eſt appuyée ſur les verges de cuivre 3, 3, & qui porte la lentille, il y a 31 pouces 5 lignes

de cuivre ; les ſecondes verges de cuivre 3, 3, ſont goupillées dans leur baſe *OO*, & elles ſupportent en haut le deſſous de la traverſe *GG*, où elles entrent dans deux petites cavités. A cette même traverſe *GG* eſt goupillée la verge de fer *PE* qui deſcend en paſſant librement dans les traverſes inférieures & qui porte la lentille ; elle a 39 pouces $\frac{1}{4}$ juſqu'au bord inférieur de la lentille ; mais ſur cette longueur il y a 35 $\frac{1}{4}$ pouces de fer, & 3 $\frac{1}{2}$ de cuivre, à cauſe d'une pièce de cuivre *LLMM*, dont nous allons parler Le diamètre *LE* de la lentille eſt de 6 pouces 11 lignes, ſon épaiſſeur 1 pouce 10 lignes $\frac{1}{2}$; elle pèſe 14 livres $\frac{1}{2}$ & la verge compoſée en pèſe 5 $\frac{1}{2}$, le total eſt de de 20 livres.

2464. Suivant les expériences de M. Berthoud, (*Eſſai ſur l'Horlogerie* 1763, 2 *vol. in*-4°), la dilatation du cuivre eſt à celle de l'acier, comme 121 eſt à 74 ; en conſéquence de ce rapport il compoſoit des pendules ſemblables avec 1297 lignes d'acier & 293 de cuivre ; mais les proportions deviennent différentes dans la deſcription que j'ai donnée (2463). Dans celle-ci la lentille eſt tenue par deſſous & a la liberté de ſe dilater vers le haut, ce qui exige une compenſation ; il y a de plus un reſſort de ſuſpenſion *RS* dont il faut corriger la dilatation ; c'eſt par expérience qu'il a fallu trouver les dimenſions précédentes ; mais elles peuvent varier un peu à cauſe de l'épaiſſeur ou du diamètre de la lentille, ou parce que le métal des verges ſera plus ou moins forgé & plus ou moins dilatable ; il faudra donc mettre en expérience un pendule conſtruit ſur ces principes pour être aſſuré de ſon exactitude, ou par le moyen d'une étuve, ou par un examen fait en hiver & en été. On peut rendre d'abord les chaſſis plus longs que je ne l'ai dit, & diminuer enſuite les verges intérieures de cuivre 3, 3, ſi l'on trouve que la correction ſoit trop forte & que le pendule avance quand il fait chaud. Lorſque la différence n'eſt plus que d'environ 1″ par jour, on acheve de règler la compenſation par la pièce ſuivante.

Dilatation du cuivre & de l'acier.

La verge de fer *PE* qui porte la lentille eſt terminée par une chappe de cuivre qui la reçoit, & s'y adapte avec une goupille *CC*, ou *LL*; cette chappe de cuivre eſt taraudée en *E* & ſupporte la lentille; lorſqu'on obſerve que le pendule compoſé s'allonge en été, ou, dans une étuve d'expérience, on en eſt quitte pour mettre la goupille *CC* un peu plus bas, par exemple, en *MM*; alors la verge qui porte la lentille ſe trouve avoir une partie *CM* en fer, laquelle auparavant étoit de cuivre, par conſéquent la dilatation totale devient un peu moindre; cette dernière partie de la correction eſt extrêmement ſenſible : car en élevant de 3 pouces la place de la goupille on ne fera retarder que d'une ſeconde par jour le pendule de l'hiver à l'été; ainſi l'on corrigera facilement une erreur d'un dixième de ſeconde.

De la préciſion des horloges.

2465. M. Short, à l'occaſion du paſſage de Mercure obſervé en 1754, aſſure qu'il avoit trouvé par pluſieurs obſervations que ſon horloge n'avoit pas varié de plus d'une ſeconde depuis le 22 Février juſqu'au 6 Mai jour de l'obſervation (*Philoſ. tranſ.* 1753), enſorte qu'avec un pendule ſemblable il eſt poſſible d'avoir une exactitude qui juſqu'alors paroiſſoit incroyable. Les aſtronomes d'Angleterre m'ont aſſuré pluſieurs fois qu'on faiſoit par ce moyen des horloges à pendule qui ne varioient pas de plus de 5″ par année; on doit tout eſpérer des reſſources de l'art, ſur-tout après avoir vu la montre marine de M. Harriſon ne varier que de 2′ en 147 jours de navigation, (*Connoiſſ. des mouv. cél.* 1765, *pag.* 240). M. Berthoud & M. le Roi ont exécuté à Paris de ſemblables ouvrages, & ſoutiennent la gloire de l'horlogerie en France. Nous voyons que M. Picard en 1672 avoit une horloge qui ne varioit pas de 1″ en deux mois, (*Voyage d'Uranibourg*, art. VII). Mais quelle que fut dès ce temps-là l'habilité des horlogers de Paris, on ne pouvoit avoir une ſemblable exactitude que par un hazard bien ſingulier, ou une égalité de température qui eſt fort rare; actuellement

l'exactitude de nos horloges eſt une ſuite néceſſaire des principes ſur leſquels elles ſont conſtruites.

2466. Lorſqu'on aura perfectionné les horloges à pendule, au point d'être aſſuré d'une ou deux ſecondes par année, on aura peut-être un moyen de rechercher les petites inégalités de la rotation de la terre (951). Elles feront connoître les inégalités de la rotation.

2467. Lorſqu'un aſtronome eſt ſeul pour compter les ſecondes en obſervant, il eſt bon, pour ne pas ſe tromper, de regarder le cadran des ſecondes avant & après l'obſervation. Il eſt encore important de s'accoutumer à compter ſi aiſément, qu'on puiſſe marcher, obſerver, écrire, & même parler, ſans ceſſer de compter les ſecondes, & ſans s'y tromper.

2468. Lorſqu'on a une horloge dont l'échappement a peu de chûte, & qui fait trop peu de bruit pour qu'on puiſſe en entendre les vibrations d'un peu loin, il faut néceſſairement avoir un *compteur* ou *valet*, c'eſt-à-dire, une eſpèce d'horloge à timbre, compoſée groſſiérement d'un pendule à ſecondes & de trois roues. La roue qui porte la poulie du poids engrène dans la roue d'échappement; l'arbre de l'échappement porte une autre roue garnie de chevilles des deux côtés, ces chevilles levent alternativement de chaque côté la queue d'un des marteaux des ſecondes; cette roue porte ſur ſon plan un coq ou un bras, qui à chaque tour, c'eſt-à-dire, à chaque minute, rencontre la queue du marteau des minutes qui frappe ſur un ſecond timbre, & par ce coup double avertit que la minute commence: c'eſt ainſi que l'on peut entendre de loin les vibrations de l'horloge aſtronomique, auſſi-tôt que le compteur eſt d'accord avec l'horloge à pendule. Compteur.

2469. On a ſouvent propoſé de faire ſervir les horloges à conduire une lunette pour ſuivre les aſtres aiſément malgré le mouvement diurne; cela ſeroit très-utile pour deſſiner la figure des taches de la lune, pour avoir toujours un aſtre au centre même de la lunette,

Digitized by Google

&c. M. Paſſemant a exécuté pluſieurs inſtrumens ſemblables, on les appelle HÉLIOSTATES ; & il y en a un dans le cabinet de Phyſique du Roi, près le château de la Meute.

Héliostate.

Je finis ici la deſcription des inſtrumens d'aſtronomie ; il me ſuffit d'avoir fait connoître ceux qui ſont uſités actuellement parmi les aſtronomes ; la manière de les conſtruire ſera détaillée par celui qui fera la deſcription de l'art des inſtrumens de mathématiques. Il me reſte à expliquer les différentes vérifications qu'on eſt obligé de faire avant que d'employer ces inſtrumens, avec leur uſage dans l'aſtronomie, pour donner une connoiſſance exacte de la pratique des obſervations ; ce ſera l'objet du Livre XIV.

FIN DU TOME SECOND.

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK AUGSBURG

Bayerische Staatsbibliothek München

Digitized by Google





Fig. 197.



Fig. 195.

Fig. 196.

Tome II. Page 830.

Digitized by Google

Digitized by Google